

- Ophrys muscifera* Huds. auf dem Gleitsch.
Cephalanthera grandiflora Babgt. ebenda.
Iris sibirica L. auf einer feuchten Wiese zwischen Saalfeld u. Eyba.
Lilium martagon L. Im Schlosspark bei Eyba.
Anthericum liliago L. Breternitz (Wilke); Kaulsdorfer und Tauschwitz Weinberge.
Ornithogalum umbellatum L. verwildert in Grasgärten bei Eyba.
Allium fallax Schult. Fischersdorf, Obernitz.
Juncus squarrosus L. Eyba, Karlshaus.
Carex praecox Schreb. am Wege von Saalfeld nach Köditz (gegenüber dem Bahnhofe.)
Andropogon ischaemum L. roter Berg.
Alopecurus fulvus Sm. mit *A. geniculatus* L. an seichten Stellen neben der Saale.
Sesleria coerulea Ard, am Bohlen bei Obernitz und an der Gost bei Fischersdorf.
Avena fatua L. forma *glabrata* Peterm. Felder um den roten Berg bis Pösneck, Röblitz, Kaulsdorf.
Melica ciliata L. Bergabhänge von Obernitz bis Tauschwitz.
M. uniflora Rtz. Eyba und Reschwitz.
Leutenberg, den 15. April 1884.

C. Wiesel.

Beitrag zur Flora von Eisleben.

Von R. Staritz.

(Forts. v. S. 25 d. J.)

Berberideen Vent.

- 39) *Berberis vulgaris* L. in Hecken bei E., auch in der Stadt selbst.

Nymphaeaceen DC.

- 40) *Nymphaea alba* L. wurde von mir im Jahre 1874 in den Ausstichteich an der Ziegelei und dem Weidabache zwischen OR. u. UR. ausgesät. Leider kann ich das Resultat nicht mitteilen. In den Mansfelder Seen, wie Hpe. angiebt, nicht, ebensowenig *Nuphar luteum* Sm.

Papaveraceen DC.

- 41) *Papaver argemone* L. Äcker bei OR., Rollsdorf, Aseleben, Unterriesdorf.
42) *P. hybridum* L. Äcker und am Damme der Kohlenbahn, vom Bahnhofe bis zum Riebeck. Kohlenwerke: Ottilia bei OR., selten, auch am Flegelsberge.
43) *P. rhöas* L. Äcker, überall. Eine eigentümliche Form fand ich am Wege von Unterriesdorf nach Wormsleben. In allen Teilen grösser und etwas fleischiger.
44) *P. dubium* L. Äcker bei OR., UR., Amsdorf, Seeburg, Aseleben, Erdeborn, Helfta, Unterriesdorf u. E.
45) *P. somniferum* L. bei OR. Schraplau. kult.

- 46) *Glaucium flavum* Crtz. am Flegels- (Kärner-) berge, am Abhange zum See, von Joh. Kunze 1870 ausgesät, erscheint jedes Jahr. 1871 sah ich sie hier zuerst. Rossleben a. d. Unstr. Hpe., HpN. G. f.
- 47) *Gl. corniculatum* Curt. Äcker bei Aseleben, Am „Himmelreich“ zwischen Seeburg und Wormsleben.
cornicul. C. v. *tricolor* Bernh. vereinzelt auf den Äckern bei Aseleben.
- 48) *Chelidonium majus* L. Schutthaufen, Zäune, Mauern überall häufig.

Fumariaceen DC.

- 49) *Corydalis pumila* Host. Graspärten bei E., Landwehr, Fellwäsche.
- 50) *C. cava* Schweigs. u. Kört. Hüneburg, Helftaer W.
- 51) *Fumaria officinalis* L. Auf Schutthaufen, Äckern, an Wegen, an Hecken überall.
- 52) *F. Vaillantii* Loisl. Äcker am Bahnhofe b. E., Weinberge zwischen Wormsleben und Seeburg, bei Rollsdorf. OR.
- 53) *Fumaria parviflora* Lmk. Äcker am Hutberge. G. u. Hpe. f. HpN. p. 66.

Cruciferen Juss.

- 54) *Nasturtium officinale* R.Br. Gräben und sumpfige Stellen, B.W., HW., Bornstedt, Kreisfeld, Wimmelburg, E., Helmsdorf, Unterriesdorf, Wormsleben a. d. Seen, Wansleben, Amsdorf, UR., OR., Stedten, Schraplau, Erdeborn.
- 55) *N. silvestre* R.Br. Wälder, feuchte Orte b. E., im Annarodaer Forste.
- 56) *N. amphibium* R.Br. sz. S., ssS., Neckendorfer Thal.
- 57) *Barbarea vulgaris* R.Br. a. d. Heubücke zw. OR. u. UR. einzeln.
- 58) *B. stricta* Andrz. Hohlweg bei OR. einmal.
- 59) *Arabis pauciflora* Grcke. Sondershausen, am Lohe.
- 60) *A. hirsuta* Scop. Kreisfeld, Hüneburg, Eisenbahndamm bei E., OR.
- 61) *Cardamine pratensis* Z. Wiesen überall.
- 62) *Sisymbrium officinale* Scop. Wolferode, E., Helfta, Wormsleben, Amsdorf, UR., OR., u. s. w.
- 63) *S. sophia* L. Auf Schutt, Mauern, brachliegenden Äckern überall.
- 64) *S. Löselyi* L. Stadtgrabenmauer b. E.
- 65) *Alliaria officinalis* Andrz. Stadtgraben b. E. HW., BW. Hecken, Gebüsche zerstreut.

- 66) *Erysimum orientale* R.Br. Kreisfeld, Felder am Bliebisbache, ZW. Unterriesdorf und Oberriesdorf, Seeburg.
- 67) *E. crepidifolium* Rchb. E., besonders a. d. Chlume, Unterriesdorf, Wormsleben nach Seeburg zu. Wird oft den Gänsen schädlich (tötlich).
- 68) *E. virgatum* Roth. am alten Stolberge.
- 69) *Brassica napus* L., *Rapa* L., *oleracea* L. kult.
- 70) *Sinapis arvensis* L. E., OR. Unterriesdorf, Wormsleben, Helfta, Wolferode.
- 71) *Erucastrum Pollichii* Schmp. u. Spen. Bennstedt u. Kölme (Weinberge).
- 72) *Diplotaxis tenuifolia* DC. Äcker a. d. Hüneburg vereinzelt. G., Hpe., HpN. f.
- 73) *Alyssum calycinum* L. Rain b. E., Hüneburg, Hutberg.
- 74) *A. montanum* L. Görsbach zw. Rossla u. Nordhausen.
- 75) *Berteroa incana* DC. E., Rollsdorf, Wansleben, UR., OR.
- 76) *Erophila verna* E. Mey. Schwarzenmolden v. der Neustadt, a. d. Unter- u. Mittehütte u. im BW., Eisenbahndamm zw. d. Bahnhof u. Helfta., Hüneburg.
- 77) *Cochlearia amoracia* L. k. u. verw. z. B. E.
- 78) *Camelina sativa* Crtz. k.
- 79) *C. dentata* Pers. unter *Linum usit.* Urbach bei Heringen (Nordhausen).
- 80) *Thlaspi arvense* L. Äcker zerstreut.
- 81) *Th. perfoliatum* L. Hüneburg, Stadtgraben b. E.
- 82) *Iberis amara* L. Äcker bei OR. G., Hpe. u. HpN. f.
- 83) *Lepidium draba* L. An der Salzke bei der Zuckerfabrik zu Langenbogen bei Kölme. Hpe., HpN. G. f. Hpe. sagt bei Wansleben, Niergsdorf nicht gefunden.
- 84) *L. ruderales* L. Schutthaufen, Strassen, Wege, Mauern allenthalben.
- 85) *Capsella bursa pastoris* Ehrh. Wege, Äcker, Schutthaufen überall.
- 86) *C. procumbens* Fr. Frankenhausen, Artern, E. auf der Seeplatte zw. Erdeborn u. OR. ausgesät, 1872 auch gefunden, ob noch jetzt?
- 87) *Coronopus Ruellii* All. E. Wormsleben, Unterriesdorf, Erdborn, OR. u. UR. in der Nähe der Heubücke.
- 88) *Isatis tinctoria* L. Am Eisenbahndamm nach der Hüneburg zu 1871 einmal. G. Hpe. HpN. f.
- 89) *Neslea paniculata* Dv. Äcker b. E., OR., Erdeborn, UR.
- 90) *Rapistrum perenne* All. Äcker bei OR. nach Hüne-

burg u. Alberstedt zu. G. S., bei Wormsleben, Seeburg.

91) *Raphanistrum lampsana* Gärtner. Äcker fast überall gemein.

92) *Raphanus sativus* L. k.

Cistaceen Dunal.

93) *Helianthemum chamaecistus* Witt. E. BW. HW. OR. Schraplau, UR.

94) *H. fumana* Witt. Bei Steigerthal a. alt. Stolberg.

95) *H. oelandicum* Wellz. v. *tomentosum* Koch Kölme, Bennstedt.

Violaceen DC.

96) *Viola hirta* L. Kurhainenholz, Geistholz, Halden und Wälder bei Bischofroda und Helfta.

97) *V. odorata* L. Wiesen und Grasgärten, auch k., so v. *alba* Bess in OR.

98) *V. canina* L. Wiesen, Steinen, Wälder Triften E., OR., Schraplau, überall.

99) *V. tricolor* L. In ihrem Abarten überall verbreitet.

Resedaceen DC.

100) *Reseda lutea* L. Wege u. Äcker b. E., OR., Schraplau. G. Hpe. HpN. f.

101) *R. luteola* L. sandige Äcker b. OR. Amsdorf, Wansleben. G. Hpe. HpN. f.

102) *R. odorata* L. mitunter den Gärten entflohen in den Dörfern.

Droseraceen DC.

103) *Parnassia palustris* L. Schäferteich b. OR. Igelsumpf. G. Hpe. HpN. S.

Polygaleen Juss.

104) *Polygala vulgaris* Wiesen, Raine, Wälder sehr verbreitet.

105) *P. amara* L. Kyffhäuser u. Rothenburg.

Silenaceen DC.

106) *Gypsophila fastigiata* L. Alter Stolberg, Questenberg bei Rossla.

107) *G. muralis* L. Auf Felsen in der Nähe des Geistholzes (am Wege von Wolferode-Bischofroda). Hpe. HpN. G. f.

108) *Dianthus carthusianorum* L. E. OR. UR. Wansleben, Seeburg. Hpe. HpN. f.

- 109) *D. deltoides* L. alter Stolberg, Pfarrholz b. Wolfrode.
110) *D. superbus* L. Katharinenholz b. E.
111) *Vaccaria parviflora* Mch. E., Hüneburg, OR. UR.
Schraplau, Wansleben. G. Hpe. HpN. f.
(Forts. folgt.)

Flora von Meran in Tirol.

Von Prof. Dr. Entleutner.

(Fortsetzung.)

23. Fam. Rutaceen. Juss.

170. *Ruta graveolens* L. 6—9, Ruinen der Zenoburg (Tappeiner).

171. *Dictamnus fraxinella* Pers. 5—6, Abhänge von Katzenstein bis Burgstall, schwarze Wand bei Lana.

II. Unterklasse. Calycifloren.

24. Fam. Celastrineen. R. Br.

172. *Euonymus europaea* L. 4—6, gemein in Hecken und Gebüsch.

173. *Euonymus latifolia* Scop. 5—6, bei Meran (Tappeiner).

25. Fam. Rhamneen. R. Br.

174. *Rhamnus cathartica* L. 5—6, Brandiser Wasserleitung, Quadrathöfe, Dornsberg. Verbreitet.

157. *Rhamnus frangula* L. (*Frangula alnus* Mill.) 4—6, verbreitet an der Etsch bei Forst, Marling, Lana.

26. Fam. Papilionaceen. L.

176. *Genista tinctoria* L. 6—7, Marlinger Berg bei Josephsberg und Lebenberg.

177. *Genista elatior* Koch. 6—7, verbreitet um Meran (Bamberger).

178. *Genista germanica* L. 4—7, Abhänge bei Katzenstein, Burgstall, Marlinger Berg. Gemein.

179. *Cytisus nigricans* L. 6—7, bei Tscherm's, Marling (Tappeiner), Lana.

180. *Cytisus hirsutus* Scop. 5—6, bei Hafling und Vöran (Tappeiner).

181. *Ononis spinosa* L. 6—7, bei St. Valentin (Isser).

182. *Ononis repens* L. 5—7, Sumpfwiesen bei Untermais, Plaus.

183. *Ononis hircina* Jacq. 6—7, Wiesen bei Algund, Lana.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Staritz R.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Eisleben. 119-123](#)