

- *pratensis* L. Auf Wiesen sehr verbreitet. Mit weisser Blüte im Torfmoor Friendsheim. 4—5.
- *amara* L. An Quellen vom Thale bis in die höhern Alpen. Massenhaft an den mächtigen Wasserquellen, an den Felswänden des Sonnwendjoches. 6—7.
- *trifolia* L. Im Walde hinter der Mariathaler Kirche und von da am Wege nach Aschau am rechten Ufer der Brandenberger Ache, bis zum Kreuzbachwasserfall. 5—6.

(Fortsetzung folgt.)

Flora des Gebietes der oberen Freiburger Mulde.

Von C. Mylius.

(Fortsetzung.)

- Epilobium**) *angustifolium* L., häufig.
- *hirsutum* L., zerstreut (den Standort wechselnd!)
- *parviflorum* Retz., verbreitet.
- *montanum* L., häufig.
- *roseum* Retz., nicht selten.
- *tetragonum* L., an der Bobritzsch bei Reinsberg.
- *palustre* L., hier und da.
- Önothera biennis* L., bisweilen verwildert.
- Circaea lutetiana* L., zerstreut.
- *intermedia* Ehrh., zwischen Nossen und Hirschfeld.
- *alpina* L., Rechenberg.
- Callitriche stagnalis* Scop. u. f. *platycarpa* Kütz., häufig.
- *vernalis* Kütz., häufig.
- *hamulata* Kütz., hier und da
- Lythrum salicaria* L., nicht selten.
- Peplis portula* L., hier und da.
- Herniaria glabra* L., nicht selten,
- Scleranthus annuus* L., gemein.
- Sedum maximum* Sut., häufig.
- *album* L., in Nossen verwildert.
- *acre* L., häufig.
- *boloniense* Loisl., seltener.
- *rupestre* L., Bergschlösschen bei Nossen.
- Saxifraga granulata* L., geht bis Herrndorf, Seifersdorf, Frankenstein; an höher gelegenen Orten sehr selten: Zug.

*) Was Tr. unter dem wenig gebrauchten Namen *E. alpestre* (p. 22) versteht ist *E. trigonum* Schrank.

- Chrysosplenium alternifolium* L., stellenweise, namentlich im oberen Teile.
- *oppositifolium* L., Georgenthal, Seyda a. d. Weiseritz, Thiemen-
dorf, Hertzdorf b. Öderan, Rodichtberg b. Nossen.
- Sanicula europaea* L., Beyermühle bei Siebenlehn.
- Aegopodium podagraria* L., gemein.
- Carum carvi* L., gemein.
- Pimpinella magna* L., Altzella.
- *saxifraga* L., häufig.
- NB. *Oenanthe fistulosa* L. und *aquatica* Lmk., die Tr.
p. 22 angiebt, finden sich im Gebiete nicht.
- Aethusa cynapium* L. häufig.
- Meum athamanticum* Jacq., im oberen Teile, von Freiberg an
gemein.
- Selinum carvifolia* L., im unteren Teile bis Freiberg.
- Angelica silvestris* L., häufig.
- Imperatoria ostruthium* L., Frauenstein, Sayda.
- Anethum graveolens* L., bisweilen verwildert.
- Pastinaca sativa* L., nach den höheren Teilen zu an Häufigkeit
abnehmend.
- Heracleum sphondylium* L., häufig.
- Laserpitium prutenicum* L., Seyda a. d. Weisseritz.
- Daucus carota* L., häufig.
- Anthriscus silvestris* Hoffm., nicht selten.
- Chaerophyllum temulum* L., namentlich im niederen Teile gemein.
- *aureum* L., Frauenstein, Nossen.
- *hirsutum* L., fast überall häufig.
- *aromaticum* L., Niederschona, Linda.
- Conium maculatum*, zerstreut und nur im niederen Teile.
- Hedera helix* L., bei Zollhaus Bieberstein.
- Viscum album* L., Schönerstädt.
- Adoxa moschatellina* L., nicht selten.
- Ebulum humile* Grcke., Frauenstein.
- Sambucus nigra* L., häufig.
- *racemosa* L., häufig, im niederen Teile seltener.
- Viburnum opulus* L., hier und da.
- Lonicera periclymenum* L., verwildert.
- *xylosteum* L., nicht häufig.
- *nigra* L., Frauenstein.
- Diervillia canadensis* Willd., zwischen Freiberg und Weissenborn
verwildert (cf. d. Bl. Jahrg, 1883, p. 75).
- (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenzen.

12) Aus Schmalkalden: (*Mimulus luteus*.) Im Septemberheft Ihrer werten Zeitschrift fand ich einen Aufsatz über *Mimulus luteus*. In

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatschrift](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Mylius C.

Artikel/Article: [Flora des Gebietes der oberen Freiburger Mulde. 156-157](#)