

- l. Pottiaceae.
42. *Barbula* W. & M.
142. *ruralis* Hdw: gemein auf Erde, Dächern u. s. w. 143. *latifolia* Schp: selten an Pappeln. 144. *papillosa* C Müll: selten an Pappeln. 145. *pulvinata* Jur: an alten Bäumen zerstreut zu Ch., C. 146. *subulata* Brd: zerstreut an Abhängen. 147. *unguiculata* Hdw: gemein an Mauern, auf Erde. 148. *fallax* Hdw: selten an kalkhaltigen Orten. 149. *convoluta* Hdw: an einer Mauer bei Westend bei Ch. 150. *muralis* Tim: gemein an Mauern.
43. *Leptotrichum* Hampe.
151. *tortile* Hp: auf nassem Sandboden zerstreut bei Ch., zusammen mit b) *pusillum* Hdw.
44. *Ceratodon* Brd.
152. *purpureus* Brd: gemein an den verschiedensten Orten.
45. *Didymodon* Hdw.
153. *rubellus* Schp: auf der Mauer des Schloßsparks bei Ch.
46. *Pottia* Ehrh.
154. *lanceolata* C. Müll: am N. Abhang der Reitweiner Berge bei C. 155. *minutula* Fürn: auf einem Ausstich beim zoologischen Garten. 156. *truncata* Fürn: gemein auf Äckern. 157. *intermedia* Fürn: selten auf kurzem Rasen bei Westend.
m. Fissidentaceae.
47. *Fissidens* Hdw.
158. *adiantoides* Hdw: auf einer Sumpfwiese im Grunewald, Wald bei C. 159. *taxifolius* Hdw: zerstreut in Wäldern. 160. *osmundoides* Hdw: auf Torf im Grunewald. 161. *bryoides* Hdw: an einem schattigen Abhange der Tamseler Berge bei C.
n. Leucobryaceae.
48. *Leucobryum* Hpe.
162. *vulgare* Hpe: gemein in Wäldern.
o. Weisiaceae.
49. *Campylopus* Brd.
163. *turfaceus* Schp: häufig auf Torfboden bei Ch.
(Fortsetzung folgt.)

Flora von Meran in Tirol.

Von Prof. Dr. Entleutner.
(Fortsetzung von Nr. 4 u. 5 p. 55.)

649. *Veronica spicata* L. 5, gemein an sonnigen Hängen, wie bei Gratsch, Algund; auf dem Küchelberg findet sich häufig: f. *polystachia* und f. *cristata* Koch., letztere Form auch bei Schloß Brandis (v. Üchtritz).
650. *Veronica bellidiodes* L. 6—7, Jocher See, Vigiloch, Muttspitze, Ifinger.
651. *Veronica fruticulosa* L. 6—7, Ifinger (Hausmann).
652. *Veronica saxatilis* Jacq. 6, zwischen Egger und Jocher, Muttspitze, Burgstall (Leybold).
653. *Veronica alpina* L. 7, Zielalpe und Ifinger (Elsmann), Spronserthal.
654. *Veronica serpyllifolia* L. 4, Wiesen am Weg unterm

Berg, grasige Abhänge am Ausgang des Passeierthal, an der Forster Straße. Verbreitet.

655. *Veronica arvensis* L. 4, Grasplätze bei Gratsch, Algund etc. Verbreitet.

656. *Veronica verna* L. 4, Felsplateau unterhalb des Segenbühels, bei Gratsch, Vernauner. Zerstreut.

657. *Veronica triphyllus* L. 1—3, Weinberge und Mauern um Gratsch, Algund, Obermais, Plars, Marling. Gemein.

658. *Veronica agrestis* L. 2, Küchelberg, Passeier.

659. *Veronica Buxbaumii* Ten. 3, bei Meran (Milde).

660. *Veronica hederifolia* L. 1—3, in Weinbergen und an Mauern gemein.

661. *Melampyrum arvense* L. 6, Äcker bei Dorf Tirol.

662. *Melampyrum pratense* L. 6, Wälder des Marlinger Berges, bei Lana, Katzenstein.

663. *Melampyrum sylvaticum* L. 6, bewaldete Abhänge der Muttspitze.

664. *Pedicularis rostrata* L. 7, Zielalpe (Elsmann), Meraner Alpen (Bamberger).

665. *Pedicularis asplenifolia* Floerk. 7, Zielalpe (Elsmann).

666. *Pedicularis tuberosa* L. 6, Vellauer Alpen, Egger, Muttspitze, Zielalpe (Isser).

667. *Pedicularis palustris* L. 5, Sumpfwiesen bei Plaus, Dornsberg.

668. *Pedicularis recutita* L. 7, Zielalpe und Maiseralm (Elsmann und Eschenlohr).

669. *Pedicularis verticillata* L. 6, Passeier (Perini).

670. *Rhinanthus minor* Ehrh. 5, Wiesen an der Etsch, feuchte Wiesen bei Untermais.

671. *Rhinanthus major* Ehrh. 4—5, auf Wiesen verbreitet.

672. *Rhinanthus alpinus* β. *angustifolius*. Ziel- und Spronserthal (Bamberger).

673. *Bartschia alpina* L. 7, feuchte Plätze der Haflinger Alm.

674. *Euphrasia officinalis* L. 5, Untermais, Lana. var. *α. pratensis* bei Algund, Mutthöfe, Passeier.

675. *Euphrasia minima* Schleich. 7, Ifinger (Hausmann).

676. *Euphrasia serotina* Lam. 6, Algund, Marling, Rabland.

677. *Euphrasia lutea* L. 8, Muttspitze, Küchelberg.

68. Fam. Orobancheen. Juss.

678. *Orobanche cruenta* Bert. 6, bei Marling (v. Üchtritz), Wiesen bei Forst, St. Felix, Rabland.

679. *Orobanche scabiosae* Koch. Passeieralpen (Perini).
680. *Orobanche epithymum* DC. 5, Küchelberg, Obermais, Burgstall.
681. *Orobanche rubens* Wallr. Meran (Bamberger).
682. *Orobanche lucorum* A. Br. 6, Untermais, Passeier- und Naifthal.
683. *Orobanche salviae* F. W. 6, am Küchelberg und bei St. Peter auf *Artemisia campestris* (Bamberger).
684. *Orobanche hederae* Vauch. 5—6, Abhänge b. Gratsch und Algund, Küchelberg.
685. *Orobanche minor* Sull. 6, auf einer Wiese bei Dorf Tirol.
686. *Orobanche coerulea* Vill. 6, Lanaer Wasserleitung.
687. *Orobanche arenaria* Borkh. 5—6, Abhänge zwischen Gratsch und Algund.
688. *Lathraea squamaria* L. Schloss Goyen.
- 69. Fam. Labiaten. Juss.**
689. *Mentha silvestris* L. 6, gemein in Gräben.
690. *Mentha aquatica* L. 7, Rabland u. Töll (Isser, Kraft), Gräben bei Untermais.
691. *Mentha sativa* Smith. 7, b. Meran (Kraft), im Passeier.
692. *Mentha gentilis* L. 7, an einem Graben auf dem Weg zur Fragsburg (Kraft).
693. *Mentha arvensis* L. 7, Maisäcker bei Gargazon.
694. *Lycopus europaeus* L. 7, Passeier, Burgstall, Plaus.
695. *Rosmarinus officinalis* L. Verwildert auf dem Küchelberg; blüht den ganzen Winter hindurch.
696. *Salvia glutinosa* L. 6, Katzenstein, Maiser- und Brandiser Wasserleitung; häufig.
697. *Salvia pratensis* L. 4—7, auf Wiesen gemein.
698. *Origanum vulgare* L. 6, verbreitet.
699. *Thymus serpyllum* L. 6—7, Ifinger (Hausmann), Gebirge um Meran.
700. *Thymus pannonicus* All. 5—9, gemein.
701. *Satureja hortensis* L. Unkraut in den Gärten.
702. *Calamintha acinos* Clairv. 6, Algund (v. Üchtritz), Forst, Lana.
703. *Calamintha silvatica* Bramf. 7, Lana, Schloss Brandis.
704. *Clinopodium vulgare* L. 6, Raine bei Algund, Lana.
705. *Melissa officinalis* L. 7, am Weg zum Schloss Tirol (Hausmann).
706. *Nepeta cataria* L. 8, an Wegen, z. B. bei Gratsch.
707. *Glechoma hederacea* L. 2—5, gemein; γ . *villosa* bei Algund.

708. *Melittis melissophyllum* L. 4, Marling (Isser), Schloss Brandis, Burgstall, Katzenstein, Trautmannsdorf.
709. *Lamium amplexicaule* L. 3, in Weinbergen gemein.
710. *Lamium purpureum* L. 1—4, gemein.
711. *Lamium album* L. 1—10, an Zäunen und Hecken verbreitet.
712. *Galeobdolon luteum* Huds. 5, von Lana bis Brandis, Katzenstein, Burgstall.
713. *Galeopsis ladanum* L. 5—8, Äcker bei Dorf Tirol.
714. *Galeopsis angustifolia* Ehrh. Bei Gargazon.
715. *Galeopsis tetrahit* L. 6, bei Lana (Fr. Mayer), an Wegen bei Gratsch, Völlau, Rabland.
716. *Galeopsis versicolor* Curt. 7, Eingang ins Sponserthal, Äcker beim Eggerhof, Partschins (Kraft).
717. *Stachys germanica* L. 8, Etschauen bei Untermais.
718. *Stachys silvatica* L. 6, Schlucht bei St. Valentin, Waldränder beim Weißplatter, Passeier.
719. *Stachys ambigua* Smith. 7, bei Lana (Fr. Mayer).
720. *Stachys palustris* L. 7, Maiser Waal, Etschmöser, bei Lana.
721. *Stachys recta* L. 5, Küchelberg, Lanaer Wasserleitung, Algund.
722. *Betonica officinalis* L. β . *hirta*. 6, Wälder um Meran (Kraft), Marlinger Wasserleitung.
723. *Leonurus cardiaca* L. 7, an Wegen zwischen dem Badl und Plaus.
724. *Scutellaria galericulata* L. 7, Gargazon (Hausmann), Passeier (Braitenberg).
725. *Brunella vulgaris* L. 6, gemein auf Triften und an Wäldern.
726. *Brunella grandiflora* Jacq. 6, Lana, Völlauer Thal etc. Verbreitet.
727. *Brunella alba* Pall. 6, Marling (Tappeiner), unterhalb der Brunnenburg. var. *laciniata* an den Abhängen zwischen Gratsch und Algund.
728. *Ajuga reptans* L. 2—5, auf Wiesen gemein.
729. *Ajuga genevensis* L. 3—5, gemein an Wegen und Weinbergmauern.
730. *Teucrium chamaedrys* L. 6, Küchelberg, Gratsch, Algund, Vellau, Lana (Kraft).
- 70. Fam. Verbenaceen. Juss.**
731. *Verbena officinalis* L. 6, Küchelberg, Algund, Plars, Dornsberg. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Entleutner

Artikel/Article: [Flora von Meran in Tirol 105-108](#)