

gemein, den ganzen Sommer, an geschützten, sonnigen Lagen auch im Winter blühend.

Erigeron canadensis L. An Wegen und auf bebautem Boden sehr verbreitet. 8—9.

„ *acris* L. An sonnigen Hügeln mit kurzem Grase, an Wegen und magern Triften bis in die Voralpen häufig. 5—6.

„ *droebachensis* Müller. Auf sandigem Boden, vorzüglich an Flussufern. Alluvium an der Innbrücke bei Rattenberg, nächst der alten Schiessstätte. Bramböckau in Kramsach am Wege gegen die Eisenbahnbrücke zu Innufer in der Radfelder und Kundler Au. 7—8.

„ *alpinus* L. Auf allen Alpen gemein. 7—8.

„ *uniflorus* L. Amtmoos und Markspitze, auch auf dem Plateau des Latschkopfes südlich vom Jochsee am Sonnwendgebirge. Am Galtenberg in Alpbach. 7—8.

Solidago virga aurea L. An trocknen, waldigen Orten gemein. 6—8.

Buphtalmum salicifolium L. An sonnigen Hügeln vom Thale bis in die Alpen. Am Wege zum Reinthaler See in Voldöpp. Alpe Zerein massenhaft. 7—8.

Pulicaria dysenterica Gaert. Voldöpp an der längs der Sümpfe gegen den Wald ziehenden Fahrstrasse. 6—8.

Bidens cernua L. An Gräben und Sümpfen gemein. Voldöpper Sumpf in der Nähe des an der Angerberger Strasse stehenden Häuschens. 8 - 10.

„ *tripartita* L. Neben voriger an denselben Standorten. 7—10.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Beitrag zur Flora des Steigerwaldes.

Von Dr. Heinrich Sippel.

Fortsetzung von No. 3 d. J. p. 39.

Polygalaceen Juss.

Polygala vulgaris L. — *P. comosa* Schk. n. s. Bei E. — *P. amara* L. Sumpfwiesen bei Aschbach. E. Hd.

Silenaceen DE.

Gypsophila muralis L.

Tunica proliifera Scop. (*Dianthus prolifer* L.)

Dianthus armeria L. zwischen E. und B. — *D. carthusianorum* L. — *D. deltoides* L. — *D. superbus* L.

Saponaria officinalis L. s.

Vaccaria parviflora Mch. s. s. Auf einem Acker am Schellenberg.

Cucubalus baccifera L. s. s.

Silene nutans L. — *S. otites* Sm. s. — *S. vulgaris* Gcke.
(*S. inflata* Sm.) — *S. noctiflora* L. s. E. Untersambach.

Viscaria vulgaris Röhl. (*Lychnis viscaria* L.) s. bei Obersteinach. Kleingressingen. — *L. flos cuculi*.

Melandryum album Gcke. (*Lychn. vespertina* Sibth.) s. Hohn.
— *M. rubrum* Gcke. (*L. diurna* Sibth.) Bachufer zwischen B. und E.

Agrostemma githago L.

Alsinaceen DC.

Sagina procumbens L. Auf feuchten Äckern und Triften. —
S. subulata Torr. und Gray. s. Schöneich, Hohn. Seramsmühle. Wüstenbuch. — *S. nodosa* Fenzl. s. s. Gösdorf. —
S. apetala L. s. s. bei Grossgressingen.

Spergula arvensis L. — *S. pentandra* L. s.

Spergularia rubra Presl. (*Lepigonum rubrum* Whb.) Bei Neudorf auf Äckern.

Möhringia trinervia Clairv. in feuchten Wäldern, an Mauern bei Ebrach.

Arenaria serpyllifolia L.

Holosteum umbellatum L.

Stellaria glauca With. s. s. An einem Wassergraben bei E.
— *S. nemorum* L. — *S. media* Cyr. — *S. holostea* L.
— *S. graminea* L. — *S. uliginosa* Murr.

Malachium aquaticum Fries.

Cerastium glomeratum Thuill. bei E. — *C. var. glutinosum* Fries. s. am Schmierofen zwischen Schmerb und Neudorf. — *C. semidecandrum* L. — *C. triviale* Link. — *C. arvense* L.

Linaceen DE.

Linum usitatissimum L. — *L. catharticum* L.

Radiola linoides Gmel. Strassengraben zwischen Heuchelheim und Rambach, Wüstenbuch, Ziegelsambach.

Malvaceen RBr.

Malva alcea L. — *M. silvestris* L. s. Oberschwarzach. —
M. neglecta Wallr. (*M. vulgaris* Fries.)

Tiliaceen Juss.

Tilia grandifolia Ehrh. — *T. parvifolia* Ehrh.

Hypericaceen DC.

Hypericum perforatum L. — *H. humifusum* L. — *H. quadrangulum* L. — *H. tetrapterum* Fries. Aschbach. — *H. pulchrum* L. h. — *montanum* L. Koppenw. Aschb. — *H. hirsutum* L. ebenda.

Aceraceen DC.

Acer pseudoplatanus L. — *A. platanoides* L. — *A. campestre* L.

Geraniaceen DC.

Geranium pratense L. — *G. palustre* L. s. Bachufer bei Wustviel, Altengrub, Untersteinb., Rambach. — *G. pyrenaicum* L. s. s. Grasplätze zu Aschbach. — *G. pusillum* L. Auf Schutt. — *G. dissectum* L. E. B. — *G. sanguineum* L. Zabelstein. — *G. columbinum* L. n. s. — *G. molle* L. s. Prichsenstadt. Ilmbach. — *G. Robertianum* L.

Erodium cicutarium L'Hérit.

Balsaminaceen A. Richard.

Impatiens noli tangere L. E. Schmerb., Gensfeld, Koppenwind, Kleinbirkach.

Oxalidaceen DC.

Oxalis acetosella L.

Diosmeen A. Juss.

Dictamnus albus L. (*D. fraxinella* Pers.) s. Auf der Wibelsberger Höhe.

Celastraceen RBr.

Evonymus europaea L.

Rhamnaceen RBr.

Rhamnus cathartica L. — *Frangula alnus* Mill. (*Rhamnus frangula* L.)

Papilionaceen L.

Sarothamnus vulgaris Wimm. h. Obersteinach, Ilmenau etc. etc. *Genista tinctoria* L. — *G. germanica* L.

Ononis spinosa L. — *O. repens* L.

Anthyllis vulneraria L.

Medicago sativa L. — *M. falcata* L. — *M. lupulina* L. *Melilotus albus* Desrouss. — *M. officinalis* Desr.

Trifolium pratense L. Überall, wird auch mit Getreide gesät.
— *T. medium* L. Aschbach. — *T. alpestre* L. — *ochroleucum* L. Ziegelsambach. — *T. arvense* L. — *T. fragiferum* L. Aschbach. — *T. montanum* L. Ziegelsambach.
— *repens* L. — *T. hybridum* L. — *T. spadiceum* L. Feuchte Wiesen. — *T. agrarium* L. An Waldrändern. Aschbach. — *T. procumbens* L. Wiesen. Aschbach. — *T. minus* Sm. (*T. filiforme* aut.) Aschbach.

Lotus corniculatus L. — *L. uliginosus* Schk. Feuchte Wiesen, Gräben, Aschbach Hd.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Astragalus danicus Retz. s. s. Sulzheim. — *A. glycyphyllos* L. E. Hd. Aschbach. — *A. cicer* L. s. s. Sulzheim. Michelau. Oberschwarzach.

Coronilla varia L.

Hippocrepis comosa L. s. s. Sulz.

Onobrychis sativa Lam.

Ervum pisiforme Pet. s. Waldränder am Stallberg, Kammerförster Ranger bei Breitbach. — *E. silvaticum* Pet. s. Kohlsteig bei E. Hd. — *E. cassubicum* Pet. n. s. Aschbach. — *E. hirsutum* L. — *E. tetraspermum* L.

Vicia dumetorum L. s. s. Am Fusse der Hallburg. — *V. cracca* L. — *V. tenuifolia* Roth, s. zwischen Hohen- und Kleinbirkach. — *V. villosa* Roth, Kornfelder. — *V. sepium* L. — *V. sativa* L. Aschbach. Unter dem Getreide. — *V. angustifolia* Roth.

Lathyrus nissolia L. s. s. Auf Äckern bei E. — *L. sativus* L. s. s. Bimbach. — *L. hirsutus* L. s. s. bei Kammerforst und Breitbach. — *L. tuberosus* L. Buch. Hd. Kammerforst. Breitbach. — *L. pratensis* L. — *L. silvester* L. B. nach E. Aschbach. — *L. vernus* Bernh. (*Orobus vernus* L.) — *L. montanus* Bernh. (*O. tuberosus* L.) — *L. niger* Bernh. (*O. niger* L.) s. Zabelstein. Stollberg. Kammerforst. Rambach.

Amygdalaceen Juss.

Prunus armeniaca L. Kultiviert. — *P. spinosa* L. — *P. domestica* L. Kultiviert und wild. — *P. insititia* L. Kult. und wild. — *P. cerasifera* Ehrb. Kult. und wild. — *P. avium* L. — *P. cerasus* L. — *P. padus* L. Mittelsteinach. Aschbach.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Sippel Heinrich

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Flora des Steigerwaldes. 78-81](#)