

Verzeichnis Pommerscher Pflanzen mit besonderer Berücksichtigung Stettins.

Von C. Müller.

I. Ranunculaceae.

Clematis vitalba L. zu Hecken verwendet. VI—VII.

Thalictrum aquilegifolium L. bei Stargardt. VI. — T. minus L. bei Stettin an Wegen. Heringsdorf: Langeberg. V—VII. — T. flavum L. auf Wiesen im Gebüschen. VII.

Hepatica triloba Gil. in Buchenwäldern, fl. rubro bei Löcknitz am Burgwall. III—V.

Pulsatilla vulgaris Mill. Rügen: Jasmunder Fähre häufig. V—VI. — P. vulgaris × pratensis ebenda. — P. pratensis Mill. trockene Triften und Hügel, Eichberge, Schrey etc. IV—VI. P. vernalis Mill. Nadelwälder bei Stepenitz und Gollnow. IV—VI. — P. patens Mill. Nadelwälder bei Stepenitz und Gollnow. IV—V.

Anemone silvestris L. sonnige Hügel im Garzer Schrey. IV—anfangs VI. — A. nemorosa L. Laubwälder überall. III—V. — A. ranunculoides L. feuchte Laubwälder. Julow, Eichberge, Schrey. IV—V.

Adonis autumnalis L. Äcker bei Pyritz, Pass. VII—IX. — A. vernalis L. auf dem Schlossberge am Pass bei Pyritz. V. — A. aestivalis L. auf Äckern des Julow bei Stettin hin und wieder. VII—VIII.

Myosurus minimus L. auf feuchtem Lehmboden. Julow — Scholwin. V—VII.

Batrachium aquatile F Mey. stehende Gewässer. VI—VIII. — B. divaricatum Wimm. stehende Gewässer, seltener als vor. VI—VIII. — B. fluitans Wimm. fliessende Gewässer: Stettin, Dammsche See, Gollnow, Colberg. VI—VIII.

Ranunculus flammula L. Gräben, Teiche, gemein. VI—X. R. reptans L. Seen bei Heringsdorf und Wollin. R. lingua L. Gräben, Teiche. Usedom, Wollin, bei Stettin am Kespersteig. VII—VIII. — R. auricomus L. Wälder, Gebüsche, Wege und am Strand. IV—V u. VII. — R. acer L. Wiesen, Wälder. V—X. — R. lanuginosus L. feuchte, schattige Laubwälder: Julow, Schrey. V—VI. — R. polyanthemos L. feuchte Wälder hin und wieder. V—VI. — R. nemorosus DC. schattige Laubwälder, sehr selten: Buchheide bei Stettin. (Utpadel) V—VI. — R. repens L. Gebüsche, Gräben. V—IX.

— R. bulbosus L. Triften, Wege. IV—VI. — R. sardous Crantz. lehmige Äcker, hin und wieder: Julow, Coeslin V—VIII.

- *R. arvensis* L. lehmige Äcker. V—VII. — *R. sceleratus* L. feuchte Orte. VI—XI.
Ficaria verna Huds. Schattige Orte III—V.
Caltha palustris L. Wiesen IV—VI, X.
Trollius europaeus L. Wiesen an der Madue & Radow. V—VI.
Helleborus niger L. in Anlagen angepflanzt.
Nigella arvensis L. Äcker: Schrey. VII—IX. — *N. sativa* L. verwild. VI—VII. — *N. damascena* L. verwild. V—VII.
Aquilegia vulgaris L. Stettin auf Festungswällen. VI—VII.
Delphinium consolida L. Äcker. V—X.
Actaea spicata L. schattige Laubwälder: Julow etc. V—VI.

Berberidaceae.

- Berberis vulgaris* L. kahle, unbebaute Hügel bei Stettin. V—VI.

Nymphaeaceae.

- Nymphaea alba* L. Teiche, Gräben, Flüsse, Landseen. VI—VIII.
Nuphar luteum Sm. Teiche, Gräben, Landseen. VI—VIII.

Papaveraceae.

- Papaver argemone* L. Äcker V—VII. — *P. rhōas* L. Äcker. V—VII. — *P. dubium* L. sandige Äcker, selten. V—VII.
P. intermedium Becker. Zahden und Schillersdorf. V—VII.
P. somniferum L. verwild. VI—VIII.
Chelidonium majus L. Schutt, Zäune. IV—X.

Fumariaceae.

- Corydalis cava* Schwgg. u. K. Gebüsche und Grasgärten: Frauendorf, Schillersdorf. IV—V. — *C. intermedia* P. M. E. Gebüsche, Frauendorf, Julow. IV—V. — *C. pumila* Rchb. Polzin (Rauden im Park). IV—V.
Fumaria officinalis L. Äcker, Schutt. V—X.

Cruciferae.

- Nasturtium officinale* R.Br. Quellen, Gräben, Bäche; Schillersdorf, Stettin: Mölln. — *N. amphibium* R.Br. Ufer, stehende Gew. V—VII. — *N. silvestre* R.Br. Gräben, Äcker, Wege. VI—IX. — *N. palustre* DC. feuchte Orte. VI—IX.

- Barbara vulgaris* R.Br. feuchte Orte. V—VII. — *B. stricta* Andrz. feuchte Orte V—VII. — *B. intermedia* Boreau: Wege, Brachen, Garz a. O. IV—V.
Turritis glabra L. Wälder. VI—VII.

- Arabis hirsuta* Scop. Wälder, Hügel, trockene Wiesen, Wege: Schrey, Radowwiesen bei Retzin. V—VI. — *A. arenosa* Scop. sandige Orte: Stettin und am Strand. VI—VII.
- Cardamine impatiens* L. feuchte, schattige Laubwälder: Buchheide. V—VII. — *C. silvatica* Lk. feuchte Wälder, selten. IV—VI. — *C. hirsuta* L. feuchte Wälder: Buchheide, nicht selten. III—V. — *C. pratensis* L. Wiesen. III—V. — *C. amara* L. Quellen, Gräben. IV—V. — *b. hirta* Wimm. u. Grab. so an trockenen Stellen.
- Dentaria bulbifera* L. Laubwälder: Buchheide. V—VI.
- Hesperis matronalis* L. Gebüsch, Anlagen bei Stettin, Colberg in der Maikuhle. V—VII.
- Sisymbrium officinale* Scop. Wege, Schutt. V—X. — *S. sophia* L. Felder, Wege, Schutt. V—X.
- Stenophragma Thalianum* Celk. auf Brachen. V—X.
- Alliaria officinalis* Andrzej. Hecken. V—VI.
- Erysimum cheiranthoides* L. Ufer, Hecken. V—VI. — *E. orientale* R.Br. hin und wieder auf Schutt. V—VII.
- Brassica rapa* L. verw. VI—X. — *B. napus* L. verw. VI—X. — *B. nigra* Koch verw. VI—VII.
- Sinapis arvensis* L. kultiv. Orte. VI—VII. — *S. alba* L. verwild. VI—VII.
- Erucastrum obtusangulum* Rchb. selten um Stettin, aber meist alle Jahre gefunden. VI—VIII.
- Diplotaxis tenuifolia* DC. Swinemünde, an Wegen und Strassen längs des Hafens bis zur Westmoole, kommt auch nach Stettin mit Ballast. Greifswald VI—IX.
- Dipl. muralis* DC. Äcker, Wege: hin und wieder bei Stettin. V—X.
- Alyssum calycinum* L. Äcker. V—X.
- Berteroa incana* DC. Äcker, Wege. VI—X.
- Erophila verna* E. Mey. Triften, Wege. III—V.
- Cochlearia armoracia* L. feuchte Orte, verw. Stettin, Penkun. VI—VII.
- Camelina sativa* Crantz. Raine. VI—VII. — *C. dentata* Pers. hin und wieder um Stettin, auch unter *Linum usitatissimum* bei Polzin. VI—VII.
- Thlaspi arvense* L., Äcker, Schutt. V—X.
- Teesdalia nudicaulis* R.Br. Äcker, Caus. IV—V.
- Lepidium draba* L. Wege, Ackerränder um Stettin, alle Jahre erscheinend. V—VI. — *L. campestre* R.Br. trockene Wiesen der Radow bei Wollin. VI—VII. — *L. sativum* L. gebaut. VI—VII. — *L. ruderale* L. Schutt, Wege. VI—IX.
- Capsella bursa pastoris* Mnch. Äcker, Wege, Schutt. III—X.

Coronopus Ruellii All. Wege, Schutt. VII—VIII.

Neslea paniculata Desv. unter Saat. V—VII.

Bunias orientalis L. wüste Plätze: Stettin, Swinemünde. VI—VII. — *B. erucago* L. sehr selten und nur eingeführt auf Äckern. Wurde vor Jahren in einigen Exempl. bei Stettin gefunden. VI—VII.

Cakile maritima Scop. am Strande, kommt mit Ballast auch nach Stettin. VII—X.

Crambe maritima L. in Folge früherer Aussaat bei Greifswald. Rügen wild. V—VI.

Raphanistrum lampsana Gaertn. Äcker, Raine. VI—VIII.

Raphanus sativus L. geb. u. verw. V—VI. — *a. niger* DC. geb. u. verw. V—VI. — *R. b. radiola* DC. geb. u. verwild. V—VI.

Cistaceae.

Helianthemum chamaecistus Mill. Wege, Heiden, Waldränder: Eichberge, Schrey, Garz. . . VII—XI.

Violaceae.

Viola palustris L. torfige Wiesen, zwischen Sphagnum: bei Stettin auf den Mölln am Sandsee, Glambecksee, Hohenleese etc. V—VI. — *V. hirta* L. Gebüsche, Wiesen: Julow, Schrey etc. IV—V. — *V. odorata* L. Waldränder, Wege, Kirchhöfe III—IV. — *V. silvestris* Lmk. Wälder, Haine. IV—VI. — *b. Riviniana* Rchb. schattige Laubwälder, Schrey, Buchheide. — *V. canina* L. Wiesen, Triften, Wälder. IV—V. — *v. lucorum* Rchb. — *b. flavicornis* Sm. — *v. ericerorum* Schrad. — *V. persicifolia* Schk. Gebüsche, Wiesen, selten. V—VI. — *V. b. stagnina* Kst. Wiesen, selten. V—VI. — *V. mirabilis* L. Bergige Wälder, Schrey, Stubnitz auf Rügen. IV—V. — *V. tricolor* L. Äcker, Brachen. V—XI.

(Fortsetzung folgt.)

Flora der Umgebung von Rattenberg (Nordtirol).

Von J. Woynar.

(Fortsetzung von No. 5 u. 6. p. 78 d. Jahrgangs.)

Gnaphalium sylvaticum L. In Waldlichtungen und an wüsten Plätzen gemein. 7—8.

„ *norvegicum* Gunn. Widersberger Horn und Kolbenthaler Alpe in Alpbach. Auf der Holzalpe. 7—8.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Carl

Artikel/Article: [Verzeichnis Pommerscher Pflanzen mit besonderer
Berücksichtigung Stettins. 123-126](#)