

subsericeis, subtus ad nervum medianum adpresse pilosis, sicco manifeste nigrescentibus; stipulis semicordatis breviter acuminatis.

Schleichers 86 „Arten“ der *Salix nigricans*.

Von J. Scheuerle in Frittlingen (Württemberg).

Es erscheint lächerlich, von 86 Arten Einer Spezies zu reden und es haben mehrere Botaniker auch nicht fehlen lassen, diese Manier Schleichers (Katalog vom Jahre 1809) mindestens als „unnütze Haarspalterei“ zu tadeln, welche geeignet sei, das Studium der *Salices nigricantes*, das ohnedies sehr schwierig ist, noch schwieriger zu machen. Man ist versucht, sämtliche 86 „Arten“ Schleichers als blosse Formen der *Salix nigricans* auszugeben; allein da hier Stamm- und Bastardformen durcheinander gemengt sind, so geht eine solche kurze Prozedur nicht an. Zwischen den niedlichen, kleinblättrigen Pflanzen, welche der *Salix arbuscula* L. sehr ähnlich sehen, und der baumartigen, gross- und derbblättrigen Stammform, sowie dem der *Salix Caprea* L. noch ähnlicher scheinenden Bastarde *S. Caprea* $\times$ *nigricans*, bestehen solch grosse — schon dem Laien auffällige — Unterschiede, dass Schleicher diese Weiden selbst mit dem besten Willen nicht als Formen Einer Art ansehen konnte. Nachdem er aber einmal angefangen hatte, Arten aufzustellen, so war es für ihn, der die Existenz der Bastarde in dieser Gruppe noch nicht kannte, nicht leicht möglich, die Grenze zu finden, wo er mit den Arten aufhören und mit den Formen bzw. Varietäten beginnen sollte. Es ist unzweifelhaft, dass Schleicher die gen. Weidengruppe, wie vorher Willdenow, in der Natur an lebenden Exemplaren fleissig und scharf beobachtete, und das Studium derselben jedenfalls nicht schwieriger gemacht hat, als Wahlenberg. Unter den Schleicherschen Benennungen sind mehrere so prägnant, dass sie von späteren Salicologen teils für die zutreffende Pflanze beibehalten, teils bei anderen ähnlichen Weiden verwertet wurden. Solche sind z. B. *grisophylla*, *incana*, *mollis*, *malifolia*, *pyrifolia*, *populifolia*, *pyrolaefolia*, *polygonifolia*, *ulmifolia*, *ligustroides*, *cotinifolia*, *vaccinioides*, *arbuscula*, *pumila*, *albescens*, *candidula*, *tenuifolia*, *crassifolia*, *firma*, *cordifolia*, *angustifolia*, *latifolia*, *parvifolia*, *elliptica*, *undulata*, *crispa*.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Scheuerle Josef

Artikel/Article: [Schleichers 86 Â„Arten“ der Salix nigricans. 127](#)