Deutsche botanische Monatsschrift.

Zeitung für

**Systematiker, Floristen und alle Freunde der
heimischen Flora.**

Zugleich Organ der bayerischen botanischen Gesellschaft in München, sowie der botanischen Vereine in Hamburg und Nürnberg und der Thüringischen botanischen Tauschvereine in Pforta bei Kösen und in Arnstadt.

Herausgegeben

von

Prof. Dr. G. Leimbach

Direktor der Realschule zu Arnstadt.

Erscheint monatlich in der Stärke von mindestens einem Druckbogen und kostet innerhalb des deutschen Reiches im Jahr 6 Mark [in Österreich-Ungarn 3 Gulden 80 kr., im Ausland 7 Mark und 50 Pf., in Nordamerika 2 Dollars], gleichviel, ob bei dem Herausgeber oder bei der Post [No. 1538 der Zeitungspreisliste] die Bestellung erfolgt. Im Buchhandel beträgt der Ladenpreis 8 Mark.

IX. Jahrg. Nr. 8. 9.

August-September.

1891.

Inhalt: Holuby, *Rubus Khekii* n. sp. Strähler, Flora von Theerkeute in Posen. Lüscher, Neue Beiträge zur Flora der Nordschweiz. Formánek, Erklärung gegen Svante Murbeck. Röhl, Die Thüringer Laubmoose und ihre geographische Verbreitung. Kleine Mitteilungen: Bruhin, Schmidt. Botan. Vereine: Nürnberg, München. Liste verkäuflicher Pflanzen. Litteratur. Anzeigen.

Rubus Khekii n. sp.

Eine neue Art aus der Gruppe *Adenophori* Focke.

Von J. L. Holuby in Ns. Podhrad-Ungarn.

Rubus Khekii. Schössling kräftig, niedrigbogig oder kletternd, fünfkantig flachseitig, unbereift, spärlich abstehend behaart, mit mässig geneigten, pfriemlichen, gleichlangen, kantenständigen Stacheln bewehrt, mit spärlich eingestreuten Stieldrüsen; Stacheln von der Länge der halben Schösslingsdurchmesser, 15—20 auf einem Interfolium; Blätter meist 3-zählig mit 5-zählig fussförmigen gemischt, oberseits mit anliegenden, schimmernden Haaren dicht be-

kleidet, unterseits graufilzig; Blattstiele spärlich abstehend behaart, mit dünnen, mässig gebogenen Stacheln bewehrt und sehr spärlichen Stieldrüsen besetzt, oberseits flach; Endblättchen aus seicht herzförmigem Grunde verkehrt-eiförmig zugespitzt, doppelt grobgesägt gezähnt, dreimal so lang als dessen Stielchen; äussere Seitenblättchen lateral, kurzgestielt; Nebenblätter lineal, langgewimpert, spärlich stieldrüsig; Blütenstand ziemlich gedrungen, am Grunde beblättert, oberwärts nackt; Blätter des Blütenstandes dreizählig, nur die oberen einfach, mit linealen Nebenblättern; Rispenäste dreigabelig, mit dünnen, schwachen, geraden oder schwachgeneigten, nadelförmigen Stacheln, dazwischen mit spärlichen Stieldrüsen besetzt, dünnfilzig; Blütenstiele ziemlich reichlich benadelt; Kelchzipfel graufilzig, nach dem Verblühen zurückgeschlagen; Blüten gross, rosafarbig; Kronenblätter rund; Staubfäden rötlichweiss, die grünlichen Griffel überragend; Fruchtknoten kahl; Frucht reichflaumig, vollkommen entwickelt, schwarz, glänzend.

Ist von *R. Silesiacus* Wimm. durch die unterseits graufilzigen, im Alter mit stark hervorragenden Netznadern versehenen, fussförmig 5-zähligen, nicht handförmigen Schösslingsblätter und die schön rosenroten, nicht weissen Kronenblätter, leicht zu unterscheiden. Von *R. Caflischii* Focke unterscheidet sich unsere Art durch die oberseits reichliche Behaarung der Schösslingsblätter und den kahlen Fruchtknoten; von *R. Pseudomelanoxylon* Halácsy durch die oberseits dichtbehaarten Schösslingsblätter, die grossen, rosafarbigen Kronenblätter, und die, die Griffel überragenden Staubfäden.

Häufig an Gebüschrändern am Grat zwischen dem Thale Chúm x und dem Ivanóczer Thal nördlich von Bosác und am Rande des Eichenwaldes bei Nemes-Podhrad, im Trentschiner Komitat Ungarns. In seiner Nachbarschaft wachsen: *R. thyrsoides* Wimm., *R. nemorosus* Hayne, *R. caesius* $\times$ *tomentosus* O. K., *R. tomentosus* Borkh., *R. fossicola* Hol., und *R. hirtus* WK.

Ich nenne diese Brombeere in Ehren des grossen Liebhabers unserer Karpathen-Brombeeren und unermüdllichen Floristen, Herrn Eugen Khek, dipl. Apotheker.

Ns. Podhard, den 24. August 1891.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Holuby Josef Ludwig

Artikel/Article: [Rubus Khekii n. sp. 113-114](#)