© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen.

Von Adolf Strähler in Jauer, Schlesien.

(Fortsetzung von S. 167 der Nrn. 10. 11 d. Jahrgangs.)

Amygdalaceen Juss.

Amygdalus Persica L. Angebaut.

Prunus spinosa L. Im Unterholz der Goraier Berge ziemlich verbreitet.

Pr. insititia L.
Pr. domestica L.
Pr. cerasifera Ehrh. } In verschiedenen Abarten gezogen.

Pr. avium L. Laubholzbestände von Gorai, zerstreut.

Pr. Cerasus L. Die vorherrschend angebaute Art.

Pr. Padus L. Theerkeute, Goraier Berge, ziemlich verbreitet.

Rosaceen Juss.

Spiraea salicifolia L. } In Gärten angepflanzt, bisweilen
Sp. opulifolia L. } verwildert.

Ulmaria pentapetala Gilib. An Bachufern und Grasrainen bei Ciszkowo, ziemlich häufig.

U. Filipendula A. Br. In den Goraier Bergen und bei Ciszkowo, zerstreut.

Geum urbanum L. In Gebüschen bei Krucz, gemein.

G. rivale L. Auf Wiesen daselbst, zerstreut.

G. urbano × rivale G. Meyer. Auf Wiesen bei Wronke, selten.

Rubus suberectus Anderson. Kruczwald selten, in den Goraier Bergen zerstreut.

R. fruticosus L. Daselbst, Klempitzer Revier, zerstreut.

R. Sprengelii W. u. N. Sträucher am Wege nach den Blotten im Kruczwald, seltener.

R. villicaulis Koehler. Goraier Berge gegen die Dember Forstgrenze.

R. dumetorum W. u. N. = nemorosus Hayne. Revier Gorai, ziemlich verbreitet.

R. caesius L. Ebendaselbst und im Revier Kruczwald, verbreitet.

R. Idaeus L. An denselben Standorten, verbreitet.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

R. saxatilis L. Revier Gorai, Ciszkowoer Anteil, Kruczwald, verbreitet.

Fragaria vesca L. Goraier Berge, gemein.

Fr. moschata Duchesne. Daselbst, seltener.

Fr. viridis Duchesne. Daselbst, zerstreut.

Comarum palustre L. An Gräben bei Theerkeute, meist nicht selten.

Potentilla norvegica L. Auf Beeten und im Grasgarten der Oberförsterei Theerkeute. Eine Form mit niederliegenden Stengeln, unteren eirunden Blättern wurde unter Gartenerdbeeren daselbst beobachtet.

P. rupestris L. Auf der Fischerinsel des Bialaer Sees, ziemlich zahlreich, aber einziger Standort.

P. Anserina L. Wege, Triften bei Krucz, Ciszkowo, gemein.

P. canescens Bess. = inclinata Autor. In üppigen Exemplaren auf Laubholzkulturen bei den „alten Teichen“ Revier Klempitz, selten.

P. argentea L. Bei Theerkeute, gemein.

P. Wiemanniana Guenth. = P. Guentheri Pohl. Lichte Stellen im Revier Theerkeute, zerstreut.

P. reptans L. Bialaer Seeufer, Theerkeute, ziemlich zahlreich.

P. mixta Nolte. An eben erwähnten Standorten, zerstreut.

P. procumbens Sibth. An Dienstäckern bei Theerkeute, zerstreut.

P. silvestris Neck. Ebendaselbst, zerstreut.

P. procumbenti × silvestris Warnsdorf. Unter den Stammformen, selten.

P. cinerea Chaix. Auf Sandwegen und Gestellen in den Revieren Kruczwald, Hamrzysko, meist sehr zahlreich in grossen Rasen.

P. opaca L. Im Klempitzer Bruche und bei Gorai, häufig.

P. cinerea × opaca = incana × opaca Aschers. Im Klempitzer Bruche unter den Eltern, mit denen sie namentlich Blattform und Bekleidung teilt, ziemlich selten.

P. alba L. Auf Hauen des Nachbarreviers Samolecz zwischen Theerkeute und Wronke, ziemlich selten.

P. cinerea × argentea. Auf den angebauten Bergen im Revier Rzecyn unter den Stammformen zerstreut in sehr ausgeprägter Form.

Sanguisorba officinalis L. Feuchte Wiesen bei Gorai, zerstreut.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. minor Scop. Wiesen bei Kruczhauland, selten.

Agrimonia Eupatoria L. In den Goraier Bergen häufig, sonst selten.

Rosa pimpinellifolia L. In Gärten gezogen, so im herrschaftlichen Garten in Ciszkowo.

R. lucida Ehrh. Desgleichen in Theerkeute.

R. tomentosa Sm.

forma subglobosa Baker. Kruczwald und Goraier Revier Ciszkowoer Anteil, sehr zerstreut.

forma cuspidata Godet. Sträucher bei Ciszkowo gegen die Czarnikauer Chaussee, zerstreut.

forma cristata Christ = Andrzeiowskii Deségl. Sträucher an der Bruchwiese Revier Klempitz und an der alten Czarnikauer Strasse, zerstreut.

R. rubiginosa L. Klempitzer Bruch, Theerkeuter Blotte, sehr zerstreut.

R. sepium Thuill.

forma typica. Nur ein starker Strauch mit gleichförmiger Bestachelung, schmalen sehr langen und nackten Kelchzipfeln und kabler Inflorescenz im Revier Gorai gegen die Guhrener Grenze.

R. canina L.

forma Lutetiana Leman. Revier Gorai am Pianowker Wege, nicht selten.

forma dumalis Bechstein. Stark blau bereifte Form in den Goraier Bergen.

forma biserrata Baker. Ebendaselbst, selten.

R. Reuteri Godet.

forma typica Christ. Strauch auf den Pianowkoer Bergen nahe der Goraier Reviergrenze, selten.

forma complicata Christ. Strauch daselbst.

forma subcanina Christ. Strauch am Krucz-Ciszkowoer Wege.

R. dumetorum Thuill.

forma platyphylla Christ. Sträucher in den Goraier Bergen ohnweit des Pflanzgartens und im Ciszkowoer Anteil, zerstreut.

forma Thuillieri Christ. Sträucher in den Goraier Bergen am Wege vom Felde nach dem Hacklande, zerstreut.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche botanische Monatsschrift

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Straehler Adolf

Artikel/Article: Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen. 183-185