

Die Flora von Meissen in Sachsen.

Von Apotheker Schlimpert in Cölln a. Elbe.

(Fortsetzung von S. 164 der No. 10. 11 d. Jahrg.)

Cynosurus cristatus L. An Rainen und Abhängen bei Polenz, Spittewitz, den Plossen und bei Zadel.

Bromus secalinus L. Auf Feldern unter Getreide häufig. *B. racemosus* L. Bei Niederau Weinböhla, Bohnitzsch, auf nassen Wiesen. *B. mollis* L. Gemein. *B. arvensis* L. Auf Sörnewitzer und Brockwitzer Fluren. *B. asper* Murr. Im Laubholz bei Scharfenberg, auf der römischen und deutschen Posel. *B. erectus* Hudson. Schlossberg in Scharfenberg, Weinbergsmauern von Crasso, selten. *B. inermis* Leys. Auf Weinbergsmauern, an der Eisenbahnbrücke bei Wahnitz (Schimpfky). *B. sterilis* L. Gemein. *B. tectorum* L. Gemein.

Brachypodium gracile Pal. B. Schieritzer Park und Seihlitzer Laubholz, an der Eisenbahnbrücke bei Wahnitz. (Schimpfky), am Bergschlösschen in Nossen. (Leonhardt.) *B. pinnatum* P. B. Anhöhe zwischen Daubnitz und Prositz. (Schimpfky), Rosswein bei der Schelze. (Leonhardt.)

Triticum repens L. Gemein. *T. caninum* L. Gemein.

Elymus europaeus L. Bei Gauernitz und Constappel in Laubwaldungen. *E. arenarius* L. Auf Flugsand unterhalb der Niederwarthaer Brücke.

Hordeum murinum L. An Mauern gemein. *H. nodosum* L. H. Auf den feuchten Wiesen bei Niederau.

Lolium perenne L. Gemein auf Grasplätzen und Wegrändern. *L. multiflorum* Lmk. Verwildert, bei Nossen gebaut. (Leonhardt.) *L. temulentum* L. Unter Getreide nicht selten. *L. remotum* Schrk. Selten unter Flachs.

9. Fam. Cyperaceen.

Carex dioica L. Auf den nassen Wiesen an der Gohse und bei Zscheila. *C. pulicaris* L. Auf den Viehweiden bei Weinböhla. *C. cyperoides* L. An den Moritzburger und Dippeldorfer Teichen. *C. disticha* Huds. Bei Neusörnewitz, Zaschendorfer Graben, Prinzengrund. *C. Schreberi* Schk. Gemein auf der Posel und dem Spaargebirge, Nossen am Kirschberg. (Leonhardt.) *C. brizoides* L. In den schattigen Laubwaldungen von Siebeneichen, Tännichtgrund, Diebeskeller. *C. vulpina* L. An den Gräben der nassen Aue, bei Neusörnewitz, Oberauer Sumpfwiesen. *C. nemorosa* Rebnt.

Bei Moritzburg. *C. muricata* L. Gemein. *C. teretiuscula* Good. Im Zellwald. (Leonhardt.) *C. paradoxa* Willd. Im Zellwald. (Leonhardt.) *C. paniculata* L. An Gräben und Sümpfen gemein. *C. stellulata* Good. Auf den Sumpfwiesen bei der Mistschänke, Nossen bei der Schafbrücke. (Leonhardt.) *C. leporina* L. Auf sumpfigen Wiesen gemein. *C. elongata* L. Im Spitzgrunde am Bächelchen häufig. *C. canescens* L. Häufig. *C. remota* L. Bockwener Telle, Diebeskeller. *C. acuta* L. Zaschendorfer Graben, nasse Aue, an der Gohse. *C. Goodenoughii* Gay. Gemein. *C. stricta* Good. Gabelteich, nasse Aue, Zaschendorfer Graben. *C. caespitosa* L. Äusserst selten. *C. Buxbaumii* Wahlb. Weinböhla auf den Viehweiden am Grenzgraben und dem Pfeil'schen Teiche. *C. limosa* L. Neusörnewitzer Sümpfe, Dippelsdorfer Teiche. *C. glauca* Scop. Auf Wiesen und in Sümpfen gemein. *C. pallescens* L. Auf Waldwiesen gemein. *C. panicea* L. An der Gohse, nassen Aue. *C. pilulifera* L. Ziegenbusch, Schieritzer Park, oberhalb der Altenburg, hohen Eifer und Götterfelsen. *C. tomentosa* L. Bei Brockwitz. *C. ericetorum* Pollich. Rechts vor dem früheren Poselthore unterhalb des Nadelholzes, bei Oberau. *C. montana* L. Am Scheunenberg, Ziegenbusch, Schieritzer Park. *C. praecox* Jacq. Gemein. *C. umbrosa* Host. Weinböhlaer Grenzgraben. *C. longifolia* Host. Bei Zella im Muldenthale. (Leonhardt.) *C. digitata* L. Im Füllbusch bei Gauernitz, im Zellpark und bei Gersdorf. (Leonhardt.) *C. humilis* Leyss. Poselspitze und Abhang rechts. *C. distans* L. Nasse Aue. *C. Hornschuchiana* Hoppe. Nasse Aue. *C. flava* L. Auf nassen Wiesen häufig. *C. Oederi* Retz. An der Gohse. *C. silvatica* Huds. Bockwener Telle, Diebeskeller. *C. Pseudo-Cyperus* L. Zaschendorfer Graben, Moritzburger Schlossteich. *C. ampullacea* Good. Neusörnewitzer Sümpfe, Moritzburger Mittelteich, Zaschendorfer Graben. *C. vesicaria* L. Häufig in Sümpfen und an Gräben. *C. paludosa* Good. Häufig. *C. riparia* Curt. Häufig. *C. filiformis* L. Moritzburger Teiche. *C. hirta* L. Gemein.

Cyperus flavescens L. Steinbacher Torfwiesen, im Finkenfluge auf der Posel, bei Weinböhla. *C. fuscus* L. Zerstreut am Elbufer, am Röderufer bei Grossenhain, unweit Walda.

Rhynchospora alba Vahl. *R. fusca* R. et Sch. Beide auf den Steinbacher Torfwiesen.

Scirpus palustris L. An Teich- und Grabenrändern gemein. *S. uniglumis* L. In den Elblachen bei Zehren, nasse Aue. *S. ovatus* Roth. Bei Neusörnewitz, nasse Aue, Dippelsdorf und Moritzburg. *S. pauciflorus* Light. Nasse Aue, bei

Moritzburg. *S. acicularis* L. Elblachen bei Niedermuschütz. *S. setaceus* L. Im Bächelchen von Sebschütz nach dem Thale zur Schlemmerei mit *J. bufonius* zusammen. Moritzburg, Zellwald. (Leonhardt). *S. lacustris* L. Gemein im Schlamme kleiner Wässer. *S. maritimus* L. In den Elblachen oberhalb Kötitz und Niedermuschütz. *S. silvaticus* L. Gemein auf nassen Wiesen und Teichrändern. *S. compressus* Pers. Am Fürstengraben, im Prinzengrund, nasse Aue.

Eriophorum vaginatum L. Auf den Torfwiesen bei Steinbach. *E. angustifolium* Roth. Sumpfwiesen bei Naundörfel und Neusörnewitz. *E. latifolium* L. Steinbacher Torfwiesen, an der Gohse.

10. Fam. Juncaceen.

Juncus conglomeratus L. Gemein auf Sumpf- und Moorwiesen. *J. effusus* L. Sumpfwiesen hinter der Mistschenke. Dippelsdorf. *J. glaucus* Ehrh. Jahnathal, bei Wildberg, Schieritz. *J. filiformis* L. Auf torfigen, sumpfigen Wiesen bei Dippelsdorf, gemein bei Grossenhain. (Schimpfky). *J. squarrosus* L. Steinbacher Torfwiesen. *J. compressus* Jacq. An den Elbufern und bei Dippelsdorf. *J. bufonius* L. Gemein. *J. supinus* Mnh. Auf den Sumpfwiesen hinter der Mistschenke. *J. articulatus* L. Zwischen der Niederwarthaer Brücke und Kötzschenbroda, an der Gohse. *J. silvaticus* Reichardt. Selten auf Moorwiesen.

Luzula pilosa Willd. Posel, Gersdorfer Wald. *L. albida* D. C. Gemein in Wäldern u. Gebüsch. *L. pallescens* Bess. Zehren am Spitzhause, Anhöhe rechts b. Nossen. (Schimpfky). *L. multiflora* Lej. Auf Haiden und in Wäldern nicht selten, Nossen. (Leonh.)

11. Fam. Colchicaceen.

Colchicum autumnale L. Nasse Aue und Bohnitzscher Fluren massenhaft, gegenüber der Beyermühle. (Leonhardt).

12. Fam. Liliaceen.

Tulipa silvestris L. Im Weinberg am Roitzschberge, in Zscheila, in den Grasgärten am Fürstengraben.

Gagea lutea Schult. Niederwartha und Gletschthal, Elbwiesen. *G. stenopetala* Rb. Hohe Eifer, Nossen bei der Klostermühle. (Leonh.) *G. minima* Schult. Bei Sörnewitz, am Kalkberg. *G. arvensis* Schult. Zwischen Rehbock und Bockwener Telle. Auf sandigen Äckern nicht selten, Nossen, beim Lindigt. (Leonh.)

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Schlimpert Alfred Moritz

Artikel/Article: [Die Flora von Meissen in Sachsen. 186-188](#)