

XVII. Brephidae.

87. Brephos O.

278. *Parthenias* L. Ueberall ziemlich häufig in und am Rande von Birkengebüschchen im März, April. Die R. im Mai, Juni auf Birken.

279. *Nothum* Hb. M. sagt, ohne indess einen Fundort anzugeben, dass die Art verbreitet ist, doch nur einzeln vorkommt. Der Falter muss aber sehr selten sein; denn bisher hat nur Al. 1 Ex. bei Quoos gefangen. März, April. Die R. auf Espen.

Curiosa aus der Praxis.

Von **Karl Uffeln** (Rietberg).

Am 30. November 1895 fand ich hier eine zur Verpuppung festgesponnene Raupe von *Pieris Rapae*; die Verpuppung des ganz gesunden Thieres erfolgte einige Stunden nachdem ich es der Stubenwärme ausgesetzt hatte.

Der 21. Januar 1896 war hier ein prachtvoller, warmer Tag; es fehlte nur die Lerche mit ihrem Trillern, um den Glauben, es sei vollständiger Frühling geworden, zu rechtfertigen; trotzdem aber erstaunte ich, als mir auf einem Spaziergange eine *Bombyx Rubi*-Raupe in flotter Gangart über den Weg lief; ich nehme an, dass die unnatürliche Wärme des Tages das Thier zum Verlassen ihres Schlupfwinkels veranlasst hat.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Uffeln Karl

Artikel/Article: [Curiosa aus der Praxis 224](#)