

Eine neue Satyride von Borneo.

Von

H. Fruhstorfer.

Erites madura ines nov. subspec.

Etwas grösser als *madura* aus Java, die Analozelle der Vorderflügel reichlich ein Drittel breiter. Die gelben Augen der Hinterflügel etwas grösser und nicht orange, sondern hellgelb. Die Admarginalbinden gleichfalls heller und prominenter.

Unterseite: Heller grau, alle Binden breiter und geradliniger verlaufend. Alle Ocellen auf beiden Flügelpaaren heller und entwickelter.

Auf den Hinterflügeln fehlt der bei den *madura* ♂♂ stets vorhandene braune Strich an der Zellwand zwischen der inneren und äusseren Binde.

Patria: Nord-Borneo, Lawas, A. Everett leg. 2 ♂♂.

Nachdem eine Lokalform von *madura* aus Perak und eine solche aus Palawan bekannt geworden sind, ist es selbstverständlich, dass sich *madura* auch auf Borneo finden musste und ebenso natürlich ist es, dass sie sich dort zu einer besonderen Lokalform umgebildet hat.

Ueberraschend ist nur, dass sich weder *elegans* Butl. noch *argentina* Butl. je nach ihren Fundorten auf den grossen Sunda-Inseln in geographische Rassen verteilt haben, sondern constant geblieben sind.

Die nächsten Verwandten gruppieren sich wie folgt:

madura Horsfield

Ost-Java, sehr häufig bis zu 2000' Höhe. Flog zu vielen Hunderten auf etwa 1500' im Zuidergebirge, südlich von Malang in lichten Wäldern, verschwand aber, als zu Gunsten der Kaffeekultur die Wälder vernichtet wurden.

In West-Java traf ich die zierlichen Falter nur bei Palabuan an der Wynkoopsbai, Januar, Februar 1892, wo sie ziemlich selten waren.

madura angularis Moore.

Tenasserim (1 ♀ Coll. Fruhst.), Siam, Kanburi, April 1 ♂ (H. Fruhst. leg.), Perak (Distant). Sumatra (Martin und de Nicéville).

madura ines Fruhst.

Nord-Borneo.

madura ochreana Standinger.

Iris 1889 p. 38.

Palawan 2 ♂♂ 2 ♀♀, Januar 1898, W. Doherty leg., Coll. Fruhst.

beelinga Moore.

Lep. Ind. Vol. II. p. 114 115, 1893.

Tenasserim. Steht nach Moore's Beschreibung nahe *madura* Horsf.

falcipennis Wood-Mason und de Nicéville.

Moore Lep. Indica. l. c. p. 116 117.

Cachar (Moore), Chiem-Hoa, Central-Tonkin auf ca. 800', September 1901 (H. Fruhstorfer 2 ♂♂ leg.).

elegans Butl.

Staudinger Exot. Schmett. t. 82 p. 230: „Nur 2 Arten in seiner Sammlung, alle Arten scheinen selten zu sein.“

Martin und de Nicéville. Butt., Sumatra p. 387 1895.

„Die seltenste der 3 sumatranischen Erites.“

Sumatra 1 ♂, S.-Borneo 1 ♂ (Coll. Fruhst.) Sarawak (Butl.).

Die Art wird wahrscheinlich noch auf Malacca gefunden werden.

argentina Butler.

Moore Lep. Ind. l. c. p. 113/114 t. 121 f. 1 a — b.

Ober-Tenasserim (Moore). Perak, Deli (N.-O.-Sumatra), Solok, S.-W.-Sumatra, Süd-Borneo (Coll. Fruhstorfer).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Satyride von Borneo 20-21](#)