© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Eine neue Nymphalide aus Neu-Guinea.

Von

H. Fruhstorfer.

Hypolimnas deois divina nov. subspec.

2 ♂♂ und 3 ♀♀ einer panopion Grose Smith verwandten Rasse aus British Neu-Guinea differieren erheblich von solchen aus Kaiser Wilhelmsland.

Die Exemplare sind grösser und von rundlicherem Flügelschnitt und die Grundfarbe ist ein tiefes Schwarz.

Durch die ganz verschiedenen Hinterflügel macht divina den Eindruck einer besonderen Art. Die in panopion vorhandene breite, rotgelbe Submarginalzone ist auf einen Analfleck reduziert, der nur etwas über M 3 hinausreicht. Der schwarze Aussensaum ist so verbreitert, dass die unterseits vorhandenen, schwarzen Pupillen davon vollständig überdeckt werden und nur durchschimmern Die Flügelmitte trägt einen breiten, rein weissen nur nach innen ganz wenig violett bestäubten Discalfleck. Unterseite: Die Vorderflügel von divina weichen von panopion durch eine durchlaufende, weisse Schrägbinde ab, welche bei panopion nur am Costalrand angedeutet ist.

Hinterflügel: Die diskale, weisse Region verbreitert sich auf Kosten der Ockerfarbe bis nach dem Marginalsaum. Sämtliche Ocellen prominenter violettblau punktiert.

Divina ♀ hat reiner weisse Schrägbinden der Vorderflügel und viel ausgedehntere und frischere weisse Diskalflecken der Hinterflügel. Der ockerfarbene Analfleck ist fast völlig verschwunden. Unterseite: Die weisse Apicalfärbung der Vorderflügel reiner weiss. Die Hinterflügel fast ganz

Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris", herausg. vom Entomologischen Verein Iris zu Dresden. Jahrgang 1903.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

weiss mit Ausnahme des grauschwarzen Basalteils. Der gelbliche Anflug ist nur noch ganz schwach vorhanden, während er bei panopion eine breite, zusammenhängende Submarginalbinde bildet.

Patria: Englisch Neu-Guinea.

Aus Neu-Guinea kennen wir jetzt:

deois panopion Grose Smith Holl. Neu-Guinea.

Nov. Zoolog. Vol. I., April 1894 p. 350 Humboldt-Bay.

Hagen, Jahrb. Nass. Ver. Naturkunde 1897 p. 88.

Astrolabebay, Simbang. Nicht häufig Dez. bis April. Fruhstorfer. B. E. Z. 1903.

deois divina Fruhst. Milne Bay, British Neu-Guinea.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: Eine neue Nymphalide aus Neu-Guinea 66-67