





Erklärung zu Tafel I.

- Figur 1. *Argynnis selene* ab. *thalia* Hb. 1898 bei Weissenborn bei Zwickau gefangen (Verein „Aulica“ in Leubnitz).
- „ 2. *Argynnis selene* ab. *thalia* Hb. Am 13. Juli 1901 im Werdauer Wald von Junkel gefangen.
- „ 3. *Callophrys rubi* L. ab. Im Mai 1903 in Plauen i. V. gefangen.
- „ 4. *Argynnis selene* ab. *thalia* Hb. Von Ziller in Einsiedel i. Erzgeb. gefangen (Col. Seiler-Dresden).
- „ 5. *Melitaea athalia* Rott. ab. 1902 von einer im Werdauer Wald gefundenen R erzogen (Verein „Aulica“ in Leubnitz).
- „ 6. *Zephyrus quercus* L. Zwitter. 26. Juni 1902 aus einer bei Lauterbach bei Crimmitschau gefundenen R erzogen von Junkel.
- „ 7. *Argynnis selene* Schiff. Albinismus. Am Auer in der Lössnitz von Riedel gefangen.
- „ 8. *Argynnis lathonia* L. Albinismus. Im August 1902 in Kauschwitz b. Plauen i. V. gefangen.
- „ 9. *Polygonia c-album* L. ab. Collection Reichert-Leipzig.
- „ 10. *Vanessa urticae* L. ab. Collection Reichert-Leipzig.
- „ 11. *Vanessa jo* ab. *exoculata* Weym. Collection Reichert-Leipzig.
- „ 12. *Gonepteryx rhamni* L. ab. Collection Kotzsch-Loschwitz.


Erklärung zu Tafel II.

- Figur 1. *Euproctis chrysorrhoea* L. ab. Bei Grimma von Gerber gefangen.
- „ 2. *Hylophila prasinana* L. ♂ ab. } Von Vol-
- „ 3. „ „ ♀ „ } landt bei
- Leipzig gefangen. (Vergl. Fauna von Leipzig, 3. Aufl. S. 15.).
- „ 4. *Aglia tau* L. ♀ ab. 1898 im Werdauer Buchenwald gefangen (Verein „Aulica“ in Leubnitz).
- „ 5. *Timandra amata* L. ab. Bei Leipzig von Bernhardt gefangen. Collection Reichert. (Vergl. Fauna von Leipzig, 3. Aufl. S. 57).
- „ 6. *Biston pomonaria* hybr. *pilzii* Standf. Im April 1896 bei Beucha bei Leipzig von Vollandt gefangen (Vergl. Fauna von Leipzig, 3. Aufl. S. 62).
- „ 7. *Bupalus piniarius* L. ab. Bei Grimma von Gerber gefangen.
- „ 8. *Arctia villica* L. In Leipzig aus einer bei Markkleeberg gef. R von Müller erzogen (Collection Philipps-Köln. Vergl. Fauna von Leipzig, 3. Aufl. S. 19).
- „ 9. *Crocallis elingnaria* L. ab. 14. Juli 1898 aus einer bei Lengenfeld i. V. gef. R erzogen von E. Möbius (Vergl. S. 191 der Fauna).
- „ 10. *Angerona prunaria* L. ab. 15. Juni 1892 im Rosental bei Leipzig gefangen (Vergl. Fauna von Leipzig, 3. Aufl. S. 60).
- „ 11. *Angerona prunaria* L. ab. 16. Juni 1901 im Universitätsholz bei Leipzig gefangen (Collection Reichert.)
- „ 12. *Hadena secalis* ab. *struvei* Rag. An der Spitzgrundmühle bei Cosvig von Seiler gefangen.
- „ 13. *Agrotis margaritacea* Vill. Melanismus. Am 31. August 1902 bei Meissen von Morezek gefangen (Collection Seiler-Dresden).
- „ 14. *Spilosoma menthastri* ab. *walkeri* Curt. Bei Leipzig gefunden (Collection Reichert-Leipzig) (Vergl. Fauna Leipzig, 3. Aufl. S. 19).






1




2




3




4




5



6



7



8



9



Erklärung der Figuren auf Tafel III.









Eupithecia:


- | | | | |
|-------|-----|-------------|------------|
| Figur | 1. | oblongata | Thnbg. |
| " | 2. | gratiosata | H. S. |
| " | 3. | syriacata | Stgr. |
| " | 4. | gueneata | Mill. |
| " | 5. | linariata | (S. V.) F. |
| " | 6. | pulchellata | Stph. |
| " | 7. | liguriata | Mill. |
| " | 8. | pusillata | (S. V.) F. |
| " | 9. | indigata | Hb. |
| " | 10. | strobilata | Hb. |
-

Erklärung der Figuren auf Tafel IV.


Eupithecia:

- | | | |
|-------|-----|---------------------|
| Figur | 1. | insignata Hb. |
| " | 2. | schiefereri Bhtsch. |
| " | 3. | carpophagata Rbr. |
| " | 4. | alliaris H. S. |
| " | 5. | euphrasiata H. S. |
| " | 6. | extraversaria H. S. |
| " | 7. | expallidata Gn. |
| " | 8. | assimilata Gn. |
| " | 9. | absinthiata Cl. |
| " | 10. | denotata Hb. |
-






1




2



3




4




5




6



7



8



9



Erklärung der Figuren auf Tafel V.


Eupithecia:

- | | | |
|-------|-----|------------------------|
| Figur | 1. | v. bergunensis Dietze. |
| " | 2. | vulgata Hw. |
| " | 3. | virgaureata Dbld. |
| " | 4. | lariciata Frr. |
| " | 5. | fenestrata Mill. |
| " | 6. | veratraria H. S. |
| " | 7. | helveticaria B. |
| " | 8. | satyrata Hb. |
| " | 9. | artemisiata Const. |
| " | 10. | santolinata Mab. |

Erklärung der Figuren auf Tafel VI.

Eupithecia:


- | | | | |
|-------|-----|---------------|---------|
| Figur | 1. | subfulvata | Hw. |
| " | 2. | oxydata | Tr. |
| " | 3. | orphanata | Bhtsch. |
| " | 4. | " | " |
| " | 5. | denticulata | Tr. |
| " | 6. | semigrapharia | Brd. |
| " | 7. | graphata | Tr. |
| " | 8. | setacea | Dietze. |
| " | 9. | isogrammaria | H. S. |
| " | 10. | thalictrata | Püng. |




2




1



3





4




5




6




8



9




10




1



2




3



7




5



6




4



8



9



Erklärung der Figuren auf Tafel VII.


Eupithecia:

Figur	1.	valerianata Hb.
„	2.	pygmaeata Hb.
„	3.	biornata Chr.
„	4.	innotata Hufn.
„	5.	unedonata Mab.
„	6.	mnemosynata Mill.
„	7.	oxycedrata Rbr.
„	8.	dodoneata Gn.
„	9.	lanceata Hb.
„	10.	sobrinata Hb.


Erklärung der Figuren auf Tafel VIII.

Eupithecia:

Figur	1.	pumilata	Hb.	(Gymnoscelis).
"	2.	coronata	Hb.	(Chloroclystis).
"	3.	Micropylübersichtsbild (vulgata Hb.).		
"	4.	Micropyle von E. semigrapharia Brd.		
"	5.	"	"	denotata Hb.
"	6.	"	"	dodoneata Gn.
"	7.	"	"	insigniata Hb.
"	8.	"	"	extraversaria H. S.
"	9.	"	"	vulgata Hb.
"	10.	"	"	linariata (S.V.) F.
"	11.	"	"	denticulata Tr.




4




5




1




6



7



2




8




9




3



10



11



Chaerocampa hybr. pernoldi Jacobs.

Erklärung der Figuren auf Tafel IX.

Figur	1	Chaerocampa	hybr.	pernoldi	Raupe.
"	2	"	"	"	Puppe.
"	3	"	"	"	
"	4	"	"	"	aberrat.

Erklärung der Figuren auf Tafel X.

Figur 1—6 *Galgula partita* ♂ ♂

„ 7—8 „ „ ♀ ♀

„ 9 „ „ ♂ Unterseite.

„ 10 „ „ ♀ „

„ 11—12 *Pseudophia wiskotti*.

„ 13 *Catephia alchymista* ab. varia.

„ 14 *Ammoconia caecimacula*.



1



3



5



2



4



6



7



8



9



10



11



12



13



14

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [18_Tafel](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Tafel I I-X](#)