

## Neue Papilioformen aus dem Bismarck-Archipel.

Von C. Ribbe.

Unter meinen zahlreichen *Papilio cilix lamponius* von Neu Mecklenburg befinden sich wenige Stücke, die auf der Oberseite der Vorderflügel, vom Innenrande ausgehend, eine Fleckenbinde mehr oder weniger stark ausgeprägt zeigen. Auf der Unterseite zeigt sich die Binde immer stärker. Auch die gelbliche Bestäubung der Vorderflügeloberseite ist stärker wie bei *cilix* von Neu-Pommern und wie bei *lamponius*. Ich benenne diese Form ab *libidori* nach dem Ort Libidor auf Nordost-Neu-Mecklenburg, wo die Stücke gefangen wurden. *P. cilix* ab. *libidori* bildet einen Uebergang zu *Papilio xenophilus* v. *hasterti* Ribbe.

Von den Gardner Inseln, die östlich von Neu-Mecklenburg liegen, erhielt ich einige *cilix*, die nicht ganz mit den Stücken von Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg übereinstimmen. ♂ Oberseite: Die Gesamtfärbung ist stumpf graubraun, beinahe ganz ohne gelben Anflug. Die gelbweisse Binde der Hinterflügel ist nach innen zu steiler und gerader begrenzt wie bei *cilix*, die blauen Zeichnungen, die die roten von unten durchschlagenden Augen nach oben zu begleiten, treten kräftig auf, mindestens so stark wie bei *cilix* ♀. Unterseite: Die Gesamtfärbung ist matt, die blaue Zeichnung längs der hellgelben Binde des Hinterflügels besonders stark entwickelt. Die roten längs des Aussenrandes der Hinterflügel stehenden Mondflecke nur schwach vorhanden. ♀ ähnlich dem von *cilix*, nur die helle Binde der Hinterflügel sehr breit. Ich benenne diese Form ab (var?) *gardneri*.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Ribbe Carl

Artikel/Article: [Neue Papilioformen aus dem Bismarck-Archipel](#)  
[182](#)