

Zur Synonymie des Genus Lycaena.

Von Prof. Dr. L. G. Courvoisier, Basel.

Einleitung.

Auf den folgenden Blättern übergebe ich der Oeffentlichkeit das Ergebnis nomenklatiorischer Studien, welche ich als ausschliesslicher Lycaenidologe (sit venia verbo!) während der 2 letzten Jahrzehnte in meiner Mussezeit betrieben habe. Dasselbe ist einerseits die Zusammenfassung, anderseits eine Erweiterung dessen, was ich seit 1910 in mehreren Publikationen mitgeteilt habe. Dieselben hatten immer nur einzelne Lycaeniden oder Gruppen von solchen (die europäischen Arten von Chrysophanus, von Thecla, die Argusgruppe) zum Gegenstand und beschäftigten sich absichtlich fast nur mit unklaren streitigen Fragen.

Jetzt bringe ich eine Synonymie aller palaearktischen Arten des Genus Lycaena im Sinn des Staudinger-Rebel-Katalogs 1901 und des Seitz'schen Werkes, also mit Einschluss der neuerdings durch Tutt isolierten Genera Plebeius, Vacciniina, Aricia, Hirsutina, Albulina, Latiorina, Agriades etc.; dagegen vorläufig mit Ausschluss der Genera Cyaniris, Chilades, Zizera, Everes, Tarucus, Lampides etc., deren Synonymie später folgen soll.

Dazu bemerke ich Folgendes: da es unmöglich ist, bei einer solchen Arbeit alle einschlägige Literatur zu erhalten, habe ich mich auf das Erreichbare beschränken müssen. Immerhin haben eigener Besitz, die liebenswürdige Aushilfe von Freunden und die Benützung der hiesigen, an alten Werken, wie an neueren Zeitschriften reichen öffentlichen Bibliothek es mir ermöglicht, an mancher Quelle zu schöpfen; und was ich zitiere, habe ich — bis auf ganz wenige Ausnahmen — selbst in Händen und vor Augen gehabt. Dadurch dürfte eine gewisse Zuverlässigkeit meiner Angaben gewährleistet sein. (Druckfehler vorbehalten!) Wo ich aber nicht ganz sicher war, ob ein Zitat zu der einen oder anderen Form gehöre, habe ich es lieber nicht erwähnt. So ist also aus verschiedenen Gründen dieser oder jener für eine Form erteilte Name samt seinem Autor bei mir unberücksichtigt geblieben. Das mag damit entschuldigt werden, dass mir die betreffenden Originalarbeiten unzugänglich waren.

Was die individuellen Aberrationen anbelangt, so habe ich mir, um nicht endlos zu werden, gewisse Grenzen ziehen müssen. Ich konnte z. B. unmöglich alle die Hunderte von Fär-

bungsabweichungen Tutt's anführen. So habe ich mich hauptsächlich auf diejenigen beschränkt, welche entweder schon länger bekannt, oder besonders eigentümlich, sowie auf diejenigen, welche da und dort abgebildet sind.

Zur Sache selbst sei noch gesagt, dass meine Nomenklatur und Synonymie vielfach anders lautet als in den grossen verbreiteten Werken. Das Quellenstudium, das leider heutzutage von Vielen vernachlässigt wird, fördert eben gar manche Unrichtigkeit zu Tage, die nach häufiger, kritikloser Wiederholung schliesslich als Wahrheit anerkannt wird, aber trotzdem Unrichtigkeit bleibt. — Immerhin gebe ich mich nicht für unfehlbar aus. Im Gegenteil bin ich für bessere Belehrung im Interesse der Wissenschaft empfänglich und dankbar. Nur glaube ich verlangen zu dürfen, dass allfällige Korrekturen sich auf gründliche Nachprüfung meiner Angaben stützen.

Abkürzungen:

Agassiz.

Agassiz G. Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection (Mitteilungen d. Schweiz. entomolog. Gesellschaft Bd. 10 Heft 6. März 1900.)

Aigner

Ann. Hung.

Aigner-Abafi. Annales Musei Nationalis Hungarici 1906.

Alph.

Kuldja

Alpheraky. Lépidoptères du District de Kouldja (Horae Societatis Entomologicae Rossicae XVI. 1881.)

Auriv.

Nord. Fjäril.

Aurivillius. Nordens Fjärilar Stockholm 1888—91.)

Berce

1867

Berce E. Faune entomologique Française. Lépidoptères. 1867.

Berce

1884

Berce E. Histoire naturelle de la France. Lépidoptères. 1884.

Berge

I

Berge F. Schmetterlingsbuch. I. Auflage Stuttgart 1842.

Berge

II

Berge F. Schmetterlingsbuch. II. Auflage Stuttgart 1851.

Berge

V

Berge F. Schmetterlingsbuch. V. Auflage Stuttgart 1876 (bearbeitet v. Steudel.)

Bergstr.

II III

Bergsträsser I. A. B. Nomenklatur und Beschreibung der Insecten etc. Bd. II u. III 1779.

Bertol.

Bertolini. Historia Lepidopterorum agri Bononiensis 1844.

Bienert

Diss.

Bienert Th. Lepidopterologische Ergebnisse einer Reise in Persien. Dissert. Leipzig 1870.

Bingham

Bingham. Fauna of British India etc. Butterflies Vol. II. 1907.

Boisd.

Ind.

Boisduval. Europaeorum Lepidopterorum Index methodicus Paris 1829.

Boisd.

Gen.

Boisduval. Genera et Index methodicus Europaeorum Lepidopterorum Paris 1840.

Angeführte Literatur.

Boisd.	Icon.	Bois du val. Icones historique de Lépidoptères nouveaux ou peu connus Paris 1832.
Borkh.	I II	Borkhausen. Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge Frankfurt Bd. I 1788. II 1789.
BRebel		Berge's Schmetterlingsbuch IX. Auflage Stuttgart 1910 (bearbeitet v. Rebel.)
Brem.		Bremer O.
Butl.	Cat. Fabr.	Butler. Catalogue of diurnal Lepidoptera described by Fabricius etc. London 1869.
Bramson		Bramson K. L. Die Tagfalter Europas und des Kaukasus etc. Kiew. 1890.
Caflisch		Caflisch J. L. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insecten - Fauna Graubündens Chur 1895.
Cantener		Cantener L. P. Histoire naturelle des Lépidoptères Rhopalocères etc. Paris 1834.
Chapm.		Chapman T. A.
Christ	1878	Christ H. Uebersicht der um Basel gefundenen Tagfalter und Sphinges (Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel 1878.)
Christ	1886	Christ H. Nachtrag zu der Uebersicht der um Basel gefundenen Tagfalter und Sphinges (Vhdgn. d. naturf. Ges. in Basel 1886.)
Donovan		Donovan. Natural History of British Insects. London 1792—1816.
Dup.	Cat.	Duponchel. Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe Paris 1844.
Eckstein		Eckstein K. Die Schmetterlinge Deutschlands etc. Stuttgart 1913.
Edwds.		Edwards Wm. H. Synopsis of North American Butterflies 1872.
Engr.		Engramelle & Ernst. Papillons d'Europe. Paris Bd. I 1779. II 1780.
Ersch.	Turk.	Erschhoff N. Lepidoptera gesammelt in Turkestan unter Fedtschenko Petersburg 1874.
Eschscholtz		Eschscholtz F. Beschreibung exotischer Schmetterlinge (Kotzebue's Reise um die Welt.) Weimar 1830.
Esper	I	Esper E. J. Chr. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen.
	Suppl. I II	I. Teil erster Band 1777. Supplemente I II bis 1805.
Evs	Volg.	Eversmann E. Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis Casani 1844.
Fabr.	Spec.	Fabricius. Species Insectorum. II Hamburgi 1781.
Fabr.	Mant.	Fabricius. Mantissa Insectorum. II Hafniae 1787.
Fabr.	Ent. syst.	Fabricius. Entomologia systematica III i. Hafniae 1793.

Favre	(Suppl.)	Favre E. Faune des Macro-Lépidoptères du Valais et des Régions limitrophes. Schaffhouse 1899 — Supplément 1902.
Feld.	Novara	Felder C. & R. Beschreibung der Lepidopteren, gesammelt auf der Reise der Fregatte Novara. Wien. Bd. II 1865. Atlas.
Frey		Frey H. Die Lepidopteren der Schweiz. Leipzig 1880. — Nachträge dazu bis 1882.
Freyer	Btr.	Freyer C. F. Beiträge zur Geschichte europ. Schmetterlinge Bd. I—III Augsbg. 1827—31.
Freyer	NBtr.	Freyer C. F. Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde Bd. I—VII. Augsburg 1831—58.
Friv.		Frivaldszky E.
Fruhstf.		Fruhstorfer H.
Füssl.		Füsslin J. C. Verzeichniss der ihm bekannten Schweizerischen Insekten. Zürich 1775.
Galv. Preiss.		Galvagni & Preissecker. Die lepidopterologischen Verhältnisse des Nied. Oest. Waldviertels I Wien. 1911.
Ghd.		Gerhard B. Versuch einer Monographie der europäischen Schmetterlings-Arten: Thecla, Polyommatus, Lycaena, Nemeobius. Hamburg 1853.
Geoffroy		Geoffroy E. Histoire abrégée des Insectes II Paris 1762; II Aufl. 1800.
Gillm.		Gillmer Max.
Gmelin-Linné		Gmelin J. Fr. Systema Naturae (Linné) Lipsiae 1788.
God.	Enc.	Godart J. B. Encyclopédie méthodique T. ix. Article Papillon. Paris 1819.
God.	Hist.	Godart J. B. Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France Paris 1821.
God. Dup. (Suppl.)		Godart J. B. Supplement zu letzterem Werk von Duponchel I Paris 1832.
Gr. Grsh.		Grum Grshimaiko.
Hein.		v. Heinemann H. Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. I. Braunschweig 1859.
HSch.	I VI	Herrich-Schäffer G. Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. Bd. I 1843. Bd. VI 1856. Regensburg.
Hoffmsegg		v. Hoffmannsegg.
Hofm.	I	Hofmann E. Die Gross-Schmetterlinge von Europa. Stuttgart 1887.
Hofm.	II	Hofmann E. Die Gross-Schmetterlinge von Europa. II. Auflage. Stuttgart 1894.
Holland	Bttfl. Book	Holland W. J. The Butterfly Book, a popular Guide to the Knowledge of the Butterflies of North America. New-York 1907.
Horm.		v. Hormuzaki C.
Hübn.		Hübner J. Sammlung europaeischer Schmetterlinge. Augsburg 1805—27.
Hübn. G.		Hübner-Geyer. Fortsetzung zu letzterem Werk. 1827—41.

Hüb.	Verz.	Hü b n e r J. Verzeichniss bekannter Schmetterlinge 1816. Augsburg.
Hbst.		(J a b l o n s k y C. G.) und H e r b s t J. V. W. Natursystem aller bekannten in- und ausländ. Insekten etc. Bd. IX 1798 von H e r b s t.
Jenner		J e n n e r E. Analytische Tabelle zum bestimmen der schweizerischen Bläulinge (Mittheilungen der schweiz. entomolog. Gesellschaft No. 5 Novbr. 1877).
Ill.	Mag.	I l l i g e r. Magazin für Insektenkunde Band I—III. Braunschweig 1801—4.
Jung	1782	J u n g C. Chr. Verzeichniss der meisten bisher bekannten europäischen Schmetterlinge in alphabetischer Ordnung. Frankfurt am Mayn 1782.
Jung	1791	J u n g C. Chr. Alphabetisches Verzeichniss der bisher bekannten Schmetterlinge etc. 1791.
Kef.		K e f e r s t e i n C. Versuch einer kritisch-systematischen Aufstellung der europäischen Lepidopteren unter Berücksichtigung der Synonymie (Stettiner entomolog. Zeitung 1851).
Killias		K i l l i a s E. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insektenfauna Graubündens (aus XXIII bis XXIV Jahresheften der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens) 1851.
Kirby		K i r b y W. F. Synonymic Catalogue of Diurnal Lepidoptera London 1871 + Supplement 1877.
Kirby	Lloyd	K i r b y W. F. Lloyd's Natural History. A. Handbook to the Order Lepidoptera Part. I. Vol. II. 1896.
Knoch	.	K n o c h A. W. Beiträge zur Insectengeschichte. Bd. I—III. Leipzig 1781—3.
Krul.		K r u l i k o w s k y L.
Labram		L a b r a m J. D. Die Tagschmetterlinge der Schweiz. Basel 1836.
Lang	1782	L a n g H. G. Verzeichniss seiner Schmetterlinge. Augsburg 1782.
Lang	1789	L a n g H. G. Verzeichniss seiner Schmetterlinge II. Auflage 1789.
Latreille	N Dict.	L a t r e i l l e. Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle T. XXVII Paris 1818.
Latreille	Enc.	L a t r e i l l e. Encyclopédie méthodique T. 26. Insectes. Paris 1830.
Led.		L e d e r e r J u l.
Leech	China	L e e c h J. H. Butterflies from China, Japan, and Corea. Bd. II. 1892.
L.	F. svec. I	v. Linné Carl. Fauna svecica Ed. I. Holmiae 1746.
L.	F. svec. II	" " Ed II " 1761.
L.	S. Nat. X	S y s t e m a N a t u r a e Ed. X " 1758.
L.	S. Nat. XII	" " Ed. XII " 1767.
Lucas		L u c a s H. Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe. Paris 1834.
Meig.		M e i g e n J. W. Systematische Beschreibung der Europäischen Schmetterlinge. Bd. II. Aachen 1830.

Meisn.		Mei s n e r Fr. Verzeichnis der schweizerischen Schmetterlinge (Naturwissenschaftl. Anzeiger der allg. schweiz. Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften) Bern 1818—19.
Ménétr.	Enum.	Mé n é t r i é s. Enumeratio corporum animalium Musei Academiae Scientiarum Petropolitanae. I. 1855.
M Dür		Mey e r - D ü r. Verzeichniss der Schmetterlinge der Schweiz. Zürich 1852.
Mill.	Icon.	Mill i è re P. Iconographie et description de Chenilles et Lépidoptères inédits. Paris 1859-74.
Müll.	Friedrichsdal.	Müller O. F. Fauna Insectorum Friedrichsdalina. Hafniae 1764.
Müller-Linné		Müller Ph. L. S t. Linnés vollständiges Natursystem (Deutsch) I. V. Nürnberg 1774.
Newman		Newman E. Illustrated Natural History of British Butterflies and Moths London 1869.
Nic.	Ind.	de Nic é ville L. Butterflies of India, Burmah and Ceylon. Bd. III. Calcutta 1890.
Obth.	I—XX	Oberth ü r Ch. Etudes d'Entomologie I—XX. Rennes 1876—1896.
Obth.	1904—1913	Oberth ü r Ch. Etudes de Lépidoptérologie comparée. Rennes 1904—1913.
Ochs.	I. 2	Ochsenheimer F. Die Schmetterlinge von Europa. Bd. I zweyte Abtheilung. Leipzig 1808.
Panzer	Fauna Gloss.	Panzer. Fauna germanica oder Entomol. Taschenbuch. Glossata. Nürnberg 1796.
Pall.		Pallas. Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches. I Petersburg 1771.
Perlini	Ital.	Perlini R. Forme di Lepidotteri esclusivamente Italiane Bergamo 1905.
Perlini	(Lomb.) 1912	Perlini R. Lepidotteri della Lombardia Bergamo 1912.
Plmh.		v. Pe y e r - Imhoff H. Catalogue des Lépidoptères d'Alsace Ed. III. Colmar 1909. (Ed. Dr. Macker.)
Poda		Poda N. Insecta Musei Graecensis etc. Graecii 1761.
Prunn		de Prunner L. Lepidoptera Pedemontana illustrata. Augusta Taurinorum 1798.
Ramb.	F. Andal.	Rambur P. Faune Entomologique de l'Andalousie Paris 1839.
Ramb.	Cat. Andal.	Rambur P. Catalogue Systématique des Lépidoptères de l'Andalousie Paris 1858.
Reutti		Reutti C. Uebersicht der Lepidopterenfauna des Grossherzogtums Baden. 2. Ausg. 1898.
Rev.		Reverdin J. L.
Rösel	Ins. Belust.	Rösel. Der monatlich herausgegebenen Insesten-Belustigung dritter Theil. 1755.
Rott.	Naturf. VI	v. Rottemburg. Anmerkungen zu den Hufnagel'schen Tabellen der Schmetterlinge (Naturforscher sechstes Stück 1775).
Rgmt.		de Rougemont Fr. Catalogue des Lépidoptères du Jura neuchâtelois (Bulletin de la

		Société Neuchâteloise des Sciences naturelles) Neuchâtel 1903.
Rühl		Rühl Fr. Die palaearktischen Gross-Schmetterlinge und ihre Naturgeschichte Bd. I Tagfalter 1893 — Nachtrag 1895.
J. Chr. Schäffer Icon.		Schäffer J. Chr. Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum etc. T. I-III. 1766-69.
Schiff.		Schiffermüller & Denis. Systematisch. Verzeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend 1776.
Schnd.		Schneider D. H. Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge I. Halle 1787.
Schott		Schott J. J. Schmetterlings-Kalender etc. Frankfurt a. M. 1830.
Schrank		Schränk Fr. Fauna Boica Bd. II. Erste Abtheilung Ingolstadt 1801.
Scop.	Carniol.	Scopoli J. A. Entomologia carniolica Vindobonae 1763.
Scudder	Bull. Buff.	Scudder S. H. Synonymic List of the Butterflies of North America etc. Pt II. Rurales (Bulletin of the Buffalo Society of Natural Science May 1876.)
Seitz		Seitz. Grossschmetterlinge der Erde, palaearkt. Lycaeniden 1909.
Selys	Cat.	de Selys-Longchamps E. Catalogue des Lépidoptères ou Papillons de la Belgique. Liège 1837.
Selys	Mém. Liège	de Selys-Longchamps E. Enumération des Insectes Lépidoptères de la Belgique (Mém. de la Société des Sciences de Liège) 1844.
Skinner		Skinner. Synonymic Catalogue of the North American Rhopalocera 1898 — Suppl. 1904.
Smith	List	Smith J. B. List of Lepidoptera of Boreal America. Philadelphia 1891.
Spberg.		Spangberg J. Om de Svenska och Norska arterna af Dagfärilslägget Cupido. Upsala 1872.
Gebr. Sp.		Speyer A. & A. Geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Leipzig 1858.
Stainton		Stainton H. T. British Butterflies and Moths. London 1867.
Std.	Cat. I	Staudinger O. Catalog der Lepidopteren Europas. Dresden 1861.
Std.	Cat. II	Staudinger O. Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebiets. II. Aufl. Dresden 1871.
StdR.		Staudinger & Rebel. Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebiets Berlin 1901.
Stef.		Stefanelli P. Nuovo Catalogo illustrativo dei Lepidotteri Ropaloceri della Toscana 1900.
Sulzer		Sulzer J. H. Abgekürzte Geschichte der Insekten. Winterthur 1776.
Syst. V. II		Systemat. Verzeichniss von den Schmetterlingen der Wiener Gegend. II. Aufl. 1801.

Täschler	1870—1877 —1902	Täschler M. Grundlage zur Lepidopteren-Fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell. (Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft St. Gallen) 1870 — Nachträge 1877 und 1902.
Trtsch.		Treitschke Fr. Die Schmetterlinge von Europa (Fortsetzung zu Ochsenheimers Werk) Bd. X. Leipzig 1834.
Tur.		Turati Em. Contribuzioni alla Fauna dei Lepidotteri Italiani Milano 1903 (Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali Vol. XLII.)
Tur. Ver.		Turati e Verity. Faunula Valderiensis nell'alta Valle del Gesso (Bullettino della Societa Entomologica Italiana Anno XLII. 1910) Firenze 1911.
Tutt	1896	Tutt J. W. British Butterflies London 1896.
Tutt	III. IV	Tutt J. W. A Natural History of the British Butterflies etc. London Vol. III. 1908—09 — IV. 1910.
Ver.		Verity R.
Vorbrodt		Vorbrodt Kl. Die Schmetterlinge der Schweiz. Lieferung 2. Bern 1911.
Wall.		Wallengren H. D. J. Skandinaviens Dagfjärilar Malmö 1853.
Wehrli		Wehrli E. Die Gross-Schmetterlinge von Frauenfeld etc. (Heft XX der Mitteilungen der thurgauischen naturforschenden Gesellsch.) 1913.
Wnbg.		Werneburg A. Beiträge zur Schmetterlingskunde. I. II Erfurt 1864.
Westwd.		Westwood J. O. The Butterflies of Great Britain etc. London 1860.
Wheeler		Wheeler G. The Butterflies of Switzerland and the Alps of Central-Europe London 1903.
Wood		Wood W. Index Entomologicus etc. London 1839.
Wright		Wright W. Gr. The Butterflies of the West Coast of the United States etc. 1906.
Courv.	1903	Courvoisier L. G. Ueber Aberrationen bei Lycaeniden. (Mitteilungen der schweizer. Entomologischen Gesellschaft Bd. I Heft 1 Novb. 1903).
Courv.	1907	Courvoisier L. G. Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden (Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 1907 Heft 1, 2, 3).
Courv.	Lyc. Bas.	Courvoisier L. G. Uebersicht über die um Basel gefundenen Lycaeniden (Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel) 1910.
Courv.	1910—11	Courvoisier L. G. Entdeckungsreisen und kritische Spaziergänge ins Gebiet der Lycaeniden. (Entomologische Zeitschrift Stuttgart 1910 Nr. 12—39; Frankfurt 1911. Nr. 40—52; Nr. 1—14).
Courv.	Iris 1912	Courvoisier L. G. Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden. Iris 1912. p. 39—65.



Zeitschriften.

Ann. Belge	Annales de la Société Entomologique Belge.
Ann. France	Annales de France.
Ann. Hung.	Annales Musei Nationalis Hungariae
Ann. Mag.	Annals and Magazine of Natural History London.
Ann. Wien.	Annalen des Wiener Hof-Museums.
Berl. E. Nachr.	Berliner entomologische Nachrichten.
Berl. E. Ztschr.	Berliner entomologische Zeitschrift.
Bull. Buff.	Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences.
Bull. France	Bulletins de la Société entomologique de France.
Bull. Genève	Bulletins de la Société lépidoptérologique de Genève.
Bull. Ital.	Bullettino della Societa Entomologica Italiana.
Bull. Nat. Mosc.	Bulletins de la Société des Naturalistes de Moscou.
Bull. Ac. Petsbg.	Bulletins de l'Académie des Sciences de St. Petersbourg.
Cat. lép. Genève.	Catalogue des Lépidoptères des Environs de Genève 1910.
Cist. Ent.	Cistula entomologica London.
Enc.	Encyclopédie méthodique Paris.
Entom.	Entomologist. London.
Ent. Mittl.	Entomologische Mitteilungen (Berlin).
Ent. Mon. Wien	” Monatsschrift Wien.
E. Z. Gub.	” Zeitschrift Guben.
Ent. Z. Stuttgt. — Frkft.	Entomologische Zeitschrift Stuttgart — später Frankfurt.
E. Z. Wien	Entomologische Zeitung Wien.
Ent. Mo Mag.	Entomological Monthly Magazine London.
Ent. Recd.	Entomologists Record London.
Ent. Tidskr.	Entomologische Tidskrift Stockholm.
Hor. Ross.	Horae Societatis Entomologicae Rossicae.
JBer. Wien	Jahresbericht des entomologischen Vereins Wien.
JB. Nassau	Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde.
Ill. Ztschr. Ent.	Illustrierte Zeitschrift f. Entomologie. Neudamm.
Int. E. Z. Gub.	Internationale entomologische Zeitschrift Guben.
J. Liebh. Ent.	Journal für die Liebhaber der Entomologie (Scriba).
JASB.	Journal of the Asiatic Society of Bengal.
J. Linn. Soc. Zool.	Journal of the Linnean Society-Zoology London.
Iris	Correspondenzblatt des entomologischen Vereins Iris.
Mém. Ac. Petsbg.	Mémoires de l'Académie de St. Petersbourg.
Mém. Rom.	” sur les Lépidoptères, rédigés par Romanoff.
Mitth. schweiz.	Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft.
Naturf.	Naturforscher Halle 1775 etc.
Natw. Anz.	Naturwissenschaftlicher Anzeiger Bern 1818 etc.
Nat. Sicil.	Naturalista Siciliano Palermo.
Nyt. Mag.	Nyt Magazin for Naturvidenskaberne Christiania.
Pet. Nouv. ent.	Petites Nouvelles entomologiques Paris.

Pr. Ent. Soc. Amer.	Proceedings of the American Entomological Society.
Pr. Calif. Ac.	Proceedings of the California Academy of Natural Science.
Pr. Ent. Soc. Phil.	Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia.
Pr. Ac. Phil.	Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia.
Pr. Z. S.	Proceedings of the Zoological Soc. of London.
Soc. ent.	Societas entomologica.
Stett. E. Z.	Stettiner entomologische Zeitung.
Tijdschr. v. Ent.	Tijdschrift voor Entomologie Gravenhage.
Trs. E. S.	Transactions of the Entomological Society of London.
Vhdl. Natf. Bas.	Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel.
Vhdl. z. bot. Wien.	Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.
Z. wiss. Ins. Biol.	Zeitschrift f. wissenschaftliche Insektenbiologie.

Genus *Lycaena* Fabricius (1807)

(abd-el-aziz Blachier 1908	F. von amandus Schnd.)
(abencerragus Pierret 1837	F. v. baton Bgstr.)
(acis Schiff. 1776 nomen nudum	== semiargns Rott. 1775).
(acreon Fabr. 1787	F. v. idas L.)

actinides	Std. Stett. E. Z. 1886. p. 214 (F. v. actis HSch.) — Rühl p. 290 — Std. Iris 1899 p. 147 — StdR. p. 84 No. 602 — Seitz, p. 312 T. 80 f. F. 4 ♂.
	Synonym: <i>actis</i> v. <i>actinides</i> Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 409. T. IX F. 4 ab ♂♀.
actis	HSch. VI. 1851 p. 24 — Std. Cat. I. p. 6 No. 149 — Kirby Cat. p. 370 No. 237 c.
	Synonyma: a) <i>atys</i> (Kindermann) Ghd. 1853 p. 11 No. 36. b) <i>damon</i> Var. Led. Hor. Ross. 1869 p. 81 — Std. Cat. II p. 13 No. 172 g.
	Bilder: HSch. F. 496—9 ♂ U ♀ U — Ghd T. 19 F. 3 ab ♂♀ — Led. l. c. T. IV. F. 8 ♀ — Seitz T. 82 a F. 5 U.
	Nebenform: <i>athis</i> Freyer. N. Btr. VI. 1852 p. 147. T. 573. F. 2. 3 ♂♂ — Rühl p. 290 — Seitz p. 318. T. 82 a. F. 4 ♂.
admetus.	Esper. I. Suppl. p. 148 — Schnd. p. 248 No. 150. — Borkh. I p. 167 No. 20 — Hübn. p. 47 No. 15 („unblauer Falter“) — Ochs. I P. 2 p. 50 No. 22 — Hübn. Verz. p. 68 Nr. 659 — Latr. NDict. p. 497 — Meig. p. 18. Nr. 28 — Boisd. Gen. p. 12 No. 104 — Dup. Cat. p. 81 — Kef. p. 306 No. 187 — HSch. VI p. 25 — Ghd p. 13 Nr. 45 — Hein. p. 82 No. 125 — Gebr. Sp. I p. 242 — Wnbg. II p. 14. 97. 160 — Std. Cat. I p. 6 Nr. 142 + Cat. II p. 13. Nr. 169 — Kirby p. 369. No. 236 — Berge V. p. 21 No. 13 — Hofm. I p. 9 No. 30 — Bramson p. 44 — Alph. Trs. E. S. 1891 p. 102 — Rühl p. 282 + 764 — Hofm. II p. 10 No. 30 — StdR. p. 87 No. 619 — Spuler p. 66. No. 35 — Seitz p. 316 — BRebel p. 72 No. 180 — Obth. 1910 p. 260 — Courv. 1910 p. 187.

Bilder: Esper T. 82 F. 3 ♂ (für ♀ erklärt!) 2 ♀ (für ♂ erklärt) — Engr. Suppl. III T. VI F. 80 ab quart ♂ c d ♀ („argus capucin“) — Hbst. T. 314 F. 4—6 ♂♀ U — Hübn. F. 307—9 ♂♀ U — Meig. T. 45. F. 6 a—c ♂♀ U ♀ — Dup. Hist. T. X. F. 6. 7 ♂ U — HSch. F. 488—9 U ♀ — Ghd T. 21 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F. 10 ♂ — Spuler T. 17 F. 1 ♂ — Seitz T. 81 e F. 7. 8 ♀ U.

Nebenformen: 1. *Transit. ad rippertii*. Rebel. Ann. Wien. Mus. 1903 p. 192.

2. *rippertii* Boisd. Icon. p. 68 No. 10 (eigne Art!) — Trtsch X p. 62 — Boisd. Gen. p. 12 No. 105 — Dup. Cat. p. 31 — Kef. p. 305 No. 185 — HSch. VI p. 24 — Ghd. p. 13 No. 44 — Hein. p. 77 No. 114 — Std. Cat. I p. 6 No. 143 — Berce 1867 p. 144 — BergeV. p. 21 No. 13 — Hofm. I p. 9 No. 30 — Hofm. II. p. 10 No. 30 — Obth. XX p. 17 + 1910 p. 257—261 — Elwes Trs. E. S. 1899. p. 326 — Wheeler p. 30 — Courv. 1910 p. 187.

Synonyma: a) *ri partii* Freyer Btr. III 1830 p. 128 T. 133. F. 3 ♀ (Bild unsicher!) — Std. Cat. II p. 13 No. 169 a — Rühl p. 282 + 764 — StdR. p. 87 No. 619 a — Seitz p. 316 — BRebel p. 78.

b) *ri perti* Led. Wien. Mon. 1857 No. 31 — Spuler p. 66.
c) *ri pertii*. Hübn. Geyer T. 194.

Bilder: Boisd. T. 16. F. 4—6 ♂♀ U — (nec. Freyer!) — Hübn. Geyer F. 958—960 ♂♀ U — Ghd T. 21 F. 3 a—c ♂ U ♀ Seitz T. 81 f. F. 1. 2 U ♀.

3. *F. mithridates*. Std. Hor. Ross. 1878 p. 247 + 1880 p. 66 (eigne Art!) — Rühl p. 283 + 764. — StdR p. 87 No. 620 — Seitz p. 316 T. 81 f. F. 3. 4 ♂ U — Courv. 1910 p. 187.

4. *F. fabressei*. Obth. 1910 p. 260.

(adonis Schiff. 1776. = bellargus Rott. 1775)

aedon: Christoph Hor. Ross. 1876 p. 326 T. 5. F. 8. ♂. — Rühl p. 287 — Std. Iris 1899 p. 152 — StdR. p. 87 No. 617 — Seitz p. 316 T. 81 e F. 1 ♂.

(aegagrus Christoph 1873	F. v. dardanus Freyer.)
(aegiades Ghd. 1853	F. v. argus L.)
(aegidion Meisner 1818	F. v. argus L.)
(aegina Gr. Grsh. 1891	F. v. idas L.)
(aegon Schiff. 1776	= argus L. 1758)
(aegonides Bremer 1864	= cleobis Bremer 1861)
(aeruginosa Std. 1881	F. v. alexis Poda)
aestiva Std. 1871	F. v. medon Esper)
(aetnaea Zeller 1847	F. v. semiargus Rott.)
(agathon God. 1821	= amandus Schnd. 1792)
(agestis Schiff. 1776 nom. nudum.	= medon Esper. 1777)
(agestor God. 1821	= escheri Hübn. 1805)
(agnata Std. 1886	F. v. christophi Std.)
(agraphomena Verity	F. v. damon Schiff.)
(akbesiana Obth. 1904	F. v. sephyrus Friv.)
(alaica Std. 1886	F. v. cytis Christoph)

alaina: Std. Stett. E. Z. 1887 p. 50 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 368 — Rühl p. 231 + 751 — StdR. p. 77 No. 542 — Seitz p. 303.

Synonym: muza farr Gr. Grsh. Mem. Rom. 1887 p. 399 + Mem. Rom. 1890 T. 8 F. 7 ♂.

(albescens Cockerell 1887		
(albicans Boisd. 1840 nom. nudum	}	Formen v. coridon Poda)
(albicans Ghd. 1853 T. 31. F. 1		F. v. hylas Esper)
(albicans Auriv. 1888		F. v. medon Esper)
(albida Leech. 1892		F. v. atroguttata Obth.)
(albofimbriata Gillm. 1905		F. v. bellargus Rott.)

alcedo: Christoph Hor. Ross. 1876 p. 233. T. 5. F. 3. 4 ♂♀ — Rühl p. 237 — StdR. p. 80. No. 562 — Seitz p. 304 T. 79a F. 9 ♂.

alcon: Fabr. Mant. p. 72 No. 683 + Ent. syst. III l. p. 293 No. 120 (nec alcon Schiff. nom. nud.). Hbst IX p. 192 — Lang 1789 p. 55 No. 472 — Syst. V. II p. 264 — Ochs I. 2 p. 7 No. 2 — Latr. NDict. p. 500 — Meisn. p. 87 — God. Enc. p. 699 No. 236 — Wood. Ind. p. 245 — Boisd. Gen. p. 13 No. 113 — MDür p. 97 No. 59 — Kef. p. 307 No. 199 — Wall. p. 282 — Gebr. Sp. p. 244 — Std Cat. I p. 6 No. 162 — Berce 1867 p. 149 — Kirby p. 374 No. 273 — Std. Cat. II p. 14 No. 186 — Spgbg p. 45 No. 13 — Frey p. 22 — Killias p. 21 — Hofm. I p. 10 No. 42 — Rühl p. 364 + 768 — Bramson p. 46 — Hofm. II p. 11 No. 42 — Caflisch p. 10 — Reutti p. 24. No. 50 — Favre p. 24 — StdR. p. 90 No. 644 — Rgmt p. 23 — Wheeler p. 20 — Spuler p. 68 No. 47 — Seitz p. 320 — Obth. 1910 p. 336 — Berge Rebel p. 75 No. 188 — Vorbrodt p. 154 No. 164 — Gramann E. Ztschr. Fkft. 1911 p. 217—8 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 285.

Synonyma: a) arcas Esper I p. 338 — Schnd. p. 262 No. 162 — Bgstr. III p. 15 — Jung 1791 p. 46.
b) diomedes Borkh. I. p. 169+281; II p. 233 — Hein. p. 75 No. 108 — BergeV. p. 20 No. 4.
c) euphemus God. Hist. 1821 p. 221 — Lucas p. 39.
d) euphemus Var. Boisd. Ind. p. 13.

Bilder: Esper T. 34. F. 4. 5 ♂♀ — Bgstr. T. 57. F. 7. 8 ♀ U (für ♂ erklärt!) T. 59. F. 1. 2 ♂ U — Hbst. T. 311. F. 6—8 ♂ U ♀ — Hübn. F. 263—5 ♂ U ♀ („hochblauer Falter“) — God. Hist. T. 11 secd. F. 6 ♂; T. 11 quart. F. 3 U (le „Protée“) — Meig. T. 43. F. 3 a—c ♂ U ♀ — Boisd. Icon. T. 13. F. 1—3 ♂ ♀ U — Lucas T. 26. F. 6 ♀ — Wood Ind. T. 53. F. 16 a ♂ — Ghd. T. 32. F. 5 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I. T. 4. F. 20 ♂ — Hofm. II T. 6 F. 14 b ♂ a ♀ (Geschlechter verwechselt!) — Spuler T. 17 F. 17 ab ♂ ♀ — Seitz T. 83. F. 1. 2 ♂ ♀ — BRebel T. 14 F. 20 ab ♂ ♀.

Nebenformen: 1. (alconoides Kef. 1851 p. 307 — nomen nudum!)
2. F. ♀ nigra Wheeler p. 21 — BRebel p. 75. — Vorbrodt p. 155.

3. *F. monticola* StdR. p. 90 No. 644 a — Spuler p. 68.
— Seitz p. 320 — BRebel p. 75.
4. *F. rebeli* Hirschke JBer. Wien 1904 (S. A.) T. II. F. 1. 2
 $\sigma\varphi$ — Seitz l. c. — BRebel l. c. — Kiefer Int. E. Z. Gub. 1913
p. 167.
5. *F. (aberri) cecinae* Horm. Vhdl. zool. bot. Wien 1897 p.
137 + Soc. ent. 1897 p. 18 — Rühl p. 305 — StdR. p. 90 —
Spuler p. 68 — Seitz p. 320 — BRebel p. 75.
6. *F. marginepunctata* Gillm. Soc. ent. 1904 p. 179.
7. *F. latimargo* Courv. Ent. Mittl. 1913 p. 294.
8. *F. basi-novopuncta* Courv. Iris 1912 p. 58. — Wehrli
p. 15.

(alconides Auriv. 1888

F. v. arion L.)

alexis:

Poda Ins. Mus. Graec. 1761 p. 77 No. 47 — Schiff.
p. 183. No. 7 („Femina Alexis Poda“) — Linné-Gmelin 1788.
I. V. p. 2347 Nr. 750 („Alexis Podae“) — Syst. V. II.
p. 265. — Wnbg. I p. 296 — Std. Cat. II p. 14 Nr. 182.
(„Alexis Poda, hoc nom. restituend.“) — Courv. 1910 p.
197—8 — Vorbrot p. 152—4 No. 163 — Tur. Bull. Ital.
1911 p. 260 — Perlini Lomb. 1912 p. 71.

Synonyma: a) *cyllarus* Rott. Naturf. VI 1775 p. 20 Nr. 7 —
Esper I p. 334 — Bgstr. III p. 11 — Fabr. Mant. p. 72 No.
685 — Borkh. I p. 176 + 283; II p. 234 — Linné-Gmelin
I. V. p. 2347 No. 750 — Schnd. p. 267. No. 166 — Lang.
1789 p. 56 No. 483 — Fabr. Ent. syst. III. 1. p. 294 Nr.
132 — Prunn p. 60 No. 116 — Ochs. I. 2. p. 12 No. 5 —
Latr. NDict. p. 501 — Meisn. p. 87 No. 8 — God. Enc. p.
702 No. 244 + Hist. p. 222. — Meig. II p. 6 No. 6 — Boisd.
Ind. p. 13 — Schott p. 75 No. 91 — Boisd. Gen. p. 13
No. 111 — Dup. Cat. p. 31 — Bertol. p. 32 — Kef. p. 306
No. 194 — MDür p. 95 No. 58 — Ghd. p. 9 No. 20 — Wall.
p. 233 — Gebr. Sp. p. 246. — Hein. p. 73 No. 102 — Std.
Cat I. p. 6 No. 158 — Berce 1867 p. 148 — Std. Cat. II
p. 14 No. 182 — Kirby p. 373 No. 265 — Spgbg. p. 56 No.
7 — Berge V. p. 21 No. 6 — Killias p. 21 — Frey p. 21
— Hofm. I p. 9 No. 39 — Bramson p. 44 — Rühl p. 300
+ 767 — Caflisch p. 10 No. 21 — Hofm. II p. 11 No. 39
— Obth. XX p. 16 — Reutti p. 24 No. 49 — Favre p. 23 —
StdR. p. 89 No. 638 — Rgmt. p. 23 — Wheeler p. 26 —
Spuler p. 68 No. 45 — PImh. p. 28 — Seitz p. 319 — Obth.
1910 p. 308—312 — Courv. 1910 p. 197—9 — BRebel p. 74
No. 186 — Rehfous Bull. lép. Genève 1913 p. 238—250 —
Eckstein p. 108.

b) *syllarus*. Berce 1884 p. 19.

c) *damaetas* Schiff p. 183 No. 7 („Wirbelkrautfalter — Fem.
alexis Poda“) — Schrank. II. p. 211 — Hübn. p. 45 No. 6
+ Verz. p. 67 No. 647.

d) *bronte*. Bgstr. III p. 13.

Bilder: Esper T. 33. F. 1. 2 $\sigma\varphi$ — Engr. T. 41 F. 86 n. o σ
U — Bgstr. T. 56 F. 7. 8 σ U; T. 55. F. 1. 2 φ U — Hbst T. 309.
F. 7—9 σ U φ — Hübn. F. 266—8 $\sigma\varphi$ U — God. T. 11 F. 3 σ ;
T. 11 quart. F. 3 σ — Meig. T. 46 F. 2 a—e σ U U φ U —

Berce 1884 T. 3 F. 24 ♀ (angeblich ♂) 23 U — Ghd. T. 15 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I. T. 4 F. 18 a b ♂ ♀ — Hofm. II T. 6 F. 11. a b ♂ ♀. — Spuler T. 17 F. 16 a b ♂ ♀ — Seitz T. 82 f. F. 5—7 ♂ ♀ U — BRebel T. 14 F. 19 b c ♂ ♀ — Eckstein T. 16. F. 2 b ♂.

- N e b e n f o r m e n :** 1. *tristis* Ghd. p. 9 No. 22 T. 15 F. 4 ab ♂ U — MDür p. 97 — Std. Cat. I p. 6 No. 159 a — Std. Cat. II. p. 14 No. 182 a („vix nom. conserv.“) — Kirby p. 373 No. 265 a — Rühl p. 301 + 768 — StdR. p. 89. No. 638 — Wheeler p. 26 — Seitz p. 319 — BRebel p. 74 — Courv. 1910 p. 199 — Cat. Lép. Genève p. 32 — Vorbrot p. 153. 2. *F. aeruginosa* Std. Stett. E. Z. 1881 p. 225 — Rühl p. 301 + 768 — Nicholl & Elwes Trs. E. S. 1901 p. 95. — StdR. p. 89 No. 638 c — Spuler p. 68 — BRebel p. 74 — Seitz p. 319 — Courv. 1910 p. 199 — Stichel Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1911 p. 112 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 285. 3. *F. blachieri*. Mill. Ann. France 1887 p. 215. + Icon. T. 108. F. 5. 6. ♂ U + Ann. France T. 5 F. 8. 9. ♀ U — Rühl p. 301 + 768 — Agassiz p. 240 — StdR. p. 89 No. 638 a — Wheeler p. 26 — Spuler p. 68 — Seitz p. 319. T. 82 g. F. 1. 2 ♂ ♀ — BRebel p. 74 — Courv. 1910 p. 198 — Cat. Lép. Genève p. 32 — Vorbrot p. 153. 4. *F. andereggii* Rühl Soc. ent. 1891 p. 51 — Agassiz p. 240 — Favre p. 24 — StdR. p. 89 No. 638 — Wheeler p. 27 — Seitz p. 319. T. 82 g. F. 1 — BRebel p. 74 — Obth. 1910 p. 311 — Courv. 1910 p. 198 — Vorbrot p. 153. 5. *F. lugens*. Caradja Iris 1893. p. 177 + ib. 1895 p. 41 — Rühl p. 768 — Horm. Vhdl z. bot. Wien 1897. p. 19 — Favre Suppl. p. 5 — StdR. p. 89 No. 638 b — (Wheeler p. 26?) — Rebel Ann. Wien. Mus. 1913 p. 194 — Spuler p. 68 — Seitz p. 319. T. 82 g. F. 4. 5 ♂ ♀ — Courv. 1910 p. 199 — (Vorbrot p. 153?) — Rebel Ann. Wien. Mus. 1911 p. 305. 6. *F. laetifica* Püngeler Soc. ent. 1898 p. 57 + Iris 1899 p. 95 (eigne Art?) — StdR. p. 89 No. 638 d — Seitz p. 319. 7. *F. alpina* Tur. Ver. Bull. Ital. 1911 p. 260. 8. *F. latimargo*. Courv. Ent. Mittl. 1913 p. 294 — Rebel Ann. Wien. Mus. 1911 p. 305. 9. *F. schneideri* Strand. Arch. f. Math. og. Naturvidenskab. XXV. 1903 p. 4. — **S y n o n y m :** *F. caerulea* Courv. Ent. Mittl. 1913 p. 293. 10. *F. punctata* Muschamp Bull. Genève 1908 p. 264 — Courv. 1908 p. 23. 11. *F. (aberr.) dimus* Bgstr. II p. 71 — (Bellier Ann. France 1858 p. 308) — (Obth. XX p. 16) — (Stef. p. 55) — Seitz p. 319 — Courv. 1910 p. 199 — BRebel p. 74 — Vorbrot p. 154. **S y n o n y m a :** a) *dymus* Borkh. I p. 177 p. II 234 — Cat. Lép. Genève 1910 p. 32. b) *phobos* Bgstr. III p. 11. c) *paucipuncta* Courv. 1907 p. 74 — MDür p. 96 — Courv. 1910 p. 199 + Iris 1912 p. 63. **B i l d e r :** Esper T. 33 F. 2 ♀ — Bgstr. T. 43 F. 7. 8 ♀ U („dimus“) T. 54. F. 7. 8 ♀ U („phobos“) — Hbst T. 309. F.

10. 11. ♀ U („dymus“) — Ghd. T. 15 F. 3 b ♀ — Meig. T. 46. F. 2 c U — Berge I. T. 29. F. 14 b. ♀ — Obth. XX T. 3. F. 22 ♂.

12. F. subtus - impunctata Obth. XX p. 16. T. 3. F. 21 ♂ — Courv. 1910 p. 199 („caeca“) + Iris. 1912. T. 5 F. 29 ♂.
13. F. subtus — radiata Obth. XX p. 16 T. 3. F. 23 ♂ — Favre Suppl. p. 5.

Synonym: F. (disco —) elongata Courv. 1907 p. 34 + 1910 p. 199 + Iris 1912 p. 47.

(alexis Var. 1 Scop. 1763, nom. praeocc. = medon Esper 1777)

(alex. Var. 2. 3 Scop. 1763, nom. praeocc. = icarus Rott. 1775)

(alexius Freyer 1858 = thersit. Canten. 1834?)

allardii: Obth. Pet. Nouv. ent. 1874 I p. 412 + Etud. IX. 1884 p. 35 T. 3 F. 16 ♀ — StdR p. 79. No. 553. („sephyri Friv. f. Darwiniana?“) — Seitz p. 303 T. 78 i. F. 4 ♀ — Obth. 1910 p. 225.

(alpestris Freyer 1852	F. v. damone Evans.)
(alpina Berce 1867	F. v. idas L.)
(alpina Courv. 1910	F. v. argus L.)
(alpina Tur. 1911	F. v. alexis Poda)
(alsa Berge 1842 }	= argus L. 1758)
(alsus Esper 1782 }	

amandus(a) Schind. N. Mag. f. Liebh. d. Ent. IV 1792. p. 428 — Hbst. IX p. 222-4 — Hein. p. 81 No. 124 — Berce 1867 p. 141 — Std. Cat. I p. 5 No. 135 + Cat. II p. 12 No. 162 — Berge V p. 22 — Hofm. I p. 24 No. 8 — Killias p. 20 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 889 — Bramson p. 54 — Rühl p. 272 + 762 — Hofm. II p. 10 No. 24 — Elwes Pr. Z. S. 1899 p. 326 — Favre p. 19 — StdR. p. 85 No. 607 — Wheeler p. 23 — Spuler p. 65 No. 29 — Seitz p. 313 — BRebel p. 70 No. 174 — Vorbrodt p. 141 — Perlini 1912 p. 67 —

Synonyma: a) amantus Hübn. 1805 T. 59.

b) icarius Esper. Suppl. II 1783 p. 35 — Ochs. I. 2 p. 37 („der ältere Name amandus als adjективum nicht zu gebrauchen!“) — Hübn. Verz. p. 68 No. 667 — Meisn. p. 87 — Meig. II. p. 15-6 — Boisd. Ind. p. 12 + Icon. p. 50 — Lucas p. 36 — Boisd. Gen. p. 12 No. 93 — Dup. Cat. p. 33 — Berge II p. 156 No. 29 — Kef. p. 309 No. 212 — Ghd. p. 17 No. 77 — Wall. p. 227 — Gebr. Sp. p. 236 — Spgbg. p. 26 — Frey p. 18.

c) corydon Becklin (Thunberg) Diss. ent. 1791 p. 39.

d) agathon God. Enc. p. 695 No. 229 — Boisd. Gen. p. 12 No. 93 — Dup. Cat. p. 33.

Bilder: Esper T. 99. F. 4 ♂ — Hbst. T. 313 F. 10-12 ♂♀ U — Hübn. F. 283-5 ♂♀ U („sattblauer Falter“) + F. 752-3 ♂ U — Meig. T. 45. F. 1 ab ♂ U — Boisd. Icon. T. 12 F. 1-3 ♂ U ♀ — Dup. Hist. Suppl. T. 11 F. 1. 2 ♂ U. — Lucas T. 25 F. 5 ♂ — Berge II T. 33. F. 12 ♂ — Ghd. T. 29 F. 4 a-c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F.

4 ♂. — Hofm. II T. 5 F. 20 ab ♂♀ — Spuler T. 16 F. 18 b
♂ a ♀. — Seitz T. 80 h. F. 1. 2 ♂ U —

N e b e n f o r m e n : 1. F. o r i e n t a l i s Std. Hor. Ross. 1875 p. 244 — StdR. p. 85 No. 607 b — Seitz p. 313 T. 80 h. F. 3 ♂ — BRebel p. 70 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 253.

2. F. a r g e n t e a Lampa Ent. Tidskr. 1885 No. 14 — Seitz l. c. — BRebel l. c.

3. F. a m a t a Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 403 — Rühl p. 273 — StdR. p. 85 No. 607 c — Seitz p. 313. T. 80 h F. 6 ♂.
S y n o n y m : F. t u r e n s i s Rühl p. 762.

4. F. a m u r e n s i s Std. Mem. Rom. 1892 p. 162 — Herz Iris 1899 p. 238 — StdR. p. 85 No. 607 d — Seitz p. 313 T. 80 h F. 7 U.

5. F. l y d i a Krul. Berl. E. Nachr. 1892 p. 97 — StdR. p. 85 No. 607 a — Rühl p. 273 — Spuler p. 65 — Seitz p. 313. T. 80 h. F. 3 ♂.
S y n o n y m : F. a m y c u s Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 403 (nom. nudum).

6. F. a b d - e l - a z i z Blachier. Ann. France 1908 p. 218.
7. F. h i s p e l i s Fruhstf. Soc. ent. 1910 p. 47.

8. F. i s i a s Fruhstf. l. c.
9. F. l i b i s o n i s Fruhst. Soc. ent. 1911 p. 96 — Ramme Berl. E. Ztschr. 1911 T. 2 F. 3.

10. F. (aberr) s t i g m a t i c a Schultz. E. Z. Gub. 1906. p. 214 — Seitz p. 313.
S y n o n y m : A b. a m a n d i n a Krul. Soc. ent. 1908 No. 2 p. 11 — BRebel p. 70.

11. F. ♀ c y a n e a Aigner Ann. Hung. 1906 p. 516 — (Hübn. T. 159. F. 284.)
S y n o n y m : a) F. a z u r e a Blachier Ann. France 1908. p. 218.
b) F. c a e r u l e a BRebel p. 70.

12. F. (aberr.) c a e c a Gillm. Soc. ent. 1904 p. 180 — Stange Macrolep. v. Friedland 1901 p. 4 — Leonhardt E. Z. Gub. 1904 p. 54 + 1905 T. XVI. F. 1 ♂.
13. F. (aberr.) c o n f l u e n s (Schrenk) Slevogt. Arb. Ver. Natf. Riga. 1910. 2. p. 49.

(amoena Schultz 1904	♀ F. v. icarus Rott.)
(amor Std. 1886	? F. v. tithonus Hübn.)
(amphion Esp. 1780	= baton Bgstr. 1779.)
(amphion Fabr. 1793	F. v. idas L.)

a n i s o p h t h a l m a : Kollar Denkschr. Akad. Wien. 1850 p. 51 — Christoph Hor. Ross. 1877 p. 199 — Rühl p. 240 — StdR. p. 80 N. 568 — Seitz p. 305 T. 79 c. F. 1. 2 ♀ U.

S y n o n y m p a n a g a e a f. a r s a c i a Led. Hor. Ross. 1869 p. 78 T. 4. F. 9 ♂ + ib. 1872 p. 9.

a n t e r o s : Freyer NBtr. III. 1839 p. 101. — Boisd. Gen. p. 11 No. 88 — Dup. Cat. p. 32 — Kef. p. 308. No. 206 — Std. Cat. I p. 5 No. 129 + Cat. II p. 11 No. 157 — Kirby p. 364 No. 207 — Christoph Hor. Ross. 1877 p. 200 — Hofm. I p. 8 No. 20. — Rühl p. 263 + 759 — Hofm. II. p. 9 No. 20 — Bramson p. 49 — Nicholl & Elwes Trs.

E. S. 1901 p. 92 — StdR. p. 84 No. 596 — Spuler p. 64
No. 26 Seitz p. 310 — BRebel p. 69 No. 170.

Bilder: Freyer T. 265. F. 1 ♂ — HSch. T. 3. F. 16. 17 ♂ U
— Ghd T. 26 F. 5 a-c ♂ U ♀ — Hofm. II T. 5. F. 17 ♂
— Spuler T. 16 F. 15 ♂ — Seitz T. 80 c. F. 4—6 ♂ ♀ U.

Nebenformen: 1. F. crassipuncta Christoph Iris 1893
p. 86 — Rühl p. 759 — StdR. p. 84 No. 596 a — Nicholl &
Elwes. l. c. p. 92 — Seitz p. 311 — BRebel p. 69.

2. F. pupillaris Aigner. Rov. Lapok IX. p. 193 — Seitz
l. c. — BRebel l. c.

3. F. albata Courv. F. nova (subtus alba).

anthracias: Christoph. Hor. Ross. 1877 p. 239. T. 5. F. 12 ♂ —
Alph. Lepid. Kouldja 1881 p. 52 — Rühl. p. 254 + 757 —
StdR. p. 80. No. 571 — Seitz p. 305 T. 79 d 6. 7 ♂ U.

(aquila Ghd. 1853
(aquilina Std. 1901
(aquilo Boisd. 1832
(aquilo Auriv. 1890
(aquilonia Wheeler 1903} Formen v. rustica Edwds.)

arcas: Rottb g Naturf. VI. 1775 p. 25 No. 18 — Borkh
I p. 169 + 281 — Hein. p. 74 No. 106 — Std. Cat I. p. 6.
No. 165 — Berce 1867 p. 150 — Std. Cat. II p. 14 No. 189
— Kirby p. 375 No. 278 — Berge V. p. 20 No. 1 — Jenner
p. 294 — Hofm. I p. 10 No. 45 — Bramson p. 44 — Hofm.
II p. 11 No. 45 — Rühl p. 309 + 770 — Reutti p. 24 —
StdR. p. 90 No. 468 — Wheeler p. 20 — Spuler p. 69
No. 50 — PImh. p. 29 — Seitz p. 321 — BRebel p. 76
No. 191 — Cat. Lép. Genève p. 33 — Obth 1910 p. 335 —
Vorbrodt p. 155 No. 166.

Synonyma: a) erebus Knoch. 1782 p. 93 — Esper Suppl.
I p. 44 — Fabr. Mant. p. 72 No. 682 + Ent. syst. III I p.
293 No. 119 — Gmelin-Linné p. 2347 No. 747 — Lang
1789 p. 56 No. 476 — Schnd. p. 264 No. 163 — Ochs. I.
2. p. 10 No. 4 — Hübn. p. 44 No. 1 + Verz. p. 67 No.
648 — Latr. NDict. p. 500 — God. Enc. p. 700 No. 238 —
Meig. II p. 4 No. 4 — Boisd. Icon. p. 77 — God. Dup.
Suppl. I p. 79 — Boisd. Gen. p. 13 No. 115 — Dup. Cat.
p. 31 — Berge II. p. 153 — MDür p. 97 No. 61 — Ghd.
p. 19 No. 93 — Gebr. Sp. p. 246 — Frey p. 23 — Rgmt. p. 23.
b) nausithous ♂, nausithoë ♀ Bgstr. II 1779. p.
70—1.

c) arion Latreille Enc. méth. XXVI. 1830 T. 50.

Bilder: J. C. Schäffer Icon. T. 185 F. 1. 2 ♂ U — Esper T.
101 F. 1. 2 ♂ U — Engr. T. 40 F. 86 b ♂ ac ♀ U —
Bgstr. T. 43 F. 1—3 ♂ ♀ U — Knoch. T. 6. F. 1. 2 ♀ U —
Hbst. T. 309 F. 4—6 ♂ ♀ U — Hübn. F. 260—2. ♂ ♀ U —
Meig. T. 43 F. 4 a-c ♂ ♀ U — Latr. l. c. T. 50 F. 2. 2 bis
♂ U — Boisd. Icon. T. 11. F. 4—6. ♀ U ♂ — God. Dup.
T. 13 F. 1. 2 ♂ U — Ghd. T. 33 F. 2 a-c ♂ U ♀ —
Berge II T. 33. F. 1 ♂ — Hofm. I. T. 4 F. 23 ♂ — Hofm.
II T. 6 F. 17 ab ♂ ♀ — Spuler T. 17 F. 19 ab ♂ ♀ —
Seitz T. 83 e F. 6. U — BRebel. T. 14. F. 23 U.

Nebenformen: 1. *F. minor* Frey. Mitth. schweiz. 1882 p. 362 (nec Rätzer!) — Rühl p. 770 — StdR. p. 90 No. 648 — Wheeler p. 20 — BRebel p. 76 — Cat. Lép. Genève 1910 p. 33.
 2. *F. lucida* Geest. Allg. Z. f. Ent. VIII p. 314 — Seitz p. 321 — BRebel p. 76.
 3. *F. (subtus) inocellata* Sohn Soc. ent. 1893 p. 77 — Gillm. E. Z. Gub. 1904 No. 1 — Seitz p. 321 — BRebel p. 76 — Obth. 1910. p. 335 — Courv. Iris 1912 p. 62.
 4. *F. lycanoides* Schultz E. Z. Gub. 1904 p. 94 („alis supra impunctatis“) — Courv. Iris 1912 p. 62. (nec Seitz p. 321!) Seitz T. 83. e F. 5 ♂.
 (Synonym: *lucida* Geest?)

(*arcas* Esper 1777 nom. praeocc. = *alcon* Fabr. 1787)
 (*arctophonus* Bgstr. 1779 ♂ } v. *euphemus* Hübn.)
 (*arctophylax* Bgstr. 1779 ♀ }

argali: Elwes. Trs. E. S. 1899. p. 328. — StdR. p. 89 No. 641 — Seitz p. 320.

(<i>argellus</i> Tur. 1911	F. v. <i>idas</i> L.)
(<i>argentea</i> Lampa 1886	F. v. <i>amandus</i> Schnd.)
(<i>argentea</i> Obth. 1896	F. v. <i>bellargus</i> Rott.)
(<i>argester</i> Bgstr. 1779	= <i>hylas</i> Esper 1777)
(<i>argiades</i> Esper 1777	= <i>argus</i> L. 1758)
(<i>argiades</i> Fabr. 1787	= <i>jolas</i> Ochs. 1816)
(<i>argianus</i> Dalman 1816	= <i>semiargus</i> Rott. 1775)
(<i>argiolus</i> Füssl. 1775 nom. praeocc.	= <i>semiargus</i> Rott. 1775)
(<i>argiva</i> Std. 1886	F. v. <i>idas</i> L.)
(<i>argopoeus</i> Bgstr. 1779	= <i>semiargus</i> Rott. 1775)
(<i>argulus</i> Frey 1880	F. v. <i>idas</i> L.)

argus: Linné. Syst. Nat. Ed. X 1758. p. 483 No. 152 + F. svec. Ed. II. 1761 p. 283 No. 1074 — Hufnagel Berl. Mag. f. Liebh. d. Nat. Gesch. 1766 p. 72 No. 29 — Fabr. Syst. 1775 p. 525 No. 346 — Lang 1782. p. 33 No. 262 — Schnd. p. 254 No. 153 — Fabr. Mant. p. 74 No. 690 — Gmelin-Linné p. 2347 No. 232 — Fabr. Ent. syst. III. I. p. 296 No. 128 Var. — Laspeyres Illig. Mag. 1805 p. 65 — Wall. p. 206—7 — Kirby Cat. p. 357 No. 145 — Spgbg p. 30 No. 8 — Schöyen Ent. Tidskr. 1882 p. 33—62 — Speyer Stett. E. Z. 1882 p. 379—381 — de Vos Tijdschr. f. Ent. 1897 p. 229 — 237 — StdR. p. 77 No. 543 — Wheeler p. 42 — Spuler p. 60 No. 8 — Seitz p. 300 — Tutt III. 1909. p. 164—248 — Chapm. Trs. E. S. 1909 p. XV etc. — BRebel p. 66 No. 159 — Courv. 1910 p. 66 etc. + Int. E. Z. Gub. 1912. No. 31 — 38 — v. Linstow Iris 1913. p. 1—8 — Schulze Int. E. Z. Gub. 1913. No. 31 — Courv. ib. 2913 p. 63—4 — Verity J. Linn. S. Zool. 1913. p. 188—9 — Courv. Int. E. Z. Gub. 1913 p. 112—3.

Synonyma: a) (*sylvius* Poda p. 77 No. 44?) — Wnbg I p. 295
 b) *aegon* Schiff. 1776 p. 185 No. 15 („Geisskleefalter“) — Müller-Linné 1774 p. 625 No. 232 („Silberauge“) — Schnd. p.

252 No. 154 — Gmelin-Linné p. 2348 No. 232γ — Lang 1789
 p. 55 No. 458 — Jung 1791 p. 10 — Syst. V. II p. 273 — Hbst.
 IX p. 239—243 — Hübn. p. 50 No. 24 — Ochs I. 2. p. 57 No.
 25 — Hüb. Verz. p. 69 No. 671. — Latr. NDict p. 497 — Meisn.
 p. 88 — God. Enc. p. 685 No. 213 + Hist. p. 217 — Meig.
 p. 31 No. 38 — Schott p. 82 No. 109 — Freyer NBtr. II
 p. 129 — Lucas p. 33 — Boisd. Gen. p. 10 No. 76 — Dup.
 Cat. p. 32 — Bertol. p. 36 No. 11 — Berge II p. 156 No.
 32 — Kef. p. 310 No. 224 — MDür p. 65—8 — Ghd p. 13
 No. 51 — Gebr. Sp. p. 233 — Hein. p. 84 No. 132 —
 Westwd. p. 114—5 — Stainton p. 119 — Berce 1867 p. 133
 — Newman p. 119—121 — Std. Cat. II p. 4 No. 105 —
 BergeV. p. 23 No. 30 — Jenner p. 294 — Frey p. 14 —
 Speyer Stett. E. Z. 1882 p. 379—381 — Bramson p. 52 —
 Rühl p. 232+751 — Caflisch p. 7 — Obth. XX. p. 28 —
 de Vos l. c. p. 229—237 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 323
 — Stef. Cat. p. 48 — Rgmt p. 20 — Obth. 1910 p. 172—
 211 — Courv. 1910 p. 89—94 — Vorbrot p. 126—9 No.
 141 — Tur. 1911 p. 248—253 — Perlini 1912 p. 62 —
 Courv. Int. E. Z. Gub. 1912 No. 31—38 + ib. 1913 p. 112
 — 3 — Ribbe Iris 1912. p. 184—5.
 c) als u.s. Esper Suppl. II. 1782 p. 46.
 d) alsa Berge I. 1842 p. 91.
 e) argiades Esper. Suppl. II. 1782 p. 49.
 f) argyrotoxus. Bgstr. II. 1779. p. 77 — Borkh. I p. 154
 — Std. Cat. II p. 10 No. 232 — Christ 1878. p. 372 —
 Hofm. I. p. 7 No. 6 — Gräser Berl. E. Ztschr. 1888 p. 76
 — Hofm. II. p. 8 No. 6 — Reutti p. 22 — Favre p. 15 —
 P. Imh. p. 25.
 g) argyra Bgstr. II. 1779. p. 78.
 h) argyrophalara Bgstr. III. 1779 p. 10.

Bilder: Esper T. 101 F. 3 ♂ 4 ♀ 5 ♂ — Engr. T. 40. F. 85
 c d ♂ U („Argus bleu violet“) — Bgstr. T. 47 F. 3. 4. ♂
 U 5. 6 ♀ U; T. 54. F. 1. 2 ♀ U — Hbst. T. 315. F. 4—6
 ♂♀ U — Hübn. F. 313—5 ♂♀ U — God. Hist. T. 11 sed.
 F. 4 ♂ — Meig. T. 49. F. 6a—c ♂♀ U — Freyer T. 175. ♂
 U — Lucas T. 24 F. 7 ♂ — Berge II T. 33. F. 15 ♂ —
 Ghd. T. 23 F. 2 a—c ♂ U ♀ — Newman p. 119 (3 Text-
 bilder) — Berce 1884 T. 3 F. 10 ♂ — Hofm. I. T. 3 F.
 24 ♂ — Hofm. II T. 5. F. 3 ab ♂♀ — Kirby Lloyd's Nat.
 Hist. II. 1896. T. 46. F. 4. 5 ♂ U — Spuler T. 16 F. 1 ab
 ♂♀ — Seitz T. 78 c F. 7. 8 ♂ U; d. F. 1 ♂; e F. 6 ♂
 — Obth. 1910. T. 38. F. 254—8 + T. 39 F. 269—274 +
 T. 40. F. 283—9.

Nebenformen: 1. F. argiades Esper Suppl. II p. 49 T. 101.
 F. 6 ♂.
 2. F. philonomus ♂, philome ♀ Bgstr. II p. 72
 — 3 T. 44. F. 7. 8 ♂ U. 6 ♀ — Hbst T. 316 F. 12 ♂ 11 ♀
 13 U (Kopien nach Bgstr.) — Ochs. Natwiss. Anzeiger 1821
 p. 15 — Kirby p. 357 No. 145 — Tutt III. 1909. p. 190.
 3. F. bella. H. Sch. I p. 127 + VI. p. 31 — Kef. p. 310

- No. 224 — Ghd. p. 21 No. 107 — Std. Cat. I p. 4 No. 105 a.
 — Std. Cat. II p. 10 No. 132 a — Kirby. p. 357 No. 145. b
 — Rühl p. 232 + 751 — Nicholl & Elwes Trs. E. S. 1901
 p. 92 — StdR. p. 78 No. 543. c — Seitz p. 300 — BRebel
 p. 66 — Tutt III. 1909. p. 187 — Obth. 1910 p. 180 —
 Courv. 1910 p. 92 + Int. E. Z. Gub. 1912 p. 258.
 Synonyma: a) (*casaiacus* Chapm. Trs. E. S. 1907
 p. 158?)
 b) *rufomaculata*. Rev. Bull. lépid. Genève 1909 p. 5
 (false „rufolunulata“ Tutt).
 c) *calabrica* Tur. Soc. ent. 1911. No. 21 p. 84.
 Bilder: H. Sch. F. 227—8 ♂ U — Ghd T. 37. F. 1 ab
 ♂ U — (Chapm. l. c. T. 5 F. 16. 17 ♂♂) — Rev. l. c. T.
 9. F. 1 ♂ — (Seitz T. 78 d. F. 6. 7 ♂ U — nicht charakte-
 ristisch!)
 4. F. *aegiades* Ghd. p. 19 No. 99 T. 34. F. 4 a—c ♂ U ♀.
 5. F. *valesiana* MDür p. 67 — Seitz p. 300 — Courv.
 1910 p. 94.
 6. F. *hypochiona* Ramb. Cat. Lép. Andal. 1858 p. 35—37
 — Obth Et. VIII. 1884 p. 15. 16 + Et. XX p. 27. T 4 F. 59.
 60 ♂♀ — StdR. p. 78 No. 543 b — Spuler p. 60 — Seitz
 p. 300. (T. 78 d. F. 4. 5 ♂ — nicht charakteristisch!) —
 Tutt III. 1909 p. 194 — BRebel p. 66 — Obth. 1910. p.
 192 T. 39 F. 267—270 ♂♀ ♂♀ — Courv. 1910. p. 93 +
 Int. E. Z. Gub. 1912 p. 258 — Vorbrot dt p. 128 — Ribbe
 Iris 1912. XXVI p. 185.
 Synonym: a) *idas* L (*argus* auct., *argyrogynomon*
Bg str.) Var (false!) Std. Cat. I p. 4. No. 106 a — Std.
 Cat. II. p. 10 No. 133 c. — Kirby Cat. p. 358. No. 153. b
 — Hofm. I. p. 7 No. 7 — Rühl p. 234.
 b) *bejarensis* Chapm. Ent. Mo. Mag. 1907 XIV p. 24. —
 Seitz. p. 300.
 c) *vacaresa* Ribbe Iris 1912. XXVI. p. 184.
 7. F. *corsica* Bellier Ann. France 1862 p. 615 — Kirby p.
 357 No. 145 a. — Obth XX p. 27 — Kollmorgen Iris 1899.
 p. 316 — StdR. p. 78 No. 543 a — Perlini Ital. 1905. p.
 19 — Spuler p. 60 — Seitz p. 300 — Tutt III p. 201 —
 Obth. 1910 p. 191—2 — Courv. 1910 p. 94 + Int. E. Z.
 Gub. 1912 p. 258.
 Bilder: Bellier l. c. T. 14 F. 5 ♂ — Obth 1910. T. 40 F.
 288—9 ♂♀ — Perlini l. c. T. 3 F. 6 ♂.
 8. F. *micrargus* Butl. Cist. ent. II 1873 p. 283 — Elwes
 Trs. E. S. 1881 p. 889 — Leech China II. p. 301 — Tutt.
 III p. 200 — Seitz p. 300.
 Synonyma: a) F. *pseudaeagon* Butl. Pr. Z. S. 1881 p.
 851 — Leech China II. p. 301 — Seitz p. 300.
 b) F. *coreana* Tutt. III. p. 201?
 c) F. *japonica* Obth. 1910. T. 42 F. 313—4 ♂♀?
 9. F. *Killiasii* Christ Vhdl. naturf. Ges. Grbdn 1883 p. 10
 — Courv. 1910 p. 93 — Tutt III p. 191 — Courv. Ent. Mittl.
 1913 No. 10.
 10. F. *valmasinii* Perlini Lep. Ital. 1905 p. 19 T. 3 F.
 5 ♂ — Tur. Ver. Bull. Ital 1911 p. 248 — Courv. Int. E. Z.
 Gub. 1913 p. 312.

11. *F. casaiacus* Chapm. Trs. E. S. 1907. p. 158 T. 5. F. 16—19 ♂♂ U ♀ — Ribbe Iris 1912. XXVI p. 186.
Synonym: *argyrogномон* Var. *casaiacus* Seitz p. 302. (false!)
12. *F. lydiades* Fruhstf. Int. E. Z. Gub. 1910 p. 55.
13. *F. cleomenes* Fruhst. ib.
14. *F. alpina* Courv. 1910 p. 22 — Vorbrot p. 126 — Courv. Int. E. Z. Gub. 1912 p. 258.
15. *F. nigrescens* Courv. 1910 p. 94 + Iris 1911 p. 103 T. 2. F. 3 ♂ — Vorbrot p. 128.
16. *F. carinthiaca* Courv. Ent. Mittl. 1913 No. 10.
17. *F. brunnea* Courv. 1910 p. 93 — Vorbrot p. 128.
18. *F. leodorus*. Esper Suppl. I 1782 p. 137 T. 80 F. 1. 2 ♀♀ (angeblich ♂♀) — Bgstr. T. 121. F. 1—4 ♀♀ UU (Kopieen nach Esper) — Schnd. p. 253 No. 155 — Borkh. I p. 156 — Lang 1789 p. 54. No. 448 — Hbst. T. 316 F. 1. ♂ 3 ♀ 4 U (Kopieen n. Esper) — Ochs. I. 2. p. 54 — Meig. II p. 31 — Tutt. III p. 166.
Synonym: *F. caerulea* Courv. 1910 p. 93 — (MDür p. 67) — (Christ 1878 p. 373) — Courv. Int. E. Z. Gub. 1912 p. 259 — Vorbrot p. 127.
19. *F. caeruleo-caerulea* (Petersen) Seitz p. 300 — Slevogt Arb. Natf. Ver. Riga 1910. 2 p. 47.
20. *F. caeruleo-cuneata* Ebert. Soc. ent. 1908 p. 169 + Festschr. Ver. Nat. kde. Cassel 1911 p. 316. T. 5. F. 4 — Seitz p. 300 — BRebel p. 66.
21. *F. albopunctata* Galv. & Preiss 1911 I p. 135.
22. *F. (aberr.) disco-elongata* Courv. Iris 1912 p. 46 — Aigner Ann. Hung. 1906. p. 515. T. 14. F. 6 ♀.
23. *F. (confluens) extrema* Courv. 1907 p. 37 T. 1 F. 24 + Iris 1912 p. 55. T. 5 F. 24 ♀.
24. *F. (confluens) tribasijuncta* Courv. Iris 1912 p. 52 T. 5 F. 16 ♀.
25. *F. (aberr.) aegidion* Meisn. (nec Meissner) p. 88 — Charpentier Germars Mag. d. Ent. IV. 1821 p. 394 — 6. — Ghd. p. 13 No. 53. T. 23. F. 4a—c ♂ U ♀ — Seitz p. 302 — Courv. 1910 p. 93 — Vorbrot p. 128 — Courv. Int. E. Z. Gub. 1912 p. 243—4.
Synonyms: a) *idas* L (*argus* auct., *argyrogномон* Bgstr) Var (false!) — MDür p. 66—7 — Std. Cat. I p. 4 No. 106. b — Std. Stett. E. Z. 1861 p. 344 — Kirby p. 359 No. 153 c — Std. Cat. II p. 10 No. 133. b — Frey p. 15 — Hofm. I p. 7 No. 7 — Rühl p. 234 + 762 — Caflisch p. 8 — Favre p. 16 — Strand Nyt Mag. 1901 p. 47 — Wheeler p. 43 — Spuler p. 61 — BRebel p. 66 No. 160.
b) *argulus* Frey: StdR p. 78 No. 544 b (false!)
c) *philonomus*. Ochs. Natwiss. Anz. 1821 p. 15 (false!) — Tutt III p. 190.
26. *F. (aberr.) inornata* Grund Int. E. Z. Gub. 1913 No. 19 — Courv. Ent. Mittl. 1913. p. 290.
Synonym: *A. leodorus* Ghd. p. 13 No. 52 T. 23 F. 3 a—c ♂ U ♀ („diese Var. besitzt keine Silberpunkte.“ nomen praeocc.) — Wall. p. 207 — Tutt p. 186.

(argus Sulzer 1761 (nom. praeocc.)	= bellargus Rott. 1775.)
(argus Poda 1761 (nom. praeocc.)	= icarus Rott. 1775.)
(argus Scop. 1763 (nom. praeocc.)	= orion Pall. 1771.)
(argus Schiff. 1776 (nom. praeocc.)	= idas L. 1761.)
(argyrocapelus	
(argyropodus	
(argyrogномон	
(argyroela	
(argyrophylax	
(ariana Moore 1865	Bgstr. 1779 Formen v. idas L.)
	F. v. stoliczkana Feld.)

arion: Linné Syst. Nat. X. 1758 p. 483 p. 151 + F. svec. II. 1761 p. 283 No. 1073 + S. Nat. XII. 1767. p. 789 No. 230 — Poda p. 76 No. 43 — Scop. p. 177 — Müller Friedr. p. 36 No. 334 — Hufnagel Berl. Mag. f. Liebh. d. Nat. Gesch. II. 1766 p. 70 No. 28 — Müller-Linné 1788 p. 625 No. 230 („der Randpunkt“) — Fabr. Syst. Ent. p. 524. No. 345 — Füssl. p. 31 No. 596 — Schiff. p. 182 No. 3 — Esper I. p. 266 („grosses Vielaug“) — Engr. I. p. 178—180 („Argus bleu à bandes brunes“) — Bgstr. II. p. 33—4 — Fabr. Spec. p. 122 No. 549 + Mant. p. 71 No. 681 — Schnd. p. 261 No. 161 („Handvogel“) — Borkh. I p. 167 + 280 — Gmelin-Linné p. 2346 No. 230 — Lang 1789 p. 33 No. 258 — Jung 1791 p. 53 — Fabr. Ent. syst. p. 293 No. 118 — Prunn. p. 59 No. 114 — Syst. V. II p. 263 — Hbst IX p. 163—7 — Schrk p. 209 — Hübn. p. 44 („gemeinblauer Falter“) — Ochs. I. 2 p. 4—7 — Hübn. Verz. p. 67 No. 652 — Latr. NDict. p. 499 — Meisn. p. 86 — God. Enc. p. 698 No. 235 — Meig. II p. 2 No. 1 — Schott p. 74 No. 87 — Boisd. Ind. p. 13 + Gen. p. 13 No. 116 — Dup. Cat. p. 31 — Bertol. p. 31 — Berge II p. 153 — MDür p. 98 No. 62 — Kef. p. 307 No. 200 — Ghd p. 19 Nr. 94 — Wall. p. 230 — Gebr. Sp. p. 244 — Hein. p. 75 No. 110 — Westwd p. 106 — Std. Cat. I p. 6 No. 164 — Berce 1867 p. 150 — Stainton p. 117 — Std. Cat. II p. 14 No. 188 — Kirby p. 374 No. 276 + 768 No. 276 — Spgbg p. 42 No. 12 — BergeV. p. 20 No. 2 — Frey p. 22 — Killias p. 22 Nr. 27 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 891 — Hofm. I p. 10 No. 44 — Bramson p. 47 — Rühl p. 307 + 769 — Hofm. II p. 11 No. 44 — Obth. XX p. 15 — Reutti p. 24 No. 52 — Favre p. 24 — Stef. p. 56 — StbR. p. 90 No. 646 — Wheeler p. 21 — Gillm. Soc. ent. 1903 No. 10 — Rgmt p. 23 — Spuler p. 69 No. 49 — Seitz p. 321 — PImh. p. 28 — BRebel p. 75 No. 190 — Obth. 1910 p. 321—9 — Courv. 1910 p. 199—204 — Vorbrot p. 156—7 — Perlini 1912 p. 71.

Synonyma: a) telejus Bgstr. II p. 71 — Borkh. I p. 167.
b) telegonus Bgstr. ib. p. 72 — Borkh. ib.

Bilder: Rösel. Ins. Belust. III. T. 45. F. 3. 4 ♀ U — Poda T. 2, F. 4 ♂ — J. C. Schäffer Icon. T. 98. F. 5. 6 ♂ U — Esper T. 20 F. 2 ♂ — Engr. T. 41 F. 86 de ♀ U — Bgstr. T. 24 F. 5. 6 ♀ U — T. 43. F 4 ♂ 5. 6. ♀ U; T. 44. F. 1 2 ♂ U — Hbst T. 308 F. 7. 8 ♀ U — Hübn. F. 254—6 ♂ U ♀ — God. Hist. T. 11. F. 2 ♀; T. 11. quart F. 1 U — Meig. T. 43. F. 1 ab ♂ U — Lucas T. 26 F. 8 ♂ — Berge

I. T. 28 F. 9 ab ♂ U — Ghd. T. 33 F. 3 a—c ♂ U ♀ —
 Berge II T. 33 F. 2 ♂ — BergeV. T. 14 F. 1 ♂ — Berce
 1884. T. 3. F. 26 ♂ — Hofm. I. T. 4 F. 22 ♂ — Hofm. II.
 T. 6. F. 16 b ♂ a ♀ — Kirby Lloyds Nat. Hist. 1896 T.
 47 F. 1. 2 ♀ U — Spuler T. 17 F. 15 ab ♂ ♀ — Seitz T.
 83 c F. 1—3 U ♂ ♀ — B. Rebel T. 14 F. 22 ♂.

Nebenformen: 1. F. cyanecula. Evs. Bull. Nat. Mosc. 1848 p.
 207 — HSch. I. p. 123 — Ghd p. 19 No. 102 — Std. Cat.
 I. p. 6 No. 164 a — Std. Cat. II. p. 14 No. 188 a. — Kirby
 p. 374 No. 276. b — Gräser Berl. E. Ztschr. 1888 p. 81 —
 Std. Mem. Rom. 1892 p. 165. — Rühl p. 308 + 769 — StdR.
 p. 90 No. 646 c — Seitz p. 321 — Courv. 1910 p. 202.
Bilder: HSch. F. 593—4 ♂ U — Ghd T. 36. F. 2 ab ♂ U
 — Seitz T. 83 d F. 1. 2 U ♂.

2. F. aldrovandus. de Selys. Enum. d. Lép. Belg. 1844
 p. 35 No. 16 — Seitz p. 321.

3. F. obscura Christ. 1878 p. 374 (nec Frey!) — (Meisn.
 Natw. Anz. p. 86) — (MDür p. 98) — Frey p. 22 — Rühl
 p. 308 + 759 — Reutti p. 24 — Favre p. 25 — Wheeler
 p. 22 — Seitz p. 321 — Courv. 1910 p. 202 + Lyc. Bas.
 p. 163 — Obth. 1910 p. 327 — Vorbrodt p. 156.

Synonyma: a) F. obscura Frey (false!) — StdR.
 p. 90 No. 646 a — Galvagni Vhdl. z. bot. Ver. Wien 1900
 p. 564 — Spuler p. 69 No. 49 — BRebel p. 76 — Galv.
 & Preiss. p. 144.

b) F. alpina (Rätzer) Favre p. 25 — Vorbrodt p. 156.
Bilder: Esper T. 59. F. 2 — Ghd T. 38 F. I. ab ♀ U —
 Seitz T. 83. c. F. 4. 5 ♂ ♀ U.

4. F. rühli Krul. Soc. ent. 1892 p. 1 — Rühl p. 308 —
 StdR. p. 90 No. 646. a — Spuler p. 69. — Seitz p. 321 —
 Courv. 1910 p. 202.

5. F. jasilowskii Horm. Vhdl. z. bot. Wien 1897 p. 20
 (SA) — StdR. p. 90 — Spuler p. 69 — Seitz p. 321 — BRebel
 p. 75 No. 190 — Rebel Ann. Wien. Mus. 1911 p. 305 —
 Galv. & Preiss. p. 144.

6. F. ligurica Wagner Soc. ent. 1905 p. 21 — Spuler p. 69
 — Seitz p. 321 — Courv. 1910 p. 203 — Obth. 1910 p.
 325 — BRebel p. 76.

7. F. arcina Fruhst. Int. E. Z. Gub, 1910 p. 55 (transit. ad.
 liguricam).

8. F. magnifica Heydemann E. Ztschr. Stuttgt. 1910 p.
 177 — (Meisn. p. 86) — (Treitsch. X. p. 58) — MDür p. 98.

Synonyma: a) laranda Fruhstf. Int. E. Z. Gub. 1910 p. 55.

b) insubrica Vorbrodt p. 156.

9. F. naruena Courv. 1910 p. 202 + Iris 1911 p. 108 T.
 2 F. 13 ♀.

10. F. tatsienluica Obth. 1910 p. 327—8 + 1912 T. 126
 F. 1121—2 ♂ ♀.

11. F. (aberr.) arthurus Melvill. Ent. Mo. Mag. 1872
 p. 263 — Std. ib. p. 290 — StdR. p. 90 — Gillm. Soc. ent. 1904
 p. 180 — Seitz p. 321 — BRebel p. 75.

Synonyma: a) F. subtus-impunctata Obth. XX
 T. 3 F. 20 ♂ + 1910 p. 325.

b) F. (subtus) caeca. Courv. Iris 1912 p. 63.

12. F. (aberr.) *mamers*. Bgstr. III p. 16 T. 59. F. 1. 2. ♂ U.
Synonyma: a) *alcon* Var. Ochs. I. 2. p. 8 (false!) —
 Borkh. I. p. 170 — Kirby p. 374 No. 273.
 b) *euphemus* Var Wnbg. II. p. 68 (false!) — BRebel p. 75.
 c) *alconides* Auriv. Nd. Fjärl. 1888. p. 15 — Seitz p. 321.
 d) *unicolor*. Horm. Berl. E. Nachr. 1892 p. 91 + Vhdl. z.
 bot. Wien 1897 p. 20 (SA) — Spuler p. 69 — Gillm. Soc.
 ent. 1904 p. 180 — Seitz p. 321 — BRebel p. 75.
 e) F. *supra-impunctata* Obth. XX. T. 3 F. 19 ♂.
 f) F. *supra-non-maculata* Obth. 1910. p. 325.
 13. F. (aberr.) *subtus* — *maculis-extensis* Obth.
 XX. T. 3. F. 20. — (Killias p. 22).
Synonym: F. *elongata* Courv. 1910 p. 203 — Galv. &
 Preiss. p. 144.
 14. F. (aberr.) *coalescens* Gillm. Soc. ent. 1904 p. 180 —
 (HSch. F. 519—520 ♀ U.) — (Ghd T. 38 F. 3 ab ♀ U.
 Kopie nach HSch.) — (MDär p. 98) — Seitz p. 321 —
 Courv. 1910. p. 23.
Synonym: F. *radiata* Courv. Iris 1912. p. 54.
 15. F. (aberr.) *retro juncta* Courv. 1907 T. 1. F. 7 ♂
 + Iris 1912 p. 50.
 16. F. (aberr.) *disco juncta* Courv. Iris 1912 p. 50.
 17. F. (aberr.) *parallela* Courv. Iris 1912 p. 51.

(arion Latr. 1830.

= *arcas* Rott. 1775.

arionides: Staudinger Mem. Rom. III 1887 p. 141 — Elwes
 Pr. Z. S. 1881 p. 890 — Gräser Berl. E. Ztschr. 1888 p. 81
 — Rühl p. 308 + 769 — StdR. p. 90 No. 647 — Seitz p. 321.
Synonym: ? Arion Var. Std. Mem. Rom. VI 1892 p.
 168 — Courv. 1910. p. 203.
Bilder: Std. 1887. T. 7 F. 1 a—c ♂♀ U — Seitz T. 83 d.
 F. 3. 4 ♂ ♀.

(armena Std. 1871	F. v. <i>hylas</i> Esper)
(armeniaca Std. in lit.	F. v. <i>tithonus</i> Hübn.
(arsacia Led. 1869	= <i>anisophthalma</i> Kollar 1850)
(arthurus Melvill. 1872	F. v. <i>arion</i> L.)

astraea: Freyer NB tr. VI. 1852 p. 161 — Ghd p. 21. No.
 111 („astrea“) — Rühl p. 303 — StdR p. 89 No. 641 —
 Seitz p. 320.

Bilder: Freyer T. 583 F. 1. 2 ♂♀ — Ghd. T. 37. F. 5 a—c
 ♂ U ♀ — Seitz T. 82 h. F. 4 U.

atra: Gr. Grsh. Mem. Rom II. 1885 p. 217.

atroguttata: Obth. Etud. II 1876 p. 21 T. 1 F. 4 ab ♂♀ —
 Doherty JASB 1892. II p. 36 — Leech China II p. 217
 (Genus: *Phengaris*) — Seitz p. 317.

Nebenform: *albida*. Leech l. c. T. 28 F. 5 ♂ — Seitz
 p. 317. T. 83 d F. 5 ♂; e F. 1 U.

(*atys* Hübn. 1804 nomen praeocc. = *orbitulus* de Prunner (1798).

(*atys* Ghd 1853 nomen praeocc. = *actis* HSch. 1851.)

(*bactriana* Gr. Grsh. 1890 F. v. *idas* L.)

barine: Leech China 1892 p. 304 T. 31 F. 14 ♂ — Seitz p. 302 T. 78. f. F. 1 ♂.

(bathus Fabr. 1787 = orion Pall. 1771.)

baton: Bgstr. III. 1779 p. 18 — Std. Cat. II p. 10 No. 146 — Christ 1878 p. 373 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 888 — Killias p. 19 — Hofm. I p. 8 No. 12 — Rühl p. 250 + 755 — Hofm. II p. 9 No. 12 — Bramson p. 48 — Reutti p. 23 — Favre p. 17 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien 1897 p. 14 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 325 — Stef. p. 49 — StdR. p. 80 No. 573 — Wheeler p. 39 — Spuler p. 62 No. 16. — BRebel p. 67 No. 163 — Obth. 1910 p. 290 — Courv. Lyc. Bas. p. 158 — Vorbrodt p. 129.

Synonyma: a) *hylas*. Schiff. p. 185 No. 16 (nom. nudum) — Syst. Verz. II. p. 273 — Hbst IX p. 245—7 — Hübn. p. 51 — Ochs. I. 2. p. 63 — Hübn. Verz. p. 68 No. 669 (Genus: *Scolitantides*) — Meisn. p. 88 — Latr. NDict. p. 497 — God. Enc. p. 687 p. 216 — Meig. II p. 27 — Schott p. 83 Nr. 111 — Lucas p. 32 — Boisd. Gen. p. 10 No. 73 — Dup. Cat. p. 32 — Bertol. p. 36 — Berge II p. 154 — MDür p. 64 No. 36 — Ghd p. 13. No. 48 — Gebr. Sp. p. 230 — Hein. p. 83 No. 128 — Std. Cat. I. p. 5 No. 117 — Wnbg I p. 392 — Berce 1867 p. 136 — Kirby p. 360 No. 170 — BergeV. p. 23 No. 26 — Frey p. 16 — Nic. Ind. III p. 85 — 6 — Rgmt p. 21 — Bingham p. 351.
b) *hylus*. Fabr. Mant. II p. 75 No. 696 + Ent. syst. p. 300 No. 136.

c) *amphion* Esper. Suppl. I. p. 18 + Suppl. II p. 135 —
Borkh. I p. 160 No. 11 + 278; II p. 227 — Schnd. p. 258
Nr. 158 — Jung 1791 p. 30 — Prunn. p. 57 No. 110 —
Boisd. Gen. p. 10 No. 73 — Dup. Cat. p. 32.

d) ? *hylactor*. Bgstr. II. p. 78 — Borkh. I p. 160 No. 10
+ 278 — Kirby p. 360 No. 170.

Bilder: Esper T. 53 F. 1 ♂; T. 79 F. 2 ♀ — Engr. T. 40 F.
 85 e f ♂ U — Bgstr. T. 47 F. 7. 8 ♂ U; T. 60. F. 6—8
 ♂ ♀ U — Hbst T. 315. F. 9—11 ♀ U ♂ — Hübn. F. 325
 —7 ♀ U ♂ — God. Hist. T. 11 seed F. 5 ♂ + 11 tert.
 F. 5 U — Meig. T. 48 F. 6 a—c ♂ ♀ U — Lucas T. 24 F. 5
 ♂ — Labram T. 104 ♂ ♀ — Berge II T. 32 F. 28 ♂ —
 Ghd T. 22 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 3 F. 28 ♂ —
 Hofm. II T. 5 F. 9 ♂ — Spuler T. 16 F. 12 ♂ — Seitz
 T. 79 d F. 8. 9. ♂ ♀ — BRebel T. 14 F. 5 ♀.

Nebenformen: 1. F. *panoptes* Hübn. T. 132 + Verz. p. 68
 No. 656 — Boisd. Ind. p. 11 + Gen. p. 10 No. 73 — Dup. Cat.
 p. 32 — Ghd p. 13 No. 49 — Std. Cat. I p. 5 No. 117 a —
 Std. Hor. Ross. 1870 p. 5 — Kirby p. 361 No. 170 a (eigne
 Art.) — Std Cat. II p. 10 No. 146 a — Hofm. I p. 8 No.
 12 — Rühl p. 250 + 756 — StdR. p. 81 No. 573 b —
 Spuler p. 62 No. 16 — Seitz p. 305 — BRebel p. 67 No.
 163 — Obth. 1910 p. 291.

Bilder: Hübn. F. 670—3 ♂ ♀ U ♀ — Millière Icon. II T. 87
 F. 1 ♂ — Ghd T. 22 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 79 e
 F. 3 U.

2. *F. abencerragus* Pierret Ann. France 1837 p. 21 T. 1 F.
 7 ♂ — Std. Cat. I p. 5 No. 117 (syn. *panoptes*?) — Std. Cat. II
 p. 10 No. 146 a — Kirby p. 361 No. 170 a — Rühl p. 251
 + 756 (eigne Art.) — StdR. p. 81 No. 573 c — Seitz p. 305
 T. 79 d. F. 10 ♂. — Obth. 1910 p. 289.
 3. *F. famelica* Seitz p. 305 T. 79 e F. 1. 2 U ♀.
 4. (*F. vicrama* Mre Pr. Z. S. 1865 p. 505 T. 31 F. 6) — Nic.
 Ind. III p. 85 — Bingham p. 351.
 5. (*F. cashmirensis* Mre ib. 1874 p. 272) — Butl. ib. 1880
 p. 408 — Nic. l. c. — Bingham l. c.
 6. *F. clara* Christoph Mem. Rom. 1887 p. 51 — Rühl p. 756
 — StdR. p. 81 No. 573 a — Seitz p. 305 — Stichel Ztschr.
 wiss. Ins. Biol. 1911 p. 112.
 7. *F. orlaria* Ribbe Iris 1912 p. 188.
 8. *F. rubripunctata* Courv. Ent. Mittl. 1913 No. 10.
Nachtrag: *F. minutus* (Aberr.?) Esper Suppl. II p. 71 T. 106
 F. 8 — Ochs I. 2 p. 23 — Meig. p. 8 T. 46. F. 6 ab ♂ U
 — Berge II p. 157 T. 33 F. 18 — Wnbg II p. 18 — Kirby
 p. 372 No. 250 — Std. Cat. II p. 13 No. 178 — Tutt III.
 1909. p. 109.

(*battus* Schiff. 1776 — nomen nudum = *orion* Pallas 1771)

bavius: *Evs. Nouv. Mém. Nat. Mosc.* II. 1832 p. 349 —
Boisd. Gen. p. 10 No. 75 — *Dup. Cat.* p. 32 — *Evs. Volg.*
 p. 59 No. 63 — *HSch. I.* p. 120; VI p. 25. — *Freyer VI*
 p. 49 — *Std. Cat. I* p. 5 No. 115 + *Cat. II* p. 10 No. 144
 — Kirby p. 360. No. 166 — *Bramson* p. 48 — Rühl p. 248
 + 755 — *StdR. p. 81 No. 575* — *Spuler* p. 62 No. 18 —
 Seitz p. 306.

Bilder: *Evs. T. 19 F. 3. 4 ♂♀* — *HSch. F. 10. 11. ♂ U; F.*
357—360 ♂ U ♀ U — *Freyer T. 511 ♂* — *Ghd. T. 23 F.*
1a—c ♂ U ♀ — *Spuler T. 176. F. 24 ♂* — *Seitz T. 79 e*
F. 8. 9. ♂♀.

Nebenform: *F. fatma*. Obth. Étud. XIII. 1890 p. 19 T. 7 F.
 50. 51 ♂♀ — *StdR. p. 81 No. 575a* — *Seitz p. 306. T.*
79 f. F. 3. 4 ♂ U.

<i>(bejarensis</i> Chapm. 1907	<i>F. v. argus</i> L. 1758)
<i>(bella</i> HSch. 1843	<i>F. v. argus</i> L. 1758)
<i>(bellargoides</i> Ver. 1904	<i>F. v. bellargus</i> Rott. 1775)

bellargus: *Rott. Naturf. VI. 1775 p. 25* No. 12 — *Esper Suppl.*
I. p. 30—1 — *Bgstr. III. p. 10* — *Schnd. p. 239* No. 144 —
Jung 1791 p. 74 — *Prunn. p. 55* No. 104 — *Meig. II p.*
21 No. 27 — *Hein. p. 79* No. 120 — *Std. Cat. II p. 12*
No. 164 — *Berge V. p. 22* No. 17 — *Killias p. 20* —
Hofm. I p. 8 No. 26 — *Bramson p. 50* — *Rühl p. 275 + 762*
 — *Caflisch p. 9* — *Hofm. II p. 10* No. 26 — *Reutti p. 23*
 — *Favre p. 20* — *StdR p. 86* No. 613 — *Wheeler p. 32* —
Spuler p. 65 No. 33 — *PImh. p. 26* — *Seitz p. 315* —
BRebel p. 71 No. 178 — *Courv. 1910 p. 167* etc. — *Obth.*
1910 p. 266—273 — *Vorbrodt p. 143—5* — *Perlini 1912 p. 68*
 — *Eckstein p. 106.*

Synonyma: a) *argus* Sulzer Kennz. 1761 p. 35 (nom. praeocc.)
— Donovan Brit. Ins. IV. 1795 p. 93.
b) *thetis* Rott. Naturf. VI. 1775 p. 24 No. 11 (ursprünglich für blaues ♀) — Esper I p. 335 — Borkh. I p. 162—3 + 279; II p. 228—230 — Kirby p. 367 No. 225 — Spbg. p. 21 No. 6 — Scudder. Hist. Sketch 1875 p. 105 — Kirby Lloyd's Nat. Hist. Lepid. II. 1896 p. 93 — Tutt. III p. 325—398.
c) *adonis* Schiff. p. 184 No. 11 — Fabr. Mant. II p. 75 No. 694 — Lang 1789 p. 53 No. 425 — Becklin Diss. 1791 p. 39 — Jung 1791 p. 8 — Fabr. Ent. syst. III. 1. p. 299 No. 134 — Panzer Fauna Germ. Glossata T. 23 b. 24 b — Syst. V. II. p. 270 — Hbst. IX p. 201—204 — Schrank p. 213 — Hübn. p. 49 — Ochs. I. 2 p. 33—36 — Hübn. Verz. p. 68 No. 663 — Meisn. p. 87 — Latr. NDict. p. 495 — God. Enc. p. 691 No. 223 + Hist. p. 210 — Boisd. Ind. p. 12 — Schott p. 79 No. 100 — Latr. Enc. T. 50 — Lucas p. 36 — Wood Ind. ent. 1839 p. 8 No. 66 — Boisd. Gen. p. 12 No. 94 — Dup. Cat. p. 33 — HSch. I p. 121 — de Selys Mém. Liège 1844 p. 4 — Bertol. p. 34 No. 7 — Berge II p. 155 — Kef. p. 308 No. 203 — MDür p. 82 No. 47 — Ghd p. 17 No. 78 — Wall. p. 223 No. 9 — Westwd. p. 109—110 — Std. Cat. I p. 5 No. 138 — Berce 1867 p. 142 — Stainton p. 117—118 — Gebr. Sp. p. 239 — Newman p. 129 — Täschler 1870 p. 84 — Frey p. 19 — Obth. XX p. 18. 19 — Berce 1884 p. 17 — Rgmt. p. 22.
d) *thetys* Hübn. I p. 50.

Bilder: Petiver Brit. Bttfl. 1715 T. VI F. 3 ♀ — Sulzer Kennz. T. 14 F. 87 ♀ — JChr. Schäffer Icon. T. 276 F. 1. 2 ♀ U — Esper T. 33. F. 3 ♀; T. 55 F. 2. 3 ♂♂ 4. ♀ — Engr. T. 39. F. 82 d ♂ a—c ♀ U („Argus bleu céleste“) — Bgstr. T. 53 F. 5. 6 ♂ 3. 4 ♀ — Borkh. II T. 1 F. 7 ♀ — Donovan l. c. T. 143 ♂♀ — Lewin Ins. Brit. I 1795 T. 37 F. 5. 6 ♀ U — Panzer Glossata T. 23 b ♂ U; T. 24 b ♀ — Hbst. T. 312 F. 7—9 ♂ U ♀ — Hübn. F. 295—6 ♂ U 300 ♀ — God. Hist. T. 11 secd. F. 2 ♂ + 11 tert. F. 2 U — Meig. T. 47 F. 1 a—d ♂ U ♀ U — Lucas T. 25 F. 6 ♂ — Freyer T. 487 ♂♀ — Ghd T. 30 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Westwd. T. 18 F. 1 ♂♀ U — Stainton T. 2 F. 4 ♂ — Newman F. 43 ♂ im Text — Berge V. T. 14 F. 7 ♂ — Berce 1884 T. 3 F. 13. 14 ♂ U — Hofm. I T. 4 F. 6 ♂ — Kirby Lloyd T. 46. F. 1—3 ♂♀ U — Spuler T. 16 F. 21 ab ♂♀ — Seitz T. 81 F. 5. 6. 7 ♂♀ U — BRebel T. 14 F. 11 ab ♂ U.

Nebenformen: 1. F. *hyacinthus* Lewin Ins. Brit. 1795 T. 37 F. 4 ♂ — Tutt. III. 1909 p. 341.

Synonym: a) *F adonis* Hübn. F. 298 ♂ — Ochs. I 2 p. 35 — Tutt. III p. 341 — Courv. 1910 p. 168.

b) *F. saphyrus* HSch. VI. p. 27. — Tutt. l. c. p. 358.

c) *F. albofimbriata* Gillm. E. Z. Gub. 1905 p. 151 T. 16 F. 2 ♂ — (Christ 1878 p. 373) — Tutt. l. c. — BRebel p. 71.

2. F. *punctifera* Obth. I 1876 p. 23 — Rühl p. 276 + 763 — Tutt. 1896 p. 171 — StdR p. 86 No. 613d — Spuler p. 65 No. 33 — Tutt. III. p. 349—350 — Obth. 1910 p. 268—9 Seitz p. 315 T. 81 c. F. 4—6 ♂♀ U — Courv. 1910. p. 168.

- Synonym: *F. punctigera*. Obth. XX p. 18 + 1909 p. 407. T. 19 F. 57—60 ♂ ♀ ♀ ♀.
3. *F. puncta* Tutt Brit. Bttfl. 1896 p. 170 — Wheeler p. 33 — Gillm. Soc. ent. 1904 p. 157 — Grund. Int. E. Z. Gub. 1908 p. 87 — BRebel p. 71 No. 613 — Seitz p. 315 — Courv. 1910 p. 168 — Cat Lépid. Genève 1910 p. 30 — Galv. Preiss. p. 140.
- Synonyma: a) *F. punctifera* (nec Obth!) Caflisch p. 9 — Favre p. 20 — Wheeler p. 33 — Trautmann Int. E. Z. Gub. 1908 p. 162.
- b) *F. parvipuncta* Aigner E. Z. Gub. 1906 p. 209.
- Bilder: Esper T. 32. F. 2; T. 55 F. 2 — Engr. T. 39 F. 82 d — Bgstr. T. 53 F. 5 — Hübn. F. 295 — Meig T. 47. F. 3a — Freyer T. 487 — Westwood T. 18. F. 1. — Berge I T. 28. F. 10 — Berge V. T. 14 F. 7 — Tutt 1909 T. 42. F. 1—4 — BRebel T. 14 F. 11 a.
4. *F. nigra* Cockerell Ent. Recd. 1899 p. 5.
- Synonym: *F. suffusa* Tutt. 1896 p. 171 — Wheeler p. 32 — Seitz p. 315 — Tutt III. 1909 p. 340 — BRebel p. 71..
5. *F. violaceo-grisea* Obth. XX p. 19 T. 3 F. 26 + 1910 p. 271 — (Bellier Ann. France 1858 p. 301)
- Synonyma: *F. czechelii* Aigner E. Z. Gub. 1906 p. 209 — Tutt III p. 338 — Seitz p. 315 — BRebel p. 71.
- b) *F. plumbeus* Courv. Lyc. Bas. 1910 p. 161 — Vorbrot p. 144.
6. *F. argentea* Obth. XX p. 19 — Tutt 1909 p. 338.
7. *F. pallida* Austin Ent. Recd 1890 p. 12. — Wheeler p. 32 — Tutt 1909 p. 339 — Seitz p. 315.
8. *F. viridescens* Tutt III. 1909 p. 331 — (Hübn. F. 298 „adonis“) — Courv. 1910 p. 168.
9. *F. (♂) rubromaculata* Obth. 1909 p. 407 T. 19 F. 57 ♂ + 1910 p. 268.
10. *F. ♀ brunnea* Courv. 1910 p. 169.
11. *F. ♀ grisea* Courv. Lyc. Bas. 1910 p. 160 — Vorbrot p. 144.
12. *F. ♀ albinisomo — rufescens* Obth. 1909 p. 407 T. 19 F. 63 ♀ + 1910 p. 270.
13. *F. ♀ marginata* Tutt 1896 p. 170 + 1909 p. 343 — (Esper T. 55 F. 4) — Vorbrot p. 144.
- Synonyma. a) *F. alfacariensis* Ribbe Soc. ent. 1905 p. 138.
b) *F. latefasciata* Schultz Int. E. Z. Gub. 1906 p. 214.
c) *F. rufomarginata* Wagner Ent. Ztschr. Stuttgt. 1909 p. 17.
14. *F. ♀ salacia* Bgstr. III. 1779 p. 4 T. 50
F. 1 (angeblich ♂.)
15. *F. ♀ venilia* Bgstr. ib. p. 5 T. 50. F. 3.
16. *F. ♀ urania* Ghd. p. 17 No. 80 T. 30
F. 4 — MDür p. 83.
17. *F. ♀ radiata* Gaschet Bull. France 1877 p. LXIII.
18. *P. ♀ caerulescens* Obth. 1909 p. 407
T. 19 F. 64.
19. *F. ♀ (caerulea) thetis* Rott. Naturf. VI. 1775 p. 24. No. 11 (s. oben unter: bellargus) — Esper I p. 335 — Borkh. II p. 228—230.
- (Formae ♀ caerulescentes)

- Synonym: a) *ceronus* Esper. Suppl. I 1784 p. 178 + Suppl. II. 1787 p. 50 (angeblich ♂ eigener Art) — Borkh. I p. 165 No. 17 (Geschlecht?) — Jung 1791 p. 114 — Hbst. IX p. 230—1 („*adonis* Var.“) — Prunn. p. 75 No. 156 — Hübn. p. 50 — Ochs. I p. 33 No. 15 — Latr. NDict. p. 495 — Boisd. Ind. p. 12 — Meig. II p. 23 No. 29 — Treitschke X. 1. p. 68 — Boisd. Gen. p. 12 No. 94 — Dup. Cat. p. 33 — Kef. p. 308 No. 203 — MDür p. 83 No. 47 — Ghd. p. 17 No. 79 — Wall. p. 223 No. 9 — Westwd. p. 109 — Std. Cat. I p. 5 No. 138 a — Berce 1867 p. 142. — Std. Cat. II p. 12 No. 164b — Kirby p. 367 No. 225a — Spgbg. p. 21 — Christ 1878 p. 373 — Frey p. 19 — Killias p. 20 — Rühl p. 276 + 763 — Caflisch p. 9 — Hofm. II p. 10 No. 26 — Obth. XX p. 18 — Reutti p. 23 — Favre p. 20 — Stef. p. 52 — StdR p. 86 No. 613 b — Wheeler p. 32 — Rgmt. p. 22 — Spuler p. 65 No. 33 — Seitz p. 315 — PImh. p. 27 — BRebel p. 71 No. 178 — Tutt III 1909 p. 345 — Obth. 1910 p. 269 — Courv. Lyc. Bas. p. 160 — Cat. lépid. Genève p. 30 — Vorbrot p. 143 — Galv. Preiss. p. 141 — Perlini 1912 p. 68.
- b) *F. coronus*. Berge V p. 22 No. 17 — Hofm. I. p. 8 No. 26. Bilder: Petiver Brit. Bttfl. 1715 T. VI F. 8 ♀. — Esper T. 90 F. 2 + T. 102 F. 1 — Engr. T. 39. F. 82b — Borkh. II T. 1. F. 6 — Hbst. T. 314 F. 9 — Hübn. F. 297 — Meig T. 47. F. 3a — Hofm. II T. 5 F. 22c — Spuler T. 16 F. 21b (rechts) — Seitz T. 81c F. 2 — Obth. 1909 T. 19 F. 58—60 — BRebel T. 14 F. 11c.
20. F. ♀ *coelestis*. Obth. Bull. France 1908 p. 23—6 + 1909. T. 19. F. 65—68 + 1910. p. 268.
- Synonyma: a) *F. ceronus* Ghd. T. 30 F. 2a (angeblich ♂). b) *F. adonis* Var. Girard. Ann. France 1865 T. 2 F. 4a.
21. F. (aberr.) *tiphys* Esper Suppl. I. 1778 p. 6 (eigne Art) — Jung 1791 p. 144 — Syst. V. II p. 269 — Berge I. 1842 p. 88.
- Synonyma: a) *typhis* Schnd. p. 251 No. 157 — Lang 1789 p. 54 No. 452.
- b) *coridon* Aberr (false!) Ochs. I. 2 p. 28 No. 13 — Kef. p. 308 No. 205 — Berge II p. 155 — Std. Cat. I p. 5 No. 139 — Wernebg II p. 11 — Std. Cat. II p. 12 No. 165 — Kirby p. 368 No. 230a — Rühl p. 276 — StdR. p. 86 No. 614 — Seitz p. 316 — BRebel p. 72 No. 179.
- c) *A. arcuata* Courv. 1903 p. 20 + 1907 p. 35 — Grund Int. E. Z. Gub. 1908 No. 87 — Tutt III. 1909 p. 352 — Courv. Iris 1912 p. 49 — Cat. lépid. Genève p. 30 — Vorbrot p. 145.
- d) *A. confluens* Aigner E. Z. Gub. 1906 p. 209 — Tutt III p. 353.
- Bilder: Esper T. 51 F. 4 ♀ — Berge I T. 29 F. 19 ♀ — Tutt. l. c. T. 42 F. 7 ♀.
22. F. (aberr.) *basijuncta* Tutt. III p. 352 T. 42 F. 7 ♀.
- Synonym: *A. retrojuncta* Courv. Iris 1912 p. 50.
23. F. (aberr.) *costajuncta* Tutt. l. c. T. 42 F. 8. — Courv. Iris 1912 p. 50.
24. F. (aberr.) *parallela* Courv. 1907 p. 36 + Iris 1912 p. 52 T. 5 F. 21 ♂.

25. F. (aberr.) partim-radiata Obth. XX p. 18 —
Tutt. III p. 351.
Synonym: A b. digitata Courv. 1907 p. 36 + 1910 p. 176 + Iris 1912 p. 53.
Bilder: Obth XX T. 3 F. 28 ♂ + 1910 T. 19 No. 62 —
Courv. 1907 T. 1 F. 22 — Tutt. l. c. T. 42 F. 14 (Kopie
n. Obth.)
26. F. (aberr.) radiata Courv. 1907 p. 37 + Iris
1912 p. 53—55 — Galv. Preiss p. 141.
Synonym: A b. conjuncta Tutt. l. c. T. 42 F. 15 ♀.
27. F. (aberr. confluens) extrema Courv. 1907
p. 37 + Iris 1912 p. 56.
Synonym: A b. striata Tutt. l. c. T. 42 F. 16 ♂.
28. F. (aberr.) addenda Tutt. l. c. p. 356 T. 42 F. 13
— (Esper T. 55 F. 3 ♂) — Cat. lép. Genève p. 30.
Synonym: Ab. pluripuncta Courv. 1911. p. 84 + Iris
1912 p. 59.
29. F. (aberr.) impuncta Courv. 1903 p. 24 — (Schnd.
p. 240 Anmkg.) — (Hübn. I p. 50)
Synonyma: a) bellargus Var. HSch. I. 1843 p. 122.
b) F. sapphirus Stollwerk Lep. Preuss. Rheinprov. 1863
p. 68 (nec Meigen) — Strand E. Z. Gub. 1909. p. 78.
c) F. cinnus Hofm. I. 1887 p. 9 No. 26 (false!)
d) F. bellargooides Verity Bull. Ital. 1904 p. 11 + ib.
1911 p. 275.
Bilder: Esper T. 55 F. 2 ♂ — Hübn. 699 ♀ — Ver. 1911
T. 1 F. 17 ♂.
30. F. (aberr.) obsoleta Tntt. 1896 p. 171 — Gillm. Ill.
Ztschr. Ent. 1900 p. 52 — Wheeler p. 33 — BRebel. p. 71
— Cat. lép. Genève p. 29.
Synonyma: a) A b. Adonis Hübn. I. p. 50 — H. Schäffer
vi p. 121.
b) A b. cinnus Std. Cat. I p. 5 No. 138 (nec Hübner) + Std.
Cat. II p. 12 No. 164 a („alis post. subt. non ocellatis“) —
Kirby p. 367 No. 225 b — Christ 1886 p. 128 — Hofm. I
p. 9 No. 26 — Bramson p. 47 — Rühl p. 276 — Reutti p.
23 — Gillm. Ill. Ent. Ztschr. 1899 p. 50—51 + Allg. Ztschr.
Ent. 1902 p. 337—340.
c) F. subtus-impunctata Obth. XX. T. 3 —
d) Trans. ad A b. Krodeli Gillm. Ill. Ztschr. Ent. 1899
p. 51.
e) A b. paucipuncta Courv. 1907 p. 74 + Iris 1912 p. 63.
f) A b. cinnides StdR. p. 86 No. 613a — Gillm. I. c. p. 51
— Wheeler p. 33 — Tutt 1909 p. 355 — Courv. 1910 p. 176
+ Lyc. Bas. p. 161 — Vorbrodt p. 145.
Bilder: J.Chr. Schäffer T. 211 F. 2 ♀ — Hübn. F. 699 ♀ —
Obth XX T. 3 F. 27 ♂ — Gillm. I. c. F. 11 ♀ (Kopie n.
Hübn.) + F. 12 ♂ — Tutt III T. 42 F. 18. 22.
31. F. (aberr.) Krodeli Gillm. Ill. Ztschr. Ent. 1899 p. 50—
52 — Wheeler p. 33 — Spuler p. 65 No. 33 — Tutt III p.
353 — BRebel p. 71 — Courv. 1910 p. 176 — Vorbrodt p.
145 — Ver. Bull. Ital. 1911 p. 275.
Synonyma: a) Adonis Ab. Hübn. I p. 50 — HSch VI p. 121.
b) A b. cinnus Frey p. 19.

- c) *Ab. cinnides* (nec StdR.) Seitz p. 315 — BRebel p. 71.
d) *A. cinnoides* Favre Suppl. p. 4.
e) *A. caeca* Courv. 1907 p. 75 + Iris 1912 p. 63. 64.
Bilder: Engr. T. 39 F. 82 f ♂ — Hübn. F. 646 — HSch.
F. 248 — Ghd. T. 38 F. 6 — Girard Ann. France
1865 T. 2 F. 4b ♀ — Gillm. l. c. F. 6. 7 ♂♂ 8. 9 ♀♀ —
Seitz T. 81c. F. 1 ♀ — Tutt. T. 42 F. 19 (Kopie n. Hübn.)
32. *F. polonus* Zeller Stett. E. Z. 1845 p. 351 = Hybrid
bellargus — **coridon** (Immer wieder verwechselt mit
orientalischen Coridonformen!!) HSch. VI p. 27. F. 432—3
♂ U — Ghd. p. 21 No. 110. T. 37. F. 4a b ♂ U — Led. Wien.
E. Mon. 1857 p. 31 — Gebr. Sp. p. 240 — Speyer Stett.
E. Z. 1863 p. 159 (eigene Art!) — Kirby p. 369 No. 230a —
Tutt. III 1910 p. 324—5 + Soc. ent. 1910 p. 2—4 — Courv.
1910 p. 169 + Iris 1911 p. 105 T. 2. F. 8 — Cat. lép.
Genève 1910 p. 30 — Petry Soc. ent. 1911 p. 10 — Vor-
brodt p. 144 — Wagner Soc. ent. 1912. p. 68 — (Galv.
Preiss p. 141 ?)
? **Synonym:** *F. hafneri*. Preissecker Vhdl. z. bot.
Wien 1908. p. 68.

(bellis Freyer 1845 F. v. semiargus Rott. 1775.)

bellona: Gr. Grsh. Hor. Ross. 1888 p. 306 + Mem. Rom. 1890 p. 380 T. 15. F. 1 ♂ — Rühl p. 243 — StdR. p. 80 No. 560 — Seitz p. 304.

bilucha: Moore J A S B 1884. II p. 9 — Swinhoe Trs. E. S. 1885 p. 340 — Nic. Ind. III p. 76—7 — Seitz p. 311.
Synonym: *balucha* Bingham p. 340—1 („Race of eros Ochs ?“)

(biton Sulzer 1776	= damon Schiff. 1776)
(biton Bremer 1864 nom. praeocc.	= lucifera Std. 1867)
(bracteata Butl. 1880	F. v. christophi Std.)
(bramafana Prunn. 1798	? = coridon Poda 1761)
(bronte Bgstr. 1779	= alexis Poda 1761)

(byzas, byze, byzenus, byzene Bgstr. 1779	
	Formen v. semiargus Rott.)
(calabrica Tur. 1911	F. v. argus L. 1758)
(callarga Std. 1901	F. v. idas L. 1761)
(calliopis Boisd. 1832	= idas L. 1761)
(calmuca Gr. Grsh. 1891	F. v. idas L.)

candalus: H S ch. VI. 1851 p. 26 — Std. Cat. I p. 5 No. 132 — Kirby p. 365 No. 209 — Std. Hor. Ross. 1878 p. 242 — Std. p. 84 No. 603 — Nicholl & Elwes Trs. E. S. 1901 p. 93 — Seitz p. 312.

Synonyma: a) cornelia Freyer VI. 1852 p. 145 — MDür
p. 77 — Ghd. p. 17 No. 74.
b) eros Var. Stdr. Cat. II p. 11 No. 159c.
Bilder: HSch. F. 502—5 ♂ U ♀ U — Freyer T. 572. F. 1 ♂
— Ghd. T. 29 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 80 f. F.
5 ♂.

(candaon, candiope, candybus Bgstr. 1779	Formen v. icarus Rott.)
(carmon HSch. 1851	F. v. damone Evans.)
(carmon Ghd. 1853	= euryp. Freyer 1852)
(casaiacus Chapm. 1907	F. v. argus L.)
{ cashmirensis Mre. 1874	F. v. baton Bgstr.)
{ cecinae Horm. 1897	F. v. alcon Fabr.)
{ coronus Esper 1784	F. v. bellargus Rott.)
{ chamanica Mre. 1884	F. v. icarus Rott.)
(chapmani Ribbe 1912	F. v. ramburi Ver.)

charybdis: Std. Stett. E. Z. 1886 p. 226 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 418 T. 9 F. 7 a b ♂ ♀ — Rühl p. 302 + 768 — StdR. p. 90 No. 642 — Seitz p. 320 T. 82 h. F. 5. 6 ♂ U.

chinensis: Murray Trs. E. S. 1874 p. 523 T. 10 F. 5 ♀ — Leech China II p. 315 — StdR. p. 83 No. 590 — Seitz p. 309.

Synonym: manduschurica Std. Mem. Rom. 1892 p. 161 — Rühl p. 262 + 759.

Nebenform: myrmecias. Christoph Hor. Ross. 1877 p. 235 T. 8 F. 7 ♀ (eigene Art!) — Rühl p. 248 (ebenso) — StdR. p. 83 No. 590 a — Seitz p. 309. T. 80 a. F. 5 ♀.

chiron: Rott. Natf. VI. 1775. p. 27 No. 15 — Borkh. I p. 165 + 280 — Jung 1791 p. 117 — Led. Wien. Ent. Mon. 1857 No. 29 — Hein. p. 82 No. 127 — Std. Cat. I p. 5 No. 134 — Wnbg. I 1864 p. 371 — Berce 1867 p. 140 — Kirby p. 366 No. 215 — Spgbg. p. 9 No. 3 — Berge V. p. 22 No. 22 — Std. Iris 1895 p. 300 + Iris 1899 p. 334 — Courv. 1910 p. 131 — Vorbrot p. 135 — Tur. 1911 p. 254 — Perlini 1912 p. 66.

Synonym: eumedon: Esper Suppl. I 1780 p. 16 — Schnd. p. 249 No. 151 — Borkh. I p. 165 + 279; II. p. 231 — Lang 1789 p. 54 No. 244 — Jung 1791 p. 202 — Hbst. IX p. 220—1 — Schrank p. 212 — Hübn. p. 49 — Ochs. I 2 p. 48 No. 21 — Hübn. Verz. p. 68 No. 666 — Latr. NDict. p. 496 — Meisn. p. 87 — God. Enc. p. 697 No. 233 — Schott. p. 81 No. 105 — Meig. II p. 26 — Lucas p. 34 — Freyer III 1839 p. 62 — Berge II p. 155 No. 25 — Boisd. Gen. p. 11 No. 79 — Dup. Cat. 32 — MDür p. 71 — Ghd. p. 15 No. 59 — Wall. p. 216 — Gebr. Sp. p. 235 — Std. Cat. II p. 12 p. 161 — Jenner p. 294 — Frey p. 18 — Killias p. 20 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 890 — Hofm. I p. 8 No. 23 — Bramson. p. 55 — Rühl p. 271 + 761 — Caflisch p. 9 — Hotm. II p. 10 No. 23 — Obth. XX p. 24 — Reutti p. 23 — Favre p. 19 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 326 — StdR. p. 83 No. 592 — Rgmt. p. 21 — Wheeler p. 27 — Spuler p. 64 No. 24 — PImh. p. 26 — Seitz p. 309—310 — BRebel p. 68 No. 168 — Obth. 1910 p. 254 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 252.

Bilder: Esper T. 52 F. 2 ♀ (nec. F. 1 ♂!) — Engr. T. 71 F. 80 a—c ♂ ♀ U — Bgstr. T. 125 F. 5—7 ♂ ♀ U — Hbst. T. 313. F. 8. 9. ♂ U — Hübn. F. 301—2 ♂ U; F. 700—1 ♀ U — Meig. T. 48 F. 5 a b ♂ U — Lucas T. 25 F. 1 ♂ — Labram T. 40 ♂ — Freyer T. 235 F. 2. 3 ♂ ♀ — Berge II T. 33 F. 9 ♂ — Ghd. T. 25 F. 2 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F. 3 ♀ — Hofm. II T. 5 F. 19 ♂ — Spuler T. 16

F. 20 ♀ — Seitz T. 80 a F. 6 7 ♂♀ — Obth. 1910 T. 42
F. 309—311; 317—319 — BRebel T. 14 F. 10 ♂.

Nebenformen: 1. F. privata Std. Iris 1895 p. 300 — Rühl
p. 761 — StdR. p. 83 No. 592 c — Schultz Berl. Ent. Ztschr.
1903 p. 263 — Seitz p. 310 — Courv. 1910 p. 131.

2. F. antiqua Std. Iris 1899 p. 334 — StdR. p. 83 No.
592 b — Schultz l. c. p. 264 — Seitz p. 310 T. 80 b F. 2—4
♂♀ U — Courv. 1910 p. 132.

Synonym: eumedon Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 405.

3. F. maritima Obth. 1910 p. 255 T. 42 F. 310 ♂ U.
4. F. (aberr.) cleon. Schnd. 1787. p. 254 No. 152.

Synonym: a) Ab. subtus - radiata Obth. XX. p. 24
T. 4. F. 50 — (Esper T. 80 F. 3 ♀) — Bellier Ann. France
1858 p. 307 — Std. Stett. E. Z. 1876 p. 235.

b) Ab. pilzii. Schultz Berl. E. Ztschr. 1903 p. 267.

5. F. (aberr.) fylgia Spgbg. Stett. E. Z. 1876 p. 91 — Std.
ib. p. 235 — Rühl p. 271 + 761 — StdR. p. 83 No. 592 a —
— Elwes Trs. E. S. 1899 p. 326 — Schultz Berl. E. Ztschr.
1903 p. 265 — Wheeler p. 28 — Spuler p. 64 No. 24 —
Seitz p. 310 — BRebel p. 69 — Obth. 1910 p. 255 — Courv.
1910. p. 132 — Vorbrot p. 135.

Bilder: Esper T. 52 F. 3 ♂ — Seitz T. 80 a F. 8 ♀; b
F. 1 U — Obth. 1910 T. 42 F. 319 ♂.

6. F. (aberr.) speveri (nie revozierter Druckfehler statt:
„speyeri“) Hucz. Berl. E. Nachr. 1881 p. 244 — Caflisch
p. 9 — Bramson p. 47 — Rühl p. 761 — StdR. p. 83 No. 592
— Schultz Berl. E. Ztschr. 1903 p. 265—6 — Wheeler p. 28
— Seitz p. 310 T. 80 b F. 6 U — BRebel p. 69 — Obth.
1910 p. 255 T. 42 F. 311 (nec F. 318!) — Galv. & Preiss
1913 p. 138.

Synonyma: a) Ab. subtus - impunctata Favre
Suppl. p. 4 — Obth. 1910 p. 255 — Vorbrot p. 135.

b) F. (aberr.) caeca Courv. Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1907
p. 75 + Iris 1912 p. 63.

7. F. dealbata Schultz Berl. E. Ztschr. 1903 p. 266.

8. F. albolinearis Schultz ib. p. 267.

9. F. albocincta Schultz ib. p. 264.

10. F. nigrostriata Muschamp. Bull. lép. Genève 1908
p. 264 — Vorbrot p. 135.

christophi: Std. Stett. E. Z. 1873 p. 37 + ib. 1874 p. 87 — Millière
Icon. 1874 III p. 419 T. 152 F. 2. 3 ♂ U — Christoph
Hor. Ross. 1874 p. 22 (S. A.) + ib. 1877 p. 199 + Mem. Rom.
1884 p. 102 T. 6 F. 2 ab ♂♀ — Rühl p. 298 + 767 —
StgrR. p. 80 No. 558 — Seitz p. 303 T. 78 k F. 6. 7 U ♀
— Wagner Ent. Mittl. 1913. p. 250.

Nebenformen: 1. F. samudra Mrc Pr. Z. S. 1874 p. 574
— Nic. Ind. III p. 78 — StdR. p. 80 No. 558 c — Bingham
p. 346—7 — Seitz p. 303.

Synonym: a) samadra Rühl p. 767.

b) bracteata Butl. Trs. E. S. 1880 p. 407 — Nic. l. c.
p. 78 — Bingham l. c. 347.

Bilder: Mrc l. c. T. 67 F. 2 ♂ — Butl. T. 39 F. 4 ♂
— Seitz T. 79 a F. 1. 2 U ♀.

2. F. agnata Std. Stett. E. Z. 1886 p. 19 — Rühl p. 299

— StdR. p. 80 No. 558 b — Seitz p. 303 T. 78 k F. 8. 9.
3. F. rogneda. Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 376 — Rühl
p. 299 + 767 — StdR. p. 80 No. 558 a — Seitz p. 303.

chrysopis: Gr. Grsh. Hor. Ross. 1888 p. 306 + Mem. Rom. 1890
p. 416 T. 10 F. ab ♂♀ (als „omphissa Mre“ auf der Tafel)
Rühl p. 302 — Seitz p. 308 (Bilder T. 79 i F. 4. 5. falsch!)

Synonyma: a) (?) omphisa Moore Pr. Z. S. 1874 p. 573 T. 66
F. 2 ♂.)
b) crysopis StdR. p. 82 No. 584.

(cinnides StdR. 1901	Aberr. bellargus Rott.)
(cinnus Hübn. 1805	Aberr. v. coridon Poda)
(clara Christoph 1887	F. v. baton Bgstr.)
(clara Tutt 1896	F. v. icarus Rott.)
(cleobis Sulzer 1776	= argiolus L. 1758)

cleobis: Bremer Bull. Ac. Petsbg. 1861 p. 472 — Std. Cat.
II p. 10 No. 134 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 888 — Fixsen
Mem. Rom. 1887 p. 285 — Gräser Berl. E. Ztschr. 1888
p. 77 — Leech China II p. 309 — Rühl. p. 236 + 753 —
StdR. p. 79 No. 547 — Seitz p. 302 T. 78 f. F. 5. 6 ♂ U.

Synonym: F. aegonides Bremer Mem. Ac. Petsbg. 1864
p. 28 T. 3 F. 8 ♂ — Kirby p. 357 No. 146 — Butl. Ann.
Mag. N. Hist. 1883 p. 111.

Nebenformen: F. ida Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 451 —
Rühl p. 753 (eigne Art!) — StdR. p. 79 No. 547 a — Seitz
p. 302 T. 78 g F. 1. 2 ♂ U.

Synonym: F. kenteana Std. Iris 1892 p. 316 + ib. 1895
p. 346 — Rühl p. 753 — Seitz p. 302.

(cleomenes Fruhstf. 1910	F. v. argus L.)
(cleon Schnd. 1787	Aberr. v. chiron Rott.)

coelestina: Evs. Bull. Nat. Mosc. 1843 p. 535 + Volg. 1844
p. 44 No. 7 — HSch VI. p. 25 — Freyer V. p. 107 —
MDür. p. 96 — Ghd p. 9 No. 21 — Std. Cat. I p. 6 No. 157
— Kirby p. 373 No. 264 — Std. Cat. II p. 14 No. 181 —
Bramson p. 43 — Rühl p. 300 — Hofm. II p. 11 No. 38 —
StdR. p. 88 No. 632 — Spuler p. 67 No. 40 — Seitz p. 318.

Synonym: cyllarus Var. MDür. p. 96.

Bilder: HSch. F. 335—8 ♂ U ♂ U — Freyer T. 445 F. 1. 2 ♂ ♀
— Ghd T. 16 F. 1a—c ♂ U ♀ — Hofm. II. T. 6. F. 10 ♂
— Spuler T. 17 F. 8 ♂ — Seitz T. 82c. F. 3. 4 ♂ U.

Nebenform: F. alticola. Christoph Iris 1893 p. 86 — StR.
p. 88 No. 632a — Seitz p. 318.

(coelestina Mill. 1874	F. v. semiargus Rott.)
(coelestis Obth. 1910	♀ F. v. bellargus Rott.)

coeli: Obth. Ann. France 1908 p. 311 T. 5. F. 1. 2 ♂ ♀.

coeligena: Obth. Étud. II. 1876. T. 1 F. 3 a b ♂ ♀ — Leech
China II p. 312 — Seitz p. 320.

coridon: Poda Mus. Graec. 1761 p. 77 No. 48 — Scop. Carniol.
p. 179 — Esper I 335 — Schnd. p. 242—4 — Prunn.

p. 56 No. 106 — Hbst. IX p. 213—6 — Berge I p. 88 — Std. Cat. II p. 12 Nr. 165 — Killias p. 20 — Hofm. I. p. 9 — Rühl p. 276+763 — Caflisch p. 9 — StdR. p. 86 No. 614 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — PImh. p. 27 — Seitz p. 315—6 — Obth. 1910 p. 274—286 — BRebel p. 72 No. 179 — Tutt. IV. 1910 p. 1—107 — Courv. 1910 p. 176 etc. — Vorbrot p. 145—9 — Perlini 1912 p. 69—70.

Synonyma: a) *corydon* Schiff. p. 184 No. 10 — Fabr. Mant. p. 74 No. 693 — Bgstr. III p. 3 — Borkh. I p. 158+277 — Gmelin-Linné p. 2348 Nr. 754 — Jung 1791 p. 154 — Fabr. Ent. syst. p. 298 No. 133 — Syst. V. II p. 269 — Schrank p. 212 — Hübn. p. 47 — Ochs I. 2 p. 28—30 — Hübn. Verz. p. 68 No. 661 — Meisn. p. 87 — Latr. NDict p. 494 — God. Enc. p. 693 No. 227 + Hist. p. 208 No. 74 — Meig. II p. 19 — Schott p. 78 No. 98 — Lucas p. 37 — Boisd. Gen. p. 12 No. 96 — Dup. Cat. p. 33 — Selys Mém. Liège 1844 p. 4 — Bertol. p. 34 — Berge II. p. 155 — MDür p. 85 — Ghd p. 17 No. 84 — Kef. p. 308 No. 205 — Hein. p. 79 No. 119. — Gebr. Sp. p. 240 — Std. Cat. I p. 5 No. 139 — Wnbg. I p. 293 — Berce 1867 p. 142 — Stainton p. 118 — Kirby p. 368 No. 230 — BergeV. p. 22 — Jenner p. 294 — Frey p. 19 — Bramson p. 49 — Hofm. II p. 10 No. 27 — Obth. XX p. 19—22 — Reutti p. 22 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien. 1897 p. 16 — Favre p. 20 — Rgmt. p. 22 — Wheeler p. 31 — Spuler p. 65 No. 134 — Cat. lép. Genève 1910 p. 30 — Tur. Vald. 1911 p. 258 — Ver. Bull. Ital. 1911 p. 276—7 — Eckstein p. 107.

b) ? *b r a m a f a n a* de Prunner 1798 p. 76 No. 161.

Bilder: Kleemann Beitr. Nat. u. Ins. Gesch. 1761 I T. 14 F. 3, 4 ♂ U — JChr. Schäffer Icon. T. 168 F. 6. 7 ♀ U; T. 214 F. 1 2 ♂ U — Petiver Gazophyl. I T. 35 F. 2 — Schröter Abhdl. I 1776 T. 1 F. 1 ♂ („grüner Argus“) — Esper T. 33 F. 4 ♂; T. 79 F. 1 ♀ — Engr. T. 39 F. 83 ab ♂ U; T. 71 F. 83 c ♀ („Argus bleu nacré“) — Bgstr. T. 49 F. 1. 2 ♂ U; T. 59 F. 5. 6 ♀ U — Hbst. T. 313 F. 1—3 ♂ ♀ U — Hübn. F. 286—8 ♂ ♀ U („silberblauer Falter“) — God. Hist. T. 11 secd. ♂; T. 11 tert. ♀ — Meig. T. 47 F. 1 a—d ♂ U ♀ U — Lucas T. 25 F. 8 ♂ — Labram. T. 78 ♂ U; T. 79 ♀ U — Berge I T. 28 F. 14 ♂ — Berge II T. 33 F. 6 ♂ — Ghd. T. 31 F. 2a—c ♂ U ♀ — Berge V. T. 14 F. 6 c ♂ — Berce 1884 T. 3 F. 12 U — Hofm. I T. 4 F. 7 ab ♂ ♀ — Hofm. II T. 5 F. 23 ab ♂ ♀ — Kirby Lloyd T. 47 F. 5. 6 ♂ U — Spuler T. 16 F. 25 ab ♂ ♀ — Seitz T. 81 c F. 7 ♂; d F. 1. 2 U ♀ — BRebel T. 14 F. 12 c ♂ — Tutt IV 1910 T. 1 F. 1—20 — Eckstein T. 15 F. 10 c ♀ (nec 10 b ♂).

Nebenformen: 1. F. *a penninga* Zeller Isis. 1847 p. 148 — Std. Cat. I p. 6 No. 139 b + Cat. II p. 12 No. 165 b — Kirby p. 368 No. 230 d — Hofm. I p. 9 — Rühl p. 278 — Stef. p. 53—4 — Spuler p. 65 No. 34 — Seitz p. 315 T. 81 d F. 3 ♂ — BRebel p. 72 — Tutt IV 1910 p. 22 — Courv. 1910 p. 177 — Obth. 1910 p. 280 — Vorbrot p. 146 — Perlini 1912 p. 69.

Synonym: *F. graeca* Rühl p. 763 — Courv. Soc. ent. 1897 p. 26 — Seitz p. 315 — Courv. 1910 p. 177 — Tutt. IV 1910 p. 27. 2. *F. albicans* HSch. VI 1851 p. 27 — (Rambur Faune Andal. 1839 p. 273) — (nec Boisd. Gen. p. 12 No. 96 — nec Dup. Cat. p. 33 — nomina nuda!) — Ghd. p. 17 No. 85 — Mill. Icon. I T. 4 — Std. Cat. II p. 12 No. 165 d — Kirby p. 368 No. 230 h — Hofm. I. p. 9 — Rühl p. 278 — Obth. XX p. 21 — StdR. p. 86 No. 614 e — Spuler p. 65 No. 34 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 No. 179 — Courv. 1910 p. 177 — Ribbe Iris 1912 p. 201—2 — Obth. 1910 p. 283 — Tutt IV 1910 p. 51—2.

Synonyma: a) *F. nivifera* Kef. Stett. E. Z. 1851 p. 308 No. 205b. (nomen nudum) — MDür p. 86.
b) *F. arragonensis* Ghd p. 17 No. 87 — MDür p. 87.
c) d) e) *F. blanca* — *margarita* — *morena* Ribbe Iris 1912 p. 201—2 — individuell!

Bilder: HSch F. 494—5 ♂ U — Ghd T. 31. F. 3a—d ♂ U ♀ U („albicans“) T. 32. F. 1a—c ♂ U ♀ („arragonensis“) — Mill. Icon. T. 4 F. 2 ♂ — Seitz T. 81d. F. 6 ♂.
3. *F. hispana* HSch. VI. 1851 p. 27. F. 500 ♂ — Led. Wien. E. Mo. 1857 p. 31 — Rühl p. 278 — Spuler p. 65 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 No. 179 — Obth. 1910 p. 283 — Courv. 1910 p. 177 — Ribbe Iris 1912 p. 200 — (Vorbrodt p. 148 ?)

4. *F. corydonius* HSch. 1852 T. 123 F. 595—6 ♂ U. — Kef. 1851 p. 308 No. 205c (nom. nudum!) — Ghd. p. 19. No. 103. T. 36 F. 3a b (Kopie n. HSch.) — Led. Wien. E. Mon. 1857 p. 31 — MDür p. 86 — Std. Cat. I p. 6 No. 139 e + Cat. II p. 12 No. 165 e — Kirby p. 368 No. 230 i — Rühl p. 278 + 763 — Spuler p. 65 No. 34 — Seitz T. 81d F. 7 ♂ („corydonius“) e. F. 4 ♂ (angeblich „caucasica“) — Courv. 1910 p. 181 — Tutt. IV. 1910 p. 57 — Obth. 1910 p. 284.

Synonym: *F. olympica* Led. Vdhl. z. bot. Wien 1852 p. 36 — Gebr. Speyer p. 241 — Seitz p. 315.

5. *ossmar* (Bischoff) Ghd p. 17 No. 86 — Gebr. Sp. p. 241 — Courv. 1910 p. 181 — Tutt IV. 1910 p. 57.

Synonym: a) *F. osmar*. Led. Wien. E. Mon. 1857 p. 31 — MDür p. 86.

b) (*F. corydonius*. Rühl. p. 278) — (StdR. p. 86) — false!

c) *F. caucasica* Led. Ann. Belg. 1869 p. 23 — Std. Cat. II p. 12 No. 165 f — Rühl p. 278 — Obth. XX. p. 20 — (Favre Suppl. p. 4) — StdR. p. 86 No. 614 g — Nicholl-Elwes p. 94 — Seitz p. 315 (nec. T. 81. e. F. 4. ♂) — Courv. 1910 p. 181 — Tutt. IV 1910 p. 56 —

d) *F. polona* (nec. Zeller!) Led. Wien. E. M. 1857 p. 31 — Std. Cat. I p. 6 No. 139 f (part.) — Led. Wien. E. Mon. 1858 p. 138 — Std. Cat. II p. 12 No. 165 f (part.) — Std. Hor. Ross. 1878 p. 244—5 — Rühl p. 278 — StdR. p. 86 No. 613 c — Nicholl-Elwes p. 93 — Spuler p. 65 No. 33 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 — Courv. 1910 p. 169 — Tutt. III. 1909 p. 324 + Soc. ent. 1910 No. 1.

Bilder: Ghd. T. 31 F. 4 a—c ♂ U ♀ („ossmar“) — Obth. XX T. 3 F. 29 ♂ („caucasica“) — Seitz T. 81 c. F. 3 ♂ („polonus“).

6. *F. calydonius* (Lowe) Wheeler p. 31 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — (Seitz p. 315) — BRebel p. 72 — Courv. 1910 p. 181 — Vorbrot p. 146.
7. *F. rezniceki* Bartel. E. Z. Gub. 1904 p. 117 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 — Tutt IV. 1910 p. 48 + Soc. ent. 1910 No. 11. 12 — Courv. 1910 p. 177 — Rev. Bull. lép. Genève 1910 p. 17—22 T. 4. F. 8. 9 ♂♀ — Tur. Vald. 1911 p. 259.
- Synonym: *F. meridionalis* Tutt. Ent. Recd 1909 p. 299 (part) + Brit. Bttfl. IV. 1910 p. 46 + Soc. ent. 1910. No. 11. 12 — Rev. l. c. — Courv. l. c.
8. *F. constanti*. Rev. Ent. Recd 1909 p. 60 + Bull. lép. Genève 1910 p. 17—22 T. 4 F. 1. 2 ♂♀ — Tutt. IV 1910 p. 45—50 + Soc. ent. 1910 No. 11. 12 — Courv. l. c.
- Synonym: *F. meridionalis* Tutt. l. c. (part.)
9. (*F. altica* Neustetter Int. E. Z. Gub. 1909 p. 118) — Tutt. IV. 1910 p. 44.
10. *F. polonus* Zeller (s. bellargus-coridon-Hybrid.)
11. *F. marginata* Tutt. Brit. Bttfl. 1896 p. 166 — Obth. XX p. 21 T. 3. F. 32 ♂ — Agassiz p. 240 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — Seitz p. 315 — Tutt IV 1910 p. 24 T. 1. F. 9. — BRebel p. 72 — Cat. Lép. Genève p. 30 — Vorbrot p. 146.
- Synonyma: a) *F. nigrocostalis* Schultz JBuch Wien. Ent. Ver. 1905 p. 77 — BRebel p. 72.
- b) *F. seminigra* Preissecker Vhl. z. bot. Wien. 1906 p. 87 — BRebel p. 72.
- c) *F. borussia* Dadd Berl. E. Ztschr. 1909 p. 36 — Stichel Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1911 p. 875 F. 15.
12. *F. suffusa* Tutt. Brit. Bttfl. 1896 p. 167 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — Pfitzner Iris. 1906 p. 14 — Tutt IV. 1910 p. 19 T. 1. F. 4 („subsuffusa“){F. 6 („suffusa“)} — Courv. 1910 p. 182 — Vorbrot p. 147.
13. *F. fowleri* South. Entomologist 1900 p. 104 — Bartel l. c. No. 29 — Leonhardt Ins. Börse 1904. p. 124 + E. Z. Gub. 1904 p. 54 — Walker Ent. Mo. Mag. 1907 p. 133 — Seitz p. 315 — Tutt IV. 1910 p. 21 — Courv. 1910 p. 185 — Ebert Festschr. Ver. Nat. Kde. Cassel 1911 p. 317 — Bilder: South l. c. T. 3 F. 4. 5 ♂ U — Tutt IV. 1910 T. 1. F. 10 ♂ 20 ♀ — Ebert l. c. T. 5 F. 5 ♂ — Eckstein T. 15 F. 10 b ♂.
14. *F. pallescens* Tutt. IV. 1910 p. 44. (Albino!)
15. *F. suavis* Schultz E. Z. Gub. 1904 p. 93 — (MDür p. 86) — Bartel E. Z. Gub. 1904 p. 115 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 — Tutt IV. 1910 p. 26 — Courv. p. 1910 p. 182 — Cat. lép. Genève 1910 p. 30 — Vorbrot p. 146.
- Synonym: *F. aurantia* Wheeler p. 31 (♂).
- Bilder: Lucas 1834. T. 25 F. 8 ♂ — Berce 1884 T. 3 F. 11 ♂ — BRebel T. 14. F. 12 c ♂.
16. *F. ♀ aurantia* Tutt. Brit. Bttfl. 1896. p. 167 — Wheeler p. 31 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 — Tutt IV. 1910 p. 29. — Vorbrot p. 147.
- Synonym: *F. aurinata* Grund. Int. E. Z. Gub. 1908 p. 87.
17. *F. ♀ tithonus* Meig. II. 1830 p. 30. (nec. Hübner!) —

- Tutt. IV. 1910 p. 33—5 — Cat. lépid. Genève 1910 p. 30.
Synonyma: a) *F. mariscolore* Boisd. Gen. 1840 p. 12 No. 96 (nomen nudum!) — (Dup. Cat. p. 33) — Ghd p. 17 No. 89 — Led. Wien. E. Mon. 1857 p. 31 — Bellier Ann. France 1858 p. 310 — Girard ib. 1865 p. 114 — Obth. 1910 p. 276.
 b) *F. syngrapha* Kef. Stett. E. Z. 1851 p. 308. (nom. nudum!) — MDür p. 85 — Std. Cat. I. p. 6 No. 139 a — Berce 1867. I. p. 143 — Kirby p. 368 No. 230 — Std. Cat. II p. 12 No. 165 a — Berge V p. 22 — Frey p. 19 — Hofm. I p. 9. — Rühl p. 278 + 763 — Hofm. II p. 10 — Obth. XX p. 19—20 — Reutti p. 23 — Favre p. 21 — StdR. p. 86 No. 614 b — Rgmt p. 22 — Wheeler p. 31 — Bartel E. Z. Gub. 1904. No. 29 — Spuler p. 65 No. 34 — PImh. p. 27 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 No. 179 — Courv. 1910 p. 177 + Lyc. Bas. p. 162 — Tutt IV. 1910 p. 33—4 — Cat. lép. Genève p. 30 — Vorbrot p. 147.
Bilder: Engr. T. 39 F. 83 c — Hübn. F. 742 — Meig. T. 47 F. 2 ab — Ghd T. 32. F. 3 b — Seitz T. 81 d F. 4 — Tutt IV. 1910 T. 1 F. 19.
 18. *F. ♀ semibrunnea* Mill. Icon. I 1859. T. 4. F. 2 (partimcaerulea) — Bellier Ann. France 1858 p. 310 — Kirby p. 368 No. 230 — StdR. p. 86 No. 614 — Wheeler p. 31 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — Seitz p. 315 — BRebel p. 72 — Courv. 1910 p. 182 —
Synonym: a) *F. radiosa* Gaschet Ann. France 1877 p. LXIV.
 b) *F. semisygrapha* Tutt. Brit. Bttfl. 1896 p. 167 + IV. 1910 p. 32.
Bilder: Mill. l. c. T. 4 F. 2 — Hübn. F. 830 („cinnus“) — Tutt IV. 1910 T. 1 F. 14. 15. 17. 18.
 19. *F. (aberr.) parisiensis* Ghd. p. 17 No. 90 — (MDür p. 87) — Bartel E. Z. Gub. 1904 p. 114 — Seitz p. 316 — Tutt IV 1910 p. 42 — Cat. lépid. Genève p. 30.
Synonyma: a) *A. tiphys* Ochs. I 2 p. 29 (nec *tiphys* Esper, Aberr. v. *thetis* Rott!) Kef. Stett. E. Z. 1851 p. 308 No. 205 — Std. Cat. II p. 12 No. 165 — Kirby p. 368 No. 230 a — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — StdR. p. 86 No. 614 — Seitz p. 316.
 b) *A. arcuata*. Wheeler p. 32 — Courv. 1903 p. 20 — Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904 p. 102 — Bartel E. Z. Gub. 1904. No. 29 — Courv. 1907 p. 35 — Tutt IV. 1910 p. 42 — Courv. 1910 p. 186 + Iris 1912 p. 49 — Ver. Bull. Ital. 1911. p. 276.
Bilder: Ghd T. 32 F. 4 ♀ + T. 38. F. 4 ♀ — HSch. F. 361 ♀ — Tutt IV. 1910 T. 2 F. 9 ♂ 10 ♀ — Ver. l. c. T. 1 F. 20 — Courv. Iris 1912 T. IV F. 8 ♂.
 20. *F. (aberr.) striata* Tutt. Brit. Bttfl. 1896 p. 171 — Wheeler p. 32 — Bartel E. Z. Gub. 1904 p. 128 — Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904 p. 54 — Leonhardt E. Z. Gub. 1904 p. 54 — BRebel p. 72 — Cat. lépid. Genève 1910 p. 30.
Synonym: *A. radiata*. Courv. Iris 1912 p. 53.
 21. *F. (aberr.) obsoleta* Tutt Brit. Bttfl. 1896 p. 167 + IV. 1910 p. 37 — Bartel E. Z. Gub. 1904 No. 29 — Cat. Lép. Genève 1910 p. 30.

Synonyma: a) *Ab. cinnus* Ghd. p. 17 No. 88. T. 32 F. 26
 — Obth XX p. 20 T. 3. F. 30 ♂ — Favre Suppl. 1902 p. 4 —
 b) *Transitus ad Ab. cinnus* Leonhardt. Ins. Börse 1905
 (Sep.) T. 1 F. 3—11 — Treitschke X. p. 67 — Girard Bull.
 France 1865 p. LXV — Leonhardt E. Z. Gub. 1902 p. 50 —
 Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904. p. 49 F. 2—6.
 c) *F. paucipuncta* Courv. 1907 p. 74 + Iris 1912 p. 63.
 22. *F. (aberr.) cinnus* Hübn. 1805 T. 167 — Boisd. Gen. p.
 12 No. 96 — Dup. Cat. p. 33 — MDür p. 87 — H Sch. IV.
 p. 27 — Led. Wien. E. Mo. 1857 p. 31 — Obth. XX p. 20
 — Gillm. Ill. Ztschr. f. Ent. 1899 p. 50 — StdR. p. 86 No.
 614a — Gillm. Allg. Ztschr. Ent. 1902 p. 337—340 + Soc.
 ent. 1902 p. 68 — Courv. 1903 p. 25 — Wheeler p. 32 —
 Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904 p. 51 — Bartel E. Z. Gub.
 1904 No. 29 — Leonhardt Ins. Börse 1905 (Sep.) — Gillm.
 E. Z Gub. 1910 p. 258 — Spuler p. 65 — Seitz p. 315 —
 BRebel p. 72 — Tutt IV 1910 p. 36—38 — Courv. 1910
 p. 186 — Obth. 1910 p. 275 — Vorbrodt p. 148 — Courv.
Iris 1912 p. 63 — Wehrli 1913 p. 15.

Synonyma: a) *Coridonis* Var. Bgstr. III p. 17 —
Freyer III p. 25 — Bellier Ann. France 1858 p. 309—310
— Fallou ib. 1871 p. 102 No. 9.

b) *bellargus* Var (false!) Kef. p. 308 No. 203 („cirnus“) —
Std. Cat. I p. 5 No. 138 — Std. Cat. II p. 12 No. 164 —
Kirby p. 367 No. 225b — Frey p. 19 — Hofm. I p. 9 No. 26
— Rühl p. 276 — Hofm. II p. 10 No. 26 — Reutti p. 23
— Favre p. 20 — PImh. p. 26.

c) A b. *lucretia* Gaschet Ann. France 1877 p. LXIV.

d) A b. so h n i Rühl p. 279 — Agassiz p. 240 — Seitz p. 315
— BRebel p. 72 — Tutt IV 1910 p. 35.

Bilder: Bgstr. T. 59 F. 8 ♀ — Hübn. F. 831 ♀ — Freyer
 T. 223 F. 1 ♂ — Obth. XX T. 3 F. 33 ♂ — Gillm. III.
 Ztschr. Ent. 1899. F. 2 ♀ (Kopie n. Hübn.) — Krodel I. c.
 F. 5. 6 ♂♂ — Leonhardt I. c. T. 1 F. 12 — Courv. 1907
 T. 1 F. 28 ♂ — Seitz T. 81d F. 5 ♂ (Kopie n. Courv.) —
 Tutt. IV. 1910 T. 1 F. 14a ♀ (Kopie n. Hübn.) T. II F. 13.
 14. ♂♂.

== candalus HSch. 1851)

cyane: E vs. Bull. Nat. Mosc. 1837. I p. 22 + 1841. I. p. 23 — Kef. p. 310 No. 220 — HSch 1852 T. 134 — Dup. Cat. p. 33 — Ghd p. 21 No. 112 — Led. Vhdl. z. bot. Wien. 1853 p. 355 — Std. Cat. I. p. 5 No. 111 — Kirby p. 360 No. 164 — Alph. Trs. E. S. 1891 p. 50 — Christoph. Stett. E. Z. 1893 p. 51 — Rühl p. 755 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 325 — StdR. p. 81 No. 578 — Spuler p. 61 No. 11 — Seitz p. 306 — Wagner Ent. Mittl. 1913. p. 251.

Synonym: *Pylao* n. Var. (et ab?) Std. Cat. II p. 10 No. 141 a.
Bildner: Eys. I. c. 1841 T. 19 F. 1-2 ♂♂ - HSch. E. 646-

Bilder: Evs. I. c. 1841 T. 19 F. 1. z ♂ ♀ — HSch. F. 640—
 9 ♂ U ♀ U — Ghd T. 39. F. 1 a-d ♂ U ♀ U — Led.
 I. c. T. 1. F. 4 ♂ — Spuler T. 17 b F. 22 ♂.

Nebenform: *F. deserticola* Elwes Trs. E. S. 1899 p. 325
— StdR. p. 81 No. 578 a — Seitz p. 306.

(cyane Freyer 1845	= pylaon Fischer 1824)
(cyanea Aigner 1906	♀ F. v. amandus Schnd.)
(cyanecula Evans 1848	F. v. arion L.)
(cyllarus Rott. 1775	= alexis Poda 1761)
(cyparissus Hübn. 1805	F. v. optilete Knoch.)

cytis: Christoph Hor. Ross. XII. 1877 p. 234. T. 5
F. 5, 6 ♂ ♀ — Rühl p. 252 + 756 — StdR. p. 80 No. 565
— Seitz p. 305. T. 79. b F. 6. 7 ♂ ♀.

Nebenform: F. panaegides Std. Stett. E. Z. 1886 p. 206 —
StdR. p. 80 No. 565 a — Seitz p. 305 T. 79 c F. 3. 4 ♂ U.
Synonym: a) F. alaica Std. Stett. E. Z. 1886 p. 207 —
Rühl p. 252 + 756.

b) F. panaegides Var. alaica Gr. Grsh. Mem. Rom.
1890 p. 386 T. 8 F. 8.

dagmara: Gr. Grsh. Hor. Ross. 1888 p. 306 + Mem. Rom. 1890
p. 412 T. 9 F. 2. ab ♂ ♀ — Rühl p. 280 — Std. Iris 1899
p. 153 — StdR. p. 84 No. 601 — Seitz p. 312 T. 80 f. F. 2.
3 ♂ ♀.

dama: Std. Iris 1891 p. 234. — Rühl p. 287 — StdR. p. 88
No. 628 — Seitz p. 318.

(damocles HSch. 1851	F. v. damone Evans.)
(damoetas Fabr. 1775	= alexis Poda 1761)
(damoetas Bgstr. 1779	= semiargus Rott. 1775)

damon: Schiff. p. 182 No. 6 („Hahnenkopffalter“) —
Bgstr. III p. 12. — Fabr. Mant. p. 72 No. 684 — Gmelin-
Linné I. 5 p. 2347 No. 749 — Fabr. Ent. III. 1 p. 293 No.
121 — Hbst IX p. 183 — Syst. V. II p. 265 —
Schrank p. 211 — Hübn. p. 45 — Ochs I. 2 p.
19 No. 8 — Hübn. Verz. p. 67 No. 646 — Meisn. p. 87 —
Latr. NDict. p. 500 — God. Enc. p. 695 No. 231 — Boisd.
Ind. p. 13 — Meig. II. p. 9 No. 11 — Schott p. 76 No. 94 —
Lucas p. 38 — Boisd. Gen. p. 13 No. 106 — Dup. Cat. p.
31 — Kef. p. 305 No. 183 — Berge II p. 152 — MDür p.
93 No. 57 — Ghd p. 11. No. 40 — Gebr. Sp. p. 242 —
Hein. p. 77 No. 113 — Std. Cat. I p. 6 No. 151 — Berce
1867 p. 145 — Std. Cat. II p. 13 No. 172 — Kirby p. 369
No. 237 — BergeV. p. 21 — Jenner p. 294 — Frey p. 20
— Killias p. 20 — Hofm. I p. 9 — Rühl p. 285 + 764 —
Bramson p. 42 — Hofm. II p. 10 No. 32 — Caflisch p. 9 —
Obth XX p. 17 — Reutti p. 24 — Favre p. 22 — StdR. p.
87 No. 624 — Rgmt p. 22 — Wheeler p. 29 — Spuler p. 66
No. 37 — PImh. p. 27 — Seitz p. 317. — BRebel p. 73 No.
181 — Oberth. 1910 p. 263 — Courv. 1910 p. 188 — 192 +
Lyc. Bas. p. 162 — Vorbrot E. Z. Gub. 1905 p. 375 +
Schmttlge d. Schweiz p. 149 — 150 — Perlini 1912 p. 70.

Synonym: biton Sulzer Abgek. II. 1776 p. 146 — Esper I.
p. 336 — Jung 1791 p. 81 — Borkh. I. p. 172 + 282; II
p. 234 — Schnd. p. 266 No. 165.

Bilder: Sulzer l. c. T. 18 F. 9 U — Esper T. 33 F. 5 ♂ —
Engr. T. 42 F. 87 cd ♂ U ab ♀ (Geschlechter verwechselt!).
— Römer Genera Ins. 1789 T. 18 F. 9 U — Bgstr. T. 55

F. 7. 8 ♂ U — Hbst T. 310. F. 7—9 ♂♀ U — Hübn. F. 275—7 ♂ U ♀ — Meig. T. 44 F. 1 a—d ♂ U ♀ U — Lucas T. 26 F. 4 ♂ — Blanchard Hist. Nat. 1840 T. 7 F. 5 — Berge II T. 32. F. 19 ♂ — Ghd T. 20 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Berge V. T. 14. F. 5 ♂ — Hofm. I. T. 4 F. 12 ♂ — Hofm. II. T. 6 F. 4 ♂ — Spaler T. 17 F. 10 ♂ — Seitz T. 81 h F. 3—5 ♂♀ U — BRebel T. 14 F. 15 ab ♂ U c ♀ — Eckstein T. 15. F. 11 c ♂.

Nebenformen: 1. F. ferreti Favre Suppl. p. 5 — Wheeler p. 29 — Seitz p. 317 — BRebel p. 73. — Courv. 1910 p. 190 — Vorbrot p. 149.

2. F. merzbacheri Courv. Ent. Mittl. 1913 No. 10 — (Alph. Kouldja 1881 p. 57?) — (Wagner Ent. Mittl. p. 253?)
3. F. decorata Courv. 1910 p. 188 + Iris 1911 p. 106 T. II. F. 10 ♀.

4. F. agraphomena Ver. Entomol. XXXVII p. 59 — Seitz p. 317 — BRebel p. 73.

5. F. transparens Courv. 1903 p. 23 — BRebel p. 73 — Vorbrot p. 149.

6. F. maculata Rev. Bull. lédip. Genève 1909 T. 10 F. 4 + ib. 1910 T. 2. F. 5 — (Esper T. 62 F. 4) — (MDür p. 94) — (Aigner Ann. Hung. 1906 p. 517) — Courv. 1910 p. 191 — Vorbrot p. 149 — (Eckstein T. 15. F. 11 d.)

7. F. caerulescens Courv. (F. nova) — (MDür p. 94) — (Agassiz p. 240.)

8. F. (aberr.) extensa Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904 p. 134 T. 1 F. 12. 19 ♂♀ — Seitz p. 317 — BRebel p. 73.

Synonym: Ab. (disco —) elongata Courv. 1910 p. 191 + Iris 1912 p. 47.

9. F. (aberr.) costojuncta Courv. Iris 1912 p. 60.

10. F. (aberr.) gillmeri Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904 p. 108 T. 1 F. 11 ♂ — Leonhardt E. Z. Gub. 1904 p. 54 — Seitz p. 317 — BRebel p. 73.

Synonym: Ab. caeca Courv. 1907 p. 75 + Iris 1912 p. 63. 64 — BRebel p. 73.

damone: Evs. Bull. Nat Mosc. 1841 I p. 18 + Volg. p. 46 No. 11 — Dup. Cat. p. 31 — Freyer V p. 6 — Std. Cat. I p. 6 No. 147 — Kirby p. 370 No. 237 a — Std. Hor. Ross. 1878 p. 251 — Bramson p. 42 — Rühl p. 288 — Std. Iris 1899 p. 327 + StdR. p. 87 No. 625 — Seitz p. 317 — Courv. 1910 p. 191.

Synonyma: a) damocles HSch. 1843 p. 113 — Kef. p. 305 No. 183 — Berge II p. 152 No. 4.

b) damon Var. Led. Hor. Ross. 1869 p. 81 — Std. Cat. II p. 13 No. 172 a — Christoph. Hor. Ross. 1877 p. 199.

Bilder: HSch. F. 214—5 ♂ U — Freyer T. 386 F. 2 ♂ — Berge II T. 32 F. 20 ♂ — Ghd. T. 19 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 81 h F. 7. 8 ♀ U.

Nebenformen: 1. F. iphigenia HSch. VI p. 24 — Led. Vhdl. z. bot. Wien 1852 p. 38 — Freyer VI p. 512 — Ghd. p. 11 No. 39 — Christoph Hor. Ross. 1874 p. 24 — Std. Hor. Ross. 1878 p. 253 — Kirby p. 370 No. 237 — Std. Iris 1899 p. 143 — Seitz p. 317 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 254.

Synonyma: a) damon Var. Kef. p. 305 No. 183 c —

- Led. Hor. Ross 1869 p. 81 — Std. Cat. II p. 13 No. 172 d.
 b) Kindermanni Var. Rühl p. 289 + 764 — Alph. Hor. Ross. 1881 p. 57—9.
 Bilder: HSch. F. 354 ♀ — Freyer T. 512 ♂♀ U — Ghd. T. 20 F. 2 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 81 i. F. 5. 6 ♂ U.
 2. F. carmon HSch VI 1851 p. 24 — Std. Cat. I p. 6 No. 150 (eigene Art) — Kirby p. 370 No. 237 d — Std. Iris 1899 p. 139—141 — StdR. p. 87 No. 625 c — Seitz p. 317.
 Synonyma: a) alpestris Freyer VI p. 161 — Std. Cat. I p. 6 No. 147 b — Kirby p. 370 No. 237 a — Std. Iris 1899 p. 140.
 b) Kindermanni Led. Vhdl. z. bot. Wien. 1852 p. 37 — Std. Cat. I p. 6 No. 147 b — Bramson p. 43 — Rühl p. 289 (eigene Art!).
 c) eurypilos Ghd p. II No. 38 (nec Kindermann) — Rühl p. 764.
 d) damocles Led. Hor. Ross. 1869 p. 82.
 e) damon Var. Std. Cat. II p. 13 No. 172 c — Rühl p. 286 + 764.
 Bilder: HSch. F. 506—7 ♂ U — Freyer T. 583 F. 3. 4 ♂♀ — Ghd. T. 20 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Led. Hor. Ross. 1869 T. 4 F. 8 ♀ — Seitz T. 81 i F. 2—4 ♂♀ U.
 3. F. melania Std. Stett. E. Z. 1866 p. 213 + Iris 1899 p. 145—6 — StdR. p. 88 No. 625 l — Seitz p. 317.
 Synonym: Kindermanni Var. Rühl p. 289 + 764.
 4. F. iphigenides Std. Stett. E. Z. 1886 p. 213 + Iris 1899 p. 144 — StdR. p. 88 No. 625 k — Seitz p. 317 T. 82 a F. 1. 2 ♂♀.
 Synonyma: a) melania Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 408 T. 9 F. 3 ♂ — Seitz p. 317.
 b) Kindermanni Var. Rühl p. 289.
 5. F. juldusa Std. Stett. E. Z. 1886 p. 213 + Iris 1899 p. 144 — StdR. p. 88 No. 625 i — Seitz p. 317 T. 82 a F. 3 ♂.
 Synonyma: a) iphigenia Alph. Hor. Ross. 1881 p. 390 — Std. Iris 1899 p. 144.
 b) Kindermanni Var. juldussa Rühl p. 290.
 6. F. altaica Elwes Trs. E. S. 1899 p. 327 — StdR. p. 87 No. 625 b.
 Synonym: F. sibirica Std. Iris 1899 p. 139 — StdR. p. 87 No. 625 b.
 7. F. damonides Std. Iris 1899 p. 138 — StdR. p. 87 No. 625 a — Seitz p. 317 T. 81 h F. 8 ♂ i F. 1 U.
 8. F. transcaspica Std. ib. p. 141—2 — StdR. p. 87 No. 625 d.
 9. F. cyanea Std. ib. 142 — StdR. p. 87 No. 625 e.
 10. (F. xerxes Std. ib. 143 — StdR. p. 88 No. 625 f. — nom. praeocc.)
 11. F. iphidamon Std. ib. p. 144 — StdR. p. 88 No. 625 h.
 12. F. duplicata BHaas. Iris 1910 p. 30.

(daphnis Schiff. 1776 nomen nudum = ♂ meleager Esper 1777)
 (daphnis Bgstr. 1779 = meleager Esper 1777)

dardanus: HSch. I. 1843 p. 123 — Freyer V. 1845. p. 59 — Kef. p. 305. No. 179 — Berge II. p. 155 — (Gerhd. p. 11 No. 28)

— Led. Vhdl. z. bot. Wien. 1857 p. 29 — Christoph Hor. Ross. 1874 p. 22—3.

Synonyma: a) *orbitulus* Esper Var. Std. Cat. I p. 5 No. 125c + Cat. II p. 11 No. 154c — Kirby p. 363 No. 195d — Christoph. Hor. Ross. 1877 p. 199 — Std. Hor. Ross. 1878 p. 239 + ib. 1880 p. 95 — Frey p. 17 — Rühl p. 258 — StdR. p. 82 No. 581h — Spuler p. 63 No. 19 — Seitz p. 307 — BRebel p. 68 No. 165.

b) *pyrenaica* Var. Obth. VIII 1884 p. 16 — Elwes Trs. E. S. 1887 p. 392.

Bilder: HSch. F. 240—3 ♂ U ♀ U — Freyer T. 419 F. 2. 3 ♂ ♀
— Berge II T. 33 F. 8 ab ♂ ♀ — (nec Ghd. T. 17.) — Seitz T. 79 h F. 1. 2 ♀ U.

Nebenformen: 1. F. *pyrenaica* Pierret Ann. France 1848 p. 399 (eigne Art.) — (Boisd. Gen. p. 11 No. 86 — nomen nudum!) — HSch 1850 VI. p. 28. — Obth. VIII. 1884 p. 16 — Elwes l. c. — Bramson p. 51 — Rühl p. 758 — Chapm. Trs. E. S. 1908 p. 314—6 — Obth. 1910 p. 293—4.

Synonyma: a) *orbitulus* Esper Var: (Boisd. Gen. p. 11 No. 86 — nomen nudum) — (Dup. Cat. p. 32 — nomen nudum) — Kef. p. 305 No. 177 — MDür p. 75 — Ghd p. 11 No. 31 — Std. Cat. I p. 5 No. 125a — Berce 1867 p. 138 — Kirby p. 363 No. 195a —

b) *orbitulus* Prunn. Var: Std. Cat. II p. 11 No. 154a — Led. Wien. E. Mo. 1857 p. 29 — Frey p. 17 — Hofm. 1 p. 8 No. 17 — StdR. p. 82 No. 581g — Spuler p. 63 No. 19 — Seitz p. 307 —

Bilder: HSch: F. 483—5 ♂ U ♀ — Ghd T. 18 F. 2a—c ♂ U ♀ — Obth VIII. 1884 T. 1 F. 10. 11 ♂ ♀ — Chapm. l. c. T. XI—XIII — (Seitz T. 79g F. 8 U — nicht typisch)
2) F. *aegagrus*. Christoph Hor. Ross. 1874 p. 22—4 — Elwes Trs. E. S. 1887 p. 394 — Rühl p. 259 (eigne Art) — StdR. p. 82 No. 581 i — Seitz p. 307.

Bilder: Christoph l. c. T. 1 F. 3. 4 ♂ ♀ — Seitz T. 79h. F 3 ♂.
3. F. *asturiensis* Obth. 1910 p. 293.

devanica: Moore Pr. Z. S. 1874 p. 573 T. 66 F. 4 — Nic. Ind. III p. 71 — StdR. p. 85 No. 605 — Bingham p. 344 — Seitz p. 313.

Nebenformen 1. F. *sarta* Alph. Hor. Ross. 1881 p. 387 T. 14 F. 8 ♂ — Rühl p. 274 + 762 (syn.: *devanica* Mre) — StdR. p. 85 No. 606 — Bingham p. 345 (syn.: *devanica* Mre) — Seitz p. 313 T. 80h. F. 4 ♂. (?)

Synonyma: a) F. *phryxis* Std. Stett. E. Z. 1886 p. 212 — Nic. l. c. p. 72 — Rühl p. 274 + 762 — StdR. p. 85 No. 606.

b) F. *devanica* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 384 T. 8 F. 4a b ♂ ♀ (auf d. Tafel „*sarta*“).

2. F. ♀ *caeruleata* Rühl p. 762 — StdR. p. 85 No. 606.

3. F. (aberr.) *pupillata* Courv. Ent. Mittl. 1913 p. 292.

diana: Miller Iris 1912 p. 220—1.

(dimus Bgstr. 1779 Aberr. v. *alexis* Poda)

(diidorus Bremer 1861 ? F. v. *rustica* Edwds)

(diomedes Rott. nom. praeocc. == euphemus Hübn. 1805)

(diomedes Borkh. 1788 == alcon Fabr. 1787)

- dis:** G r. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 453 — Rühl p. 312
— StdR. p. 82 No. 586 — Seitz p. 308.
- divina:** Fixsen Mem. Rom. 1887 p. 286. T. 13 F. 5 a b ♀ U
— Leech China II p. 314 — StdR. p. 81 No. 577 — Seitz p. 306.
- dolus:** Hübner G. 1827 T. 159 — Boisd. Ind. p. 13 — Freyer
Btr. III. 1830 p. 7 — Meig. III. p. 265 — Boisd. Icon. p.
70 — Dup. God. Suppl. p. 63 — Lucas p. 38 — Treitschke
X. p. 61—2 — Boisd. Gen. p. 13 No. 107 — HSch. I. p.
116 — Dup. Cat. p. 31 — Kef. p. 205 No. 186 — Ghd. p.
11 No. 41 — Std. Cat. II p. 13 No. 170 — Berge V p. 21
— Hofm. I p. 9 No. 31 — Alph. Trs. E. S. 1891 p. 502 —
Rühl p. 284 + 764 — Hofm. II p. 10. No. 31 — Obth XX
p. 17 — StdR. p. 87 No. 621 — Wheeler p. 30 — Spuler
p. 66 No. 36 — Seitz p. 316 — BRebel p. 73 — Obth.
1910 p. 261—3 — Courv. 1910 p. 187 —
- Synonyma: a) lefebvrei God. Enc. 1821 p. 696 No. 232 —
Std. Cat. I p. 6 No. 144 — Berce 1867 p. 145.
b) admetus Var. Kirby. p. 369. No. 236b.
- Bilder: Hüb. F. 793—6 ♂ U ♀ U — Meig. T. 125 F. 3a—c
♂ U ♀ — Dup. God. T. 10 F. 3—5 ♂ U ♀ — Boisd. Ic. T.
15. F. 6—8 ♂ ♀ U — Freyer Btr. T. 97 F. 3. 4 ♂ ♀ — Lucas
T. 26 F. 3 ♂ — Ghd T. 20 F. 4a—c ♂ U ♀ — Hofm. I
T. 4 F. 11a b ♂ U — Hofm. II T. 6. F. 3a b ♂ ♀ — Obth
XX T. 4 F. 49 ♂ — Spuler T. 17 F. 7a b ♂ ♀ — Seitz
T. 81 f. F. 5. 6 ♂ ♀.
- Nebenformen: 1. F. menalcas Freyer NBtr. III 1839 p. 26
— Std. Cat. II p. 13 No. 170a — Rühl p. 283 + 764 (eigne
Art) — StdR. p. 87 No. 621b — Seitz p. 316 — Courv. 1910 p. 187.
Synonyma: a) (F. epidolus Boisd. Gen. p. 13 No. 108
— nomen nudum!) — HSch. 1843. p. 114 T. 4 — Dup. Cat.
p. 31 (eigne Art) — Kef. Stett. E. Z. 1851 p. 205 No. 186a
— Ghd. p. 13 No. 42 — StdR. p. 87 No. 621b —
b) lefebvrei Var. Std. Cat. I p. 6 No. 145.
c) admetus Var. Kirby p. 369 No. 236c.
- Bilder: Freyer T. 223 F. 2. 3 ♂ ♀ — HSch T. 4 F. 18.
19 ♂ U; T. 102 F. 486—7 ♀ U — Ghd T. 21 F. 1a—c ♂
U ♀ — Seitz T. 81g. F. 1 ♂.
2. F. vittata Obth. Bull. France 1892 p. VIII + XX p. 17
T. 4 F. 48 — Rühl p. 285 — StdR. p. 87 No. 621a —
Wheeler p. 30 — Spuler p. 66 — Seitz p. 316 T. 81. f.
F. 7. 8 U ♀ — BRebel p. 73 — Obth. 1910 p. 261—3 —
Courv. 1910 p. 187.
3. F. virgilia Obth. 1910 p. 263.
4. F. (aberr.) discoelongata Courv. Iris 1912 p.
47. — (Hüb. F. 829 ♂) — Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1901 F. 7
(Kopie n. Hüb.)
- (dorylas Schiff. 1776 nom. nudum. = hylas Esper 1777)
(dschagatai Gr. Grsh. 1890 F. v. idas L.)
(dymus Borkh. 1788 Aberr. v. alexis Poda)
(ellisii Marshall 1882 F. v. rustica Edwds)
- elvira:** Evs. Bull. Nat. Mosc. 1854 p. 177 — Std. Cat. I
p. 5 No. 107 — Kirby p. 369 No. 231 — Std. Cat. II. p.

10 No. 135 — Erschoff Fedtschenko 1874 p. 10 — Rühl p. 238 + 753 — StdR. p. 81 No. 579 — Seitz p. 307.

Synonym: oberthüri Gr. Grsh. Mem. Rom. 1887 p. 399 + ib. 1890 p. 369 T. 7 F. 4 ab ♂♀ — Rühl p. 770.

(empyrea Freyer 1852	= loewii Zeller 1847)
(endymion Schiff. 1776 nom. nudum	= meleager ♀ Esper 1777)
{endymion Freyer 1852	= panagaea HSch. 1851)
{epidetus Boisd. 1840 nom. nudum	= menalcas Freyer 1839)
{erebus Knoch 1781	= arcas Rott. 1775)
{erigone Gr. Grshm. 1890	? F. v. tithonus Hbn.)
{eroides Friv. 1835	? F. v. tithonus Hbn.)
{eros Ochs. 1808	= tithonus Hbn. 1805)
{eros Stephens 1828	F. v. icarus Rott.)
{erotides Std. 1892	F. v. tithonus Hbn.)

erschoffii: Led. Hor. Ross. 1869 p. 80 T. 4 F. 4. 5 ♂♀ — Kirby p. 369 No. 233 — Std. Cat. II. p. 13 No. 173 — Christoph. Hor. Ross. 1877 p. 200. — Rühl p. 290 — Std. Iris 1899 p. 152 — StdR. p. 87 No. 618 — Seitz p. 316 T. 81 e F. 5. 6 ♂♀.

Nebenform: F. tekkeana. Christoph Mem. Rom. 1887 p. 52 T. 3 F. 1 ♂ — StdR. p. 87 No. 618a — Seitz p. 316.

escheri: Hübn. T. 160. 1819 — Boisd. Ind. p. 12 + Icon. p. 52 — Dup. God. Suppl. p. 71 — Treitschke X. p. 68 — Lucas p. 35 — Boisd. Gen. p. 11 No. 90 — Dup. Cat. p. 32 — MDür. p. 81 No. 46 — Ghd. p. 17 |No. 75 — Hein. p. 81 No. 123 — Std. Cat. II p. 12 No. 163 — Jenner p. 295 — Frey p. 19 — Hofm. I p. 8 No. 25 — Bramson p. 56 — Rühl p. 273 + 762 — Killias p. 9 — Hofm. II p. 10 No. 25 — Caflisch p. 9 — Obth. XX p. 22 — Favre p. 20 — Stef. p. 51—2 — StdR. p. 86 No. 612 — Wheeler p. 34 — Spuler p. 65 No. 32 — Gillm. E. Z. Gub. 1909 p. 144 — Tutt III. 1909 p. 357 — Seitz p. 314 — Obth. 1910 p. 212—9 — BRebel p. 71 No. 177 — Courv. 1910 p. 186—7 — Vorbrot p. 142 — Tur. 1911 p. 257—8 — Perlini 1912 p. 68.

Synonyma: a) a gestor. God. Enc. p. 690 No. 221 — Boisd. Gen. p. 11 No. 90 — Dup. Cat. p. 32 — Std. Cat. I p. 5 No. 136 — Kirby p. 366 No. 222 — Berce 1867 p. 140 — Berge V. p. 22 No. 20.

b) sapphirus Meig. II. 1830 p. 22 — Tutt. Ent. Recd XXI 1909. p. 202 — Gillm. E. Z. Gub. 1909 p. 144.

c) alexis (icarus) Var. Kef. p. 310 No. 218 a.

d) icarus Var. Evsm. Volg. p. 42 — Treitschke X p. 69 — Spgbg p. 19—20.

Bilder: Hübn. F. 799—800 ♂ U; 867—8 ♀ U — Meig. T. 47 F. 4 ab ♂ U — God. Dup. Suppl. T. 11 F. 3—6. ♂ U ♀ U — Boisd. Icon. T. 12 F. 4—6 ♂♀ U — Lucas T. 25 F. 4 ♂ — Ghd. T. 29 F. 2 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F. 5 ♂ — Hofm. II T. 4 F. 5 ab ♂♀ — Spuler T. 16 F. 19 ab ♂♀ — Seitz T. 81 a F. 7 U; b F. 1. 2 ♂♀ — Obth. 1910 T. 20 F. 78. 79 ♂♀.

Nebenformen: 1. F. dalmatica Speyer Stett. E. Z. 1882 p. 331 + ib. 1885 p. 81 — Rühl p. 274 — StdR. p. 86 No.

- 612 a — Spuler p. 65 — Seitz p. 314 T. 81 b F. 3. 4 ♂♀
BRebel p. 71 No. 177.
 2. F. roseonitens Obth. 1910 p. 215.
 3. F. rondoui Obth. 1910 p. 216 + 1909 T. 20 F. 71 ♂ 73 ♀.
 4. F. helenae Obth. 1910 p. 217 T. 49 F. 415—16 ♂♂.
 5. F. ballestrei Fruhstf. Soc. eut. 1910 p. 48.
 6. F. punctulata Wheeler p. 34.
 7. F. ♀ subapennina Tur. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 1903
p. 43 T. III F. 8—11 — Seitz p. 314 — BRebel p. 71 Nr. 177.
 8. F. ♀ foulquieri Obth. 1910 p. 214.
 9. F. ♀ styx Tur. Ver. Bull. Ital. 1911 p. 258.
 10. F. ♀ chryseis Tur. Ver. ib.
 11. F. (aberr.) radiata Siépi Cat. rais. d. Lépid. d. Bouches
du Rhône p. 40 — Obth 1910 p. 214 + 1909 T. 20 F. 74.
80 ♀♀ — Ver. Bull. Ital. 1911 p. 275 T. 1 F. 16 ♀.
 12. F. (aberr.) subtus-im punctata Obth. XX p. 22
T. 3 No. 25 ♂.
 Synonym: a) Ab. rostagnoi Stef. Bull. Ital. 1904.
p. 5 — Verity ib. 1911. p. 275 T. 1. F. 15 ♂.
 b) Ab. caeca Courv. 1907 p. 75 + Iris 1912 p. 63.

(eumedes Meisn. 1818	F. v. medon Esper)
(eumedon Esper 1777	= chiron Rott. 1775)
(euphemus God. 1821	= alcon Fabr. 1787)

euphemus: Hübn. 1793 p. 44 („trübbblauer Falter“) — Hbst IX. p. 168 — Ochs I. 2 p. 9 No. 3 — Hübn. Verz. p. 67 No. 651 — Meisn. p. 87 — Latr. NDict. p. 499 — God. Enc. p. 699 No. 237 — Meig. II p. 3. No. 2 — Schott p. 75 No. 89 — Boisd. Icon. p. 79 — Lucas p. 39 — Dup. Cat. p. 31 — Kef. p. 307 No. 198 — MDür p. 97 No. 60 — Ghd p. 19 No. 92 — Gebr. Sp. p. 245 — Butl. Pr. Linn. Soc. 1866 p. 56 — Std. Cat. II p. 14 No. 187 — Berge V p. 20 — Jenner p. 294 — Frey p. 22 — Killias p. 22 — Hofm. I. p. 10 No. 43 — Bramson p. 46 — Leech China II p. 313 — Rühl p. 306 + 768 — Hofm. II p. 11 No. 43 — Reutti p. 24 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 329 — Stef. p. 56 — StdR. p. 90 No. 645 — Rgmt p. 23 — Wheeler p. 20 — Spuler p. 68 Nr. 48 — PIImh. p. 28 — Seitz p. 320 — BRebel p. 75 No. 189 — Obth. 1910 p. 329—333 — Vorbrot p. 155.

Synonyma: a) diomedes Rott. Natf. VI. 1775 p. 26 No. 14 (nom. praeocc.) — Borkh. I. p. 169 + 281; II p. 233 — Hein. I p. 75 No. 109 — Std. Cat. I p. 6 No. 163 — Berce 1867 p. 149 — Kirby p. 374 No. 275.
 b) arctophylax Bgstr. III 1779 p. 6.
 c) arctophonus Bgstr. ib. p. 10.

Bilder: Hübn. F. 257—9 ♂ U ♀ — Engr. T. 41 F. 86 f ♂
gh ♀ U — Hbst T. 309. F. 1—3. ♂ U ♀ — Bgstr. T. 51.
F. 1. 2 ♀ U; T. 53 F. 7. 8 ♂ U — Meig. T. 43. F. 2 ab
♂♀ — Boisd. Icon. T. 13. F. 4—7 ♂♀ U ♀ — Lucas
T. 26 F. 6 ♀ — Ghd T. 33. F. 1 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I.
T. 4 F. 21 ♂ — Hofm. II T. 6 F. 15 ab ♀♂ (Geschlechter
verwechselt!) — Spuler T. 17 F. 20 ab ♂♀ — Seitz T. 83
a. F. 3—5 ♂♀ U — BRebel T. 14 F. 21 ab ♂♀ —

Nebenformen: 1. *F. kazamoto* Druce Cist. entomol. I 1869 p. 361. — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 891 — Leech China II p. 314 — Rühl p. 306 + 769 — StdR. p. 90 No. 645 c — Seitz p. 321 T. 83 b. F. 4—6 ♂♀ U.

2. *F. euphemia* Std. Mem. Rom. 1887 p. 142 — Fixsen ib. p. 288 — Gräser Berl. E. Nachr. 1888 p. 81 — Leech China II p. 314 — Rühl p. 306 + 769 (eigne Art!) — StdR. p. 90 No. 645 b. — Seitz p. 320.

Bilder: Fixsen l. c. T. 13 F. 6 ♀ — Seitz T. 83 b. F. 3 ♀ (nec 2).

3. *F. obscurata* Std. Iris 1892 p. 320 — Herz Iris 1899 p. 238 — StdR. p. 90 No. 645 a — Seitz p. 320 T. 83. b. F. 1. 2 ♂♀.

4. *F. albo-cuneata* Spuler 1908 p. 68 No. 48 — BRebel p. 75 — Galv. Preiss p. 143.

5. *F. pulverulenta* PImh. 1909 p. 28.

6. *F. sanguisorbae* Obth. 1910 p. 333 T. 55 F. 472 ♀. (Syn.: *pulverulenta*?)

7. *F. (aberr.) striata* Gillm. Soc. ent. 1904 p. 179.

8. *F. (aberr.) obsoleta* Gillm. E. Z. Gub. 1904 No. 1. Synonym: *Ab. paula* Schultz E. Z. Gub. 1906 p. 215.

9. *F. caeca* Courv. (*F. nova*) — (Boisd. Icon. T. 13. F. 8 U)

eurypilus: Freyer NBtr. VI 1852 p. 148 — Led. Hor. Ross. 1869 p. 79 — Std. Cat. II p. 10 No. 142 — Christoph. Hor. Ross. 1874. p. 22 — Std. ib. 1878 p. 237 — Rühl p. 247 + 755 — Nicholl & Elwes Trs. E. S. 1901 p. 96. — StdR. p. 79 No. 550 — Seitz p. 302.

Synonyma: a) *eurypylus* Std. Cat. I p. 5 No. 113 — Bramson p. 51.

b) *carmon* Ghd p. 15 No. 58.

c) *argus* L. Var. Led. Hor. Ross. 1869 p. 79.

d) *argyrogномон* Bgstr. Var. Kirby p. 359 No. 153 a.

e) *sephyrus* Friv. *F. dimorpha* Alph. Trs. E. S. 1891 p. 500—1.

Bilder: Freyer T. 573 F. 4 ♂ — Ghd T. 25 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 78 g. F. 9. 10 ♂ U; h F. 1 U.

(*eurypilos* Ghd 1853 = *damone* Evans 1841)

eversmanni: Std. Stett. E. Z. 1886 p. 205 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 375 T. 7. F. 2 ab ♂♀ — Rühl p. 241 + 753 — StdR. p. 79. No. 548 — Seitz p. 302. T. 78 g F. 2. 3 ♂ U.

Nebenformen: 1. *F. grumi*. Std. p. 79 No. 548a (eigne Art?) — Seitz p. 302. T. 78 g F. 5. 6 ♂♀.

2. *F. (aberr.) amplificata* Schultz E. Z. Gub. 1906 p. 215.

Synonym: *Ab. (disco —) elongata* Courv. 1907 p. 33 + Iris 1912 p. 47.

(*famelica* Seitz 1909
(*fatma* Obth. 1888

F. v. *baton* Bgstr)
F. v. *bavius* Evans)

felcis:	Obth. Et. XI. 1886 p. 21 T. 7 F. 52 ♂ — Leech China II p. 308 — Seitz p. 308 T. 79. i. F. 8 ♀.
fergana:	Std. Stett. E. Z. 1881 p. 262 — StdR. p. 79 No. 555 — Seitz p. 303 T. 78 k. F. 2 ♂. Synonyma: a) ferghana Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 381. b) löwii Var. Rühl p. 244 + 754.
Nebenform:	F. torgouta Alph. Hor. Ross. 1881 p. 380 T. 14. F. 5. 6 ♂♀ — Christoph Mem. Rom. 1884 p. 102 — Rühl p. 245 + 754 (eigne Art!) — StdR. p. 79 No. 555 a — Seitz p. 303.
	(franklinii Curtis 1831 F. v. rustica Edwds.) (fugitiva Butl. 1881 F. v. icarus Rott.) (fuscus L 1746 = ♀ idas L. 1761) (fylgia Spbg. 1876 F. v. chiron Rott.) (gabrielis Obth. 1910 ♀ F. v. hylas Esper)
gigantea:	G. Grsh. Mem. Rom. 1885 p. 215 + ib. 1890 T. 9 F. 8 ab ♂♀ — StdR. p. 88 No. 625 — Seitz p. 318. Synonym: iphicles Std. Stett. E. Z. 1886 p. 227 — Rühl p. 304.
	(gillmeri Krodel 1904 Aberr. v. damon Schiff.) (glauca Maassen 1860 ♀ F. v. icarus Rott.)
glaucias:	Led. Hor. Ross. 1872 p. 10 T. 1 F. 6. 7 ♂♀ — Christoph ib. 1874 p. 25 — Rühl p. 298 — StdR. p. 86 No. 616 — Seitz p. 316 T. 81 e F. 2. 3 ♂ U.
	(haberhaueri Std. 1886 F. v. sieversi Christoph) (hadjina Rühl 1895 F. v. hopfferi HSch.) (hecateus Drapier 1819 = orion Pall. 1771) (helena Std. 1862 F. v. semiargus Rott.) (helena Gr. Grsh. 1891 F. v. tithonus Hübn.) (helenae Obth. 1910 F. v. escheri Hübn.) (hesperica Ramb. 1839 F. v. sephyrus Friv.)
hopfferi:	HSch 1851 p. 24 F. 512—4 ♂ U U — Std. Cat. I p. 6 No. 146 — Ghd. p. 13 No. 43 — Std. Hor. Ross. 1878 p. 249 — Rühl p. 285 + 764 — StdR. p. 87 No. 622 — Seitz p. 317 T. 81 g F. 2—4 ♂♀ U — Synonyma: a) dolus Var. Kef. Stett. E. Z. 1851 p. 206 No. 186 b — Ghd. Inhaltsverzeichnis — Courv. 1910 p. 188. b) dolus Var. alpina ? Std. Cat. II. p. 13 No. 171. c) admetus Var. Kirby p. 369 No. 236 d.
Nebenform:	F. hadjina Rühl p. 764 — StdR. p. 87 No. 622a — Seitz p. 317 T. 81 g F. 5 U.
	(hunza Gr. Grsh. 1890 F. v. stoliczkana Feld.) (hyacinthus Lewin 1795 F. v. bellargus Rott.) (hyacinthus HSch. 1847 F. v. nicias Meig.) (hylactor Bgstr. 1779 F. v. baton Bgstr.) (hylas Schiff. 1776 nomen nudum = baton Bgstr. 1779)

hylas: Esper I p. 375 + Suppl. I p. 30 — Lang Verz. 1782 p. 31 No. 233 — Jung 1782 p. 69 — Borkh. I p. 157 + 277; II p. 227 — Prunn. p. 55 No. 105 — Std. Cat. II p. 12 No. 167 — Jenner p. 295 — Killias p. 20 — Hofm. I p. 9 No. 28 — Bramson p. 56 — Rühl p. 279 + 763 — Hofm. II p. 10 No. 28 — Reutti p. 23 — Favre p. 21 — Stef. p. 54 — StdR. p. 85 No. 610 — Wheeler p. 33 — Walker Ent. Mo. Mag. 1907 p. 132 — Spuler p. 65 No. 30 — PImh. p. 27 — Seitz p. 314 — BRebel p. 70 No. 175 — Courv. 1910 p. 148 + Lyc. Bas. p. 160 — Vorbrot p. 140 — Tur. Ver. 1911 p. 257 — Perlini 1912 p. 67.

Synonyma: a) *dorylas* Schiff. p. 322 No. 19 (nom. nudum!) — Schnd p. 241 No. 145 — Fabr. Mant. p. 75 No. 695 — Gmelin-Linné p. 2349 No. 756 — Fabr. Ent. syst. III p. 299 No. 135 — Hbst IX p. 225 — Hübn. p. 48 No. 17 — Syst. V. II p. 270 — Ochs. I. 2 p. 31 No. 14 — Hübn. Verz. p. 68 No. 662 — Meisn. p. 87 — Latr. NDict. p. 494 — God. Enc. p. 692 No. 224 — Boisd. Ind. p. 12 — Meig. II p. 18 No. 24 — Schott. p. 78 No. 99 — God. Dup. Suppl. p. 74 — Lucas p. 36 — Boisd. Gen. p. 12 No. 95 — Dup. Cat. p. 33 — Selys Mem. Liège 1844 p. 4 — HSch. I. p. 125 — Berge II p. 155 No. 27 — Kef. p. 309 No. 211 — MDür p. 84 No. 48 — Ghd. p. 17 No. 81 — Wall. p. 225 No. 10 — Gebr. Sp. p. 238 — Hein. p. 78 No. 118 — Std. Cat. I p. 6 No. 140 — Wnbg I p. 390 — Berce 1867 p. 143 — Kirby p. 366 No. 223 — Spgbg p. 3 No. 1 — Berge V p. 22 No. 15 — Täschler 1870 p. 84; 1877 p. 69 — Frey p. 20 — Obth. XX p. 17 — Rgmt p. 23 — Obth. 1910 p. 226—9
b) *argester* Bgstr. III p. 15.
c) *argester alter* Bgstr. ib. p. 19.

Bilder: J. Chr. Schäffer Icon. T. 98 F. 3. 4 ♂ U; T. 108 F. 6. 7 ♀ U — Esper T. 45. F. 3 ♂; T. 55 F. 1 ♀ — Engr. T. 83 F. 82 a bis ♂, e bis ♀ („l'azuré“) — Bgstr. T. 58 F. 3. 4 ♂ U („argester“) T. 61 F. 1—4. ♂ U ♀ U („argester alter“) — Hbst T. 314 F. 1—3 ♂ ♀ U — Hübn. F. 289 bis 291 ♂ ♀ U („feinblauer Falter“) — Meig. T. 45. F. 6 a b ♂ ♀ — Boisd. Icon. T. 14 F. 1—3 ♂ ♀ U — God. Dup. Suppl. T. 12 F. 1—4 ♂ U ♀ U — Lucas T. 25 F. 7 ♂ — Ghd T. 30 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F. 8 ♂ ♀ — Hofm. II T. 5. F. 24. ab ♂ ♀ — Spuler T. 16 F. 23 ab ♂ ♀ — Seitz T. 80 i F. 3—5 ♂ U ♀ — BRebel T. 14 F. 13 ab ♂ U.

Nebenformen: 1. F. *golgus* Hübn. T. 136 + Verz. p. 68 No. 664 — Meig. II p. 10 — Boisd. Ind. p. 12 + Gen. p. 12 No. 95 — Dup. Cat. p. 33 — Berge II p. 155 No. 27 — Ghd p. 17 No. 82 — MDür p. 85 No. 48 — Kirby p. 367 No. 223 b — Std. Cat. II p. 12 No. 167 — Rühl p. 280 — StdR. p. 85 No. 610 — Courv. 1910 p. 156 — Cat lépid. Genève p. 31.

Synonym: *minor* (Tutt.) Wheeler p. 34.

Bilder: Hübn. F. 688—9 ♂ U — Ghd. T. 30 F. 5 ab ♂ U (Kopie n. Hübn.)

2. *F. albicans* Ghd. p. 17 No 83.

Synonyma: a) *dorylas* Var. Rambur Faune Andal. 1838 T. 10 — Std. Cat. I p. 6 No. 140 a — Rambur Cat. Lép. Andal. 1858. I p. 39 — Kirby p. 367 No. 223 a — Std. Cat. II p. 12 No. 167 b — Rühl p. 763 — StdR. p. 86 No. 610 b — Obth. 1910 p. 229.

b) (*F. albicans* Boisd. Gen. p. 12 No. 95 — nomen nudum) — (Dup. Cat. p. 33 — nomen nudum) —

c) (*F. niveoscens* Kef. p. 309 No. 211 — nomen nudum) — MDür p. 85 — Std. Cat I p. 6 No. 140 a — Kirby p. 367 No. 223 a — Std. Cat. II p. 12 No. 167 b — Bramson p. 47 — Rühl p. 280 + 763 — Obth. XX p. 17 — StdR. p. 86 No. 610 b — Spuler p. 65 No. 30 — Seitz p. 314 — Obth. 1910 p. 229.

Bilder: Rambur Faune T. 10 F. 8—10 ♂♀ U — Ghd T. 31 F. 1 ab ♂ U — Seitz T. 80 i F. 7 ♂ 8 U.

3. *F. armena* Std. Cat. II. p. 12 No. 167 a — Bramson p. 47 — Rühl p. 280 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien. 1897 p. 17 — StdR. p. 86 No. 610a — Seitz p. 314 T. 81a F. 1 ♂.

4. *F. griseo-violascens* Obth. XX p. 17 T. 3 F. 38 ♂ — Courv. 1910 p. 156 — Galv. Preiss. p. 140 — Vorbrot p. 140.

5. *F. nigropunctata* Wheeler p. 34 — Engram. T. 83. F. 82 a bis ♂ — Agassiz p. 240 — Seitz p. 314 — Courv. 1910 p. 156 — Cat. lép. Genève. p. 31 — BRebel p. 71 — Vorbrot p. 140.

6. *F. atlantica* Elwes Trs. E. S. 1905 p. 380 T. 19 F. 5. 6 ♂♀ — Obth. 1910 p. 229.

7. *F. castilla* Fruhst. Soc. ent. 1910 p. 48.

8. *F. tirolensis* Heydemann Ent. Ztschr. Stuttgt. 1910 p. 177 — Courv. 1910 p. 167 — Vorbrot p. 140.

9. *F. metallica* Favre Suppl. p. 4 — Wheeler p. 34 — Seitz p. 314 — Courv. 1910 p. 156 — BRebel p. 71 — Cat. lép. Genève p. 31 — Vorbrot p. 140 — Tur. Ver. 1911 p. 257.

Synonyma: a) *F. gabrielis* Obth. 1909. T. 19 F. 77 + 1910 p. 228.

b) *F. caerulea* Courv. 1910 p. 156.

10. *F. brunnea* Courv. 1910 p. 156.

11. *F. (aberr.) radiata* Courv. 1907 p. 37. T. 1. F. 23 ♂ + 1910 p. 167 + Iris 1912 p. 55.

12. *F. (aberr.) confluens-transversa* Courv. 1910 p. 167 + Iris 1912 p. 57 T. 5 F. 25 ♂.

13. *F. (aberr.) basipunctata* Ver. Bull. Ital. 1911 p. 274.

Synonym: *A. b. basi-novopunctata* Courv. Iris 1912 p. 58 — Wehrli p. 14.

14. *F. (aberr.) obsoleta* Gillm. E. Z. Gub. 1904 No. 1 — Aigner Ann. Hung. 1906 p. 516 — Seitz p. 314 — BRebel p. 71 — Courv. 1910 p. 167 + Iris 1912 p. 63 T. 5 F. 28 ♂.

Synonym: *A. b. glycera* Schultz Soc. ent. 1904 p. 9 — BRebel p. 71.

(*hylus* Fabr. 1787) = baton Bgstr. 1779)
(*hypochiona* Ramb. 1858) F. v. *argus* L.)

hyrcana: Led. Hor. Ross. VI. 1869 p. 78 T. 4 F. 3. 4 ♂ U —
Std. Cat. II p. 10 No. 136 — Christoph Hor. Ross. 1873—4.
p. 21 — Rühl p. 239+753 — StdR. p. 80 No. 561 — Seitz
p. 304 T. 79a F. 7, 8 U ♀.

Synonym: *morgiana* Kirby Syn. Cat. 1871 p. 369 No. 232.

(jaloka Mre 1874	F. v. <i>rustica</i> Edwds)
(icadius Gr. Grsh. 1890	F. v. <i>icarus</i> Rott.)
(icarius Esper 1792	= <i>amandus</i> Schnd. 1787)
(icarinus Scharfenberg 1791	F. v. <i>icarus</i> Rott.)

icarus: Rott. Natf. VI 1775 p. 21 No. 8 — Esper I p. 334 — Jung 1782 p. 70 — Schnd. p. 244 No. 147 — Borkh. I p. 161 + 278; II p. 227 — Jung 1791 p. 282 — Hbst IX. p. 205—212 — Sepp. Aurélien 1794 p. 75 — Prunn. p. 56 No. 107 — Meig. p. 24 No. 30 — Berge I p. 86 — Berge II p. 154 No. 18 — Hein. p. 80 No. 121 — Std. Cat. I p. 5 No. 133 — Wnbg I p. 371 — Berce 1867 p. 139 — Newman p. 128—9 — Bienert Diss. p. 29 — Std. Cat. II p. 11 No. 160 — Kirby p. 365 No. 210 — Spgbg p. 16 — Berge V p. 22 No. 18 — Hofm. I p. 8 No. 22 — Bramson p. 50 — Rühl p. 267 + 760 — Hofm. II p. 10 No. 22 — Reutti p. 23 — Favre p. 19 — StdR. p. 84 No. 604 — Spuler p. 64 No. 28 — PImh. p. 26 — Seitz p. 312—3 — Tutt IV p. 113—208 — BRebel p. 70 No. 173 — Courv. 1910 p. 134 etc. — Obth. 1910 p. 235—243 — Vorbrodt p. 136—8 — Perlini 1912 p. 66.

Synonyma: a) (*Argus oculatus* ♂, *fuscus* ♀. Linné F. svec. Ed. I 1746 p. 246-7)

b) (blew Argus Petiver Musei Petiver. Cent. IV. V.
1695 p. 34 No. 318)

c) (Argus bleu. Geoffroy Hist. abrég. II 1762 p. 61
No. 30)

d) *Alexis* (nom. praeocc.) Var. 2 ♂ Var. 3 ♀ Scopoli

Ent. Carniol. 1763 p. 176 No. 461)
d) (alexis Schiff. p. 184 No. 12 — „Hauhechelfalter“ —

nomen praeocc.) — Syst. V. II. p. 271 — Hübn. p. 49 — Schrank II. p. 213 — Ochs I. 2 p. 38—41 No. 17 — Latr.

NDict. p. 495 — Meisn. p. 87 No. 98 — God. Enc. p. 690
No. 222 + Hist. p. 212 — Boisd. Ind. p. 12 — Schott

p. 79 No. 101 — Boisd. Gen. p. 11 No. 89 — Dup. Cat.
p. 32 — HSch. I p. 120 — Bertol. p. 35 No. 8 — Selys

Mém. Liège 1844 p. 4 — Kef. p. 309 No. 218 — MDür p. 77
No. 45 — Ghd p. 15 No. 70 — Wall. p. 220 No. 8 —

Gebr. Sp. p. 237 — Westwd p. 111—3 — Stainton p. 118—9
— Freyer VII p. 29 — Täschler 1870 p. 84 — Frey p. 18

— Troyer VII p. 25 — Faschner 18.3 p. 34 — Frey p. 10
— Obth. XX p. 22-4 — Rgmt p. 21 — Wheeler p. 35.
(v) *theta tis* Esner I p. 335 (S)

c) thetis Esper T p. 333 (♀)

f) *candybus* ♂ Bgstr. II p. 78 — Borkh. I p. 161 — Tutt IV. 1910 p. 138.

g) *candaon* ♂ Bgstr. III p. 3.

h) *pampolyge* ♀ Bgstr. II p. 77.

i) *candiope* ♀ Bgstr. II. 78.

k) *fusciolus* ♀ Fourcroy Entom. Paris 1785 p. 245.

l) *agestis* Lang Verz. 1789 p. 54 No. 439.

m) *oebalus* Hoffmannsegg Illig. Mag. III 1804 p. 185.

n) *icarius* Wood. Index entomol. 1839 p. 8.

Bilder: Petiver Papil. Brit. Icon. 1715. T. VI F. 3 ♀ — Rösel Ins. Belust. III T. 37 F. 3 ♂ 5 U — Esper T. 32 F. 4 ♂; T. 55 F. 5 ♂ — Bgstr T. 47 F. 1. 2 ♀ („pampolyge“) T. 48. F. 1. 2 ♂ („candybus“). T. 48. F. 3. 4 ♀ („candiope“) T. 49 F. 3 4 ♂ („candaon“) — Sepp. Aurélien 1794 p. 75. T. 39 — Hübn. F. 292—4 ♂ ♀ U — Hbst T. 312 F. 10—12 ♂ ♀ U — God. Hist. T. 11 secd. ♂; T. XI tert. U — Meig. T. 48 F. 1 a—f ♂ U ♂ ♀ U ♀ — Labram T. 55 ♂ 56 ♀ — Westwd T. 17 F. 1 ♂ ♀ U — Ghd T. 27 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Berge I. T. 28 F. 11 a b ♂ ♀ — Freyer T. 616 ♂ ♀ — Newman p. 128 ♂ U. Textfig. — Berge V. T. 14 F. 8 ♂ — Hofm. I T. 4 F. 2 a b ♂ ♀ — Hofm. II T. 5 F. 18 a b ♂ ♀ — Spuler T. 16 F. 16 a b ♂ ♀ — Seitz T. 80 f. F. 6 7 ♂ ♂ — BRebel T. 14 F. 9 c—e ♂ ♀ U — Eckstein T. 15 F. 8 c d ♂ ♀ U.

Nebenformen: 1. *F. eros* Stephens Ill. Haust. 1828. I p. 93 — Tutt IV. 1910 p. 137.

2. *F. agestooides* Selys Mém. Liège 1844 p. 4 No. 33 (nom. nudum!).

3. *F. pusillus* Ghd. p. 15 No. 73. T. 28 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Ochs I. 2. p. 41 — (Blachier Ann. France 1889 p. 259 T. 4 F. 2. 3 ♀ U.)

Synonyma: a) *F. minor*. Cockerell Entom. 1889 p. 176.
b) *F. parvula* Krul. Berl. E. Nachr. 1893 p. 370.

c) *F. nana* Grund. Int. E. Z. Gub. 1908 p. 79.

4. *F. persica* Bienert. Diss. 1870 p. 29 — Std. Cat. II p. 12 No. 160 b — Butl. Pr. Z. S. 1880 p. 407 — Swinhoe Trs. E. S. 1885 p. 340 — Nic. Ind. III p. 75 — Tutt. 1896 p. 175 — StdR. p. 85 No. 604 e — Bergman. Entom. 1903 p. 249 — Gillm. E. Z. Gub. 1904 No. 20 + No. 22 — Krodé ib. 1904 p. 80 — Bingham p. 339 — Gillm. ib. 1910 No. 1 — Seitz p. 312 — Courv. 1910 p. 141 — Tutt IV. 1910 p. 182—4 — Stichel Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1911 p. 113.

Synonyma: a) *F. fugitiva* Butl. Pr. Z. S. 1881 p. 606 — Nic. l. c. p. 74 — Bingham p. 339—340.

b) *F. yarkundensis* Mre Ann. Mag. 1878. I p. 229 + Yarkand Miss. 1879 p. 6 No. 21 („yarkundensis“) — Nic. p. 75—6 — Bingham p. 339 — Seitz p. 312.

c) *F. turanica* Rühl p. 761 — Seitz p. 312 — Gillm. Int. E. Z. Gub. 1910 No. 1 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 252.

Bilder: Mre l. c. T. 1 F. 8 ♀ U — Seitz T. 80 g F. 4 U.

5. *F. celina*. Austaut. Pet. Nouv. ent. XI. 1879 p. 293 — Obth. Etud. VI. 1881 p. 50 — Std. Iris 1892 p. 280 — Rühl p. 269 + 761 — Rebel & Rogenhofer Ann. Wien 1894

- p. 32 — StdR. p. 85 No. 604 d — Seitz T. 312 T. 80 g F.
 3 ♀ — BRebel p. 70 — Obth. 1910 p. 241 — Rebel Ann.
 Wien 1911. p. 304 — Vorbrodt p. 136.
Synonym: ? *lucia* Culot Bull. lèp. Genève 1905. p.
 68 T. 1 F. 6—8 ♂♀ U.
 6. *F. icadius* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 402 — Rühl
 p. 269 — StdR. p. 85 No 604f — Seitz p. 313 T. 80g F.
 5. 6 U ♀ — Tutt. IV. 1910 p. 187.
 7. *F. clara* Tutt 1896 p. 175 — Wheeler p. 35 — Seitz
 p. 312 — BRebel p. 70 — Tutt. 1910 p. 177.
 8. *F. pallida* Tutt. ib. + 1910 p. 136 — Rebel Ann.
 Wien. 1911. p. 304.
 9. *F. septentrionalis* Fuchs JB. Nass. 1900 p. 31 —
 Seitz p. 312 — Tutt 1910 p. 172.
 10. *F. sibirica* Fuchs. ib. — Tutt. 1910 p. 192.
 11. *F. brunnea* Fuchs ib. — Seitz p. 313 — Tutt 1910
 p. 172.
Synonym: *F. sardoa* Wagner Ent. Ztschr. Stuttgt. 1909
 p. 17 — Tutt 1910 p. 177 — Galv. & Preiss. 1911 p. 139.
 12. *F. livida* Gillm. Int. E. Z. Gub. 1909 p. 64 — Tutt
 1910 p. 136.
 13. *F. tutti*. Obth. 1910 p. 238 — Tutt 1910 p. 179.
 14. *F. ♂ nigromaculata* Cockerell Entom. 1889 p. 99
 — Tutt. 1910 p. 138.
Synonym: a) *F. punctifera* Courv. 1903 p. 23 +
Lyc. Bas. p. 160 — Vorbrodt p. 136.
 b) *F. punctigera* Aigner Ann. Hung. 1906 p. 516.
 15. *F. ♂ rufopunctata* Neuburger Soc. ent. 1907 p.
 180 — Rev. Bull. lèp. Genève 1909 p. 375. — BRebel p. 70
 — Tutt 1910 p. 140.
 16. *F. ♂ courvoisieri* Hirschke Vhdl. z. bot. Wien.
 1910 p. 412 (Albino!)
 17. *F. ♀ fusca* Gillm. Int. E. Z. Gub. 1908 p. 11 —
 BRebel p. 70 — Tutt 1910 p. 130.
Synonym: *F. brunnea* Courv. 1910 p. 141 (nom. praeocc.)
 18. *F. ♀ rufina* Obth. Étud. XIX 1894 p. 14 T. 6 F. 52
 — Grund Iut. E. Z. Gub. 1908 p. 79 — Spuler p. 64 —
 Seitz p. 312 — Tutt 1910 p. 141.
Synonym: *F. amoena* Schultz E. Z. Gub. 1904 p. 93
 — Seitz p. 312 — BRebel p. 70.
Bläue ♀ Formen:
 19. *thetis* Esper I p. 332 (für ♂ gehalten!) — Prunn.
 p. 59 No. 113.
 20. *icarus* Var. Esper Suppl. I p. 135.
 21. *oceanus* Bgstr. III p. 9.
 22. *thetys* Schnd. p. 245 No. 148.
 23. *caerulea* Fuchs Stett. E. Z. 1877 p. 133 — Frey p.
 18 — Rühl p. 268 + 761 — Tutt 1896 p. 175 — Horm.
Vhdl. z. bot. Wien 1897 p. 16 — Favre p. 19 — StdR. p.
 85 — Wheeler p. 35 — Spuler p. 64 — Gillm. Int. E. Z.
Gub. 1908 No. 1 — Seitz p. 312 — Tutt. 1910 p. 145 —
 BRebel p. 70 — Courv. 1910 p. 137 + *Lyc. Bas.* p. 159 —
Cat. lèpid. Genève p. 29 — Vorbrodt p. 136 — Galv. Preiss
 p. 139 — Perlini 1912 p. 66.

24. *Kashgarensis* Mre Seecd Yarkd. Miss. 1878 p. 5 + Ann. Mag. 1878. I. p. 230 — Nic. Ind. III p. 75 — Rühl p. 269 („Kaschgarensis“) + 761 — Gillm. Int. E. Z. Gub. 1908 No. 1 — Tutt 1910 p. 181.
25. *glauca* Maassen Stett. E. Z. 1880 p. 160 — Rühl p. 269 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien 1897 p. 16 — Agassiz p. 240 — StdR. p. 85 — Seitz p. 312 — Tutt 1910 p. 146 — Courv. 1910 p. 137.
26. *casanensis* Krul. Bull. Nat. Mosc. 1890 p. 223 — Rühl p. 268 — StdR. p. 85 — Seitz p. 312.
27. *mariscole* Kane Entom. 1893 p. 243.
28. *supra-caerulea* Obth. XX. 1896. p. 23.
29. *semiclarata* Tutt. 1896 p. 175 — Wheeler p. 36 — Gillm. l. c. No. 1.
30. „*icarus*“ Wheeler p. 36 — Gillm. l. c. No. 1 — Tutt 1910 p. 147.
31. *caeruleascens* Wheeler p. 35 — Gillm. l. c. No. 1 — Seitz p. 312 — BRebel p. 70 — Courv. 1910 p. 137 — Cat. lép. Genève p. 29.
32. *amethystina* Gillmer l. c. No. 1.
Bilder: Petiver Brit. Bttfl. 1715. T. VI. F. 1. 4 — JChr. Schäffer Icon. T. 235. F. 4. 5 — Esper. T. 32 F. 2 (für ♂ erklärt.) T. 79. F. 2 — Bgstr. T. 53. F. 3 + T. 121. F. 7 — Ghd T. 28 F. 4 — Mre Yarkd Miss. T. 1 F. 8 — Krul. Bull. Mosc. 1890 T. 8 F. e — Obth XIX T. 6 F. 52 + XX T. 4 F. 46 + 1910 T. 43 F. 324 — Seitz T. 80g. F. 1. 3. 8.
33. F. (aberr.) *subtus-maculis-extensis* Obth. XX. T. 4 F. 42 ♀.
Synonyma: a) *A. elongata* Courv. 1907 p. 33 + 1910 p. 142 + Iris 1912 p. 46—7.
b) *A. striata* Gillm. Int. E. Z. Gub. 1908 p. 178.
c) *A. extensa* Tutt 1910 p. 164.
34. F. (aberr.) *excessa* Gillm. l. c.
Synonyma: a) *multipuncta* BRebel. p. 70 (nec. Courv.)
b) *addenda* Tutt Ent. Recd 1910 p. 51.
c) *pluripuncta* Courv. Iris 1912 p. 59.
35. F. (aberr.) *melanotoxa* Pincitore-Marott Giorn. di Agricolt. 1873 p. 248—252 + Giorn. Sc. Nat. Palermo 1879 p. 341 — StdR. p. 85 — Ver. Entomologist 1904 p. 58 — Leonhardt Naturalista Sicil. 1905 (Sep.) — Seitz p. 313 — BRebel p. 70 — Courv. 1910 p. 141 — Tutt. 1910 p. 168 — Vorbrot p. 137 — Courv. Iris 1912 p. 49.
Synonyma: a) „*icarus*“ Freyer VII. 1858 p. 87.
b) *A. arcuata* Weymer Jahresber. natw. Ver. Elberfeld 1878 p. 55 — Rühl p. 761 — Courv. 1903. p. 11 — Leonhardt E. Z. Gub. 1904 p. 331 — Gillm. ib. p. 2 — Seitz p. 313 — BRebel p. 70 — Courv. 1910 p. 141 — Tutt. 1910 p. 168 — Vorbrot p. 137.
c) *A. regnieri* I André J. Natur. Macon 1901 p. 52 — Courv. 1910 p. 141 — BRebel p. 70 — Tutt 1910 p. 168.
d) *A. arcua* Favre Suppl. p. 4 — Wheeler p. 36.
Bilder: Petiver Brit. Bttfl. 1715 T. VI F. 2 ♂ — Freyer T. 651 F. 2. 3 ♂♀ — HSch. F. 362 U — Pincitore 1879.

- T. 3 F. 14 — André l. c. F. 1 (nec 2) — Verity Entomol.
1904 T. 4 F. 14 —
36. *F. polyphemus* Var. Esper I p. 388 T. 50 F. 3 ♀
— Schnd. p. 250 No. 156 — Leonhardt. Naturalista Sicil.
1905 No. 1 — Gillm. E. Z. Gub. 1905 p. 74 — Courv. 1907
p. 35 + 1910 p. 141 + Iris 1912 p. 49 — Tutt 1910 p. 168.
Synonym: Ab. semiarcuata Courv. 1903 p. 20 +
1907 p. 35 — Leonhardt l. c. No. 1 — Courv. 1910 p. 141
+ Lyc. Bas. p. 160 — Vorbrot p. 137.
37. *F. polyphemus* Esper 1 p. 387. T. 50 F. 2 ♀ —
Leonhardt l. c. — Gillm. E. Z. Gub. 1908 p. 178 — Seitz
p. 313 — BRebel p. 70 — Tutt. 1910 p. 168.
Synonyma: (nec melanotoxa Pinc. — nec arcuata Weym.
Ab. arcuata-retrojuncta Courv. Iris 1912 p. 51 T.
4 F. 14 ♀ + 1907 p. 36 T. 1 F. 14 ♀
38. *F. (aberr.) digitata* Courv. 1907 p. 36 + Iris
1912 p. 53.
39. *F. (aberr.) striata* Tutt 1896 p. 175 — Wheeler p.
36 — Gillm. E. Z. Gub. 1904 No. 1 — Seitz p. 313.
Synonym: radiata Obth. XX p. 23 — Agassiz p. 240
— Courv. 1903 p. 22 + 1907 p. 37 — Heinrich Berl. E.
Ztschr. 1910 p. 108 — Courv. 1910 p. 141 — BRebel p. 70
— Obth. 1910 p. 239 — Courv. Iris 1912 p. 53.
Bilder: JChr. Schäffer Icon. T. 255 F. 4. 5 ♀ U — New-
man p. 128, 2 Textfiguren — Obth. XX T. 4. F. 43. 44 ♀♀
— South. Brit. Bttfl. 1906 T. 118 F. 3 — Blachier Bull.
lég. Genève 1908 T. 9 F. 9 ♂ — Heinrich Berl. E. Ztschr.
1910 T. 1 F. 2 — Obth. 1910 T. 43 F. 321 ♂.
40. *F. (aberr.) candiope* Bgstr. II p. 78.
Synonyma: a) (Ab) iphis Meig. II. p. 25 (eigne Art?)
— MDür p. 80 — Ghd p. 15 No. 71 — Kirby p. 365 No.
210b — Rühl p. 760 — StdR. p. 85 No. 604 a — Wheeler p. 36
— Seitz p. 313 — BRebel p. 70 — Courv. 1910 p. 142 +
Lyc. Bas. p. 159 — Vorbrot p. 138 —
b) Ab. (basi-) unipuncta Courv. 1903. p. 24 + 1907 p.
74 + Iris 1912 p. 60.
Bilder: Petiver Brit. Bttfl 1715 T. VI F. 7 ♀ — Bgstr.
T. 48 F. 3 4 ♀ U — Meig. T. 47 F. 5 ab ♂ U — Ghd. T.
28 F. 1 a-c ♂ U ♀.
41. *F. (aberr.) icarinus* Scharfenberg (nec Scriba) Scriba's
Journ. 1791 p. 216 — Meig. II p. 25 — Kef. p. 310 No.
218 — Std. Cat. I p. 5 No. 133 a — Bienert. Diss. p. 29 —
Berce 1867 p. 140 — Kirby p. 365 No. 210 a — Std. Cat.
II p. 12 Vo. 160a — Std. Hor. Ross. 1879 p. 243 — Berge V. p.
22 — Frey p. 18 — Hofm. I p. 8 No. 22 — Rühl p. 268
+ 761 — Reutti p. 23 — Favre p. 19 — Stef. p. 51 —
StdR. p. 85 No. 604 a — Rgmt p. 21 — Wheeler p. 36 —
Leonhardt E. Z. Gub. 1904. p. 53 — Spuler p. 64 — Seitz
p. 313 — BRebel p. 70 — Courv. 1910 p. 142 + Lyc. Bas.
p. 159 — Tutt 1910 p. 158 — Vorbrot p. 138.
Synonyma: a) icarus Var. Esper Suppl. I p. 31 —
Berge I p. 86.
b) thersites. Cantener Hist. nat. d. Lép. Rhopal. 1834 p.
53-4 — (nec thersites Boisd. Gen. 1840 p. 10 No. 89 — nec

thersites Dup. Cat. p. 32 — nomina nuda!) — Ghd. p. 15 No. 72 — Std. Cat. I p. 5 No. 133 a — Berce 1867 p. 140 Std. Cat. II p. 12 No. 160 a — Kirby p. 365 No. 210 a — Rühl p. 268 — StdR. p. 85 — Seitz p. 313 — Tutt 1910 p. 158.

c) alexis Var. HSch. I p. 120 — Std. Cat. I p. 5 + II p. 12 — Kirby l. c — StdR. l. c — Tutt l. c.

d) alexius Freyer VII. 1858 p. 133 — Std. Cat I l. c + II l. c — Rühl p. 768 — StdR. p. 85 — Seitz p. 313 — Courv. 1910 p. 142 + Lyc. Bas. p. 159.

e) Ab. basi-impuncta Courv. Iris 1912 p. 60 — (Courv. 1903 p. 24. — 1907 p. 74)

Bilder: Petiver l. c. T. vi. F. 8 — Esper T. 55 F. 5 ♂ — Meig. T. 48 F. ab ♂ U — Cantener l. c. T. 11 F. 1. 2 ♂ U („thersites Boisd.“) — Berge I T. 28 F. 11 ♀ — HSch F. 246 U — Ghd. T. 28 F. 2 a-c ♂ U ♀ — Freyer T. 676 ♂ ♀ („alexius“) — Seitz T. 80 f. F. 8 U („icarus“!) [Chapman (Ent. Mo. Mag. 1912 p. 127—8; Trs. E. S. 1913 p. 152—162), sowie Warren (Ent. Recd 1913 p. 253—6) vermuten, dass manche Stücke von icarinus-thersites-alexius einer eigenen Art angehören, welche coridon u. thetis näher stünde, als icarus. Die Angelegenheit bedarf noch sehr der Klärung. Hier ist vorläufig darauf noch keine Rücksicht genommen.]

41. F. (aberr.) subtus-minus-punctata Obth. XX. p. 23. T. 4 F. 42 ♀ + 1910 p. 240 T. 43. F. 325 ♀.

Synonyma: a) F. persica (nec Bienert) Std. Cat. II p. 12. No. 160b („subtus punctis subnullis!“) — Auriv. Nord. Fjärl. 1888 p. 14 — Rühl p. 761 — Tutt 1896 p. 175 — Reutti p. 23 — Wheeler p. 36 — Seitz p. 312 — BRebel p. 70 — Tutt 1910 p. 156—7.

b) Ab. semipersica Tutt. 1896 p. 175 — Wheeler p. 36 — Seitz p. 312 — BRebel p. 70 — Gillm. Int. E. Z. Gub. 1910 No. 1.

c) Ab. obsoleta Clark Entomologist 1905 p. 261.

d) Ab. paucipuncta Courv. 1907 p. 74 + Iris 1912 p. 63.

e) Ab. vacua Gillm. Int. E. Z. Gub. 1910 p. 2 —

43. F. (aberr.) caeca Gillm. l. c — Tutt 1910 p. 157.

Synonym: Ab. impunctata Obth. 1910 p. 240 T. 43. F. 322. 326 ♂♂.

44. F. (aberr.) albo-ocellata Gillm. Soc. ent. 1904 p. 186 — BRebel p. 70.

Synonym: Ab. caeca Obth. 1910 p. 240. T. 43 F. 323 ♂ (Albino)

(ida Gr. Grsh. 1891

F. v. cleobis Brem.)

idas:

Linné Fauna svec. Ed. II 1761 p. 283 No. 1075 (angeblich ♀ von „argus“) — (Scopoli Carniol. p. 178?) — Müller F. Fridrichsdal. 1764 p. 36 No. 336 — L. Syst. Nat. Ed. XII. 1767 I. 2 p. 789 No. 232 („Argus β Idas Femina.“) — Schiff. p. 184 No. 14 („P. Argus L, Fem P. Idas L — Stechginsterfalter“) — Gmelin-Linné p. 2348 No. 232 („Argus β Idas“) — Borkh. I p. 152+274; II p. 224 — Hbst.

IX p. 232—8 — Prunn. p. 55 No. 103. — Ochs I. 2. p. 52
 No. 24 — Meig. II p. 29 No. 37 — Kef. p. 310 No. 223
 — Wall. p. 207 — P. Schulze Int. E. Z. Gub. 1913 p. 10—11
 — Ver. J. Linn. Soc. May 1913 p. 189 — Courv. Int. E.
 Z. Gub. 1913. p. 112—3 — Bethune-Baker Entom. Recd 1913.
 15. Oct. p. 252—3.

Synonyma: a) *argus*, „Auctorum“ (nec Linné!) Schiff. p. 184 No. 14 — Esper I p. 268—277 — Bgstr. III. p. 7—8
 — Schnd. p. 255 No. 153 — Borkh. I p. 152+274; II p. 224 — Prunn p. 54 No. 103 — Hbst. IX p. 232—8 — Syst. V. II p. 272 — Schrank p. 214 — Hübn. p. 50 — Ochs. I p. 52—3 No. 24 — Hübn. Verz. p. 69 No. 670 — Meisn. p. 88 — Latr. NDict p. 497 — God. Enc. p. 684 No. 212 + Hist. p. 215 — Meig. II p. 29 No. 37 — Schott p. 82 No. 108 — Lucas p. 33 — Boisd. Ind. p. 12 — Freyer II p. 121 — Berge I p. 87 No. 7 — HSch. I. p. 127 — Boisd. Gen. p. 11 No. 77 — Dup. p. 32 — Evs. Volg. p. 55 No. 26 — Berge II p. 156 No. 31 — Kef. p. 310 No. 223 — MDür p. 68—70 No. 39 — Ghd. p. 13 No. 54 — Gebr. Sp. p. 233 — MDür p. 68—70 No. 39 — Ghd. p. 13 No. 54 — Gebr. Sp. p. 233 — Hein. p. 84 No. 131 — Std. Cat. I p. 4 No. 106 — Wnbg I p. 202 — Berce 1867 p. 134 — Std. Cat. II p. 10 No. 133 — BergeV. p. 23 No. 29 — Frey p. 14 — Killias p. 17 — Berce 1884. p. 16 — Hofm. I p. 7 No. 7 — Gräser Berl. E. Ztschr. 1888 p. 76 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 372 No. 70 — Bramson p. 53 — Leech China II p. 302 — Hofm. II p. 8 No. 7 — Rühl p. 233+752 — Obth. XX p. 26—28 — Reutti p. 22 — Favre p. 15 — Rgmt. p. 20 — PImh. p. 25 — Obth. 1910 p. 172—202 — Courv. 1910 p. 66, 75 + 79, + E. Z. Gub. 1912 No. 31—38 + ib. 1913 No. 10, 17 — Tur. Bull. Ital. 1911 p. 248—252 — Vorbrodt p. 124—6 — Perlini 1912 p. 62.
 b) ♀ *acreon* Fabr. Mant. p. 76 No. 699 + Ent. syst. III. 1 p. 301 No. 140 — (vgl. Butl. Cat. Fabr. p. 171. No. 140) — Boisd. Ind. p. 12 — Kirby p. 358 No. 153.
 c) *amphion* Fabr. Ent. syst. III. 1 p. 301 No. 139 — Butl. ib. — Kirby ib.
 d) *calliopsis* Boisd. Icon. p. 58 (beide Geschlechter!) — Kirby p. 359 No. 153 c — Wall. p. 209. — Spgbg. p. 34. No. 8. — Obth. XX. p. 27—28 + 1910 p. 175 + 202 — Courv. 1910 p. 86 + E. Z. Gub. 1912 p. 286.
 e) (*Argus*) *vulgaris* Lamarck Anim. sans vertèbr. IV. 1817 p. 22 — Bertol. 1844 p. 35 No. 10.
 f) *argyrognomon* (Bergstr.) Kirby p. 358 No. 153 — Spgbg. p. 33—36 — Schöyen Ent. Tidskrift 1882 p. 33—62 — StdR. p. 78 No. 544 — Wheeler p. 43 — Spuler p. 61 No. 9 — Tutt Trs. E. S. 1909 p. XII—XVIII + III 1909 p. 167 — Seitz. p. 300—2 — BRebel p. 66 No. 160. — Obth. 1910 p. 172—179 — Courv. 1910 p. 66 etc. — Stichel Berl. E. Ztschr. 1911 p. 55—58 — Courv. Int. E. Z. Gub. 1912 No. 31. 32 — v. Linstow Iris 1913 p. 5—8 — Schulze Int. E. Z. Gub. 1913. p. 10. — Courv. ib. p. 63. 64 + 112—113.

Bilder: JChr. Schäffer Icon. T. 29 F. 3. 4 ♂ U — Esper T. 20 F. 3. 4 ♂♀ — Bgstr. T. 52 F. 1—4 ♂ U ♀ U — Hbst

T. 315. F. 1—3 ♂ U ♀ — Hübn. F. 316—8 ♂ ♀ U —
 God. Hist. T. 11 tert. ♂ U — Meig. T. 49 F. 2 a—d ♂ U
 ♀ U — Lucas T. 24 F. 8 ♂ — Berge I T. 29 F. 1 ab ♂ ♀
 — Ghd. T. 24 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Freyer T. 169 ♂ ♀
 — Berge II T. 33, F. 14 — Berce 1884 T. 3 F. 8. 9 ♂ U
 — Hofm. I T. 3 F. 25 — Hofm. II T. 5 F. 4 ab ♂ ♀ —
 Obth. XX T. 4. F. 52—58 — Spuler T. 16 F. 3 ab ♂ ♀ —
 Seitz T. 78 c F. 8 U — BRebel T. 14 F. 3 ab ♂ ♀ —
 Obth. 1910 T. 39—42 — Eckstein T. 15. F. 4 bc ♂ ♀.

Nebenformen: 1. F. lycidas Meig. II p. 32 No. 39 T. 49 F. 4 ab
 ♂ U — Ghd p. 13 No. 57 T. 24 F. 4 a—b ♂ U — Kef.
 p. 310. No. 223 — Kirby p. 359 No. 153 f.

2. F. ismenias Meig. II p. 33 No. 40 T. 49 F. 5 a—d ♂ U ♀ U — Ghd. p. 13 No. 56 T. 24 F. 3 a—d ♂ U ♀ U —

Kef. p. 310 N. 223 — Kirby p. 359 No. 153 g („ismenius“).
 3. F. lapponica Ghd. p. 19 No. 98. (irrtümlich „aegon Var.“) — Std.R. p. 78 No. 544 c — Seitz p. 301 — Tutt
 III. 1909 p. 208 — Courv. 1910 p. 82 + Int. E. Z. Gub.
 1912 p. 268.

Synonyma: a) F. argulus Frey. Mittl. schweiz. ent.
 Ges. 1882 No. 7 p. 350 etc. — (MDür p. 67) — Rühl p.
 235 + 752 — StdR. p. 78 No. 544 b — Favre p. 16 —
 Agassiz p. 239 — Wheeler p. 43 — Seitz p. 301 — BRebel
 p. 66 No. 160 — Courv. 1910 p. 82 + Int. E. Z. Gnb. 1912
 p. 268 — Vorbrot p. 125.

b) F. ganssuensis Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 450 —
 Rühl p. 234 — StdR. p. 78 No. 544 b — Seitz p. 301 —
 Courv. 1910 p. 82.

Bilder: Ghd T. 34 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Obth XX T. 4
 F. 58 U + 1910 T. 39. F. 263. 266 ♂♂; T. 40. F. 278 ♂.

4. F. alpina Berce 1867 p. 134 (nec argus Var!) —
 (Wheeler p. 42) — (Seitz p. 300) — (Tur. Ver. 1911 p. 253)
 — (BRebel p. 66) — (Tutt III p. 208) — (Obth. 1910 p.
 202) — Courv. 1910 p. 88 + Int. E. Z. Gub. 1912 p. 268.
 5. F. planorum. Alph. Hor. Ross. 1881 p. 379 — Rühl
 p. 234 + 752 — Std. Iris 1895 p. 345. — StdR. p. 78 —
 Seitz p. 301 T. 78 c. F. 3 ♂ — Wagner Ent. Mittl. 1913
 p. 250.

6. F. aegina. Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 451 (syn:
 planorum Alph?) — Leech China II p. 303 T. 31 F. 11 ♂
 — StdR. p. 78 — Seitz p. 301. T. 78. e F. 4 ♂ — Obth.
 T. 41 F. 301 ♀.

Synonym: F. regina Rühl p. 233 (eigne Art).

7. F. argiva Std. Stett. E. Z. 1886 p. 204 — Gr. Grsh.
 Mem. Rom. 1890 p. 372—4 — Rühl p. 236 (eigne Art) —
 StdR. p. 78 No. 544 g — Seitz p. 301.

Synonyma: a) F. bracteata Butl. Pr. Z. S. 1880 p.
 407 — Nic. III p. 78 — StdR p. 78 — Seitz p. 301.

b) F. roxane Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 372 — Rühl
 p. 235 (eigne Art!) — StdR l. c. — Seitz l. c.

c) F. bactriana Gr. Grsh. ib. p. 374 — Rühl p. 236 —
 StdR. l. c. — Seitz l. c.

d) F. calmucca Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 450 — Rühl
 p. 234 („calmuca“) — StdR. l. c. — Seitz l. c.

Bilder: Butl. I. c. T. 39 F. 4 ♂ (bracteata) — Gr. Grsh. I. c. T. 7 F. 3 ab ♂♀ (roxane) — Seitz T. 78 e. F. 5 ♂ (argiva).

8. F. dschagatai Gr. Grsh. Mem. Rom. 1887 p. 400 + ib. 1890 p. 370—2 (eigne Art) — Rühl p. 235 — StdR. p. 78 No. 544 d (angeblich syn.: planorum) — Seitz p. 301 — Courv. 1910 p. 81.

9. F. insularis Leech China II p. 302 — Obth. 1910 p. 202.

Synonym: argus L. Var. (false!) Seitz p. 300.

Bilder: Leech I. c. T. 31 F. 8 ♂ 5 ♀ — Seitz T. 78 d F. 2. 3 ♂♀ — Obth. 1910 T. 42 F. 305. 306 ♂♀.

10. F. mongolica (Gr. Grsh.) Rühl p. 235.

11. F. transcaucasica Rebel. Ann. Wien 1901 p. 166.

12. F. ligurica Courv. 1910 p. 81 + Iris 1911 p. 103 T. 2 F. 1 ♂. (nec Obth. 1910 T. 41 F. 291—297) — Vorbrot p. 124.

13. F. nivea Courv. 1910 p. 88 + Iris 1911 p. 103 T. 2 F. ♂ — Vorbrot p. 126.

14. F. armoricana Obth. 1910 p. 189 T. 40 F. 275—6 ♂♀.

15. F. bellieri Obth. 1910 p. 191 T. 40 F. 280—1 ♂♀.

16. F. nevadensis Obth. 1910 p. 191 T. 39 F. 259—260 ♂♀ — Obth. XX T. 4 F. 54 ♂.

17. F. argellus Tur. Soc. ent. 1911 p. 67.

Synonym: abetonica Ver. Bull. Ital 1911 p. 266.

18. F. croatica Grund Int. E. Z. Gub. 1913 No. 19.

19. F. F. naruena Courv. (1910 p. 88) + Ent. Mittl. 1913 No. 10.

20. F. ♀ brunnea Spuler p. 61 — Wheeler p. 44 — Gillm. E. Z. Gub. 1907 p. 84 — BRebel p. 66 No. 160 — Cat. lép. Genève p. 28 — Courv. 1910 p. 82 — Vorbrot p. 125 — Galv. Preiss. 1911 p. 136.

21. F. ♀ lutea (albino) Caradja Iris 1893 p. 174 — Gillm. E. Z. Gub. 1907 p. 83 — (Millière Icon. T. 73. F. 4. 5 ♀ U.)

22. F. ♀ albomarginata Ebert Festschr. Ver. Nat. Kde Cassel 1911 p. 315 T. 5 F. 3 ♀.

Bläue ♀ Formen:

23. F. argyrogonomon Bgstr. II p. 76 (für ♂ erklärt!) — Borkh. I p. 152 — Ochs. I. 2 p. 53 — Meig. II p. 30 — Std. Cat. I p. 4 No. 106d — Std. Cat. II p. 10 No. 133a — Frey p. 15 — Rühl p. 324 — Reutti p. 22 — StdR. p. 78 No. 544a — Courv. 1910 p. 81.

24. F. argyrocapelus Bgstr. II p. 76

25. F. argyroela Bgstr. ib.

26. F. argyrocopus Bgstr. ib. p. 77

27. F. argyrophylax Bgstr. III p. 13

28. F. calliopsis Var. Boisd. Icon. p. 58—9 + Genera p. 11 No. 77 — Dup. Cat. p. 32 — Berce 1867 p. 134 — Kef. p. 310 No. 224 — Std. Cat. I p. 4 No. 106 c — Std. Cat.

Borkh. I p. 152—3 —

Ochs I. 2. p. 53 —

Meig. II p. 30—1 —

Kirby p. 358 No. 153 —

Courv. 1910 p. 81.

- II p. 10 No. 133 a — Kirby p. 359 No. 153 c — Rühl p. 234 — StdR. p. 78 No. 544 c —
 29. F. caeruleascens Gr. Grsh. Hor. Ross. 1893 p. 127 —
 — StdRebel p. 78.
 30. F. callarga StdR p. 78 No. 544 a — Seitz p. 301 —
 BRebel p. 66 — Obth. 1910 p. 175 — Courv. Int. E. Z. Gub. 1912 p. 268 — Vorbrot p. 124 — Galv. Preiss. p. 136.
 31. F. unicolora Favre Suppl. p. 3 — Wheeler p. 44 („unicolor“) — Seitz p. 301 — Courv. 1910 p. 82 — Vorbrot p. 125.
 32. F. valesiaca Obth. 1904 p. 19—21 — Courv. 1910 p. 81 — Vorbrot p. 124.
 33. F. astragaliphaga (Courv.) Vorbrot p. 125 (Courv. 1910 p. 82).
 Bilder v. ♀ blauen Formen: Petiver Brit. Bttfl. 1715 T. VI F. 6 — Bgstr. T. 46 F. 1—8; T. 56. F. 3. 4 — God. Hist. T. 11 F. 1 — Boisd. Icon. T. 15 F. 4. 5 — Freyer T. 169 — Ghd T. 24 F. 1 c — Berge II T. 33 F. 14 — Obth. 1904 T. 2 F. 15. 16 — Seitz T. 78 e F. 2 („callarge“) — Obth. 1910 T. 39 F. 265; T. 41 F. 295; T. 42 F. 308. 320.
 34. F. (aberr.) costojuncta Courv. 1907 p. 50.
 35. F. (aberr.) retrojuncta Courv. ib.
 36. F. (aberr.) limbojuncta Courv. ib. p. 51.
 37. F. (aberr.) subtus-radiata Obth. XX T. 4 F. 53 U — Courv. 1910 p. 89 + Iris 1912 p. 55.
 Synonym: argus Var. HSch F. 247 — Ghd T. 38. F. 5 (Kopie nach HSch.) — Krodel Allg. Ztschr. f. Ent. 1904 F. 21 (ebenso) — Fallou Ann. France 1871 p. 101 No. 8.
 38. F. (aberr.) maracandica Ersch. Lep. Turkest. 1874 p. 10 — Rühl p. 234 + 752 — StdR. p. 78 No. 544f — Seitz p. 301.
 Synonym: Ab. paucipuncta Courv. 1910 p. 82 + Iris 1912 p. 63.
 39. F. (aberr.) tomyris Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 377 T. 7 F. 5 ♀ — StdR. p. 78 No. 544b — Seitz p. 301 — Courv. 1910 p. 89.
 Synonym: Ab. caeca Courv. 1910 p. 89 + Iris 1912 p. 63 — Vorbrot p. 126.

(idas Ramb. 1839 nom. praeoccup. = ramburi Ver. 1913)

jolas:

- Ochs. IV. 1816 p. 144 — God. Enc. 1821 p. 700 No. 239 — Boisd. Ind. p. 13 — Meig II p. 5 No. 5 — Freyer Btr. 1830. III p. 59 — Boisd. Icon. p. 83 — God.-Dup. Suppl. p. 46 — Lucas p. 40 — Treitschke X p. 58—60 — Boisd. Gen. p. 13 No. 112 — HSch. I. p. 117 — Dup. Cat. p. 31 — Berge II p. 153 No. 9 — Kef. p. 307 No. 202 — Ghd p. 19 No. 97 — Gebr. Sp. p. 243 — Hein. p. 74 No. 107 — Std. Cat. I p. 6 No. 161 — Berce 1867 p. 148 — Std. Cat. II p. 14 No. 185 — Kirby p. 374 No. 270 — Jenner p. 294 — Berge V p. 20 No. 5 — Frey p. 22 — Hofm. I p. 9 No. 41 — Bramson p. 45 — Rühl p. 303 + 768 — Hofm. II p. 11 No. 41 — Favre p. 24 — Stef. p. 56 — StdR. p. 88 No. 630 — Wheeler p. 22 — Spuler p. 67

No. 39 — Seitz p. 318 — BRebel p. 73 No. 182 — Obth.
1910 p. 320—1 — Vorbrodt p. 150—1.

Synonyma: a) argiades Fabr. Mant. II p. 76 No. 698
(nom. praeoccup.) + Ent. syst. III. 1 p. 300 No. 138 —
teste: Butl. Cat. Fabr. 1869 p. 169.
b) cyllarus Hbst. IX p. 172—4.
c) jolaus Hübn. T. 178 —

Bilder: Meig. T. 43 F. 5a—c ♂ U ♀ — Freyer T. 110 F. 2.
3 ♂♀ — Boisd. Icon. T. 11 F. 1—3 ♂♀ U — God. Dup.
Suppl. T. 7 F. 1—3 ♂♀ U — Lucas T. 26 F. 7 ♂ — Hübn.
G. F. 879—882 ♂ U ♀ U — Berge V. T. 32. F. 25 ♂ —
Ghd T. 34 F. 2a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F. 19 ♂ —
Hofm. II T. 6 F. 13 ab ♂♀ — Spuler T. 17 F. 12 ab ♂♀ —
— Seitz T. 82 c F. 1 ♂, b F. 6 ♀ —

Nebenform: F. powelli Obth. Bull. Soc. Ent. France 1911
p. 268 + Lép. comp. 1910 T. 126 F. 1120 ♂.

(iphicles Std. 1886	= gigantea Gr. Grsh. 1885)
(iphidamon Std. 1899	
(iphigenia HSch. 1847	Formen v. damone Evans.)
(iphigenia Alph. 1881	
(iphigenides Std. 1886	
(iphis Meig. 1830	Aberr. v. icarus Rott.)

iris: Std. Stett. E. Z. 1886 p. 207 — Gr. Grsh. Mem. Rom.
1890 p. 378 T. 7 F. 8 ab ♂♀ — Rühl p. 240 + 753 —
StdR. p. 80 No. 566 — Bingham p. 388 F. 80 ab ♂ U
(im Text) — Seitz p. 305 T. 79 b F. 8 ♂.

isaurica: Std. Berl. E. Ztschr. 1870 p. 327 — Rühl p. 262 —
StdR. p. 85 No. 609 — Nicholl-Elwes Trs. E. S. 1901 p. 92
— Seitz p. 314 T. 80 i F. 2 ♂.

Nebenform: F. latimargo Courv. Ent. Mittl. 1913 No. 10.

(ismenias Meig. 1830	F. v. idas L.)
(kashgarensis Mre 1878	v. v. icarus Rott.)
(kenteana Std. 1892	F. v. cleobis Brem.)
(kindermanni Led. 1852	F. v. damone Evans.)

kogistana: Gr. Grsh. Hor. Ross. 1888 p. 306 + Mem. Rom. 1890
p. 406 T. 8 F. 6 ab ♂♀ — Rühl p. 272 + 762 — StdR.
p. 83 No. 591 — Seitz p. 309.

(krodeli Gillm. 1899	Aberr. v. bellargus Rott.)
(lama Gr. Grsh. 1891	F. v. venus Std.)

lamasem: Obth. 1910 p. 21 T. 41 F. 303 ♂.

lanty: Obth. Etud. XI. 1887 p. 21 T. 7 F. 35 ♂ — Alph.
Mem. Rom. 1889 p. 108 — Leech China II p. 310 — Rühl
p. 755 — StdR. p. 81 No. 576 (false: „lantyi“) — Seitz p.
306 T. 79 f. F. 1. 2 ♂ U.

(lapponica Ghd 1853	F. v. idas L.)
(lefebvrei God. 1821	= dolus Hübn. 1905)
(lehana Mre 1878	F. v. orbitulus Prunn.)

(leodorus Esper 1781 F. v. argus L.)
 (leodorus Ghd. 1853 nom. praeocc. Aberr. v. argus L.)

loewii: Zeller Isis 1847 p. 9 — HSch. VI. p. 31. T. 91 — Std. Cat. I p. 5 No. 110 — Std. Cat. II p. 10 No. 139 — Kirby p. 360 No. 163 — Christoph Hor. Ross. 1874 p. 22 — Calberla Iris 1891 p. 40 — Nic. Ind. III p. 79 — Rühl p. 244 + 754 — Nicholl-Elwes Trs. E. S. 1901 p. 92 — StdR. p. 79 No. 554 — Bingham p. 343—4 — Seitz p. 303.

Synonyma: a) loewi Led. Wien. E. Mon. 1857 p. 29.
 b) loevii Bramson p. 54.
 c) empyrea Freyer VI. p. 147 — Ghd p. 11 No. 27 — Std. Cat. II p. 10 No. 139 — Kirby p. 360 No. 163 — Rühl p. 244 — StdR. p. 79 — Seitz p. 303.

Bilder: HSch. F. 434—7 ♂ U ♀ U — Freyer T. 573 F. 1 ♂ — Ghd T. 17 F. 2 a—c ♂ U ♀ — Nic. l. c. T. 26 F. 167 ♂ — Seitz T. 78 i F. 5—7 ♂ U ♀.

Nebenformen: 1. F. gigas Std. Cat. II p. 10 No. 139 a — Rühl p. 244 — StdR. p. 79. No. 554 a — Seitz p. 303 T. 78 i F. 8 U; k F. 1 ♂.
 2. F. chamanica Mre JASB 1884. II p. 23 — Swinhoe Trs. E. S. 1885 p. 340 No. 17 — Nic. l. c. p. 79 — Bingham. p. 343.

(lucia Culot 1905 F. v. icarus Rott.)

lucifera: Std. Stett. E. Z. 1867 p. 100 + ib. 1874 p. 87 + Mem. Rom. 1892 p. 163 + Iris 1892 p. 316 — Rühl p. 241 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 324 — StdR. p. 79 No. 549 — Seitz p. 302.

Synonyma: a) biton Brem. Bull. Nat. Mosc. 1861 p. 472 (nom. praeocc.) + Mem. Ac. Petsbg 1864 p. 30 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 890 —
 b) subsolanus Std. Cat. II p. 10 No. 137 (nec Evsm.) — Std. Iris 1892 p. 316.
 c) themis Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 451 — Rühl p. 242 (eigne Art) — Seitz p. 302.

Bilder: Brem. Mem. Ptsbg 1864 T. 3 F. 9 ♂ — Std. Iris 1892 T. 3 F. 1 ♂ — Seitz T. 78 g F. 7. 8. U ♂.

(lucretia Gaschet 1877	Aberr. v. coridon Poda)
(lycaonius Schultz 1904	Aberr. v. arcas Rott.)
(lycidas Meig. 1830	F. v. idas L.)
(lycidas Trapp 1863	F. v. sephyrus Friv.)

lycormas: Butl. Pr. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 57 No. 26 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 890 — Std. Mem. Rom. 1892 p. 164 — Leech China. II p. 311 — Rühl p. 296 + 767 — Elwes Trs. E. S. 1899. p. 327 — Herz Iris 1898 p. 238 — StdR. p. 88 No. 631 — Seitz p. 318.

Synonym: scylla Obth. Etud. 1880 p. 22 — Std. Mem. Rom. 1887 p. 139 — Rühl p. 296 — Seitz p. 318.

Bilder: Std. Mem. Rom. 1887 T. 16 F. 7 ♂ — Seitz T. 82 c F. 2 ♂.

Nebenform: *F. ledieri* Bang-Haas Iris 1907 p. 69.

(lydia Krul. 1892	<i>F. v. amandus</i> Schnd.)
(magnifica Gr. Grsh. 1887 (Mai)	= <i>superba</i> Std. 1887 Febr.)
(magnifica Heydemann 1910	<i>F. v. arion</i> L.)
(maloyensis Rühl 1893	Aberr. <i>v. orbitulus</i> Prunn.)
(mainers Bgstr. 1779	Aberr. <i>v. arion</i> L.)
(mandschurica Std. 1892	= <i>chinensis</i> Murray 1874)
(maracandica Ersch. 1874	Aberr. <i>v. idas</i> L.)
(marchandii Boisd. 1834	Aberr. <i>v. melanops</i> Boisd.)

marcida: Led. Hor. Ross 1872 p. 10 T. 1 F. 8 ♂ — Rühl p. 279
— StdR. p. 86 No. 615 — Seitz p. 310.

martinii: Allard Ann. France 1867 p. 14 — Kirby Cat. 1871
p. 372 No. 254 — Obth. Et. I 1876 p. 23 — Rühl p. 246
+ 754 — StdR. p. 79 No. 556 — Seitz p. 303 — Obth. 1910
p. 220—5.

Synonyma: ? *zephyrus* (Friv.) Std. Cat. II p. 10 No. 140 b
(„an synonym. tantum?“)

zephyrus Var. b. Kirby Cat. 1877 p. 766.

Bilder: Allard. l. c. T. 6 F. 2 ab ♀ — Obth. 1876 T. 1 F. 1 ♂
— Seitz T. 78 k F. 3. 4 ♂ U.

medon: Esper I p. 330 — Schnd. p. 247 No. 449 — Borkh. I p.
163 + 279 — Hbst. IX p. 217—9 — Berge I p. 88 No. 12
— Courv. 1910 p. 112 — Vorbrodt p. 133 — Perlini 1912
p. 65.

Synonyma: a) *medon* Hufnagel Berl. Mag. II. 1766 p. 78
No. 41 (nomen nudum) — Std. Cat. I. p. 5 No. 126 —
Berce 1867 p. 138 — BergeV. p. 23 — de Nic. Ind. III p. 69.
b) *medon* Herbst - Berge II p. 155 No. 26.

c) *alexis* Scop. Ent. carniol. 1763. p. 179. Var. 1 — Rott.
Natt. VI. 1775 p. 10 No. 41 — Syst. V. II p. 271 — Hein.
p. 82 No. 126 — Kirby p. 363 No. 202 — Spgbg. p. 12 No.
4 — Kirby Lloyds Nat. Hist. p. 99.

d) *agestis* Schiff. p. 184 No. 13 — Lang 1789 p. 54 No.
439 — Jung 1791 p. 14 — Syst. V. II p. 271 — Schrank
p. 214 — Hübn. 1805 p. 49 No. 20 — Ochs. I. 2 p. 44 No.
20 — Hübn. Verz. p. 68 No. 665 — Meisn. p. 87 — Latr.
NDict. p. 496 — God. Enc. p. 689 No. 220 + Hist. p. 213
— Boisd. Ind. p. 12 — Meig. II p. 27 — Schott p. 80 No.
104 — Lucas p. 35 — Freyer III p. 61 — HSch. I p. 124 —
de Selys 1844 p. 4 — Boisd. Gen. p. 11 No. 82 — Dup. Cat.
p. 32 — Bertol. p. 35 — Wood. Ind 1839. p. 9 No. 72 —
MDür p. 71 No. 42 — Ghd. p. 15 No. 62 — Kef. p. 309
No. 215 — Wall. p. 213 — Gebr. Sp. p. 234 — Westwd. p.
116—7 — Stainton p. 119—120 — Frey p. 17 — Killias p.
19 — Berce 1884 p. 17 — Obth. XX p. 25 — Rgmt. p. 21
— Obth. 1910 p. 244—254.

e) *astrarche* Bgstr. III 1779 p. 4 — Std. Cat. II p. 11
No. 155 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 889 — Hofm. I p. 8
No. 18 — Bramson p. 55 — Rühl p. 260+758 — Caflisch
p. 8 — Hofm. II. p. 9 No. 18 — Reutti p. 23 — Horm.
Vhdl. z. bot. Wien. 1897 p. 14 — Favre p. 18 — Elwes Trs.

E. S. 1899 p. 326 — Stef. p. 49 — StdR. p. 83 No. 589 — Wheeler p. 38 — Spuler p. 63 No. 23 — Seitz p. 309 — PImh. p. 26 — BRebel p. 68 No. 167 — Tutt III. p. 142 etc.

Bilder: Petiver Brit. Bttfl. 1715. T. VI F. 7. 9. 10 + Gazophyl. Nat. 1769 T. 35. F. 4 („Papiliunculus fuscus marginibus aureis“) — Esper T. 32 F. 1 ♀; T. 55. F. 7 ♀ — Engr. T. 38 F. 80 cdef ♂ U ♀ U („Argus brun“) — Bgstr. T. 49. F. 7. 8 ♂ U — Hübn. F. 303—6 ♂ U ♀ U — Hbst. T. 313 F. 4 — 7 ♂ ♀ U — God. Hist. T. 10. F. 4 ♂; T. 11 tert. F. 3 ♀ — Meig. T. 48. F. 4 ab ♂ U — Lucas T. 25 F. 3 — Labram T. XCVII ♂ ♀ U — Freyer T. 235 ♂ — Ghd T. 26 F. 1 a—c ♂ U ♀ — BergeV. T. 14 F. 9 — Berce 1884 T. 3 F. 15. 16 ♂ U — Hofm. I. T. 3 F. 32 ab ♂ ♀ — Hofm. II T. 5 F. 15 ab ♂ ♀ — Spuler T. 16 F. 15 ab ♂ ♀ — Seitz T. 79. k. F. 5—7 ♂ U ♀ — BRebel T. 14. F. 8 ♂ — Eckstein T. 15 F. 7 b ♀.

Nebenformen: 1. F. artaxerxes Fabr. Ent. syst. 1793 III. 1. p. 279 No. 129 — Lewin Ins. Brit. 1795. T. 39 — Hbst IX p. 244 — Ochs II p. 57 — God. Enc. p. 688 No. 219 — Boisd. Index p. 12 + Icon. p. 60 — Wood. Index p. 9 No. 74 — Treitschke X. p. 70 — Freyer NBtr. III p. 62 — Boisd. Gen. p. 11 No. 81 — Dup. Cat. p. 32 — Ghd. p. 15 No. 60 — Std. Cat. I p. 5. No. 126 b — Stainton p. 120 — Westwd. p. 118—9 — Zeller Stett. E. Z. 1868 p. 401—5 — Newman p. 123 — Kirby p. 364 No. 202a — Berge V. p. 23. No. 23 — Hofm. I p. 8 — Rühl p. 261 + 759 — StdRebel p. 83 No. 589 g — Harrison Bull. Lép. Genève 1905 p. 30—2 — Spuler p. 63 No. 23 — Seitz p. 309 — BRebel p. 68 No. 167 — Obth. 1910 p. 245—8.

Synonym: F. quadrripunctata Tutt. Brit. Bttfl. 1896 p. 180 — Spuler p. 63.

Bilder: Lewin l. c. T. 39. F. 8. 9 ♂ ♀ — Hbst T. 315. F. 7. 8 ♂ U — H. Geyer F. 951—4 ♂ U ♀ U — Boisd. Icon. T. 14 F. 7. 8 ♂ U + Spec. T. 7 F. 7. 8 ♂ U — God. Dup. T. 9 F. 3. 4. U ♂ — Freyer T. 235. F. 4 ♂ — Ghd T. 25. F. 3a—c ♂ U ♀ — Newman p. 123 (Textfigur) — Kirby Lloyd T. 48. F. 6. 7 ♂ U — Seitz T. 80a F. 4 ♂. 2. F. eumedes Meisn. Nat. Anz. 1818 p. 87 (angeblich eigne Art!) — MDür p. 73.

3. F. allouus Hübner-Geyer 1819. F. 990 — Boisd. Gen. p. 11 No. 82 — Dup. Cat. p. 32 — Std. Cat. I p. 5. No. 126a — MDür p. 73 — Kef. p. 309 No. 215 — Std. Cat. II p. 11 No. 155a — Killias p. 20 — Alph. Hor. Ross. 1881 p. 53 — Std Mem. Rom. 1892 p. 160 — Rühl p. 261 + 758 — Caflisch p. 8 — Reutti p. 23 — Favre p. 18 — Agassiz p. 240 — StdR. p. 83 No. 589a — Wheeler p. 38 — Rgmt p. 21 — Spuler p. 63 — Seitz p. 309 — BRebel p. 68 — Obth. 1910 p. 250 — Courv. 1910 p. 126 — Vorbrodt p. 134 — Tur. Ver. 1911 p. 254 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 251.

Synonym: a) idas Ramb. Var. HSch. I. p. 124.

b) F. alpina Std. Hor. Ross. 1868. VII p. 52 — Rühl p. 262 — Wheeler p. 38.

4. *F. c r a m e r a*. Eschscholtz Kotzebue's Reise 1821. III p. 217. T. 10 F. 26 a b ♂♀ — Rühl p. 262 — StdRebel p. 83 No 589c — Seitz p. 309 T. 80a F. 2 ♀ — Courv. 1910 p. 126 — Obth. 1910 p. 253 — Vorbrot p. 134.

Synonym: *F. c a n a r i e n s i s* Blachier Ann. France 1889 p. 258 T. 4 F. 7. 8 ♂♀ — Rebel Ann. Wien. 1894 p. 31.

5. *F. salmacis* (*transitus ad artaxerxem!*) Stephens Ill. Brit. Ent. 1828. I p. 235 — Wood Index p. 9 No. 73 — Westwood Humphrey Brit. Bttfl. 1841 p. 115 — Std. Cat. I p. 5 No. 126 c — Westwood 1860 p. 117—8 — Zeller Stett. E. Z. 1868 p. 401 — Kirby p. 364 No. 202a — Newman p. 126 — Std. Cat. II. p. 11. No. 155 c — Rühl p. 261 + 759 — StdR. p. 83 No. 589f — Spuler p. 63 No. 23 — Seitz p. 309 — Obth. 1910 p. 250.

Synonyma: a) *salmucis* Ghd. p. 15 No. 61.
b) *albiannulata* Harrison Ent. Record XVIII p. 296 — BRebel p. 68.

Bilder: Westwd Hphrey l. c. T. 37 F. 1—3 — Ghd T. 25. F. 4a—c ♂ U ♀ — Newman p. 126 (Textfigur) — Kirby Lloyd T. 48. F. 4. 5 ♂ U + Allen's Nat. Libr. Bttfl. II. 1896. T. 48. F. 3—5. ♂♀ U.

6. *F. calida* Bellier Ann. France 1862 p. 615 — Kirby p. 364 No. 202b — Rühl p. 262 — StdR. p. 83. No. 589b — Wheeler p. 38 — Spuler p. 63 No. 23 — Seitz p. 309 — BRebel p. 68 — Courv. Lyc. Bas. p. 159 + E. Z. Stuttg. 1910 p. 126 — Obth. 1910 p. 252 — Vorbrot p. 134 — Perlini 1912 p. 65.

Synonyma: a) *F. allouus* Ghd. p. 15 No. 63.
b) *F. aestiva* Std. Cat. II. 1871 p. 11 No. 155 b — (MDür p. 73) — (Frey p. 17) — Rühl p. 261 + 759 — Caflisch p. 9 — Reutti p. 23 — Favre p. 18 — Stef. p. 49 — StdR. p. 83 No. 589 b — PImh. p. 26 — Seitz p. 309 — Obth. 1910 p. 252 — Courv. 1910 p. 126 — Vorbrot p. 134.

c) *F. gallica*. Obth. Lép. compar. 1910 p. 252.
Bilder: Esper T. 32. F. 1 ♀; T. 55. F. 7 ♂ — Engr. T. 38 F. c e ♂♀ — Ghd T. 26 F. 2 ♀ — Bellier T. 14 F. 6 ♂ — Seitz T. 79 k F. 8 U; T. 8 a F. 1 ♀.

7. *F. nazira*. Moore Pr. Z. S. 1865. p. 504 T. 31 F. 4 ♂ + Pr. Z. S. 1882 p. 246 — Kirby p. 364 No. 204 — Nic. Ind. III p. 69 — StdR. p. 83 No. 589 — Bingham p. 337 — Seitz p. 309.

8. *F. albicans* Auriv. Nord. Fjärl. 1888 p. 13 — Freyer T. 235 F. 1 ♂ — StdR. p. 83 — Seitz p. 309 — BRebel p. 68 — Courv. 1910 p. 126.

Synonyma: a) *F. sarmatis* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 393 — Rühl p. 262+759 — StdR. p. 83 No. 589 d — Spuler p. 63 („sarmates“) — Seitz p. 309 — Courv. 1910 p. 126 — Stichel Ztschr. wiss. Biol. 1911 p. 112.

b) *F. ornata* Std. Iris 1892 p. 280 — Rühl p. 262 — Rebel Ann. Wien. 1894 p. 31 (false = canariensis!) — StdR. p. 83 No. 589 e — Seitz p. 309 T. 80 a F. 3 ♀ — Obth. 1910 p. 252 — Courv. 1910 p. 126.

9. *F. montana* Rühl p. 759 — Seitz p. 309.
 Synonym: *F. nevadensis* Obth. 1910 p. 250.
 10. *F. (aberr.) caeca* Blachier Bull. lèp. Genève 1910 T.
 1 F. 13 ♂ — Courv. Iris 1912 p. 63.

(*melandia* Std. 1886 }
 (*melandia* Gr. Grsh. 1890 } Formen von *damone* Evans.)

melanops: Boisd. Index 1829 p. 13 + Icon. p. 75 — Freyer 1830. III p. 5 — God. Dup. Suppl. p. 50 — Meig. III p. 266 No. 10 — HSch. I p. 115 — Ghd. p. 9 No. 17 — Kef. p. 307 No. 195 — Std. Cat. I p. 6 No. 159 — Berce 1867 p. 148 — Std. Cat. II p. 14 No. 183 — Kirby p. 373 No. 268 — BergeV. p. 20 — Hofm. I p. 9 No. 20 — Elwes Trs. E. S. 1887 p. 393 — Rühl p. 301 + 768 — Obth. XX p. 16 — Hofm. II p. 11. No. 40 — StdR. p. 89 No. 639 — Wheeler p. 27 — Spuler p. 68 No. 46 — Seitz p. 320 — BRebel p. 74 No. 187 — Obth. 1910 p. 314—320.

Synonym: *saportae* Hübn. Geyer T. 188 — Std. Cat. I p. 6 No. 159 + Cat. II p. 14 No. 183 — Kirby p. 373 No. 268 — Rühl p. 301 — StdR. p. 89 No. 639 — Seitz p. 320.

Bilder: Boisd. Icon. T. 17 F. 4—6 ♂♀ U — Freyer Btr. III T. 97 F. 1. 2 ♂♀ — Hübn G. F. 922—5 ♂ U ♀ U — God. Dup. Suppl. T. 8 F. 4. 5 ♂♀ — Meig. T. 125. F. 4 a—c ♂♀ U — Ghd T. 14 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Millière Icon. III T. 108 F. 4 ♂ — Hofm. II T. 6 F. 12 a b ♂♀ — Spuler T. 17 F. 17 a b ♂♀ — Seitz T. 82 h F. 1—3 ♂♀ U.

Nebenformen: 1. *F. algirica* Rühl p. 768 — StdR. p. 89 No. 639 („non differt“) — Seitz p. 320.

2. *F. (aberr.) marchandi* Boisd. Rev. Ent. Silberm. II. 1834 p. 121 T. 27 F. 1. 2 ♂ U + Gen. p. 13 No. 110 — Dup. Cat. p. 31 — Kef. p. 307 No. 195 — Std. Cat. I p. 6 No. 159 a + Cat. II p. 14 No. 183 a („subt. ocell. nullis“) — Kirby p. 373 No. 268a — StdR. p. 89 No. 639a — Seitz p. 320.

Synonym: (*A. b. caeca* Courv. Iris 1912 p. 62—3)

3. *F. (aberr.) subtus-partim-im punctata* Obth. XX T. 3 F. 34. 35 ♂♂.

Synonyma: a) *marchandi* Hübn. Geyer F. 996—7 (false!) — Rühl p. 302 + 768.

b) *A. b. paucipuncta* Courv. Iris 1912 p. 63.

4. *F. (aberr.) subtus-radiata* Obth. XX T. 3 F. 36 ♂

Synonyma: a) *V. r. Marchandii* Ghd. p. 9 No. 18

T. 15. F 1 ab U U (false!)

b) *F. elongata* Courv. 1907 p. 34 — Seitz p. 320.

(*melanotoxa* Pincit. 1873

Aberr. v. *icarus* Rott.)

meleager: Esper I p. 375 + Suppl. I. 1779 p. 67 — Engr. I. p. 172 („argus bleu découpé“) — Bgstr. III p. 11 — Jung 1782 No. 88 — Schnd. p. 265 No. 164 — Fabr. Mant. II p. 71 No. 679 — Borkh. I. p. 171 + 282; II p. 234 — Fabr. Ent. syst. III. 1 p. 292 No. 116 — Prunn. p. 59 No. 115 — Hbst. IX p. 186—9 — Latr. NDict. p. 493 — God. Enc. p.

694 No. 228 — Boisd. Ind. p. 12 — Lucas p. 87 — Boisd. Gen. p. 12 No. 97. — Dup. Cat. p. 31 — Ghd. p. 19 No. 95 — MDür p. 87 No. 50 — Std. Cat. II p. 12 No. 168 — Jenner p. 293 — Killias p. 20 — Hofm. I p. 9 — Brämon p. 41 — Caflisch p. 9 — Rühl p. 281 + 763 — Hofm. II p. 10 No. 29 — Stef. p. 54 — Nicholl-Elwes Trs. E. S. 1901 p. 94 — Std.R. p. 86 No. 611 — Wheeler p. 80—1 — Spuler p. 65 No. 31 — Seitz p. 314 — Obth. 1910 p. 265—6 — BRebel p. 71 No. 176 — Vorbrot p. 142 — Tur. Valder p. 257 — Perlini 1912 p. 68.

Synonyma: a) *daphnis* (σ) Schiff. p. 182 No. 2 („zackichter blankblauer Falter“) — Bgstr. III p. 15 — Lang 1782 p. 46. No. 397 — Borkh. I p. 171 + 282 — Syst. V. II p. 263 — Hübn. p. 46 — Ochs I. 2 p. 26 No. 12 — Hübn. Verz. p. 68 Nr. 654 — Meisn. p. 87 — Meig. II p. 11 No. 14 — Schott p. 77 No. 97 — Treitschke X. p. 66—7 — HSch. I. p. 118 — Berge II p. 154 No. 14 — Kef. p. 306 No. 118 — Gebr. Sp. p. 241 — Hein. p. 76 No. 111 — Std. Cat. I p. 6 No. 141 — Berce 1867 p. 144 — BergeV. p. 21 No. 14 — Frey p. 20.
 b) *endymion* (φ) Schiff. p. 182 No. 1 — Lang 1789 p. 56 No. 480 — Syst. V. II. p. 261 — Kirby p. 369 No. 234.
 c) *hylas* Engr. I p. 175—6 — Berge I p. 87 No. 10 („grauer Schlüpfer“).

Bilder: IÜhr. Schäffer. Icon. T. 211 F. 1. 2 σ U — Esper T. 62 F. 1 σ ; T. 42 F. 2 φ — Engr. T. 38 F. 81 ab φ U; T. 40 F. 84 ab σ U (angeblich φ) — Bgstr. T. 55 F. 3. 4 φ („meleager“) T. 58. F. 1. 2 σ („daphnis“) — Panzer Fauna Dtschld. Glossata T. 5 φ — Hbst. T. 311. F. 1—3 $\sigma\varphi$ U — Meig. T. 46 F. 1 a—d σ U φ U — Lucas T. 26 F. 1 φ — Boisd. Species T. 23 F. 4 φ — Berge I T. 28 F. 18 φ — Ghd T. 33 F. 4 a—c σ U φ — Hofm. I T. 4. F. 9 ab $\sigma\varphi$ — Hofm. II T. 6 F. 1 b σ a φ — Spuler T. 17 F. 6 ab $\sigma\varphi$ — Seitz T. 81 a F. 2. 3 $\sigma\varphi$ — BRebel T. 14. F. 14 φ — Eckstein T. 15. F. 9 ab $\sigma\varphi$.

Nebenformen: 1. F. φ *steevenii* Treitschke X. p. 66 — Syst. V. II p. 262 — Hübn. Geyer T. 201 — Std. Cat. II 12 168 a — Hofm. I p. 9 No. 29 — Rühl p. 282 + 763 — Hofm. II p. 10 No. 29 — Favre p. 21 — StdR. p. 86 No. 611 a.

Synonyma: a) *steeveni* Berge II p. 21 No. 14 — Std. Hor. Ross. 1880 p. 95 — Wheeler p. 31 — Seitz p. 314 — Spuler p. 65 No. 31 — Vorbrot p. 142.

b) *stevenii* HSch. T. 52 — Freyer NBtr. V. p. 75 — Kef. p. 306 No. 188 — Std. Cat. I p. 6 No. 141 a — Kirby p. 369 No. 234 — Caflisch p. 9 — Obth. 1910 p. 265 — BRebel p. 71 No. 176.

c) *steveni* Led. Wien E. Mon. 1857 p. 31 — Evs. Volg. p. 49.

Bilder: Hübn — G. F. 994 — 5 φ U — HSch F. 244—5 σ U — Freyer T. 427 F. 1. 2 $\sigma\varphi$ — Ghd T. 34 F. 1. a—c σ U φ — Seitz T. 81 a F. 4 φ .

2. *F. versicolor* Rühl p. 764 — StdR: p. 86 No. 611 — Seitz p. 314 — BRebel p. 71.
 3. *F. ignorata* StdR. p. 86 No. 611 b — BRebel p. 71 — Seitz p. 314 T. 81 a F. 5. 6 ♂♀.
 4. *F. oricus* Fruhst. Int. E. Z. Gub. 1910 p. 56.
 5. *F. (aberr.) obsoleta* BRebel p. 71.

(meleager Hübn. 1905 nom. praeocc.	= <i>rustica</i> Edwds)
(menalcas Freyer 1839	F. v. dolus Hübn.)
(mesopotamica Std. 1891	F. v. poseidon H. Sch.)
(metallica Felder 1865 partim	= <i>omphisa</i> Mre 1874)
(metallica Favre 1902	♀ Form v. <i>hylas</i> Esper)
(metioche Fruhstf. 1910	F. v. <i>orion</i> Pall.)
(micrargus Butl. 1873	F. v. <i>argus</i> L.)
(minuta Gr. Grsh. 1890	F. v. <i>persephatta</i> Alph.)
(minutus Esper 1800	? F. v. <i>baton</i> Bgstr.)

miris: Std. Stett. E. Z. 1881 p. 263 — Christoph Mem. Rom. 1884 p. 103 T. 6. F. 4 ♂ — Gr. Grsh. ib. 1890. p. 391—2 — Rühl p. 259 + 758 — Seitz p. 306 T. 79 f. F. 6. 7 ♂♀

(mirza Std. 1874	= <i>sieversi</i> Christoph 1873)
(mithridates Std. 1878	F. v. <i>admetus</i> Esper)
(monticola Std. 1901	F. v. <i>alcon</i> Fabr.)

moorei: Leech Trs. E. S. 1889 p. 109 T. 7 F. 3 ♂ + China II p. 311 — Seitz p. 306 T. 79 f. F. 5 ♂.

(morgiana Kirby 1871	= <i>hyrcana</i> Led. 1869)
(muzaffar Gr. Grsh. 1887	= <i>alaina</i> Std. 1887)
(myrmecias Christoph 1877	F. v. <i>chinensis</i> Murray)

myrrha: HSch. 1851 T. 106 F. 508—11 ♂ U ♀ U — Ghd. p. 19 No. 104 T. 36 F. 5a—d ♂ U ♀ U — Std. Hor. Ross. 1878 p. 241 — Rühl p. 265 + 760 — StdR. p. 85 No. 608 — Seitz p. 314.

Synonyma: a) *eroides* Var. Std. Cat. I p. 5 No. 131a.
 b) *eros* Var. Led. Wien. Ent. Mon. 1857 p. 30 — Std. Cat. II p. 11 No. 159b.
 c) *tithonus* Var. Kirby p. 365 No. 508 b.

Nebenform: F. *myrrhina* StdR. p. 85 No. 608a — Seitz p. 314 T. 80 i F. 1 U.

nadira: Moore JASB. 1884. II p. 24 — Nic. Ind. p. 76.

(napaea Gr. Grsh. 1891	F. v. <i>tithonus</i> Hübn.)
(naruena Courv. 1911	F. v. <i>arion</i> L.).
(naruena Courv. 1913	F. v. <i>idas</i> L.)
(nausithous, nausithoë Bgstr. 1779	= <i>arcas</i> ♂♀ Rott. 1775)
(nazira Moore 1865	? F. v. <i>medon</i> Esper.)

niclas: Meig. II p. 10 — (Kef. Stett. E. Z. 1851 p. 305 No. 182.)
 Synonyma: a) *donzelii* Boisd. Icon. p. 64. + Gen. p. 12 No. 103 — Treitschke X p. 64 — God-Dup. Suppl. p. 48 — Freyer II p. 86 — Dup. Cat. p. 32 — HSch. I p. 114 +

VI p. 24 — Hübn. — G. T. 193 — MDür p. 92 No. 55 —
 Ghd p. 11 No. 35 — Wall. p. 218 — Gebr. Sp. p. 243 —
 Hein. p. 77 No. 115 — Std. Cat. I. p. 6 No. 152 + Cat.
 II p. 13 No. 174 — Kirby p. 370 No. 238 — Spgbg. p. 6
 No. 2 — Berge V p. 21 No. 11 — Jenner p. 295 — Frey
 p. 20 — Hofm. I p. 9 — Bramson p. 42 — Rühl p. 291
 + 765 — Hofm. II p. 10 No. 33 — Favre p. 22 — Elwes
 Trs. E. S. 1899 p. 327 — StdR. p. 83 No. 593 — Wheeler
 p. 28 — Obth. Etud. 1906 p. 37—40 — Seitz p. 310 —
 BRebel p. 69 No. 169 — Courv. 1910 p. 126 — Tur. Ver.
 1911 p. 255.

b) *donzeli* Kef. p. 305 No. 182 — Spuler p. 64 No. 25
 — Vorbrot p. 134.

Bilder: Meig. T. 45. F. 3 a b ♂ U — Boisd. Icon. T. 15. F.
 1—3 ♂♀ U + Species T. 7 F. 5. 6 ♂♀ — God. Dup. Hist.
 Suppl. T. 8 F. 1—3 ♂♀ U — Freyer T. 145. F. 2. 3 ♂♀
 — HSch. F. 351—2 ♂ U — Hübn. — G. F. 955—7 ♂ U ♀ —
 Ghd T. 19. F. 2 a b c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4 F. 13 ♂ —
 Hofm. II T. 6. F. 5 ♂ — Spuler T. 17. F. 4 ♂ — Seitz T.
 80 b F. 6. 7 ♂♀.

Nebenformen: 1. F. *hyacinthus*. HSch. VI p. 29 —
 Freyer VI p. 153 — Ghd p. 15 No. 65 — Std. Cat. I p. 5.
 No. 128 (eigne Art!) — Std. Cat. II p. 13 No. 174 a
 (*donzelii* Var.) — Kirby p. 364 No. 206 — Std. Hor. Ross.
 1880 p. 95 — Rühl p. 292 — Std. Iris 1899. p. 151 (eigne
 Art) — StdR. p. 83 No. 594 (ebenso) — Obth. 1910 p. 257
 (*donzelii* Var.) — Seitz p. 310 — Courv. 1910 p. 127 —
 Vorbrot p. 135.

Bilder: HSch. F. 345—8 ♂ U ♀ U — Freyer T. 577 F.
 2 ♂ — Ghd T. 26. F. 4 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 80 b F. 9
 ♂, c F. 1 ♀.

2. F. *septentrionalis* Krul. Soc. ent. 1908 p. 11 —
 Seitz p. 310 — Courv. 1910 p. 126 — Vorbrot p. 135.

3. F. *obscura* Courv. 1910 p. 26.

Synonym: F. *montana* BHaas (in lit.)

4. F. *kenteana* BHaas (in lit.)

5. F. ♀ *caerulea*. Courv. 1910 p. 127. .

(<i>nigra</i> Gerhd 1853	F. v. <i>orion</i> Pall.)
(<i>nigrescens</i> Courv. 1910	F. v. <i>argus</i> L.
(<i>oberthüri</i> Gr. Grsh. 1887	= <i>elvira</i> Evans. 1854)
(<i>oberthüri</i> Std. 1901	F. v. <i>rustica</i> Edwds)
(<i>oceanus</i> Bgstr. 1779	♀ F. v. <i>icarus</i> Rott.)
(<i>oebalus</i> Hoffmsegg 1804	= <i>icarus</i> Rott.)
(<i>olympica</i> Led. 1852	F. v. <i>coridon</i> Poda 1775)

omphisa: Moore Pr. Z. S. 1874 p. 573 + ib. 1882 p. 247 —
 Bingham. p. 347 — Seitz p. 308.

Synonyma: a) *omphissa* Nic. Ind. III p. 84 — Gr. Grsh.
 Mem. Rom. 1890 p. 417 — Holland Pr. Unit. Stat. Nat.
 Mus. 1895 p. 277 — StdR. p. 82 No. 585.

b) *metallica* Felder Novara II p. 283 (part.)

c) ? *chrysopis* Gr. Grsh. (s. diese!)

Bilder: Felder l. c. T. 35 F. 9 ♂ (nec F. 7. 8) — Mre l. c.

1874 T. 66 F. 2 ♂ — Bingham. T. 19. F. 131 ♂ — Seitz
T. 79 i F. 6. 7 ♂ U.

optilete: Knoch Btr. z. Ins. Gesch. I 1781 p. 76 („Gelbauge“) — Esper Suppl. I. 1782 p. 136 — Engr. II p. 311—312 („Argus bleu turquin“) — Schnd. p. 259 No. 159 — Fabr. Mant. II p. 74 No. 691 — Bgstr. T. 109 — Borkh. I p. 155 + 277: II p. 225 — Fabr. Ent. syst. III 1. p. 297 No. 131 — Gmelin-Linné I. 5. p. 2348 No. 752 — Prunn. p. 58 No. 111 — Hbst IX p. 255—7 — Hübn. I p. 50 — Panzer F. Germ. Glossata T. 23. 24 ♂♀ — Ochs. I. 2 p. 51 No. 23 — Hübn. Verz. p. 69 No. 672 — Meisn. p. 88 — Latr. NDict. p. 498 — God. Enc. p. 686 No. 214 — Boisd. Ind. p. 12 — Meig. II p. 16 — Schott p. 81 No. 107 — Boisd. Gen. p. 11 No. 78 — Dup. Cat. p. 32 — HSch. I p. 127 — Freyer V p. 117 — Berge II p. 156 No. 33 — Kef. p. 310 No. 226 — MDür p. 70 No. 40 — Ghd p. 9 No. 25 — Wall. p. 209 No. 3 — Hein. p. 83 No. 130 — Std. Cat. I p. 5 No. 109 — Berce 1867 p. 135 — Std. Cat. II p. 10 No. 138 — Kirby p. 359 No. 160 — Spgbg p. 39 No. 11 — Berge V p. 23 No. 28 — Christ 1878 p. 373 — Frey p. 15 — Killias p. 17 No. 4 — Hofm. I p. 7 No. 8 — Rühl p. 243 + 753 — Hofm. II p. 8 No. 8 — Reutti p. 22 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien. 1897 p. 14 — Favre p. 16 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 324 — StdR. p. 80 No. 363 — Rgmt p. 21 — Wheeler p. 41 — Spuler p. 61 No. 13 — Seitz p. 304 — BRebel p. 67 No. 162 — Courv. 1910 p. 100 + Lyc. Bas. p. 158 — Tutt III. 1909 p. 154 — Obth. 1910 p. 300—1 — Vorbrot p. 131.

Bilder: Knoch l. c. T. 5 F. 5. 6 ♀ U — Esper T. 79 F. 4. 5 ♂ ♀ — Engr. T. 85 a tert. ♂ b tert. ♀ c tert. U — Bgstr. T. 109 F. 5 ♀ — Hbst. T. 316 F. 8—10 ♂♀ U — Hübn. F. 310—2 ♂♀ U — Panzer l. c. T. 23. 24 ♂♀ — Meig. T. 45 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Freyer T. 451 F. 2. 3 ♂♀ — Ghd. T. 16 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I. T. 3 F. 26 ♂ — Hofm. II. T. 5 F. 5 ♀ — Spuler T. 16 F. 6 ♀ — Seitz T. 79 b F. 1. 3 ♂ U — Eckstein T. 15 F. 5. bc ♂♀.

Nebenformen: 1. F. cyparissus Hübn. T. 129 — Boisd. Gen. p. 11 No. 78 — Dup. Cat. p. 32 — MDür p. 71 — Kef. p. 311 No. 226 — Ghd. p. 11 No. 26 — Std. Cat. I p. 5 No. 109 a — Std. Cat. II p. 10 No. 138 — Kirby p. 360 No. 160 a — BergeV p. 23 No. 28 — Frey p. 15 — Hofm. I p. 7 Nr. 8 — Caflisch p. 8 — Rühl p. 243+753 — Hofm. II p. 8 No. 8 — Favre p. 16 — Herz. Iris 1898 p. 237 — StdR. p. 80 No. 563 b — Wheeler p. 41 — Spuler p. 61 No. 13 — Seitz p. 304 — BRebel p. 67 No. 162 — Courv. 1910 p. 100 — Obth. 1910 p. 301 — Vorbrot p. 131.

Synonym: cyparissius Killias p. 17.

Bilder: Hübn. F. 654—7 ♂ U ♀ U — Ghd. T. 17 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 79 b F. 2 U.
2. F. sibirica Std. Iris 1892 p. 317 — Rühl p. 753 — StdR. p. 80 No. 563 a — Seitz p. 304 — Courv. 1910 p. 100.
3. F. uralensis Courv. 1910 p. 100 + Iris 1911 p. 104 T. 1 F. 4 ♀ — (Leech China II p. 304?) — Seitz p. 304 — Obth. 1910 p. 301.

4. F. (aberr.) subtus-radiata Favre Suppl. p. 4 —
Obth. 1910 p. 301.

(orbitulus Esper 1800

= rustica Edwds 1864)

orbitulus: de Prunner Lepid. pedemont. 1798 p. 75 No.
158 — Wnbg. II. 1864 p. 305 — (Kirby p. 362 No. 185)
— Courv. 1910 p. 100—1.

Synonyma: a) atys Hübn. 1804 T. 97 (I p. 46) (nom. praeocc.)
— Esper T. 118 — Hoffmsegg Illig. Mag. 1804 p. 187 —
Ochs I. 2 p. 25 No. 11 — Latr. NDict. p. 493 — BergeV
p. 23 No. 25 — Hein. p. 78 No. 116 — Std. Cat. I p. 5
No. 123 („hoc nom. recipiend.“) — Kirby p. 362 No. 185
— Spgbg p. 58—60 No. 18.
b) p heretes Hübn. p. 46 (Text) („saphyrblauer Falter“)
— Hübn. Verz. p. 67 No. 645 — Meisn. p. 87 — God. Enc.
p. 702 No. 243 — Boisd. Ind. p. 12 — Schott p. 77 No. 96
— Meig. II p. 11 No. 15 — Lucas p. 38 — Labram T. 37
— Boisd. Gen. p. 12 No. 98 — HSch. I. p. 112 — Dup.
Cat. p. 32 — Kef. p. 305 No. 180 — MDür p. 88 No. 51
— Ghd p. 13 No. 46 — Wall. p. 235 — Gebr. Sp. p. 229
— Std. Cat. I p. 5 No. 123 — Berce 1867 p. 137 —
Täschler 1870 p. 83 — Std. Cat. II p. 11 No. 152 —
Jenner p. 294 — Frey p. 16 — Killias p. 19 — Elwes Pr.
Z. S. 1882 p. 402 — Hofm. I p. 8 No. 16 — Nic. Ind. III
p. 81 — Leech China II p. 305—6 — Rühl p. 256 + 757
— Hofm. II p. 9 No. 6 — Caflisch p. 8 — Favre p. 17 —
Elwes Trs. E. S. 1899 p. 325 — Agassiz p. 240 — StdR. p.
82 No. 583 — Wheeler p. 38 — Bingham p. 352 — Spuler
p. 63 No. 20 — Seitz p. 308 — BRebel p. 68 No. 166 —
Tutt III. p. 154 — Obth. 1910 p. 297—8 — Courv. 1910
p. 106 — Vorbrot p. 132—3 — Chapm. Trs. E. S. 1913
p. 393—406.

Bilder: Hübn. F. 495—6 ♂ U (atys) F. 548—9 ♀ U — Esper
T. 118 F. 4. 5 ♂♀ — Meig. T. 44 F. 3 a—d ♂ U ♀ U —
Lucas T. 26. F. 2 ♂ — Labram. T. 37 ♂ T. 38 ♀ — Ghd
T. 22 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 3 F. 30 ♂ — Hofm.
II T. 5 F. 13 ♂ — Spuler T. 16 F. 6 ♂ — Seitz T. 79 h
F. 8. 9 ♂♀; i F. 1 U — Chapm. l. c. T. 18—35 — BRebel
T. 14 F. 6 ♂.

Nebenformen: 1. F. lehanus Moore Ann. Mag. 1878. I
p. 230 + Seed Yarkd Miss. 1879 p. 6 — Nic. Ind. III p.
81 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890. p. 389 — Leech China
II p. 306 — Rühl p. 257 + 757 (eigne Art) — StdR. p.
82 No. 583 — Bingham p. 352 — Seitz p. 308

Bilder: Mre Ann. Mag. T. 1 F. 6 ♂ — Gr. Grsh. l. c.
T. 10 F. 4 ab ♂♀ — Bingham. T. 10 F. 132—3 ♂♀ —
Seitz T. 79 i F. 2. 3. ♂♀.

2. F. asiatica Elwes Pr. Z. S. 1882 p. 402 + Trs. E. S.
1888 p. 382 — Nic. Ind. III p. 81 — Rühl p. 257 + 757
— Herz Iris 1898 p. 237 — StdR. p. 82 No. 583. b —
Bingham l. c. p. 352 T. 19 F. 134 ♂.

3. F. p heretimus Std. Iris 1892 p. 317 — Rühl p. 257
— StdR. p. 82 No. 583 a — Seitz p. 308.

4. *F. sajana* Rühl p. 757 — StdR. p. 82 No. 583 — Seitz p. 308.

5. *F. pharis*. Fawcett Pr. Z. S. 1904. II p. 138. T. 9 F. 5. 5 a ♂♀.

6. *F. ♀ caerulea* Courv. Soc. ent. 1896 — Seitz p. 308 — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot dt p. 133.

7. *F. ♀ caeruleo-punctata* Wheeler p. 39 — (MDür p. 88) — Seitz p. 308 — Vorbrot dt p. 133.

Synonym: *F. lunulata* Courv. 1903 p. 23 + 1910 p. 107.

8. *F. (aberr.) maloyensis* Rühl Soc. ent. 1892 p. 181 + Gross-Schm. 1893 p. 256 — (MDür p. 88) — Favre p. 17 — Agassiz p. 240 — StdR. p. 82 No. 583 — Täschler 1902 p. 229 — Wheeler p. 39 — Seitz p. 308 — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot dt p. 133.

Synonym: *A. b. paucipunctata* Courv. (1903 p. 24) + 1907 p. 75 + Iris. 1912 p. 63.

Bilder: Esper T. 118 F. 5 ♀ — Labram T. 37 ♂ — Spuler T. 16 F. 9 ♂ — Seitz T. 79. i. F. 1 U.

9. *F. (aberr.) caeca* Courv. 1907 p. 75 + 1910 p. 107 + Iris 1912 p. 63.

orion:

Pallas Reise dch. d. russ. Reich 1771. I p. 471 — Wnbg. I p. 360 — Std. Cat. II p. 10 No. 145 — Jenner p. 294 — Killias p. 18 No. 5 — Elwes Pr. Z. S. 1881 p. 388 — Hofm. I p. 8 No. 11 — Bramson p. 48 — Leech China II p. 309 — Rühl p. 249 + 755 — Hofm. II p. 9 No. 11 — Reutti p. 22 — Favre p. 17 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien 1897 p. 14 — Stef. p. 49 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 325 — StdR. p. 81 No. 574 — Wheeler p. 40 — Spuler p. 62 No. 17 — Seitz p. 306 — BRebel p. 67 No. 164 — Courv. 1910 p. 99 — Obth. 1910 p. 286—9 — Vorbrot dt p. 130 — Srdinko Int. E. Z. Gub. 1912 p. 102 — Perlini 1912 p. 64.

Synonyma: a) *argus* Scopoli Carniol. p. 177.

b) *battus*. Schiff. p. 185 No. 17 — Lang. 1789 p. 54 No. 454 — Jung 1791. p. 73 — Fabr. Ent. syst. III. 1. p. 300 No. 137 — Syst. V. II p. 273 — Schrank p. 215 — Hübn. p. 51 No. 29 — Ochs. I. 2. p. 64 No. 29 — Meisn. p. 88 — Hübn. Verz. p. 68 No. 668 — Latr. NDict. p. 498 — Boisd. Ind. p. 11 — Schott p. 83 No. 112 — Boisd. Gen. p. 10 No. 74 — Dup. Cat. p. 32 — Lucas p. 32 — HSch. I p. 119 — MDür p. 65 No. 37 — Kef. p. 308 No. 207 — Ghd p. 13 No. 47 — Gebr. Sp. p. 231 — Hein. p. 83 No. 129 — Std. Cat. I p. 5 No. 116 — Berce 1867 p. 136 — Kirby p. 360 No. 167 — BergeV. p. 23 No. 27 — Frey p. 15.

c) *bathus* Fabr. Mant. II p. 76 No. 697.

d) *telephii* Esper I p. 364 — Engr. II p. 310—11 — Bgstr. III p. 18 — Borkh. I p. 159 + 278; II p. 227 — Lang Verz. 1782 p. 48 No. 420 — Schnd. p. 257 No. 158 — Prunn. p. 57 No. 109 — God. Enc. p. 686 No. 215 — Meig. II p. 28 No. 36 — Berge II p. 154 No. 16 — MDür p. 65 No. 37 —

e) *sedi* Fabr. Spec. 1781 p. 121 No. 538.

f) *hecateus* Drapier Ann. Soc. phys. Bruxell. 1819 p. 355. T. 30.

Bilder: Kühn Naturf. IX. 1776 T. 1. F. 4. 5 ♂ U — Esper T. 41 F. 2 ♂ — Engr. T. 84 F. 85a bis, b bis ♂ U („telephii“) c bis ♀ („orion“) — Bgstr. T. 56 F. 5. 6 ♂ U; T. 60 F. 1—3 ♂ ♀ U — Hbst T. 31b F. 5—7 ♂ U ♀ — Hübner F. 328—330 ♂ U ♀ — Drapier l. c. T. 30 F. 5 — Meig. T. 49 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Lucas T. 24 F. 4 ♂ — Ghd. T. 22. F. 2 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 3 F. 27 ♂ — Hofm. II T. 5 F. 8 ♂ — Spuler T. 16 F. 7 ♂ — Seitz T. 79 e F. 4. 5 ♀ U — BRebel T. 14 F. 4 ab ♀ U — Eckstein T. 15 F. 6 cd ♂ ♀.

Nebenformen: 1. F. nigra Ghd Berl. E. Ztschr. 1882 p. 126 (nec Rühl) — Rühl p. 249 — Favre p. 17 — Wheeler p. 40 — Spuler p. 62 No. 17 — Seitz p. 306 — BRebel p. 67 No. 164 — Obth 1910 p. 289 — Courv. 1910 p. 99 — Rebel Ann. Wien. 1911 p. 304 — Galv. Preiss. p. 137 — Perlini 1912 p. 64.

Synonym: ? F. metioche Fruhst. E. Z. Gub. 1910 p. 63 — Perlini 1912 p. 64 — Vorbrot p. 130.

Bilder: Esper T. 94 F. 5 — Hüb. F. 801—2 ♀ U — Seitz T. 79 e F. 7. 8 ♀ U.

2. F. orithyia Gr. Grsh. Hor. Ross. XXV p. 452 — Rühl p. 249 — StdR. p. 81 No. 574b — Seitz p. 306.

3. F. ornata Std. Mem. Rom. 1892 p. 159 — Rühl p. 250 — StdR. p. 81 No. 574a — Spuler p. 62 — Seitz p. 306 T. 79e F. 6 ♀ — BRebel p. 67 — Rebel Ann. Wien 1911 p. 304 — Vorbrot p. 130 — Galv. Preiss. p. 137.

4. F. lariana Fruhst. E. Z. Gub. 1910 p. 63 — Perlini 1912 p. 64 — Vorbrot p. 130.

5. F. rubrifasciata Courv. Ent. Mittl. 1913 No. 10.

6. F. (aberr.) arcuata Courv. 1903 p. 20 + 1907 p. 35 + 1910 p. 100 + Iris 1912 p. 49.

7. F. (aberr.) costojuncta Courv. (1907 T. I. F. 6) + (1910 p. 100) + Iris 1912 p. 50 T. 4 F. 5.

panagaea: HSch. VI 1851 p. 30 T. 103 — Std. Cat. I p. 5 No. 119 + Cat. II p. 11 No. 148 — Kirby p. 361 No. 171 — Led. Hor. Ross. 1872 p. 9 — Christoph ib. 1874 p. 22 + ib. 1877 p. 199 — Rühl p. 251 + 756 — Nicholl-Elwes Trs. E. S. 1901 p. 92 — StdR. p. 80 No. 564 — Seitz p. 304.

Synonym: endymion Freyer V. 1852 p. 145 — Ghd. p. 9 No. 23 — Kef. p. 308 No. 210.

Bilder: HSch. F. 490—3 ♂ U ♀ U — Freyer T. 572 F. 2. 3 ♂ ♀ — Ghd T. 16 F. 2 ab ♂ U; T. 36. F. 6 ab ♂ ♀ — Seitz T. 79 b F. 4. 5 U ♀.

Nebenform: F. taygetica Rebel Berl. E. Ztschr. 1902 p. 90.

(panaegides Std. 1886

F. v. cytis Christoph)

panope: E vs. Bull. Nat. Mosc. 1851. II. p. 619 — Erschoff. Lep Turk. 1874 p. 11 — Bramson p. 55 — Rühl p. 251 — StdR. p. 80 No. 572 — Spuler p. 65 No. 15. T. 17. b F. 23 ♂ — Seitz p. 305.

Synonym: parope Kef. p. 307 No. 201.

(panoptes Hüb. 1805
(parisiensis Ghd 1853

F. v. baton Bgstr.)
Ab. v. coridon Poda)

persephatta: Alph. Hor. Ross. 1881 p. 395 — Rühl p. 296 + 767 — StdR. p. 89 No. 636 — Seitz p. 319 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 285.

Synonym: *minuta* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 415 — Rühl p. 296 — StdR. p. 89 No. 636 (eadem cum *persephatta typica*) — Seitz p. 319.

Bilder: Alph. l. c. T. 14 F. 11 — Gr. Grsh. l. c. T. 10 F. 3 — Seitz T. 82 d F. 8 ♂; e F. 1 ♀.

(*pheretes* Hübn. 1805)

= *orbitulus* Prunn. 1798)

pheretiades: Evans. Bull. Nat. Mosc. 1843 p. 536 — Kef. p. 305 No. 151 — HSch VI 1852 p. 28 T. 134 — Ghd p. 21 No. 113 — Std. Cat. II p. 11 No. 153 — Kirby p. 362 No. 186 — Alph. Hor. Ross. 1881 p. 52 — Elwes Trs. E. S. 1887. p. 393 — Rühl p. 257 + 757 — StdR. p. 82 No. 582 — Seitz p. 307 — Courv. 1910 p. 108 — Wagner Ent. Mittl. 1913 p. 251.

Synonym: ? *pheretes* Var. Std. Cat. I p. 5 No. 124.

Bilder: Evans. l. c. T. 7 F. 3 ab ♀ U — HSch. F. 650—1 ♀ U — Ghd T. 39 F. 2 ab ♀ U — Seitz T. 79 h. F. 5 U (nec F. 4 ♂)

Nebenformen: 1. F. *pheretulus* Std. Stett. E. Z. 1886 p. 209 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 391 — Rühl p. 257 — StdR. p. 82 No. 582 c — Seitz p. 308 T. 79 h. F. 6. 7 ♂♀ (?) — Courv. 1910 p. 108.

2. F. *phereclus* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 391 T. 8 F. 5 ♂ —

Synonyma: (a) *pheres* Std. Stett. E. Z. 1886 p. 210 — nom. praeocc.) — Rühl p. 257 (eigne Art) — StdR. p. 82 No. 582a — Seitz p. 308 T. 79 h. F. 5 U — Courv. 1910 p. 108.

b) *pheretulus* Gr. Grsh. l. c. p. 390—1 T. 8 F. 5 ♂

3. F. *tekessana* Alph. Mem. Rom. 1897 p. 234 T. 12 F. 3 ♂ — StdR. p. 82 No. 852b — Seitz p. 308 — Courv. p. 108.

4. F. *micra* Avinow Hor. Ross. 1910 p. 244 T. 14. F. 19 ♂ U.

5. F. ♀ *caerulea* Courv. 1910 p. 108.

6. F. (aberr.) *caeca* Courv. Iris 1912 p. 63.

(*philonomus* ♂, *philonome* ♀ Bgstr. 1779 Formen v. *argus* L.)

(*phobos* Bgstr. 1779 F. v. *alexis* Poda)

(*phryxis* Std. 1886 F. v. *devanica* Mre)

phyllides: Std. Stett. E. Z. 1886 p. 225 — Rühl p. 284 — Std. Iris 1899 p. 150 — StdR. p. 83 No. 595 — Seitz p. 310 (T. 80 c F. 2. 3 U ♀?)

Synonym: *phyllis* Var. Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 407. T. 9 F. 6 ab ♂♀.

phyllis: (Std. in lit.) Christoph Hor. Ross. 1877—8 (damon Var.) — Rühl p. 283 — Std. Iris 1899. p. 149 — StdR. p. 87 No. 623 — Seitz p. 317.

Bilder: Christoph T. 5. F. 9. 10 ♂♀ („phillis“) — Seitz T. 81 g F. 6—8 ♂♀ U.

Nebenformen: 1. F. posthumus Christoph l. c. p. 238 T. 9
 F. 11 ♂ — Std. Hor. Ross. 1879 p. 256 — StdR. p. 87
 No. 623 a — Seitz p. 317. T. 81. h. F. 1. 2 U ♀.
 Synonym: damon Var. posthumus Rühl p. 286.
 2. F. (aberr.) schultzii Krodel Allg. Ztschr. Ent. 1904
 T. 1. F. 13 ♀ + E. Z. Gub. 1904 p. 21.
 Synonym: A. b. radiata Courv. 1907 p. 37 + Iris 1912
 p. 54.

(planorum Alph. 1881 F. v. idas L.)
 (podarce Felder 1865 F. v. rustica Edwds)
 (polyphemus + polyphemus Var. Esper 1777 Formen v. icarus Rott.)

pontica: Courv. Iris 1911 p. 112 T. 2 F. 12 ♂.
 poseidon: HSch. VI. 1851 p. 24 — Rühl p. 288 — Std. Iris 1899
 p. 148 — Std. p. 88 No. 627 — Nicholl-Elwes Trs. E. S. 1901
 p. 93 — Seitz p. 318 T. 82 a F. 6. 7 ♂ U.

Synonyma: a) damone Ghd p. 11 No. 37 T. 19 F. 4 a—c
 ♂ U ♀.
 b) damone Var. Led. Vhdl. z. bot. Wien 1852 p. 37 —
 Kef. p. 305 No. 183 b — Std. Cat. I p. 6 No. 147 a —
 Led. Hor. Ross. 1869 p. 81 — Std. Cat. II p. 13 No. 172 b
 — Kirby p. 370 No. 237 a.

Nebenformen: 1. F. caerulea Std. Cat. II p. 13 No. 172
 (damon Var. f.) + Hor. Ross. 1878 p. 255 — Rühl p. 288 +
 764 — Std. Iris 1899 p. 148 — StdR. p. 88 No. 627 b —
 Seitz p. 318 T. 82 b. F. 1—3 U ♂ ♀.
 Synonym: damone Var. Led. Hor. Ross. 1869 p. 81
 T. 4. F. 8 ♀.
 2. F. poseidonides Std. Stett. E. Z. 1886 p. 225 —
 Rühl p. 288 — Std. Iris 1899 p. 149 — StdR. p. 88. No.
 627 c — Seitz p. 318
 Synonym: F. refulgens Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p.
 408 T. 9 F. 5 ab ♂ ♀ — Rühl p. 288 — Seitz p. 308.
 3. F. mesopotamica Std. Iris 1891 p. 233 — Rühl p.
 288 (eigne Art.) — Std. Iris 1899 p. 148 — StdR. p. 88
 No. 627 a — Seitz p. 318 T. 82 b F. 4. 5 ♂ ♀ —

(privata Std. 1895 F. v. chiron Rott.)
 (pseudaegon Butl. 1881 } (pseuderos Mre 1879 } Formen v. tithonus Hübn.)

psylorita: Freyer V. 1845 p. 146 — HSch VI. p. 30 — Ghd p. 11 No.
 29 — Std. Cat. I p. 5 No. 122 — Kirby p. 362 No. 184 —
 Std. Cat. II p. 11 No. 151 — Hofm. I p. 8 No. 15 — Bram-
 son p. 46 — Rühl p. 256 — Hofm. II p. 9 No. 15 — StdR.
 p. 82 No. 588 — Seitz p. 308.

Synonyma: a) psylarita Kef. p. 309 No. 214.
 b) psyllorita Spuler p. 63 No. 22.

Bilder: Freyer T. 469 F. 3 ♂ — HSch. F. 328—331 ♂ U ♀ U
 — Ghd T. 17 F. 4a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 79 k F. 3. 4 ♂ ♀.

Nebenform: A. b. caeca Courv. (f. nova) — Freyer T. 469.
 F. 4 ♀.

(pupillaris Aigner	F. v. anteros Freyer)
(pupillata Courv. 1913	F. v. devanica Mre)
(pusillus Ghd 1853	F. v. icarus Rott.)

pylaon: Fischer de Waldheim Nouv. Mem. Mosc. II 1824 p. 357 — Boisd. Gen. p. 11 No. 83 — Dup. Cat. p. 32 — HSch VI p. 29 — Ghd p. 19 No. 101 — Kef. p. 310 No. 222 — Std. Hor. Ross. 1870 p. 49 — Std. Cat. I p. 5 No. 114 — Kirby p. 360 No. 165 — Hofm. I p. 8 No. 10 — Bramson p. 56 — Rühl p. 247 + 754 — Hofm. II p. 9 No. 10 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 324 — StdR. p. 79 No. 551 — Spuler p. 61 No. 10 — Seitz p. 302.

Synonyma: a) zephyrus HSch. I. 1843 p. 126 — Kirby p. 360 No. 165.

b) zephyrus F. darwiniana? Std. Cat. II p. 10 Nr. 141.

c) zephyrus Var. Alph. Trs. E. S. 1891 p. 500.

d) cyane Freyer V. 1845 p. 145 — Std. Cat. I p. 5 No. 114.

Bilder: Fischer de W. T. 19 F. 5. 6 ♂ U — HSch. F. 20—1 ♂ U; F. 333—4 ♂ U — Freyer T. 469 F. 1. 2 ♂ U — Ghd. T. 35 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Hofm. II T. 5 F. 7 ♂ — Spuler T. 16 F. 10 ♂ — Seitz T. 78 h. F. 2. 3 ♂ U.

(radiata Gaschet 1877	♀ F. v. bellargus Rott.)
(radiosa Gaschet 1877	♀ F. v. coridon Poda)

ramburi: Verity J. Linn. Soc. Lond. 1913 p. 189.

Synonyma: a) idas (nom. praeocc.) Rambur Faune Andal. 1839. I p. 266 + Cat. Lép. Andal. 1858. p. 38 — Boisd. Gen. p. 11 No. 80 — Dup. Cat. p. 32 — MDür p. 74 — Ghd. p. 15 No. 64 — Std. Cat. I p. 5 No. 127 + Cat. II. p. 11 No. 156 — Kirby p. 364 No. 203 — Hofm. I. p. 8 No. 19 Rühl p. 262 — Hofm. II p. 9 No. 19 — Bramson p. 56 — StdR. p. 82 No. 587 — Chapm. Trs. E. S. 1907 p. 155—58 — Spuler p. 63 No. 21 — Seitz p. 308 — Ribbe Iris 1912 p. 189—192.

b) agestis Var. Kef. p. 309 No. 215.

Bilder: Rambur l. c. T. 10 F. 5—7 ♂ ♀ U — Ghd T. 26 F. 3 ab U ♀ — Chapm. l. c. T. 5 F. 13—15 ♂ ♀ U — Spuler T. 16 F. 24 ♂ — Seitz T. 79 k F. 1. 2 U ♀.

Nebenformen: 1. F. morronensis Ribbe Iris 1912 p. 190.
2. F. chapmani Ribbe l. c. p. 192.

(regina Rühl 1893	F. v. idas L.)
(regnieri André 1901	Aberr. v. icarus Rott.)
(rognedia Gr. Grsh. 1890	F. v. christophi Std.)
(roxane Gr. Grsh. 1890	F. v. idas L.)
(rubrifasciata Courv. 1913	Aberr. v. orion Pall.)
(rufina Obth. 1894	Aberr. v. icarus Rott.
(rufomaculata Rev. 1909	Aberr. v. argus L.)
(rufomaculata Courv. 1910	Aberr. v. semiargus Rott.)
(rufomarginata Wagner 1909	♀ F. v. bellargus Rott.)
(rufopunctata Neuburger 1907	Aberr. icarus Rott.)

rustica: Edwards Pr. Ent. Soc. Philad. IV 1864 p. 203
+ Synops. 1872 p. 36 No. 35 — Kirby p. 377 No. 322 —
Mead Report upon Coll. of diurnal Lepid. of Colorado 1871
— 4 p. 783 — Scudder Bull. Buff. 1876 p. 121 No. 266 —
Smith List. Lepid. Bor. Amer. 1891 p. 12 No. 340 — Skinner
Syn. Cat. N Amer. Rhopal 1898 p. 56 No. 350 — Holland
Bttfl. Book 1907 p. 263 T. 32 F. 17 ♂ U — Obth. 1910
p. 295.

Synonyma: a) *orbitulus* (Esper) Ochs. I. 2 p. 43 No. 19
— Meissn. p. 87 — Latr. NDict. p. 499 — God. Enc. p. 688.
No. 217 — Boisd. Ind. p. 12 — Schott p. 80 No. 103 —
Meig. II p. 17 No. 22 — Lucas p. 34 — Boisd. Gen. p. 11
No. 86 — Dup. Cat. p. 32 — Freyer NBtr. V. p. 61 —
HSch. I p. 122 — Kef. p. 305 No. 177 — Ghd p. 11 No.
30 — MDür p. 75 No. 43 — Gebr. Sp. p. 229 — Hein.
p. 78 No. 117 — Std. Cat. I p. 5 No. 125 — Berce 1867
p. 137 — Täschler 1870 p. 84 No. 11 — Kirby p. 263 No.
195 — BergeV. p. 23 No. 24 — Nic. Ind. III p. 87 —
Bingham p. 349 — Obth. 1910 p. 294—6 — Courv. 1910
p. 106 — Vorbrodt p. 131.
b) *orbitulus* (Prunn.) Esper Suppl. II p. 101 (1800)
(„piemontesischer Argusfalter“) — Hübn. Verz. 1816 p. 68
No. 660 — HSch. I p. 128 — Std. Cat. II p. 11 No. 154
— Scudder Bull. Buff. 1876 p. 121 No. 266 — Jenner p.
294 — Frey p. 16 — Killias p. 19 — Hofm. I. p. 8 No. 17
— Bramson p. 51 — Rühl p. 258+758 — Hofm. II p. 9
No. 17 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 326 — Favre p. 18 —
Caffisch p. 8 — StdR. p. p. 81 No. 581 — Wheeler p. 37—8
— Spuler p. 62 No. 19 — Seitz p. 307 — BRebel p. 67
No. 165 — Tutt III. 1909 p. 154 — Chapm. Trs. E. S. 1911
p. 148 etc. —
c) *meleager* Hübn. 1805 p. 47 („nebelblauer Falter“) —
Werneburg II p. 19 — Spgbg p. 61 No. 19.

Bilder: Esper T. 114 F. 4 ♂ — Hübn. 5. 522—5 ♂ U ♀ U
+ F. 761—2 ♂ U — Meig. T. 45 F. 5 a—d ♂ U ♀ U —
Lucas T. 25 F. 2 ♂ — Freyer T. 421 F. 3 ♂ — Berge II
T. 33 F. 8 (angeblich dardanus) — Ghd T. 17 F. 3 a—c.
♂ U ♀ (angeblich dardanus); T. 18 F. 1 a—c (orbitulus)
— Hofm. I T. 3 F. 21 ♂ — Hofm. II T. 5. F. 14 a ♀
(angeblich ♂) b ♀ — Spuler T. 16 F. 8 a b ♂ ♀ — Seitz
T. 78 f. F. 8—10 ♂ ♀ U — BRebel T. 14 F. 7 ♂.

Nebenformen: 1. F. *aquilo* Boisd. Icon. 1832 p. 62 +
Gen. p. 11 No. 85. — HSch I p. 122 — Berge II p. 155
— Kef. p. 305 No. 178 — Ghd p. 11 No. 34 — Wall. p.
211 No. 4 — Möschler Wien. E. Mon. IV. 1860 p. 343 —
Spgbg p. 61 No. 19 — Edwds Synops. 1872 p. 35 No. 26
— Scudder Pr. Bost. S. N. Hist. 1874 p. 310—4 — Strecker
Lepid. Rhop. 1874. p. 86—7 — Scudder Bull. Buff. 1876
p. 120 No. 264 — Obth VIII. 1884 p. 17 — Möschler Vhdl.
zool. b. Wien 1884 p. 280 — Smith. List Bor. Amer. p. 12
No. 339 — Skinner Syn. Cat. N. Amer. Rhop. p. 56 No.
349 — Holland Bttfl. Book p. 263.

Synonyma: a) F. *franklinii* Curtis. Ross. II Voy.
Append. 1835. p. 69—70.

- b) *orbitulus* Var: MDür p. 75 No. 43 — Gebr. Sp. p. 230 — Std. Cat. I p. 5. No. 125 b + Cat. II p. 11 No. 154 b — Kirby p. 363 No. 195 c — Frey p. 17 — Rühl p. 258 + 758 — StdR. p. 81 No. 581 f — Seitz p. 307 — Spuler p. 63 No. 19 — Courv. 1910 p. 107.
Bilder: Boisd. Icon. T. 12 F. 7. 8 ♀ U — God. Dup. Suppl. I T. 47 F. 6. 7 ♂♀ — Curtis l. c. Taf. A. F. 8. 9 ♂ U — Ghd. T. 19. F. 1 a b ♀ U — Holland l. c. T. 32. F. 10. 11 ♂ U.
2. *F. araraticus* Ghd. p. 11. No. 32 T. 18 F. 3 a—c ♂ (?) U ♀ — Kef. p. 305 No. 178.
3. *F. aquila* Ghd. p. 11 No. 33 T. 18 F. 4 a—c ♂ U ♀.
4. *F. wosnesenskii*. Ménétriés Enumer. I 1855 p. 58 + 95. No. 964 — Std. Cat. II p. 11 No. 154 d — Rühl p. 259 + 758 — Alph. Mem. Rom. 1897 p. 317 — Herz Iris 1898 p. 237 — StdR. p. 81 No. 581 d — Seitz p. 307 — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot p. 132.
Synonym: ? *F. diodorus* Brem Bull. Ac. Petsbg 1861 p. 471 + Mem. Ac. Petsbg 1864 p. 29 — Rühl p. 311 — StdR. p. 81.
Bilder: Ménétr. l. c. T. 4 F. 6 ♀ — (Brem. l. c. T. 1 F. 10 ♀) — Alph. l. c. T. 14. F. 5 ♂ — Seitz T. 79 g. F. 5 U.
5. *F. podarce* Felder Novara II. 1865 p. 282 — Scudder Bull. Buff. 1876. p. 120 No. 265 — Smith List Bor. Amer. 1891 p. 12 No. 338 — Skinner 1898 p. 56 No. 348 — Wright Bttfl. West Coast 1906. p. 224 — Holland Bttfl. Book p. 263.
Synonyma: a) *cilla* Behr Pr. Calif. Ac. Nat. Sc. III 1867 p. 281 — Scudder l. c. p. 120. No. 265.
b) *tehamia* Reakirt Pr. Ac. Nat. Sc. Philad. 1866 p. 246 — Edwds. Synops. p. 36 No. 34 — Scudder l. c.
c) *nestos* Boisd. Ann. Belg. 1869 p. 50 — Obth. 1913 p. 43.
d) *orbitulus* Strecker Lep. Rhopal. 1874 p. 87 + Cat. 1878 p. 99.
Bilder: Felder l. c. T. 35. F. 22—3 ♂ — Strecker Rhop. T. 10 F. 16 ♂ — Wright l. c. T. 29 F. 375 c ♂ U — Holland l. c. T. 32 F. 15. 16 ♂ ♀ — Obth. l. c. T. 239 F. 2074—5 ♂♀ (nestos).
6. *F. jaloka* Moore Pr. Z. S. 1874 p. 573 — Nic. Ind. III p. 86 — StdR. p. 82 No. 581 g — Bingham p. 349—350 — Seitz p. 307 — Courv. 1910 p. 107.
Synonym: a) *F. ellisi* Marshall JASB. 1882. II p. 41 — Nic. l. c. p. 87 — Elwes Trs. E. S. 1887 p. 393 — StdR. p. 82 — Bingham l. c — Seitz p. 307 — Courv. 1910 p. 107.
b) *F. leela* Nic. JASB. 1883. II p. 66 + Ind. III p. 87 — StdR. p. 82 — Bingham l. c — Seitz p. 307.
Bilder: Mre l. c. T. 46 F. 3 ♂ — Marshall l. c. T. 4 F. 4 ♂ — Nic. l. c. T. 1 F. 3. 3a ♂♀ — Bingham l. c. p. 350 Textfigur.
7. *F. orbona* Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 453 — Rühl p. 312 (eigene Art) — StdR. p. 81 No. 581c — Seitz p. 307 T. 79 g F. 3. 4 U ♀ — Courv. 1910 p. 307.
Synonym: *F. tartarus* Std. Iris 1895 p. 300.

8. *orbitulinus* Std. Iris 1892 p. 318 — StdR. p. 81 No. 581b — Seitz p. 307 — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot dt p. 131.

9. *F. oberthüri* StdR. p. 81 No. 581a — Seitz p. 307 T. 79g F. 1. 2 ♂♀ — Obthür 1910 p. 296 — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot dt p. 131.

Synonym: *orbitulus* Var. Obth. VIII. 1884 T. 1 F. 8. 9 ♂ U.

10. *F. aquilina* StdR. p. 81 No. 581e — Seitz p. 307 T. 79g F. 6. 7 ♂♀ — Spuler p. 62.

Synonym: *F. aquilo* Auriv. Nd. Fjärl. p. 11 (nom. praeocc.) — StdR. p. 81 — Vorbrot dt p. 132.

11. *F. aquilonia* (Lowe) Wheeler p. 37 — Seitz p. 307 — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot dt p. 132.

Synonyma: a) *aquilo* HSch. F. 24 25 ♀ U — Berge II T. 33 F. 7 ♀ — MDür p. 75 — Gebr. Sp. p. 230.

b) *orbitulus* ♀ Freyer T. 421 F. 4.

c) *orbitulus* Ab. ♀ Frey p. 17.

d) *Ab. transparens* Courv. 1903 p. 23.

e) *F. albo-ocellata* (Wheeler?) Seitz p. 307 — Vorbrot dt p. 132.

12. *F. (aberr.) subtus-punctis-fortissimis* Favre Suppl. p. 4 — Wheeler p. 37.

13. *F. (aberr.) striata* Rev. Bull. lép. Genève 1909 T. 10 F. 3 ♀ — (Frey p. 17) — Vorbrot dt p. 132.

14. *F. (aberr.) caeca* Muschamp. Bull. Genève 1908 p. 264 — Hübn. F. 841 ♀ — Courv. 1910 p. 107 — Vorbrot dt l. c. — Obth. 1910 T. 40 F. 290 ♀.

rutilans: Std. Stett. E. Z. 1886 p. 208 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 378 T. 7 F. 7 ♂ — Rühl p. 241 + 753 — StdR. p. 80 No. 567 — Seitz p. 305 T. 79 b F. 9 ♂.

(<i>sajana</i> Rühl 1895	<i>F. v. orbitulus</i> Prunn.)
(<i>salacia</i> Bgstr. 1779	♀ <i>F. v. bellargus</i> Rott.)
(<i>samudra</i> Mre 1874	<i>F. v. christophi</i> Std.)
(<i>sapphirus</i> Meig. 1830	= <i>escheri</i> Hübn. 1805)
(<i>sapphirus</i> Stollwerk 1863	<i>F. aberr. v. bellargus</i> Rott.)
(<i>saportae</i> Hübn. G. 1830	= <i>melanops</i> Boisd. 1829)
(<i>sarta</i> Alph. 1881	= <i>devanica</i> Mre 1874)
(<i>schniederi</i> Strand 1903	♀ <i>F. v. alexis</i> Poda)
(<i>scylla</i> Obth. 1880	= <i>lycormas</i> Butl. 1866)
(<i>sedi</i> Fabr. 1781	= <i>orion</i> Pall. 1771)

semilargus: Rott. Naturf. VI. 1775 p. 20 No. 6 — Jang 1782 p. 132 — Borkh. I p. 172—3 + 282; II. p. 234 — Hbst IX p. 177—9 — Hein. p. 73 No. 103 — Std. Cat. I p. 6 No. 156 — Wnbg I p. 391 — Berce 1867 p. 147 — Std. Cat. II p. 14 No. 179 — Kirby p. 372 No. 253 — Spbg p. 51 No. 15 — Berge V p. 21 No. 7 — Jenner p. 294 — Killias p. 21 — Hofm. I p. 9 No. 37 — Bramson p. 45 — Rühl p. 296 + 767 — Hofm. II p. 11 No. 37 — Caflisch p. 10 — Reutti p. 24 — Favre p. 23 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 328 — StdR. p. 89. No. 637 — Wheeler p. 25 — Spuler p. 67 No. 44 — Seitz p. 319 — Tutt III. 1909 p.

253—319 — BRebel p. 74 No. 185 — PImh. p. 28 — Obth. 1910 p. 305—8 — Courv. 1910 p. 196—8 + Lyc. Bas. p. 162 — Vorbrot p. 152 — Tur. 1911 p. 259 — Perlini p. 70.

Synonyma: a) *demi-argus* Geoffroy Hist. abrég. 1764 II p. 63 No. 31 — Engr. I p. 181.
 b) *argiolus* Füssl. Verz. 1775. p. 31 No. 598 — Sulzer Abg. Gesch. p. 146 — Esper I p. 277 — Fabr. Mant. II p. 73 No. 686 + Ent. syst. III. 1. p. 295 No. 123 — (Schnd. p. 269 No. 168) — Hübn. p. 45 — Panzer Enumer. zu Schäffers Icon. 1804 p. 163+181 — Hoffmsegg Illig. Mag. III. 1804 p. 186 — God. Hist. p. 224—5 — Lucas p. 39 — Berge I p. 86 —
 c) *b y z a s* ♂ + *b y z e* ♀ Bergstr. II p. 79.
 d) *argopoeus* Bgstr. III. p. 8. 9.
 e) *d a m o e t a s* Bgstr. III. p. 14.
 f) *c i m o n* Lewin Ins. Brit. I. 1795 p. 80.
 g) ? *f r e j u s* (♀) Prunn 1798 p. 76 No. 160.
 h) *argianus* Dalman Vet. Akad. Handl. 1816 p. 95.
 i) *a c i s*. Schiff. 1776 p. 182 No. 5 („völlblauer Falter“ — nom. nudum) — Lang 1789 p. 56 No. 486 — Jung 1791 p. 6 — Syst. V. II p. 264 — Schrank p. 210 — Ochs. I. 2 p. 14 No. 6 — Hübn. Verz. p. 67 No. 647 — Meisn. p. 87 — Latr. NDict. p. 500 — God. Enc. p. 703 No. 245 — Boisd. Ind. p. 13 — Meig. II p. 6 No. 7 — Schott p. 76 No. 92 („Halbargus“) — Boisd. Gen. p. 12 No. 100 — HSch. I p. 116 — Dup. Cat. p. 31 — Bertol. p. 32 No. 3 — de Selys Mém. Liège 1844 p. 3 — Freyer V. 1845 p. 117 — HSch I p. 116 — Berge II p. 153 — Kef. p. 307 No. 196 — MDür p. 89 No. 52 — Ghd. p. 9 No. 13 — Wstwd. p. 105—6 — Wall. p. 238 — Gebr. Sp. p. 247 — Newman p. 133 — Täschler 1870 p. 83 — Frey p. 21 — Rgmt. p. 23.
 k) *a s i s*. Wood Ind. entomol. 1839 p. 8 No. 63.

Bilder: Petiver Brit. Bttfl. 1715 T. VI F. 2 ♀ — Rösel Ins. Belust. III. 1755 T. 37 F. 4 U — JChr. Schäffer Icon. T. 185 F. 1. 2 ♂ U — Esper T. 21 F. 1 ab ♂♀ („Kleines Vielaug“) — Engr. T. 42 F. 88 a—d ♂ U ♀ U — Bgstr. T. 48 F. 5. 6 ♂ („byzas“) 7. 8 ♀ („byze“) T. 52 F. 7. 8 ♂ U („argopoeus“) F. 5. 6 ♂ U („damoetas“) — Hbst T. 310 F. 1—3 ♂♀ U — Hübn. F. 269—271 ♂♀ U — God. Hist. T. 11 secd. F. 7 ♂; 11 quart. F. 4 ♂ — Meig. T. 46 F. 4 a—c ♂♀ U — Freyer T. 451 F. 4 ♂ — Lucas T. 26 F. 5 ♀ — Berge II T. 32 F. 23 ♂ — Berge I T. 28 F. 13 ab ♂♀ — Ghd T. 13 F. 4 a—c ♂ U ♀ — Westwood T. 16 F. 2 ♂♀ — Newman p. 133. F. 45 ♂ U Textfiguren — Hofm. I T. 4 F. 17 ♂ — Hofm. II T. 6. F. 9 ab ♂♀ — Spuler T. 17 F. 11 ab ♂♀ — Seitz T. 82 e F. 2—5 ♂ U ♀ U — BRebel T. 14 F. 18 ab ♂ U c ♀ — Tutt III. T. 42 F. 23—5 ♂♀ U.

Nebenformen: 1. F. *bellis* Freyer V. 1845 p. 26 — HSch I p. 126 — Kef. p. 307 No. 196 — Ghd p. 9 No. 14 Std. Cat. I p. 6 No. 156 a — Kirby p. 372 No. 253 a — Std. Cat. II p. 14 No. 179 a — Hofm. I p. 9 — Rühl p. 297+767 — Caradja Iris 1895 p. 40 — Nicholl-Elwes Trs.

- E. S. 1901 p. 94 — StdR. p. 89 No. 637 b — Seitz p. 319 — Tutt III p. 274 — Courv. 1910 p. 197.
- Bilder:** Freyer T. 398 F. 1. 2 ♂♀ — HSch. F. 232—5
♂ U ♀ U — Ghd T. 14 F. 1 a—c ♂ U ♀ — Seitz T. 82 d F. 7 ♂, e F. 1. 2 U ♀.
2. *F. montana* MDür p. 90 No. 52 — Frey p. 21 — Rühl p. 298 — Caflisch p. 10 No. 20 — Horm. Vhdl. z. bot. Wien 1897 p. 17 (Sep.) — Favre p. 23 — Agassiz p. 240 — StdR. p. 89 No. 637 a — Gillm. E. Z. Gub. 1907 p. 100 — Spuler p. 67 No. 44 — Seitz p. 319 T. 82 e F. 6 ♂ (nicht typisch) — Tutt III p. 269 — BRebel p. 74 — Courv. 1910 p. 197 Obth. 1910 p. 307 — Vorbrot p. 152 — Tur. 1911 p. 259.
3. *a ntiochen a* Led. Wien. E. Mon. 1861 p. 148. T. 1 F.
2. 3 ♂♀ — Rühl p. 298+767 — StdR. p. 89. No. 637 e — Nicholl-Elwes Trs. E. S 1901 p. 94 — Seitz p. 319 — Tutt III p. 280 — Courv. 1910 p. 197.
4. *F. helen a* Std. Stett. E. Z. 1862 p. 265 — Millière Icon. 1863 T. 3 g F. 1—3 ♂♀ U — BergeV. p. 21 — Rühl p. 297 — Hofm. I p. 9 No. 37 — StdR. p. 89 No. 637 d — Spuler p. 67 No. 44 — Seitz p. 319 T. 82 f F. 3. 4 ♂♀ — Tutt III p. 278 — Courv. 1910 p. 197.
5. *F. parnassia* Std. Hor. Ross. 1870 p. 35 — BergeV p. 21 — Rühl p. 297 — Hofm. I p. 9 No. 37 — StdR. p. 89 No. 637 c — Spuler p. 67 — Seitz p. 319 — Tutt III p. 273 — Obth. 1910 p. 306.
6. *F. coelestina* Millière Icon. 1874 p. 440 T. 154 F. 3 ♂ — Tutt III p. 268—9.
7. *F. uralensis* Tutt III p. 270.
8. *F. altaiana* Tutt. ib.
9. *F. amurensis* Tutt ib. p. 271.
10. *F. fergana* Tutt. ib.
11. *F. balcanica* Tutt ib. 272.
12. *F. mesopotamica* Tutt. ib. 277.
13. *F. persica* Tutt. ib.
14. *F. salassorum*. Fruhstf. Soc. ent. 1910 p. 48.
15. *F. (aberr.) aetnaca* Zeller Isis 1847 p. 148 — Rühl p. 298. — StdR. p. 89 No. 637 — Wheeler p. 25 — Gillm. E. Z. Gub. 1907 p. 100 („aetnea“) — Tutt III p. 266 — Seitz p. 319 — BRebel p. 74 No. 85 — Kiefer I. E. Ztschr. Gub. 1913 p. 167.
16. *F. (aberr.) impura* Krul. Soc. ent. 1906 p. 50 — Courv. 1910 p. 197.
- Synonyma:** a) *F. decorata* Courv. Iris 1911 p. 106 T. 2 F. 11 ♂ — (Schrank II. 1 p. 211) — (MDür p. 90) — Courv. 1910 p. 197 — Vorbrot p. 152.
b) *F. alconoides* (Muschamp) Vorbrot p. 152.
c) *F. albipunctata* (Muschamp) Vorbrot p. 152.
17. *F. (aberr.) ♀ rufomaculata* Courv. 1910 p. 197.
18. *F. (aberr.) striata* Wheeler p. 25 — (Aigner Ann. Hung. 1906 p. 517) — Seitz p. 319 — Tutt. III p. 267 T. 42 F. 26 — BRebel p. 74.
- Synonym:** A b. (disco-) *elongata* Courv. 1913 p. 19 + 1907 p. 34 T. 1 F. 3 ♂ + 1910 p. 197 + Iris 1912 p.

47 T. 4 F. 2 ♂ — Gillm. Int. E. Z. Gub. 1909 p. 312 — BRebel p. 74 — Kiefer Int. E. Z. Gub. 1913 p. 167.

19. F. (a b e r r.) c a e c a Fuchs Stett. E. Z. 1883 p. 253 — Rühl p. 298 + 767 — StdR. p. 89 No. 637 — Fuchs JB. Nass. 1903 p. 67 — Wheeler p. 25 — Krodel Ill. Ztschr. Ent. 1904 p. 52 — Krul. Soc. ent. 1908 p. 172 + Iris 1908 p. 202 — Spuler p. 67 No. 44 — Gillm. E. Z. Gub. 1909 p. 312 — Seitz p. 319 — Tutt III p. 266 — BRebel p. 74 — Courv. 1910 p. 197 — Vorbrodt p. 152.

S y n o n y m : A b. p a u c i p u n c t a Courv. 1910 p. 197 + Iris 1912 p. 63.

20. F. (a b e r r.) s p a d a e Hellweger E. Z. Gub. 1896 p. 67 — Krodel Ill. Ztschr. Ent. 1904 p. 52 — Tutt III p. 267 — Seitz p. 319 — BRebel p. 74.

S y n o n y m : Ab. c a e c a Courv. 1907 p. 75 + 1910 p. 197 + Iris 1912 p. 64.

(semibrunnea Millière 1859 } (semisyrapha Tutt. 1896 } ♀ Formen v. coridon Poda)

sephyrus: Frivaldszky Tarsas Evkönyv. II 1835 p. 269 — StdR. p. 79 No. 552 („forma Darwiniana“ von pylaon?) — Seitz p. 303 — BRebel p. 66 No. 161.

S y n o n y m a : a) z e p h y r u s HSch. I p. 126 — Boisd. Gen. p. 11 No. 91 — Dup. Cat. p. 33 — MDür p. 67 — Freyer VI. p. 154 — Ghd p. 17 No. 76 — Std. Cat. I p. 5 No. 112 — Led. Hor. Ross. 1869 p. 79 + Ann. Belg. 1870 p. 7 — Std. Cat. II p. 10 No. 140 — Kirby p. 359 No. 153 b — Erschoff Turkest. p. 10 — Berge V p. 23 — Speyer Stett. E. Z. 1882 g. 379 — Hofm. I p. 8 No. 9 — Bramson p. 52 — Alph. Trs. E. S. 1891 p. 499—500 — Rühl p. 245 + 754 — Hofm. II p. 9 No. 9 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 324 — Nicholl-Elwes ib. 1901 p. 95 — Wheeler p. 41 — Obth. 1904 p. 16 — Spuler p. 61 No. 12.
b) z e p h i r u s Favre p. 16.
c) a l e x i s Var. b. Kef. p. 310 No. 218. b.
d) a r g u s Var. Led. Hor. Ross. 1869 p. 79.

B i l d e r : Friv. I. c. T. 7 F. 1. 2 ♂♀ — HSch. F. 208—211 ♂ U ♀ U — Freyer T. 577 F. 3 ♂ — Ghd T. 29 F. 3 a—c ♂ U ♀ — Led. Ann. Belg. 1870 T. 3 F. 1. 2 ♂♀ — Hofm. II T. 5 F. 6 ♂ — Spuler T. 16 F. 4 ♂ — Seitz T. 78 h. F. 4. 5 ♂ U.

N e b e n f o r m e n : 1. h e s p e r i c a Rambur Faune Andal. 1839 p. 270 — Boisd. Gen. p. 11 No. 91 — HSch. I. p. 125 — Dup. Cat. p. 33 — Ghd. p. 21 No. 108 — Ramb. Cat. Andal. 1858 p. 40 — Std. Cat. II p. 10 No. 140 a — Kirby p. 359 No. 153 a — Rühl p. 246 — Hofm. II p. 9 No. 9 — StdR. p. 79 No. 552 b — Obth 1904 p. 16 — Spuler p. 61 No. 12 — Seitz p. 303 — Obth 1910 p. 212.

S y n o n y m : a l e x i s Var. c. Kef. p. 310 No. 218 c.

B i l d e r : Ramb. Faune T. 10 F. 1—4 ♂ U ♀ U — HSch. F. 14. 15 ♂ U + F. 349—350 ♀ U — Ghd T. 37. F. 2 a—c ♂ U ♀ — Obth. 1904 T. 2. F. 23—4 ♂♀ — Seitz T. 78 h. F. 8 ♂.

2. *F. lycidas* Trapp Mitthl. schweiz. E. Ges. 1863 p. 203
 — Jäggi ib. 1881 p. 95 — Rühl p. 246 — Hofm. II p. 9 No. 9
 — Jones Ent. Mo Mag. 1900 p. 79 — Agassiz p. 240 —
 StdR. p. 79 No. 552 c — Wheeler p. 41 — Obth. 1904 p.
 16 — Spuler p. 61 No. 12 — Seitz p. 303 — BRebel p. 66
 — Courv. 1910 p. 99 — Obth. 1910 p. 212 — Vorbrot
 p. 129.
 Bilder: Jäggi l. c. T. 3 ♂♀ — Lang Bttfl. Europ. 1884
 T. 82 F. 7 ♂ — Obth 1904 T. 2 F. 17. 18 ♂♀ — Seitz
 T. 78. i F. 1—3 ♂ U ♀.
3. *F. zephyrinus* Christoph Mem. Rom. 1884 p. 102 T.
 6 F. 3 a b ♂♀ — Std. Stett. E. Z. 1886 p. 204 — Gr. Grsh.
 Mem. Rom. 1890 p. 382 — Alph. Trs. E. S. 1891 p. 499 —
 Rühl p. 246 + 754 (eigene Art) — Std R. p. 79 No. 552 a.
 — Seitz p. 303 T. 78 h. F. 6 7 U ♀.
4. *F. akbesiana* Obth. 1904 p. 16 T. 2 F. 21. 22 ♂♀
 — Seitz p. 303.
5. *F. ♀ nichollii* Elwes Trs. E. S. 1901 p. 96.
6. *F. ♀ lycidas-caerulea* Courv. 1910 p. 99 — BRebel
 p. 67 — Vorbrot p. 129.
7. *F. ♂ lycidas-rubrimaculata* Courv. Ent. Mittl.
 1913 p. 291.
8. *F. (aberr.) disco-elongata* Courv. 1910 p. 99
 + Iris 1912 p. 46 — BRebel p. 66 — Vorbrot p. 129.
9. *F. (aberr.) parallela* Courv. 1910 p. 99 + Iris 1912
 p. 53 — BRebel p. 66 — Vorbrot p. 129.
10. *F. (aberr.) radiata* Courv. 1910 p. 99 + Iris 1912
 p. 59 — BRebel p. 66 — Vorbrot p. 129.

(sibirica Std. 1892
 (sibirica Fuchs 1900

F. v. optilete Knoch)
 F. v. icarus Rott.)

siewersii: Christoph Hor. Ross. 1874 p. 21 T. 1 F. 1. 2 ♂♀ (auf der
 Tafel: „siewersii“) — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 No. 379
 — Rühl p. 242 + 753.

Synonyma: a) *sieversi* StdR. p. 80 No. 559 — Seitz p. 304
 T. 79 a F. 3. 4 ♂ U.
 b) *mirza* Std. E. Z. Stett. 1874 p. 90 — Rühl p. 239
 (eigene Art)

Nebenform: *F. haberhaueri* Std. Stett. E. Z. 1886 p. 206
 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 379 T. 7 F. 6 a b ♂♀ —
 Rühl p. 242 + 753 (eigene Art) — StdR. p. 80 No. 559 a
 — Seitz p. 304 T. 79a F. 5. 6 ♂♀.

(sohni Rühl 1893 Aberr. v. coridon Poda)
 (speveri (nec speyeri) Hucz 1881 F. v. chiron Rott.)

staudingeri: Christoph Hor. Ross. 1873 p. 26 T. 1 F. 5. 6 ♂♀
 — Rühl p. 294 — StdR. p. 80 No. 557 — Seitz p. 303. T.
 78 k. F. 5 U.

stoliczkana: Felder Novara II p. 283 — Nic. Ind. III p. 73 —
StdR. p. 84 No. 559 — Bingham p. 341—3 T. 19 F. 130 ♂
— Seitz p. 311.

Synonym: *sutleja* Mre Pr. Z. S. 1882 p. 246 — Nic l. c. p. 73 — Bingham p. 342.

Nebenformen: 1. *F. ariana* Mre Pr. Z. S. 1865 p. 504 +
ib 1882 p. 246 — Butl. Ann. Mag. 1888 I p. 149 — Nic.
l. c. p. 72 — Leech China II p. 307 — Holland Pr. Unit.
Stat. Nat. Mus. 1895 p. 276 — StdR. p. 84 No. 599 b —
Bingham p. 342—3 — Seitz p. 311 T. 80 e F. 8. 9 ♂ U.
2. *F. hunza* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 397 T. 15 F. 2
♂ (eigene Art) — Rühl p. 266 — StdR. p. 84. No. 599 a —
Seitz p. 311 T. 80 e F. 6. 7 U ♀.

(Synonym: Aberr. caeca Courv.)

(*subapennina* Tur. 1903) ♀ F. v. *escheri* Hübn.)

superba: Std. Stett. E. Z. 1887 p. 51 — Rühl p. 291 — Std. Iris 1899 p. 153 — StdR. p. 84 No. 600 — Seitz p. 312 T. 80 f F. I U.

Synonym: *magnifica* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1887 p. 399 +
ib 1890 p. 404. T. 9 F. 1 ab ♂♀.

Nebenform: Aberr. radiata Courv, 1907 p. 37 + Iris 1912
p. 55.

(sutleja Mre 1882 = stoliczkana Feld. 1865)
(sylvius Poda 1761 ? = argus L. 1758)
(syngrapha Kef. 1851 nomen nudum ♀ F. v. coridon Poda)

tancrei: Gräser Berl. E. Ztschr. 1888 p. 77 — Rühl p. 237
+ 753 — StdR. Mem. Rom. 1892 p. 158 — StdR. p. 79
No. 546 — Seitz p. 302 T. 78 f. F. 2. 3 ♂♀.

(tartarus Std. 1895 (telegonus Bgstr. 1779 (telejus Bgstr. 1779 (telephii Esper 1777 (themis Gr. Grsh. 1891 (thersites Boisd. 1840 nom. nudum. (thersites Ghd. 1853 (thersites Cantener 1834	F. v. <i>rustica</i> Edwds) Formen v. <i>arion</i> L.) = <i>orion</i> Pall. 1771) = <i>lucifera</i> Std. 1867) Aberr. v. <i>icarus</i> Rott.) s. bei <i>icarus</i> Rott.)

timida: Gr. Grsh. Mem. Rom. 1885 p. 217.

(*tiphys* Esper 1778) Aberr. v. *bellargus* Rott.)

titheonus : Hübn. 1805 p. 48 („dünnblauer Falter“) — Hoffmsegg Illig. Mag. III p. 205 — God. Enc. p. 692 No. 225 — Kirby Cat. p. 364 No. 208 — Courv. 1910 p. 148 — Obth. 1910 p. 230—4 — Vorbrodt p. 139 — Tur. Ver. 1911 p. 256 — Perlini 1912 p. 67.

Synonym: *eros*. Ochs. I. 2. 1808 p. 42 No. 18 — Meisn. p. 87 — Schott p. 80 No. 102 — Boisd. Ind. p. 12 — God. Dup. Suppl. p. 77 — Boisd. Icon. p. 56 + Gen. p. 12 No. 87 — Dup. Cat. p. 32 — HSch. I. p. 120 — Berge II p. 152 — Kef. p. 309 No. 217 — MDür p. 76 No. 44 — Ghd p. 15 No. 68 — Gebr. Sp. p. 236 — Hein. p. 80 No. 122 — Std. Cat. I p. 5 No. 130 — Berce 1867 p. 139 — Std. Cat. II p. 11 No. 159 — BergeV. p. 22 No. 19 — Frey p. 17 — Christoph Hor. Ross. 1877 p. 200 — Killias p. 19 — Hofm. I p. 8 — Bramson p. 50 — Caflisch p. 9 — Rühl p. 264 + 759 — Obth. XX p. 24 — Hofm. II p. 9 No. 21 — Favre p. 18 — Leech China II p. 308 — Elwes Trs. E. S. 1899 p. 326 — StdR. p. 84 No. 597 — Wheeler p. 36 — Spuler p. 64 No. 27 — Seitz p. 311 — BRebel p. 69 No. 171 — Tutt III. 1909 p. 154 — Courv. 1910 p. 148 — Wagner. Ent. Mittl. 1913. p. 252.

Bilder: Hübn. F. 555—6 ♂ U — God. Dup. Suppl. T. 12 F. 5. 6 ♂ U — Boisd. Icon. T. 14 F. 4—6 ♂♀ U — HSch. F. 212 — 213 ♀ U — Ghd. T. 27 F. 2 a—c ♂ U ♀ — Hofm. I T. 4. F. 1 ♂ — Hofm. II T. 5 F. 17 b ♂ — Spuler T. 16 F. 17 b ♂ — Seitz T. 80 c F. 7. 8 ♂♀, d F. 1 U —

Nebenformen: 1. *eroides* Friv. Tarsas Evkönyv. II. 1835 p. 270 — HSch. I p. 121 — Kef. p. 309 No. 217 a — MDür p. 77 — Std. Cat. I p. 5 No. 131 (eigne Art) + Cat. II p. 11 No. 159 a — Kirby p. 364 No. 208 a (eigne Art) — BergeV. p. 22 No. 19 — Hofm. I p. No. 21 — Rühl p. 264 + 759 — Hofm. II p. No. 21 — Caflisch p. 9 — StdR. p. 84 No. 597 c — Spuler p. 64 No. 27 — Seitz p. 311 — BRebel p. 69 (eigne Art) — Obth. 1910 p. 233—4 — Courv. 1910 p. 148.

Synonyma: a) *F. anteros* FreyerV. 1845 p. 6 (nec III 1839 p. 101!) — Rühl p. 264 — StdR. p. 84 — Seitz p. 311. b) *F. everos* Dup. Cat. Cat. 1844 p. 32 — nom. nudum.) — Ghd Inhaltsverzeichnis.

c) *F. myrrha* Var. *helena* Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 453 — Rühl p. 265 (eigne Art.) — StdR. p. 84.

Bilder: Friv. I. c. T. 7 F. 3 ♂ — Freyer T. 386 F. 3. 4 ♂♀ — HSch F. 12. 13 ♂ U — Ghd T. 27 F. 1 a—c ♂ U ♀ + T. 37 F. 3 ab ♂ U — Hofm. II T. 5. 17 a ♂ — Spuler T. 16 F. 17 a ♂.

2 *F. boisduvalii* HSch. I p. 121 — Kef. p. 309 No. 217 b — Led. Vhdl. z. bot. Wien. 1853 p. 355 — Std. Cat. I p. 5 No. 131 (syn. *eroides* Friv.) — MDür p. 77 — Std. Cat. II p. 11 No. 159 (ebenso) — Kirby p. 365 No. 208 a (ebenso) — Rühl p. 264 — StdR. p. 84 No. 597c — Seitz p. 311.

Bilder: HSch. F. 7—9 ♂♀ U — Seitz T. 80 d F. 6. 7 ♂♀.

3. *F. pseuderos* Mrc Pr. Z. S. 1879 p. 138 + ib. 1882 p. 246 — Nic. Ind. III p. 77 — StdR. p. 84 No. 597 f — Seitz p. 311.

4. *F. amor* Std. Stett. E. Z. 1886 p. 211 — Rühl p. 265 + 759 (eigne Art) — StdR. p. 84 No. 597 d — Seitz p. 311 T. 80 e F. 1. 2 ♂ U.

Synonym: *F. napaea* Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 458.

5. *F. erigone* Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 397 — Rühl p. 759 — StdR. p. 84 No. 597 e — Seitz p. 311 T. 80 c F. 3. 4 ♂♀ — Avinow. Hor. Ross. 1910 p. 244 T. 14 F. 20. 21 ♂♀.
 6. *F. erotides* Std. Iris 1892 p. 319 — Rühl p. 759 — StdR. p. 84 No. 597 b — Seitz p. 311. T. 80 d F. 3 ♂.
 7. *F. armeniaca* Std. (in lit.) 1898.
 8. *F. stigmatifera* Std. (in lit.) 1898.
 Synonym: *F. lunulata* Courv. 1903 p. 23.
 9. *F. italicica* Obth. 1910 p. 232. T. 50 F. 423 ♀.
 10. *F. tatsienlouica* Bartel (in lit.) 1910 — (Obth. 1910 p. 233).
 11. *F. klaphecki* Courv. 1910 p. 148 + Iris 1911 p. 104. T. II F. 5 ♂.
 12. *F. petrividendus* Favre 1898 p. 19 — Wheeler p. 37 — Seitz p. 311 — Courv. 1910 p. 148 — Vorbrodt p. 139.
 13. *F. punctifera* Courv. 1910 p. 148 — Vorbrodt p. 139.
 14. *F. ♀ caerulescens* Obth. Et. VIII. 1884 p. 17. T. 1 F. 4 — (Boisd. Icon. T. 14 F. 6) — (Bellier Ann. France 1858 p. 307) — (Frey p. 18) — (Rühl p. 264 + 769) — Obth. 1910 p. 232 T. 50. F. 424 — Seitz p. 311 T. 80 d F. 3 — BRebel p. 69 — Courv. 1910 p. 148 — Vorbrodt p. 139.
 15. *F. ♀ caerulea* Courv. 1910 p. 148.
 16. *F. ♀ albopicta* Schultz. E. Z. Gub. 1906 p. 214.
 17. *F. ♀ senilis* BRebel p. 69.
 18. *F. (aberr.) arcuata* Courv. 1903 p. 20 + 1907 p. 35 + 1910 p. 148 — BRebel p. 69 — Vorbrodt p. 139 — Courv. Iris 1912 p. 49.
 19. *F. (aberr.) subtus-radiata* Obth. XX T. 3 F. 39 ♂ — Favre Suppl. p. 4.
 Synonym: *Ab. discojuncta* Courv. Iris 1912 p. 50.
 20. *F. (aberr.) digitata* Courv. 1907 p. 36 + 1910 p. 148 + Iris 1912 p. 53 — Obth. 1910 T. 50 F. 426 ♀.
 Synonym: *Ab. subtus-radiata* Blachier Bull. lép. Genève 1910 T. 1 F. 14 ♂.
 21. *F. (aberr.) radiata* Courv. 1910 p. 148 — (Bellier Ann. France 1858 p. 307) — (Fallou ib. 1871 p. 101) — Courv. Iris 1912 p. 55.
 22. *F. (confluens-) transversa* Courv. Iris 1912 p. 57.
 23. *F. (aberr.) subtus-minus-punctata* Obth. XX T. 3. F. 40 ♂ (boisduvalii).
 24. *F. caeca* Courv. Iris 1912 p. 63.

(*tithonus* Meigen 1830
 (*tomyris* Gr. Grsh 1890
 (*torgouta* Alph. 1881

♀ F. v. coridon Poda)
 Aberr. v. idas L.)
 F. v. fergana Std.)

triphysina: Std. Iris 1891 p. 235 T. 3. F. 3 ♂ — Rühl p. 254 — StdR. p. 80 No. 570 — Seitz p. 305 T. 79 d F. 3. 4 ♂♀.

(*turanica* Rühl 1895
 (*turensis* Rühl 1895
 (*unicolora* Favre 1902

F. v. icarus Rott.)
 F. v. amandus Schnd.)
 ♀ F. v. idas L.)

(valesiaca Obth. 1904	F. v. idas L.)
(valesiana MDür 1852	F. v. argus L.)
(valmasinii Perlini 1905	F. v. argus L.)
(venilia Bgstr. 1779	♀ F. v. bellargus Rott.)

venus: Std. Stett. E. Z. 1886 p. 211 — Gr. Grsh. Mem. Rom. 1890 p. 393 T. 8 F. 3 ab ♂ ♀ — Rühl p. 266 + 760 — StdR. p. 84 No. 598 — Seitz p. 311 T. 80 e F. 5 U.

Synonym: eros V. lama Gr. Grsh. Hor. Ross. 1891 p. 453 — Rühl p. 264.

Nebenformen: 1. F. wiskotti Courv. Iris 1911 p. 105 T. 2 F. 7 ♂ — Ent. Mittl. 1913 No. 10.
2. F. rubrimaculata Courv. (F. nova) ib.

(versicolor Rühl 1895	F. v. meleager Esper)
(vicrama Mre 1865	F. v. baton Bgstr.)
(virgilia Obth. 1910	F. v. dolus Hübn.)
(viridescens Tutt 1909	F. v. bellargus Rott.)
(violaceo-grisescens Obth. 1896	F. v. bellargus Rott.)
(vulgaris Bertol. 1844	= idas L)
(xerxes Std. 1899, nom. praeoccup.	F. v. damone Evans.)
(yarkundensis Mre 1878	♀ F. v. icarus Rott.)
(zephyrinus Christoph 1884	F. v. sephyrus Friv.)

Bemerkungen über Euchloë falloui Allard (♀ = seitzi Röber) und Amicta ecksteini Led.

Von H. Stauder. Triest.

1. Euchloë falloui Allard.

Literatur-Nachweis: Rühl-Heyne, Die palaearkt. Gross-Schmetterlinge und ihre Naturgeschichte, Erster Band, Tagfalter, Leipzig 1895, pag. 133 und 717;

Staudinger-Rebel Katalog, III. Aufl. 1901, 1. Teil — 62, (pag. 12);

Verh. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien, LIII, 1903, A. Kneucker „Zoologische Ausbeute einer botanischen Studienreise durch die Sinai-Halbinsel im März und April 1902“, pag. 584;

Dr. Adalbert Seitz, Die Gross-Schmetterlinge der Erde, I. Abt., 1. Band, pag. 52. J. Röber: E. falloui All. und E. seitzi Röber; idem: Exoten-Teil, Abt. III, Fauna africana, pag. 49;

H. Stauder, Triest, in Z. für wissenschaftl. Insektenbiologie, Schöneberg-Berlin, Band IX, 1913 „Lepidopt. Ergebnisse zweier Sammelreisen in den Algerischen Atlas und die nördliche Sahara“, pag. 181—183;

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Courvoisier Ludwig Georg

Artikel/Article: [Zur Synonymie des Genus Lycaena. 143-229](#)