

Seitz führt fünf Abarten von *Lar. cambrica* an:

- a) ab. *pygmaea* Tgstr.: eine kleine Form mit eingeschnürtem Zentrafeld;
- b) ab. *latefasciata* Strand mit sehr breitem Mittelfeld und parallelen Linien;
- c) ab. *webbi* Prout mit fast verloschenen Zeichnungen;
- d) ab. *bradyi* Prout (-nigricaria Rbl) mit einfarbig dunkel übergossenen Fl;
- e) ab. *lofthousi* Prout mit gleichfalls dunkel übergossenen Fl, aber mit einem noch verbleibenden weißen Längsstrahl im Distalfeld.

Nach diesen Angaben würden meine erzgebirgischen melanotischen Stücke zu ab. *bradyi* Prout gehören.

---

### Beobachtung von *Deiopeia pulchella* L. in Ost-Preussen.

Von Dr. G. Steimig, Ludwigshafen (Rh.)

In meiner Sammlung befindet sich noch ein Exemplar von *Deiopeia pulchella* L., welches ich 1893 in Neukrug bei Landsberg in Ost-Preussen gefangen habe. Es handelte sich um ein vereinzeltes Stück, und ich habe auch in späteren Jahren an dieser Stelle keine weiteren mehr beobachtet. Dr. P. Speiser machte mich freundlichst auf das Interessante dieses Fundes aufmerksam, mit der Angabe, daß der Falter in Nordostdeutschland als einzelne Seltenheit in je 1 Exemplar bei Rastenburg 1844 und bei Heubude 1841 gefangen wurde. (Siehe auch P. Speiser: Die Schmetterlingsfauna der Prov. Ost- und Westpreußen.)

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Steimmig G.

Artikel/Article: [Beobachtung von Deiopeia pulchella L. in Ost-Preussen. 216](#)