

also beim ♀ die weisse Querbinde nicht nur ganz anders wie beim ♂ begrenzt, sondern die davorstehende braune Binde, beim ♂ nur im unteren Theile in der Mitte weiss, ist beim ♀ in zwei völlig getrennte Binden getheilt. Es unterliegt aber gar keinem Zweifel, dass die beiden ♀♀ zu dem ♂ gehören. Sehr interessant ist hier die auch bei mehreren anderen Tagfaltern (Pap. *Merope* Cr., *Hypol. Misippus* L. etc.) vorkommende Thatsache, dass nur das dimorphe ♀ auffallend einer anderen Art ähnlich ist.

Die folgenden 8, auf Taf. I abgebildeten, palaearktischen Arten sind nicht kolorirt worden, da wahrscheinlich dadurch nur die von unserem Mitglied, Herrn Aug. Weyding, so schön gemachten Abbildungen mehr oder weniger verdorben worden wären.

Fig. 4. *Sesia Doryceraeformis* Ld. (siehe Iris Bd. IV, S. 246.)

„ 5. *Sesia Regula* Stgr. l. c. S. 246.

„ 6. *Sciapteron? Dispar* Stgr. ♂ l. c. S. 243.

„ 7. „ „ Stgr. ♀ l. c. S. 243.

„ 8. *Sciapteron Splendidum* Stgr. l. c. S. 242.

„ 9. *Naclia Syntomida* Stgr. l. c. S. 248.

„ 10. *Heliophobus Discrepans* Stgr. l. c. S. 278.

„ 11. *Metoponia Gratiola* Stgr. l. c. S. 325.

## Lepidoptera Nova Faunae Palaearcticae

a H. Christoph.

**Anthocharis Gruneri** HS. var. **Armeniaca**. Alae albae, non flavidae, ♂ is fascia latiori limitante maculam aurantiacam in qua, vel ante quam posita macula discocellularis. ♀ non differt.

Habitat ad Ordubad. Armeniae rossicae.

**Lycæna Anteros** Frr. var. **Crassipuncta**. Alae griseo-virescentes, macula discocellulari incrassata; subtus dilute brunneae. ♂ Volat Junio circa Kasikoparan. Armeniae rossicae.

**Lycæna Coelestina** Ev. var. **Alticola**. Minor, margine fusco latiori, subtus alae posticae fere toto virescentes, ocellis plerumque minoribus aut deficientibus. Urmus, Kasikoparan. Armeniae rossicae.

**Melit. Aurinia** var. **Pellucida**. Alis anticis subdiaphanis. fasciis dilutioribus, subtus pallidioribus unicoloribus. Kurusch Daghestan Elev: 8000 ps. Volat Julio.

**Melit. Aurinia** var. **Laeta**. Prope v. Meropem Prun. Seriebus macularum grossarum dilute lutescentium, ♂ ♀ Long. alae ant. 15 – 19 mm Habitat Vilui. Sibir. or.

**Melit. Phoebe** var. **Ornata**. Alae supra valde variae, maculis albicantibus et rufescentibus; subtus posticae albae.

Habitat circa Guberli, promontorium uralensium austrarium. Volat Majo.

**Argynnis** **Erda**. Alae integrae, supra fulvae, maculis cellulae mediae fasciaeque mediae attenuatis strioliformibus; subtus posticae rufo-brunneae, fascia media irregulariter angulata lutescente-alba, partim rufo-fusco impleta, maculis (tribus) albis ad basin, saepe evanescentibus, ante fasciam serie adjacentibus ad puncta nigra post fasciam maculisque limbalibus. Long. alae ant: 19—26 mm. Vilni. Julio ♂♀.

**A. Niobe** var. **Tekkensis**. Alae supra pallidiores punctis fuscis minoribus; subtus posticae virescentes ut in var: Orientali Alph. Tekke, Majo, Junio.

**Oeneis Semidea** Say var. **Pansa**. Major; dilutius; subtus alae anticae dilute-castanae, ocellis duabus parvis albide-pupillatis; fascia obscura latiori utrimque latius albide signata. Hab: Witim, Sibir. or.

**Coenonympha Iphis** Schiff. var. **Heroides**. Minor. Alis supra dilutioribus ochraceo-griseo-fuscis; subtus anticarum costa apiceque lutescente-griseis; posticis ocellis majoribus. Volat circa Witim et Vilni. Sibir.or. s. Junio, Julio.

**Coen. Tiphon** var. **Grisescens**. Alae supra dilute ochraceo lutescentes vel grisescentes, interdum strigis albidis translucens; subtus lutescente-griseae, anticarum fascia crenulata, posticarum anguloso-crenata fusca extus albide-signata ♂♀. Hab. Vilni. Sibir. or. s.

**Syrichthus Staudingeri** Spr. var. **Plurimacula**. Alarum anticarum fascia macularum angustiori, posticarum macula rotundata prope marginem anteriorem (desinente S. Staudingeri); subtus posticae pallidiores ♂. Habit. circa Schahrud. Hyrcaniae.

**Hesperia Hyrcana**. Inter Hesperias Venatam Brem. et Sylvanam Esp. ponenda.

A Venata Brem. differt: Alis anticis apice minus acuto, posticis minus latis, colore satiatori fusco-ochracea linea, disci crassa obliqua fusca, (non nigra), fasciis, macularum media et terminali lata, fuscis ♀ eadem colore, quam in ♂ re fascisque angustioribus dilutioribus fuscis.

A Sylvano differt: magnitudine, fasciis distinctioribus, obscurioribus colore paullum dilutiori. Long. alae ant. 17 mm. Lenkoran, Astrabad. Hyrcaniae.

**Carterocephalus Palaemon** var. **Albiguttata**. Supra

maculis minoribus flavis; subtus posticis obscurioribus, maculis albis. Vilui. Irkut. Guberli. Ural merid.

**Zygaena Tamara** Chr. var. **Daemon**. Alae anticae maculis permagnis miniaceo-rubris. ♂ ♀ Habit. Ordubad.

**Nola Impudica**. Alae anticae albiae, strigis duabus mediis, prima ante medium, curvata, ad costam incrassata, altera post medium sinuata, denticulata, fuscis; linea undulata maculisque limbalibus fuscescentibus; ciliis lutescentibus; posticae cinerae. Long. alae ant. 8—9 mm. Ordubad, volat Aprili, Majo.

**Setina Irorella** Cl. var. **Lata**. Alis latioribus, anticis punctis tenuibus paucioribus; posticis sine punctis ♂ ♀ Witim.

**Nemeophila Plantaginis** ab. **Melas**. Nigra. Alae anticae ♂ is fasciis attenuatis maculisque minoribus albis, ♀ ae lutescentibus; posticae omnino nigrae vel maculis nonnullis parvis albis. Vilui.

**Holocerus Volgensis**. Proxime affinis H. Arenicolae. Thorax hirsutus, brunneo fuscus, abdomen lutescente griseum. Alae anticae cinerae, dense fusco-conspersae, fascia in medio, lata, angulata, fascia postica, oriente prope apicem usque ad angulum fasciae mediae et hic ea juncta fuscis, striolis costalibus et in fasciam nigro fuscis; posticae cinerae striolis obsoletis fuscescentibus, ciliis cinereis, obscurius variis. ♀ Exp: alae ant; 21 mm. Hab. Sarepta.

**Hypopta Turcomanica**. Proxima H Caestro. Antennae breviter pectinatae, thorax griseus, collari albo, fusco-terminato. Alae anticae albide-griseae striolis atomisque fuscis, macula discocellulari costaque cretaceis. costa, striolis punctisque fuscis, vitta e basi. venis, striga post medium obliqua, non attingente costam lineaque dentata obliqua ex apice nigris. disco plerumque glauco obnubilo ciliis latis albidis cinereo alternantibus; posticae grisescentes superiore parte venisque infuscaetae. ♂ Long alae ant. 20 mm. Hab. Askhabad, Pul-i-Hatum. Tekke.

**Ocneria Signatoria**. Antennae ♂ is pectinatae. Alae anticae cinerae ♀ ae rufescente griseae, vittula indistincta prope basin, strigis, antica curvata obsoleta, postica crenata et undulata, geminata annuloque albo expleta, venae transversae fuscis, ciliis fuscis, griseo-alternantibus; posticae extus obscurius infuscaetae striola media obsoleta.

Long. alae ant. ♂ is 13, ♀ ae 20 mm. Hab. Eldar, Transcaucasi et Turkestan. Augusto.

**Bombyx Concolor**. Proxima B. Herzi Chr. Alis ochraceis, venis leviter brumescenscentibus ♂ ♂ Long. alae ant. ♂ is 15, ♀ ae 20 mm. Scharud. Hyrcaniae.

**Notodonta Nigroramosa.** Pone *N. Atrovittatam* Brem. ponendum. Antennae ♂ is pectinatae. Alae anticae margine interiori dentato, griseae, brunnescente-nubilosae, infra vittam tennem e basi, non longe a limbo, terminantem furcillatam nigram ad marginem internam albae, strigis ambabus mediis, antica tridentata, postica foras albide limitata, sinuosa, crenulata, venis exemptibus in marginem, fuscis, limbo leviter crenulato, ciliis albidis fusco-alternantibus, macula media rotundata lutescente; posticae ♂ is albae, venis limboque infuscatis ♀ ae infuscae fascia media obsoletissima, dilutiori. Long. ant. ♂ is 19 ♀ ae 22 mm. Habit. Aidere. Nuchur. Tekke.

**Bryophila Duskei.** Alae anticae virescente griseae, linea prope basin undulata, lineisque duabus mediis crenulatis nigris, formantibus fasciam latam caesio-expletam, sicut spatio basali et ante limbum, ubi linea undulata lutescente, maculis ordinariis, orbiculari permagna, renali utrimque in medio attenuata lutescente circumscripta obscure caesio expletis, striolis costalibus 4 lutescentibus: posticae griseae basin versus vix dilutiores, lunula media obsoleta, ciliis omnium lutescentibus. Expans: alae ant. 14 mm 2 ♂ ♂ Helenendorf. Transcaucas.

Dedicavi hanc speciem meritissimo entomologo Dom. Duske.

**Bryoph: Conspersa.** Alae anticae albae, dense fusco pulveratae, lineis transversis altera prope basin, altera ante medium, subrectis, altera post medium ad costam incrassata, valde sinuosa, macularum obsoletarum antelimbaliis fuscis; inter lineas primas et spatio post strigam sinuosam cinereo expleto; posticae lutescente-griseae, foras infuscae, ciliis omnium lutescentibus. Long. alae ant. 12 mm. ♂. Askhabad. Tekke.

**Br. Praecana.** Alae anticae subcutae cinercae, strigis transversis duabus mediis, antica undulata, postica sinuosa, crenulata, fuscis, extus albide-cincta, praecipue distincta prope marginem internam — maculis ordinariis cinereis reniformi infra fusco-limitata, spatio inter strigas obscuriori, linea undulata obsoleta lutescente: posticae latae, cinerascens, foras et in venis infuscae. ♂ ♀. Long. alae ant. 12—15 mm. Askhabad. Nuchur. Tekke.

**Br. Idonea.** Thorax griseus, atomis nigris. Alae anticae griseae, strigis ambabus nigris, antebasali imperfecta biundata, antica strigarum mediarum curvata, intus unidentata, spatio inter hanc strigam et antebasalem dilute cinnamomeo sicut ante angulum analem, post strigam posticam obliquam versus apicem obsoletissimam, inflexam ante marginem internam, punctis marginalibus nigris, ciliis albicantibus, griseo maculatis

divisis linea fusciscente, posticae grisescentes venis et ante marginem infuscatis. Long. alae ant. 12 mm ♂. Pul-i-Hatum. Tekke.

? **Br. Protracta.** Alae subacutae, cretaeae, dilute ochraceo-variae, strigis mediis imperfectis fuscis, antica obliqua inclinata ad marginem interiore ad strigam posticam sinuosam, ante marginem externum striga subfracta obsoleta brunnescente; vitta lata non determinata interrupta non longe a margine inferiori, punctis marginalibus nigris; posticae albicantes venis limboque leviter infuscatis. Long. alae ant. 14 mm. 1 ♂. Nuchur.

**Thaumasta Siderigera.** Antennae ♂ is breviter bipectinatae Thorax hirsutus niger, albide varius. Alae anticae latae, apice rotundato nigrofusco, strigis transversis nigris, striga prope basin dimidiata, altera undulata subrecta infra albide limitata, postica sinuosa, crenulata, limita lunulis albidis, macularum ordinariarum orbiculari late-albide circumscripta, in excavatione maculae reniformis incubita macula alba, lineaque undulata, dentata, utrimque limita maculis albidis, linea limbali nigra, ciliis latis albidis, nigro-variis; posticae cinerascens lunula media, strigisque duabus arcuatis obsoletis obscurioribus 1 ♂. Long. alae ant. 20 mm. Montes Sajan. Siberiae orient.

**Agrotis Insignata** var. (ab?) **Pallescens.** Alae anticae dilute cervinae, strigis transversis prope basi et ante medium, interruptis, tenuis, postica deficiente maculis, leviter circumscriptis non obscurius expletis, alae posticae albicantes ♀ ae ante marginem magis infuscatis. Askhabad.

**Agrotis Herzi.** Minor. Antennae ♂ is breviter bipectinatae ♀ ae sparse ciliatae. Alae brevisculae, anticae dilute badiae, striga transversa antica undulata ante apicem incrassata maculaque reniformi grossa orbiculari rotundata, obscurioribus, ciliis rufescentibus; posticae nigricantes, foras lunulaque media magna obscuriores, ciliis grisescentibus. Long. alae ant. 12 mm. Scharud. Hyrcaniae.

**Agrotis Marcida.** Proxima A. Pachnobidi Stg. Alae anticae dilute rufescente-griseae, signatura fere aequat Pachnobidi, sed macula reniformis oblique posita, attenuata, umbraculaque media desunt, linea undulata distincta, basin versus fuscolimitata: posticae lutescente-griseae, ad marginem infuscatae, sine lunula media et striga post medium. ♂ ♀

Long. alae ant. 14—17 mm. Askhabad. Augusto.

**A. Marcens.** Affinis A. Heringi Chr. Thorax luteo-griseus. Alae anticae sordide luteae, fusco inspersae, praecipue inter strigas medias, quarum antica subcurvata, dentata, luteo-cinctas maculis ordinariis saepius obsoletis, orbiculari reniformi postice

excavata, luteo circumscriptis, linea undulata antemarginali lutescente, ciliis concoloribus; posticae albescente-griseae, foras infuscatae. ♂ ♀ Long. alae ant. 15—16 mm. Kasikoparan. Armeniae rossicae. Julio.

**Agrotis Sulcifera.** Thorax lutescente-grisens, scapulis rubicundo-fuscis Alae anticae rubicundo fuscae, venis costae, medianae et submediana, lineis inter alteras venas, maculisque orbiculari et renali lutescentibus, linea limbali fusco, ciliis lutescentibus, fusciscentis variis; posticae lutescente-griseae, foras leviter infuscatae, lunula media fusciscente. Long. alae ant. 13—13 mm. Kasikoparan. Julio.

**Agrotis Alpherakii.** Thorax rubicundo-fuscus, collare albo. Alae anticae rubicundo-fuscae, venis costalibus, mediana submediana et la albidis, maculis ordinariis brunnescentibus albide circumscriptis, macula conifera acuta brunnescente-grisea fusco limitata, striga antica deficiente, postica subsinuosa crenulata fusca striga umbrosa fusca ante limbum, punctis limbilibus nigris; posticae lutescente-griseae, lunula media inter venas et versus limbum obsolete fusciscentes. ♀ Long. alae ant. 17 mm. Imminet A. Skaramangae Alph. Julio. Kirusch. Daghestan.

**A. Carthalina.** Thorax brunneo-fuscus, collari fusco, scapulis albide-limitis. Antennae ♂ is bipectinatae. Alae anticae rufo-cinereae, in cellula media, macula coniformi striolisque cuneiformibus strigae posticae fuscae, costa, maculis, orbiculari semi rotundata vittaque inter venas, submedianam et lam lineaque undulata rufescente albidis; posticae lutescente griseae, striola media, fascia curvata in medio, limbali obsoletis fusciscentibus. 2 ♂ ♂ Exp. alae ant. 14 mm. Ad lacum Tabitzkhuri et ad Masram. Transcaucasiae.

**Mamestra Sabulorum** Alph. var. **Rhodina.** Alae anticae dilute-rosaceo-brunneae, maculis ordinariis dilutioribus distincte nigrofusco circumscriptis; posticae rufescente-griseae. ♂ Ordubad.

**Mam. Lupa.** Vicina M. Altaicae Ld. Antennae breviter pectinatae. Thorax grisens, collare scapulisque fusco strigatis. Alae anticae subacutae griseae, lutescente nubilosae, maculis ordinariis distincte fusco circumscriptis, coniforme: brunneo expleta, brevi, rotundata, strigis transversis, antica geminata, postica crenulata, maculis sagittatis lineae undulatae albiae, M formante maculisque costalibus nigrofuscis; posticae infuscatae, basin versus albicantes, fasciis duabus dimidiatis obsoletis obscurioribus.

Long. alae ant. 21 mm. 2 ♂ ♂ Schahküh, Hyrcaniae.

**Mam. Chrysozona** Bkh. var. **Humilis**. Var. minor, obscurior, fusco cinereo adumbrata, macula magna nubilosa albida in disco.

Long. alae ant. 9–12 mm. Borshom, Ordubad, Kasikoparan, Asia min.

**Hadena Farinulenta**. Had. Zetae Fr. proxima. Antennae ♂ is ciliatae. Alae anticae griseo lutescentes, dense fusco conspersae, strigis, maculis ordinariis punctisque costalibus ut in H. Zeta; subtus differt fasciis duabus obsoletis, media et antemarginali, obsoletis anticarum. Long. alae ant: 18 mm ♂ ♀ Kasikoparan.

**Rhiza Indigna** Chr. var. **Manifesta**. Alis anticis strigis maculisque disdinctioribus, ciliis fusco alternantibus. Eldar. Ordubad.

? **Leucania Lacteola**. Oculi hirsuti. Thorax et alae anticae subacutae albae; posticae nigricantes, ciliis albidis 1 ♀ Long. alae ant. 16 mm. Kasikoparan. Julio.

**Anarta Cordigera** Thnbg. var. **Carbonaria**. Alae anticae fere omnino nigrae macula reniforme angustiore; posticarum fascia marginali angustiori, subtus alae flavae, late nigro-marginatae. Vilui.

**Chariclea Vexilliger**. Capite, antennis, thorace pedibusque obscure ferrugineis. Palpis ochraceis. Alis anticis rufescente-ochraceis, strigarum antica angulosa fere in medio, postica obliqua subsinuosa, fuscis, spatio inter fascias plerumque violaceo-fusco, ad costam et limbum ferrugineo; posticis ochraceis, nervis infuscatis. Lunula fasciaque marginali fuscis, ciliis ochraceis. 1 ♀.

Long. alae ant. 16 mm. Krasnojarsk. Sibir. or. mer.

Nov. gen: **Metopoplus** Alph. i. l. \*) A. g. Mycteroplo H. S. cui proximum esse videtur, differt: fronte cornu cylindrico (apice concavo) velque lamina cornea, spatulata armata; tibiis anticis spina unguiformi robusta, terminatis, articulo primo tarsorum anticorum plus quam duplo longiore, antennisque breve ciliatis.

**Metopoplus Fixseni**. Proxima (Clidiae) Excelsa Chr. quae etiam hujus generis est. Thorax et alae anticae dilute straminei, strigarum antica curvata, dentata, postica geminata, area basali pro parte ochraceo-fusco expleta, inter strigas umbracula ochracea, in area antemarginali post strigam et ei adjacentibus duabus maculis dentatis, saepe junctis lineae limbali. brunnescentibus, ciliis brunneo-maculatis; posticae lutescentes, striga et

\*) Illustrissimus entomologus. Dom. Alpheraki jam prius examinavit hoc genus novum et concedit mihi ejus publicationem.

fascia ante limbum dilute fuscescentibus. Long. alae ant. 17 mm. Achal Tekke. ♂♀. Pul-i-Hatum. Tekke.

**Thalpochares Caduca.** Alis anticis dilute rosaceo-griseis, foras ciliisque ochraceis, strigis ambabus maculaque discocellulari obsoletissimis rosaceo-cinereis; posticis lutescente-griseis, extus vix obscuratis. ♀ Long. alae ant. 12 mm. Ordubad. Majo.

**Th: Transmittens.** Persimilis Th. Mundae Chr. Alae anticae, apice acuto, cretaceae, minori dimidio externo glauco, striga in medio recta perpendiculari brunnea, punctis disci nigris, uno non longe a basi altera ad strigam, lineis duabus undulatis albidis antelimbilibus, ciliis albidis, brunneo maculatis; posticae nigricantes basin-versus albicantes. ♂ Long. alae ant. 10—12 mm. Kasikoparan. Julio.

**Palpangula Fricata.** Subsimilis P. Fractistrigatae Alph. Thorax albide-griseus, scapulis fusco-striatis. Alae anticae rufescente albidae (griseae) foras et in disco brunnescentes, vitta lata e basi postice dilatata, linea acute dentata ex apice, foras albide-cincta, macula discocellulari, striola ante medium punctis tribus costae, limbilibusque nigrofuscis; posticae dilute ochraceae, post medium fascia et postice ei cohaerente macula fuscis; subtus lutes ante-albidae, ciliis anticarum fusco-alternantibus posticae maculis duabus obsoletis versus angulum analem. ♂♀. Long alae ant. 12 mm. Askhabad.

Nov. gen: **Micromania** Alph.\*) Inter gen: Mania Tr. et gen. Zethes Ramb. ponendum. A. g. Mania differt statura parva, articulo terminali palporum multo longiori (praecipue in ♂e) pedibusque multo gracilioribus.

**M. Turcomanica.** Alae latae, anticae apice acuto, thoraci concolores griseo-fuscae, strigis duabus mediis, antica triente primo marginis anterioris curvata, altera post medium subsinosa, foras lutescente-cincta linea submarginali undulata, obtuse-dentata, infracta, postice lutescente limita, maculaque renali circumscripta, nigro-fuscis, spatio medio plus minusve superiorique dimidio, inter strigam posticam et lineam ante-marginalem fusco-expletis, limbo crenulato nigro, ciliorum basi lutescenti; posticae fuscae, striga media subrecta fusca, subtus fusco cinereae, puncto medio strigaque postmedium, anticarum obsoleta, posticarum distinctiori, fuscis. ♂♀ Long alae ant. 15—17 mm. Askhabad. Aidere. Julio.

! **Pseudophia Terrulenta.** Frons pustulosa, caput, thorax et alae anticae fuscescente-cinereae, strigis ambabus fuscis, antica obliqua subdentata, postica sinuosa, bis-obtuse angulata,

\*) Etiam hoc genus Dom. Alpheraki posuit.



infra lutescente-cinereo limitata, linea undulata acuto-dentata albida, spatio inter eam et strigam obscurius impleto cum striolis nonnullis sagittatis, limitantibus lineam undulatam, limbo crenulato fusco, maculis ordinariis, orbiculari parva albida reniformi procerâ, fusco-circumscriptis. ♂ ♀ Long. alae ant. 14 mm. Helenendorf. Eldar. Transcaucas. Volat Majo, Julio.

**Catephia Alchymista** Schiff. ab. **Varia.** Alis anticis virescente griseis lineis transversis nigris distinctissimis ad lineam undulatam serie macularum brunnescentium. Sarepta.

**Catocala Scortum.** Alae anticae rufescente-griseae virescente griseo nubilosae, vitta lata oriente basi, ad costam desinente tricuspidata ante medium, vitta supra angulum analem strigae postica, longe et acute dentata, nigrofusca, macula renali dilutiori, fusco circumscripta, subter qua inter duas cuspides vittae basalis incubita macula lutescente grisea posticae aurantiacae, fasciis, media in vena 2 leviter infracta, marginem inferiorem non-attingente, terminali latiori maculaque anali interdum cohaerente fasciae, nigris. Thorax rufescente griseus, collari nigrofusco limitato. ♂ ♀ Long. alae ant. ♂ is 33, ♀ ae 35 mm. Sidemi. Amur.

**Spintherops Dilucida** Hb. var. **Subfusca.** Alae anticae ochraceae, strigis distinctis incrassatis, macula discocellulari areaque terminali fere totum fuscis; posticae ante limbum fasciaeque media obsoleta infuscaetae. ♀ Germob. Tekke. Ordubad.

**Herminia Proxima.** Fere aequat H. Crinali Frr., sed striga antelimbalis bifracta est (non recta), intus distincte et late fusco limitata. 2 ♂ ♂. Ordubad.

**Acidalia Descitaria.** Ad Longariam ponenda. Alae elongatae, subcutae lutescente-griseae, fusco-conspersae, anticae strigis duabus transversis, antica subcurvata, postica subangulosa, dentata, punctis: discocellulari interdum deficiente, marginalibusque fuscis, ciliis concoloribus, posticae puncto medio strigaeque post medium biangulata, dentata, fuscis. Long. alae ant. 9—10 mm.

Occurrit circa Sareptam. Guberli. Ural. Taganrog. Askhabad. Kuldsha. Majo, Julio.

**Acidalia Divisaria.** Alae anticae dilute-flavae, strigis duabus mediis, fasciam latam formantibus, antica obsoleta subcurvata, postica distincta, incrassata, sinuata, puncto discocellulari, punctisque limbilibus nigrofuscis; ante marginem posticum lineis duabus plus minusve obsoletis, denticulatis geminatis brunnescentibus; posticae lutescentes, striga media subrecta biundulata punctisque marginalibus fuscis. ♂ ♀.

Long. alae ant. 9—13 mm. Guberli. Volat Majo.

**Rumia Niko.** Alae flavae, anticae area basali obtuse bidentata limitata, postica infra dentata, et posticarum minori dimidio externo ferrugineo-fuscis, lunula media albida, fusco-circumscripta, costa ciliisque ferrugineis. ♀.

Long. alae ant. 21 mm. Swanetia. Julio.

**Macaria Liturata** var. **Pressaria.** Minor, obscurior, strigis transversalibus crassioribus, fulvo tantum non multo ante apicem. Vilui, Albasin. Amur sept.

**Hemerophila Scalaria.** Alae anticae elongatae subcutae, griseo-flavescentes, striolis sparsis rufescente-griseis, strigis duabus oblique positis, antica in vena submediana dentata, postica subrecta, obtuse dentata, nigris, puncto disco-cellulari lineaque undulata fuscis; posticae dilutiores, puncto medio strigaque post medium leviter infracta, umbracula ante limbum undulatum fuscum, ciliis omnium lutescentibus. 2 ♂ ♀. Long. alae ant. 20 mm. Helenendorf. Transcaucas.

**Phasiane Irrorata.** Alae albae, dense fusco-irroratae, anticae extus griseae, strigis; antica subcurvata, postica sinuata, brunnescentibus, macula media albide pupillata, linea undulata non distincta albida; posticae puncto medio strigaque subrecta post medium fuscis, ciliis concoloribus. ♀. Long. alae ant. 13 mm. Vilui.

**Atomophora Punctistrigaria.** Alae anticae albae plus-minusve fusco-conspersae, seriebus tribus macularum transversarum striolaque brevi ex apice, fuscis; posticae grisescentes; extus infuscatae, margine interiori maculis duabus fuscis. Long. alae ant. 8—11 mm. Askhabad.

**Cidaria Caesiata** L. var. **Impallescens.** Minor. Alis angustioribus, anticis albidis, dense fusco-conspersis, lineis transversis undulatis minus expressis. Kurusch. Caucas. Julio.

**Cidaria Propagata.** Inter C. Thophaeatam Hb. et Senectariam HS. ponenda.

Alae anticae griseae, dense fusco-conspersae, fascia media obscurius expleta, strigis tribus fuscis, striga basali curvata, denticulata, antica fasciae mediae subcurvata, denticulata, postica sinuata, angulata; linea undulata obsoleta fuscescente, punctis marginalibus nigris, ciliis lutescentibus, cinereo-variis; posticae fuscescentes fascia media obscuriori obsoleta angulosa ♂ ♀ Long. alae ant. 16 mm.

Hab. Transcaucaso ad Lagodechi et Nuchur. Tekke.

**C. Milvaria.** Proxima C. Uniformatae Bell.

Alae albide-griseae, anticae lutescente-admixtae, dense adspersae atomis fuscis, striga prope basi curvata, altera ante

medium subcurvata, altera postica sinuata, denticulata, fere tantum significatis punctis fuscis in venis, linea undulata albida paralella margini externo; posticae albide-griseae, plus minusve fusco adpersae, strigis tribus dimidiatis brunnescentibus, ciliis grisescentibus.

Long. alae ant. ♀ is 12, ♀ ae 16 mm. Ordubad.

**C. Intermediaria** Alph. var. **Muscosaria**. Differt: Alis anticis obscurioribus viride-fuscis, serieque punctorum albidorum adjacentium strigae posticae. Caucasus, Kasbek ♀.

**Cidaria Percandidata**. Simillima C. Candidatae Schiff.

Alae candidae, anticae strigis (interdum deficientibus) obsolete ochraceis; subtus albae, solum ad costam, initio strigarum, punctoque medio fuscescentibus.

Long. alae ant. 8—10 mm Habitat. Transcaucaso ad Nucham, Lagodechi, Sakatala, Borshom etc.

**Hypotia Guttosalis**. Proxima H. Speciosa Chr.

Alae anticae griseo-lutescentes, vitta e basi biarcuata; striga oriente non longe ab apice, paralella margini postico, tridentata, valde inflexa ante angulum interiorem maculisque tribus, antica subquadrangulari, posita in excavationem vittae, altera ovata post medium non longe a costa adjacente puncto fusco, tertia ad costam prope apicem, albis; ciliis lutescentibus. albo variis; posticae lutescente-griseae. ♀.

Long. alae ant. 12—16 mm. Pul-i-Hatum. Tekke.

**Aglossa Simplicialis**. Alae anticae cinereo-cupreae; posticae lutescente-griseae, foras leviter infusatae, ciliorum grisescentium basi lutescente.

Long. alae ant. 13—17 mm. Schahrud.

**Asopia Kacheticalis**. Asopiae Regali Schiff. proxima. Minor. Alae anticae angustiores, striga antica argentea attenuata, terminante in marginem interiorem, posticae area basali purpureo-fusca inde margine externo purpureo-fusco ♂ is albicante, ♀ ae brunnescente.

Long. alae ant. 7—8 mm. Eldar, Munganli. Transcaucas.

**Endotricha Ragonoti**. Differt ab End. Flammeaei: thorace longe piloso, puncto medio fusco distinctiori, alae anticae punctis limbalibus nigris, ciliis lutescentibus divisim linea purpureo-fusca non interrupta; subtus brunneo-lutescentes, anticarum linea transversa postica albida, dentata, posticarum fascia media dentata utrimque fusco-limitata.

Long. alae ant. 11 mm. Montes Tianchan.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Christoph Hugo Theodor

Artikel/Article: [Lepidoptera Nova Faunae Palaearcticae 86-96](#)