



Der in Worten des Buchstaben
ist die Reihenfolge der Buchstaben nicht
unregelmäßig geworden, so folgen sie
einander

XV , XVI , XVII

Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von Jacob Sturm,

der Königl. botan. Gesellschaft in Regensburg, der Societät der Forst- und Jagdkunde zu Dreißigacker, der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der naturhistorischen Gesellschaft in Halle, der kaiserl. Moskovischen Gesellschaft der Naturforscher, der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der pharmaceutischen Gesellschaft zu St. Petersburg, des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschlande, des Maclurian Lyceums zu Philadelphia, des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, der naturforschenden Gesellschaft des Oesterlandes zu Altenburg, der Linné'schen Gesellschaft zu Stockholm, der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt am Main, und des entomologischen Vereins zu Stettin correspondirendem oder Ehrenmitgliede.

V. Abtheilung. Die Insecten. Fünfzehntes Bändchen. Käfer.

Mit 16 illuminirten Kupfertafeln.

Nürnberg, 1844.
Gedruckt auf Kosten des Verfassers.
(Panierstrasse S. Nr. 709.)

Deutschlands I n s e c t e n.

Von
Jacob Sturm,

der Königl. botan. Gesellschaft in Regensburg, der Societät der Forst- und Jagdkunde zu Dreißigacker, der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, der naturhistorischen Gesellschaft zu Halle, der kaiserl. Woskowsischen Gesellschaft der Naturforscher, der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der pharmaceutischen Gesellschaft zu St. Petersburg, des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschlande, des Maelurian Lyceums zu Philadelphia, des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, der naturforschenden Gesellschaft des Osterreiches zu Altenburg, der Linné'schen Gesellschaft zu Stockholm, der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt am Main, und des entomologischen Vereins zu Stettin correspondirendem oder Ehrenmitgliede.

XV. B ä n d c h e n.

K ä f e r.

Mit 16 illuminirten Kupfertafeln.

Nürnberg, 1844.

Gedruckt auf Kosten des Verfassers.

(Panierstraße S. Nr. 709.)

CXIX. Blumenknopfkäfer.

CERCUS. *)

Tab. CCLXXXVIII.

Gattungszeichen.

Die Fühler elfgliederig: das Wurzelglied dick und lang, walzenförmig, das zweite nur halb so lang und wenig dünner, die sechs folgenden klein: die drei ersten länglich-walzig, die drei folgenden kürzer, rundlich, die drei Endglieder groß, durchbohrt, einen länglichen Knopf bildend. (Fig. c. C.)

Die Lefze pergamentartig, breit, leicht ausgerandet, gewimpert. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, an der Wurzel breit, vorn in eine scharfe, etwas gebogene Spitze übergehend. (Fig. E.)

*) *Cercus*. Latr. Gen. Crust. et Insect. 2. p. 14. —
Erichson in Germar Zeitschr. für die Entomologie.
4. p. 228.

Die Kinnladen am Stamme hornartig, die äußere Lade schmal, linienförmig, mit einem Büschelchen von Haaren; die innere Lade mit einer hakenförmigen Spitze, und einem Bart über derselben. (Fig. F.)

Die Zunge klein, hornartig, herzförmig ausgeschlitten, an jeder Vorderecke mit einem vortretenden Hautzipfel. (Fig. G.)

Die Lippe hornartig, breit. (Fig. H.)

Die Kinnladentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite und dritte länglich-walzenförmig, das Endglied länglich-eiförmig. (Fig. I.)

Die Zungentaster dreigliederig: die zwei ersten Glieder kurz, walzig, das Endglied groß, eiförmig. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper ist stumpf-eiförmig, gewölbt (Fig. A.). Der Kopf (Fig. B.) breit, vorgestreckt, gesenkt. Die Augen an den Seiten klein, kugelig, stark nebartig, schwarz. Die Lefze klein. Die

Kinnbacken nur zum Theil sichtbar. Die Fühler (Fig. C. Mas. Fig. D. Fem.) sind länger, als der Kopf; die zwei ersten Glieder sind größer, als die folgenden sechs sehr kleinen Glieder, die drei letzten wieder groß, einen länglichen Knopf bildend. Bisweilen sind sie nach dem Geschlechte verschieden, wie bei *Cercus pedicularius* L. und *Cercus bipustulatus* F. Das Halschild ist so breit, wie die Deckshilde, und etwa nur halb so lang, wie breit, stark gewölbt, die Seiten, besonders in den Borderecken stark herabgezogen, daher es von oben betrachtet vorn verengt erscheint; sie sind fein gerandet, und hinten mehr oder weniger in einen stumpfen Winkel übergehend. Der Borderrand macht einen leichten Bogen; der Hinterrand ist gerade, und in der Mitte sehr leicht ausgeschnitten, und mehr oder weniger an den Borderrand der Deckshilde angegeschlossen. Das Rückenschildchen (Fig. L.) ist ziemlich groß, breit und stumpf-dreieckig. Die Flügeldecken sind länglich, gleichweit, in der Mitte etwas bauchig, hinten von außen nach innen etwas schief und rundlich abgestumpft, auf dem Rücken gewölbt, und kürzer, als der Hinterleib, von welchem sie nur die drei oder vier ersten Hinterleibssegmente bedecken, und zwei zarte, weiße, mit sehr feinen Nerven versehene Flügel unter sich verbergen (Fig. m. M.)

Die Beine (Fig. N. ein vorderes, O. ein hinteres Bein) sind kräftig, die Schenkel ziemlich dick, walzig, etwas gedrückt, die Schienen lang, an der Wurzel dünne, gegen die Spitze fast dreieckig erweitert, zusammengedrückt, mit kleinen Enddornen; die Füße haben die drei ersten Glieder erweitert, das dritte herzförmig, das vierte sehr klein, alle unten mit langen dichten Haaren besetzt, das Klauenglied lang, mit einfachen oder gezähnten Klauen.

Die Arten lassen sich in zwei Gruppen theilen:

- a) die drei ersten Hinterleibssegmente von den Flügeldecken bedeckt:

Cercus pedicularius. Latr.

bipustulatus. F.

- b) Die vier ersten Hinterleibssegmente bedeckt:

Cercus Sambuci. Märk.

Dalmatinus. Dej.

rusilabris. Latr.

Es sind kleine Käferchen, die man im Frühjahr auf Obstblüthen, und während des Sommers auch noch auf verschiedenen blühenden Pflanzen, vorzüglich gerne auf dem Hollunder (*Sambucus*), der Spierstaude (*Spirea*), der Brennessel und andern oft häufig antrifft.

* 1. Läusekraut=Blumenknospfläfer.

C. pedicularius.

Tab. CCLXXXVIII.

Hell-rosth, weichhaarig, grob, und locker-punktirt; einfarbig, oder das Rückenschild und ein gemeinschaftlicher Fleck um dasselbe auf den Deck-schilden schwärzlich.

Länge 1 Linie.

Männchen: die zwei ersten Glieder der Fühler groß.

Weibchen: die Fühler dünn, einfach.

Cercus pedicularius. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 228.

Cercus pedicularius. *Latr. Gen. Crust. et Ins.* II. p. 16. 4.

Dermestes pedicularius. *Linn. Fn. Suec.* p. 434.

— *Fabr. S. El.* 1. 319. 43. — *Panz. Fn.* 7. 5.

Cateretes pedicularius. *Illig. Käf. Pr.* p. 395.

3. — *Heer, Fn. Col. Helv.* 1. p. 414. 12.

Catheretes pedicularius. *Gyllenh. Ins. Suec.* 1. p. 249.

Kateretes pedicularius. *Herbst. Käf.* 5. p. 12. 1. t. 45. f. 1.

Brachypterus pedic. *Schneider Mag.* 5. p. 561. 1.

Silpha unicolor. *Marsh. Ent. Br.* 1. p. 127,
37 et similis No. 38.

Anisocera Spireae. *Steph. Illustr.* V. p. 438.

Anomococera Spireae. *Schuck. Coleopt. Delin.*
p. 25. t. 30. f. 2.

Man trifft ihn den ganzen Sommer auf blühenden Gewächsen, oft in zahlreicher Gesellschaft, an.

Das ganze Käferchen hat eine hell-roströthliche Farbe, und gewöhnlich sind die Deckshilde etwas heller. Kopf, Halschild und Flügeldecken sind mit weißlich-gelben, feinen, anliegenden Härchen dünne überkleidet. Der Kopf ist breit, stumpf, gewölbt und stark dicht-punktirt. Die Augen schwarz, wenig vortretend. Die Fühler so lang, wie die Breite des Halschildes, stark, und zeichnen sich besonders bei dem Männchen, durch das sehr große erste und zweite Glied aus (Tab. 288. Fig. A. u. C.). Das Halschild ist ganz so breit, wie die Deckshilde, aber etwa nur halb so lang, gewölbt, durch die stark herabgezogenen Vorderwinkel vorn scheinbar etwas enger, die Hinterwinkel breit-abgestumpft; die ganze Oberfläche stark, aber nicht sehr dicht punktirt. Das Rückenschild ist groß, stumpf-dreieckig, und grob-punktirt gewöhnlich schwarzbraun. Die Flügeldecken sind länglich, gleichweit, in der Mitte etwas bauchig, auf dem

Rücken gewölbt, noch stärker und lockerer, als das Halschild punktirt, an der Spitze breit-abgestumpft, kürzer, als der Hinterleib, dessen drei erste Segmente sie nur bedecken; an der Basis verbreitet sich ein gemeinschaftlicher schwarzbrauner Flecken, der das Rückenschild umschließt, und bis in die Hälfte der Naht verloren herabzieht, welcher aber auch sehr oft fehlt. Die Brust und der Bauch sind, bis auf den After, schwarz, fein-punktirt. Die Beine roströthlich.

Das Weibchen unterscheidet sich nur durch die dünnern Fühler, deren erstes und zweites Glied nur wenig verdickt ist, auch die drei letzten Glieder einen viel dünneren Knopf bilden.

2. Zweitropfiger Blumenknopfkäfer.

C. bipustulatus.

Tab. CCLXXXIX. Fig. a. A. Männchen.

b. Ein Fühler des Weibchens.

Schwarz, weichhaarig, grob punktirt, der Mund, die Fühler, die Beine und ein großer Flecken auf der Mitte der Flügeldecken gelblich=roth.

Länge 1 bis $1\frac{1}{2}$ Linie.

Männchen: die Fühler lang, das erste und zweite Glied groß.

Weibchen: die Fühler dünn und einfach.

Cercus bipustulatus. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 229.

Dermostes bipustulatus. *Payk. Fn. Suec.* 1. p. 286. 11. *Fabr. S. El.* 1. p. 320. 46.

Cateretes bipustulatus. *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 248. *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 412. 6.

Cercus bipust. *Zetterst. Ins. Lupp.* p. 104. 2.

In Oesterreich.

Er ändert in der Größe etwas ab, hat aber sonst ganz die Gestalt des vorigen. Die Hauptfarbe ist schwarz, glänzend, und die ganze Oberseite des Körpers mit feinen, anliegenden gelblichen, glänzenden Härchen dünne bekleidet. Der Kopf wie bei dem vorigen, aber minder gewölbt, der Mund röthlich-gelb, welche Farbe auch öfter einen Theil des Vorderkopfes einnimmt, übrigens grob, nicht sehr dicht punktiert. Die Augen schwarz und etwas vorstehend. Die Fühler sind röthlich-gelb, bei dem Männchen länger und dünner, als bei dem vorigen, die zwei ersten Glieder auch beträchtlich, aber doch minder groß, als bei diesem, das Wurzelglied ist stark aufgetrieben, das zweite Glied beträchtlich kleiner. Das Halschild ist vorn etwas mehr verengt, als bei

C. pedicularius, und die Hinterwinkel noch stärker schief-abgerundet, die ganze Oberfläche viel gröber und fast noch lockerer punktiert. Das Rückenschild, wie bei dem vorigen. Die Flügeldecken schwarz, länglich, gleichweit, die Seiten sehr wenig gerundet, daher an der Spitze fast ganz gerade abgestumpft, oben gleich und mäßig gewölbt, eben so grob wie das Halschild, und eben so locker punktiert. Auf der Mitte stehet ein fast dreiwinkliger gelbrother Flecken, der bisweilen sich mehr ausdehnet, so daß nur die Gegend um das Rückenschild und der Syngenrand noch unberührt bleibt. Sie lassen, wie bei dem vorigen, nur die zwei letzten Hinterleibssegmente unbedeckt. Der ganze Unterleib ist schwarz, punktiert, und mit zarten Härchen dünne bekleidet. Die Beine sind röthlich-gelb.

Das Weibchen gleicht dem Männchen ganz, und ist nur in den dünneren und einfachen Fühlern von demselben unterschieden.

3. Hollunder-Blumenknospkäfer.

C. Sambuci.

Tab. CCLXXXIX. Fig. c. C.

Rostbröthlich, weichhaarig, fein und dicht punktiert; die Fühler und

Seine röthlich=gelb; Augen, Brust und Bauch schwarz; das Halschild in der Mitte leicht erweitert, die Hinterwinkel spitzig.

Länge 1 Linie.

Cercus Sambuci. Märkel. Germ. Zeitschr. 4. p. 229.

Cercus bicolor. Sturm. Cat. 1826. p. 113.

Mas. Cateretes Solani. Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 412. 7.

Fem. Cat. scutellaris. Heer. l. c. p. 412. 8.

Auf den Blüthen des Hollunders (*Sambucus*), und auch andern blühenden Gewächsen in mehreren Gegenden Deutschlands. Herr Cantor Märkel in St. Wehlen hat ihn zuerst entdeckt und unter obigen Namen vertheilt.

An Größe und Gestalt ist er den beiden vorigen, mit einigen Abweichungen, ähnlich. Die Farbe ist etwas schmutzig=roströthlich, matt=glänzend, mit sehr feinen, anliegenden, weiß=gelblichen Härchen dünne überkleidet. Der Kopf ist breit, stumpf, die Stirn flach, die Augen schwarz, die Fühler röthlich=gelb, die drei letzten Glieder einen länglichen birnförmigen Knopf bildend, indem das zweite Glied größer und breiter, als das erste, und das Endglied

rundlich-eiförmig zugespitzt ist, und alle gedrängt aneinander stehen. Das Halschild ist quer, nicht ganz so breit als die Deckshilde, und fast nur halb so lang, wie breit, der Vorder- und Hinterrand fast gerade, die Seiten gerundet, und vor der Mitte fast in einen stumpfen Winkel vortretend, so daß sie vorn und hinten etwas eingezogen erscheinen, und die Hinterwinkel gerade und spitzig sind; an den Seiten fein gerandet, oben gewölbt, und sehr fein und dicht punktiert. Das Rückenschild ist mäßig groß, kurz, stumpf-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, die Seiten nur wenig gerundet, hinten abgestumpft, und wenig kürzer, als der Hinterleib, so daß nur der After unbedeckt bleibt. Sie sind hinter der Mitte des Rückens gewölbt, fein und nur etwas lockerer, als das Halschild punktiert. Der Hals, die Brust und der Bauch sind schwarz, das letzte Hinterleibssegment und der After sind roströthlich, fein punktiert und dünn behaart. Die Beine sind hellroströthlich, die Füße unten mit weißlichen Härchen gepolstert.

Bei einer Abänderung ist die Stirn, das Rückenschild und die Naht schwärzlich angelauten.

4. Dalmatischer Blumenknospkäfer.

C. dalmatinus.

Tab. CCLXXXIX. Fig. d. D.

Rostroth, die Deckschilde, Fühler und Beine heller, weichhaarig, starklockerpunktirt; das Halschild vorn verengt, die Hinterwinkel abgerundet; das Rückenschild und die Naht der Deckschilde schwärzlich.

Länge 1 Linie.

Cercus Dalmatinus. *Dej. Cat. ed. 3. p. 137. —*
Germ. Zeitschr. 4. p. 229.

In Dalmatien, auch bei Triest.

Er hat Aehnlichkeit mit dem Weibchen des C. bipustulatus F., aber Kopf und Halschild sind rostroth, die Deckschilde mehr gelblich-roth. Der Kopf ist stark- und dicht punktirt, die Augen schwarz. Die Fühler sind fast etwas länger, als das Halschild, rostrothlich, das Wurzelglied nur mäßig größer und dicker, als die übrigen, die drei letzten größeren Glieder gleich, einen länglichen Knopf bildend. Das Halschild ist hinten vollkommen so breit wie die

Deckshilde, aber nach vorn verengt, stark gewölbt, der Borderrand leicht bogenförmig gerundet, der Hinterrand gerade, in der Mitte kaum merklich ausgeschnitten, die Hinterwinkel breit abgerundet, die Seiten fein gerandet, und nach hinten gerundet; die ganze Oberfläche stark- und nicht sehr dicht punktiert. Das Rückenschild groß, sehr stumpf-dreieckig, stark punktiert, schwarz. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, die Seiten kaum merklich gerundet, hinten gerade abgestumpft, und nur den After unbedeckt lassend, nur mäßig und besonders gegen die Spitze gewölbt, und stark, aber etwas minder dicht, als das Halschild punktiert; die Naht gegen die Spitze verloren, und um das Rückenschild ausgedehnt schwarz, auch verbreitet sich bisweilen ein breiter schwärzlicher Schatten an dem Spitzurande, wodurch die Grundfarbe gleich einem ausgebreiteten Flecken hervortritt. Die ganze Unterseite des Körpers ist schwarz, die Afterdecke jedoch gewöhnlich roströthlich. Die Beine hell-rostroth.

5. Rothlefiger Blumenknopfläfer.

C. rufilabris.

Tab. CCLXXXIX. Fig. e. E.

Schwarz, glänzend, weichhaarig,

kräftig = punktiert; der Mund, die Fühler, der Spitzenrand der Flügeldecken und die Beine roströthlich; das Halschild fast so lang wie breit, vorn etwas verengt, die Hinterwinkel stumpf.

Länge kaum eine Linie.

Cercus rufilabris. *Latr. Gen. Crust. et Ins.* 2. p. 16. 3. — *Germ. Zeitschr.* 4. p. 229.

Cateretes rufilabris. *Steph.* III. III. p. 54. 8.
Cat. Junci. *Steph.* III. III. p. 54. 9.

Cat. Caricis. *Steph.* III. III. p. 54. 10.

Cat. rubicundus. *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 411. 4.

Abänderung röthlich = gelb.

Cateretes pallidus. *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 411. 5.

Bei Berlin; auch bei Triest.

Er ist etwas kleiner, als die vorigen, schmaler, gleichbreit, gewölbt, fast walzenförmig. In der Farbe veränderlich, gewöhnlich schwarz, oder in das Rostbraune übergehend, auch roströthlich, oder noch heller, fast röthlich-gelb. Die ganze Oberseite ist mit anliegenden Härchen dünne überkleidet. Der Kopf ist

breit, stumpf-eiförmig, dicht punktiert, die Lefze, selbst bei allen Abänderungen in der Farbe, röthlich-gelb. Die Augen beständig schwarz. Die Fühler sind kaum so lang, wie das Halschild, roströthlich; das Wurzelglied nur wenig größer und dicker, als die folgenden; nur die drei letzten Glieder sind größer, gleich, einen länglichen Knopf bildend. Das Halschild ist genau so breit, wie die Deckshilde, doch nach vorn deutlich verengt, und wenig kürzer, als breit, gewölbt, und kräftig-, doch nicht sehr dicht punktiert. Der Vorderrand ist leicht gerundet, der Hinterrand gerade, die Seiten gerundet, die Hinterwinkel stumpf. Das Rückenschild stumpf-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, die Seiten gerade, hinten gerade abgestumpft, und wie das Halschild kräftig-punktiert; der Spitzenrand meist schmal rothbraun durchscheinend. Sie lassen nur den After unbedeckt, welcher bisweilen auch bei schwarzen Individuen rothbraun ist. Die Unterseite des Körpers ist schwarz, nur der After rothbraun. Die Beine roströthlich.

CXX. Kurzknopfläfer.

BRACHYPTERUS.*)

Tab. CCXC.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das Wurzelglied länglich, größer und dicker, als das zweite Glied, welches auch noch größer, als die folgenden sechs kleinen, rundlichen und gleichen Glieder ist; die drei letzten Glieder groß, das erste und zweite fast gleich, das Endglied größer und rundlich. (Fig. D.)

Die Lefze hornartig, klein, leicht ausgerandet. (Fig. E.)

Die Kinnbacken hornartig, in eine scharfe Spitze ausgehend. (Fig. F.)

Die Kinnladen am Stamme hornartig; die äußere Lade schmal, einfach, die innere

*) Brachypterus. *Kugeln* Schneid. Magaz. p. 560. —
Erichson in Germar Zeitschr. für die Entomologie.
4. p. 230.

Lade über der hakenförmigen Spitze ohne Bart.
(Fig. G.)

Die Zunge hornartig, schmal, leicht ausgerandet, mit einem häutigen, zugespitzten, kleinen, nicht über die Zunge vortretenden Seitenlappen. (Fig. H.)

Die Lippe hornartig, breit=viereckig, kurz.
(Fig. I.)

Die Kinnladentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite länglich, vorn etwas erweitert, das dritte etwas größer und breiter, das Endglied länglich, dünn, walzenförmig. (Fig. K.)

Die Zungentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite größer, kurz und breit, das Endglied aufgetrieben, fast kugelförmig. (Fig. L.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper ist länglich=eiförmig, gewölbt (Fig. A. B.) Der Kopf (Fig. C.) ist klein, stumpf, wenig

vorgestreckt, stark gesenkt. Die Augen sind klein, kugelig, nebartig. Die Lefze klein, kurz. Die Kinbacken wenig sichtbar. Die Fühler ziemlich kurz, die beiden ersten Glieder etwas verdickt, die drei letzten größer, einen länglichen Knopf bildend. Das Halschild ist bald so breit, wie die Deckschilde, bald etwas schmaler, quer, vorn etwas verschmälert, mehr oder weniger gewölbt, die Hinterwinkel herabgezogen, spizig oder stumpf; der Borderrand ist in einen leichten Bogen gerundet, der Hinterrand leicht ausgeschweift, und mit demselben der Basis der Deckschilde angeschlossen. Das Rückenschild (Fig. M.) ist groß, abgerundet oder dreiwinkelig. Die Flügeldecken sind abgekürzt, länglich, gleichweit, hinten gerade abgestumpft, leicht gewölbt, sie bedecken nur die ersten drei oder vier Hinterleibssegmente, und verbergen zwei unter sie eingeschlagene weiße, zarte, mit wenig Geäder versehene Flügel. (Fig. n. N.) Die Beine (Fig. O. ein vorderes, P. ein hinteres Bein) sind stark, die Schenkel wenig verdickt, walzenförmig, etwas gedrückt; die Schienen an der Wurzel dünn, gegen die Spitze erweitert, zusammengedrückt; die drei ersten Glieder der Füße kurz, etwas erweitert, das dritte ausgebuchtet, das vierte sehr klein, das Klauenglied fast so lang, wie die übrigen zusammen genommen; die Klauen an der Wurzel mit einem Zahn.

Das erste Segment des Hinterleibs ist so lang, wie die beiden folgenden zusammengenommen, das zweite und dritte also sehr kurz, das vierte und fünfte größer, als die übrigen. Bei den Männchen ist noch ein kleines sechstes Segment zu bemerken, wodurch sich diese Gattung von der vorigen noch besonders unterscheidet.

Diese Käferchen sind im Habitus und Lebensart denen der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber durch die angegebenen Charaktere von ihnen unterschieden.

1. Quadratischer Kurzknopffläfer.

B. quadratus.

Tab. CCXC. Fig. a. A.

Graulichschwarz, matt, dicht punk-
tirt, und mit mausgrauen Härchen
dünn bekleidet; das Halschild quer,
die Seiten vortretend gerundet; das
Rückenschild länglich, stumpf; die Flü-
geldecken kurz, fast viereckig, abge-
stutzt.

Länge 2, Breite $1\frac{1}{3}$ Linie.

Brachypterus quadratus. *Germ. Zeitschr.* 4.
p. 230.

Cercus quadratus. Koy. Creutzer *).

In Oesterreich.

Der ehemalige königl. ungar. Hofkammer-Zahlamts-Officier Tobias Koy in Ofen hat ihn zuerst in Ungarn entdeckt, und Dahl ihn später auch in Oesterreich gefunden.

In Größe und Gestalt ausgezeichnet; überall von gräulich-schwarzer Farbe, nur mit einem matten Glanze begabt, der durch einen Ueberzug von feinen, anliegenden mausgrauen Härchen noch mehr gedämpft wird. Der Kopf ist breit, dreieckig, stark und dicht punktiert. Die Augen kugelig, etwas vorstehend, dunkel-purpurroth. Die Fühler sind dünn und kaum so lang, wie das Halschild, schwarz; der aus den drei letzten größern Gliedern gebildete längliche Knopf mit aschgrauen Härchen überzogen. Das Halschild ist breiter, als lang, gewölbt, die Seiten vorn und hinten eingezogen und dadurch in der Mitte stark vortretend abgerundet, die Hinterwinkel in den abgerundeten -Hinterrand übergehend, der Vorderrand, fast gerade, die Vorderwinkel stumpf gerundet; oben stark und dicht punktiert, der feine Haarüberzug in den

*) Auf der Kupfertafel steht irrthümlich *Brachypterus quadratus Dejean* statt *Koy*.

Vorderwinkeln und an den Seitenrändern zusammengebrängt und weißlich glänzend; die Seiten mit einem feinen Rändchen, und in dem vortretenden Winkel mit einem Beulchen versehen. Das Rückenschild ist länglich, gleichbreit, an der Spitze abgerundet und stark punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, hinten abgestutzt, und beide zusammen genommen fast ein Viereck bildend, von dem hinten kegelförmig zugespitzten Hinterleib, die zwei letzten Segmente unbedeckt lassend. Sie sind leicht gewölbt, vor dem Hinterrand quer niedergedrückt, und außer der vorstehenden Schulterbeule, eben, stark, doch etwas lockerer, als das Halschild punktiert; die an den Seiten gedrängter stehenden Härchen ein weißlich glänzendes Rändchen bildend. Die beiden unbedeckten Hinterleibsegmente sind walzig, dicht punktiert, bei dem Männchen noch das kleine sechste Segment vorragend. Die Beine sind schlank, wie der Körper schwarz, und mit grauen Härchen bedeckt; die Fußsohlen mit langen weißlichen Haaren besetzt.

*2. Trächtiger Kurzknopfkäfer.

B. gravidus.

Tab. CCXC. Fig. b. B.

Schwarz, weich behaart, dicht punktiert; die Fühler und die vorderen Beine braunroth; das Halschild breit, die Hinterwinkel scharf, vorgezogen; das Rückenschild groß, dreieckig; die Flügeldecken kurz, schief abgestutzt.

Länge $1\frac{1}{4}$, Breite 1 Linie.

Brachypterus gravidus. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 230.

Cateretes gravidus. *Illig. Käf. Pr.* 395. 1.

Cat. pulicarius. *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 246. 1.
Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 410. 1.

Cat. linariae. *Steph. Illustr. Mand.* III. p. 53. 4.

Brachypterus scutellatus. *Kugel. in Schneid. Mag.* 1. p. 561. 3.

Scaphidium scutellatum. *Panz. Fn.* 4. 11.

Scaphid. agaricinum, *Herbst. Käf.* 5. p. 134.
2. t. 49. f. 5. c.

Dermestes hemipterus. *Panz. in Naturf.* 24.

St. p. 11. 14. t. 1. f. 14. b.

Abänderung b. die Beine alle schwarz, nur die Füße roth.

Cateretes atratus. *Dej. Cat. ed. 3.* p. 136.

Ob Linné's *Dermestes pulicarius*, *Silpha pulicaria* und *Fabricius Sphaeridium pulicarium* zu dieser oder zu der folgenden Art gerechnet werden müssen, oder auch zu keinem von diesen, ist bei der Unbestimmtheit der Beschreibungen nicht zu ermitteln.

Um Nürnberg und in mehreren Gegenden Deutschlands nicht selten, auf den Blüthen verschiedener Sträucher und Pflanzen, als *Gallium Mollugo*, *Spiraea Ulmaria* und andern.

Er ist fast nur halb so groß, wie der vorige, und von demselben in der ganzen Gestalt sehr verschieden. Die Farbe ist schwarz, nur wenig glänzend, überall dicht punktiert, und mit feinen dicht anliegenden greisgrauen Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist kurz, dreieckig; die Augen rund, flach und matt schwarz. Die ganzen Fühler sind rostroth, die drei letzten größeren Glieder einen länglicheiförmigen Knopf bildend. Das Halschild ist hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn etwas

verengt, und fast nur halb so lang, wie breit, gewölbt, die Seiten leicht gerundet, der Vorderrand sehr leicht ausgeschnitten, die Vorderwinkel stumpf, der Hinterrand beiderseits etwas ausgeschweift, die Hinterwinkel gerade, und spitzig an die Schulter der Flügeldecken herabgezogen. Das Rückenschild ist groß, dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind breit, gewölbt, die Schulterbeule nur wenig vorgehoben, hinten von außen nach innen etwas schief abgestuft, und etwas mehr, als den halben Hinterleib deckend, dessen beide letzte Segmente unbedeckt vorstehen, und wie bei dem vorigen sich eiförmig verschmälern, so daß das vorletzte Segment mit seinen Hinterecken über das letzte vorragt; sie sind ebenfalls dicht, aber viel feiner punktiert, und bei dem Männchen ist noch das sehr kleine sechste Segment zu bemerken. Die vier Vorderbeine sind braunroth, die hintersten bräunlich-schwarz.

3. Greisgrauer Kurzknopfkäfer.

B. cinereus.

Tab. CCXCI. Fig. a. A.

Rechschwarz, fein punktiert,
mit rauchgelblichen Härchen dicht

bekleidet, die Fühler und vorderen Beine roströthlich; das Halschild quer, vorn etwas verengt, die Hinterwinkel fast gerade; das Rückenschild dreieckig; die Flügeldecken kurz, abgestutzt.

Länge $1\frac{1}{2}$ Linie.

Brachypterus cinereus. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 231.

Cateretes cinereus. *Chevrolat. Heer. Fn. Col. Helv.* 1. p. 413. 9.

Cercus pulicarius. *Latr. Gen. Crust. et Ins.* 2. p. 15. 1.

Er ist bisher nur im westlichen Deutschland in den Rheingegenden und bei Berlin gefunden worden.

Bei gleicher Länge mit dem vorigen ist er beträchtlich schmaler, und scheint daher kleiner zu seyn. Die Farbe ist pechschwarz, aber durch einen dichten Ueberzug von langen anliegenden graisgrauen Härchen, nimmt er eine rauchgelbliche Farbe an, und ist überall fein und dicht punktirt. Der Kopf ist kürzer, als bei dem vorigen, die Augen fast größer, etwas vorstehend und schwarz. Die ganzen Fühler sind roströth. Das Halschild ist breit, etwa halb

so lang wie breit; hinten von der Breite der Deck-
 schilde, vorn nur wenig verengt, der Borderrand fast
 gerade, nur leicht ausgeschnitten, oben sanft gewölbt;
 der Hinterrand ist beiderseits leicht ausgebuchtet, und
 in der Mitte über dem Rückenschilde etwas ausge-
 schnitten, die Seiten sanft gerundet, die Hinterwinkel
 fast gerade, und spizig. Das Rückenschild ist klei-
 ner, als bei dem vorigen, dreieckig. Die Flügeldecken
 sind länglich, gleichbreit, hinten fast gerade abgestutzt,
 und etwa zwei Dritttheile von dem Hinterleib de-
 ckend, von welchem nur die zwei letzten Hinterleibs-
 segmente unbedeckt bleiben; bei dem Männchen ist
 noch das sehr kleine unter der Afterdecke vorschauende
 sechste Segment sichtbar. Die vier vorderen Beine
 sind braunroth, die hintersten pechschwarz.

4. Weichhaariger Kurzknopfkäfer.

B. pubescens.

Tab. CCXCI. Fig. b. B.

Stumpf=eiförmig, schwarz, glän-
 zend, mit einem bläulichen Schim-
 mer, gewölbt, fein punktirt, mit
 feinen aschgrauen Härchen dicht be-
 kleidet; das Halschild quer, die Sei-

ten gerundet, vorn wenig eingezogen, die Hinterwinkel stumpf; die Flügeldecken länglich, gleichbreit, hinten abgestutzt und kürzer, als der Hinterleib.

Länge kaum 1 Linie.

Brachypterus pubescens. Schüpp. inedit. Germ. Zeitschr. 4. p. 231.

Bei Berlin; wohl in ziemlicher Anzahl auf Nesseln, aber doch weniger häufig, als der ihm sehr nahe verwandte *B. Urticae*, und nie in dessen Gesellschaft.

Er scheint mit dem folgenden öfter verwechselt worden zu sein, ist aber etwas größer, das Halschild minder kurz, die Deckshilde länger, der Kopf breiter, und sowohl vorn als hinten stumpfer eiförmig. Die Farbe ist schwarz, glänzend, etwas bläulich schimmernd. Kopf, Halschild und Flügeldecken sind fein und sehr dicht punktiert, dagegen bei dem folgenden die Punkte viel stärker sind und lockerer stehen; die ganze Oberfläche ist mit weißlich-grauen anliegenden, feinen langen Härchen dicht überkleidet. Der Kopf ist breit, die Augen etwas vortretend, schwarz und matt. Die Fühler nicht ganz

so lang, wie die Breite des Kopfes beträgt, und schwarz. Das Halschild ist so breit, wie die Deck-
 schilde, und etwa den vierten Theil kürzer, als breit,
 gewölbt, die Seiten gerundet, und vorn wenig ein-
 wärts gezogen, daher es vorn kaum merklich ver-
 schmälert erscheint; der Vorderrand ist nur wenig bo-
 genförmig gerundet, der Hinterrand fast gerade, die
 Hinterwinkel stumpf. Das Rückenschild stumpf-drei-
 eckig, punktirt. Die Flügeldecken ziemlich lang,
 gleichbreit, ohne merklich gerundete Seiten, mäßig
 gewölbt, hinten abgestutzt, nur einen kleinen Theil
 des vorletzten, und das sehr kurze und stumpfe letzte
 Hinterleibssegment freilassend, welche noch feiner als
 die Deckschilde punktirt sind. Die Beine sind schwarz
 und schlanker, als an *B. Urticae*.

* 5. Brenneffel = Kurzknopfkäfer.

B. Urticae.

Tab. CCXCI. Fig. c. C.

Eiförmig, pechschwarz, etwas
 metallisch glänzend, gewölbt, stark
 punktirt, weichhaarig; das Hals-
 schild quer, die Seiten gerun-
 det, vorn eingezogen, die Hinter-

winkel stumpf; die Flügeldecken hinten abgestumpft, kürzer, als der Hinterleib; die Fühler und Beine roströthlich.

Länge keine ganze Linie.

Brachypterus Urticae. *Germ. Zeitschrift.* 4. p. 231.

Dermestes Urticae. *Fabr. S. El.* 1. p. 320. 44.

Brachypterus Urticae. *Kugel. Schneid. Mag.* p. 561. 2.

Cateretes Urticae. *Heer. Fn. Col. Helv.* 1. p. 410. 2.

Auf den Blüthen der Brennessel (*Urtica dioica*. L.) sehr häufig.

Er ist etwas kürzer, vorn und hinten mehr eiförmig zugespitzt und stärker gewölbt, als der vorige. Pechschwarz, Kopf, Halschild und Flügeldecken etwas bronzegrünlich glänzend, stark punkirt, und mit feinen anliegenden gräulichweißen Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist schmaler, als bei jenem, die Augen tief-schwarz. Die Fühler sind roströthlich. Das Halschild ist kürzer, und vorn mehr verengt, als bei dem vorigen, nemlich dadurch, daß die

abgerundeten Seiten vorn mehr einwärts gezogen sind, die Hinterwinkel sind stumpf, der Vorderrand ist bogenförmig gerundet, der Hinterrand fast ganz gerade, und beiderseits desselben ziehet schief gegen den Seitenrand ein schwacher Eindruck. Das Rückenschild ist verhältnißmäßig groß, stumpf-dreieckig, punktirt. Die Flügeldecken sind etwas kürzer, stärker gewölbt, die Seiten sichtbarer gerundet als bei *B. pubescens*, hinten rundlicher abgestumpft, und lassen ebenfalls nur einen kurzen Theil des vorletzten, und das letzte Hinterleibssegment unbedeckt, welche nur sehr fein punktirt sind. Die Beine sind roströthlich.

6. Rostbrauner Kurzknopffkäfer.

B. rubiginosus.

Tab. CCXCI. Fig. d. D.

Stumpf-eiförmig, gewölbt, rostbraun, dicht-punktirt, weichhaarig; die Fühler und Beine röthlich-gelb; der Kopf schwärzlich; das Halschild quer; die Seiten gerundet; die Flügeldecken länglich, gleich-

breit, hinten abgestumpft und kürzer, als der Hinterleib.

Länge $\frac{4}{5}$ Linien.

Brachypterus rubiginosus. *Ericks. Germ. Zeitschr.* 4. p. 232. 9.

Bei Cassel von Herrn Hauptstaatskassen-Controleur Niehl entdeckt.

Er ist kleiner, besonders schmaler, als der vorige, beinahe walzenförmig; dunkel-rostbrann, glänzend, der Kopf schwärzlich, und das Hals- und Rückenschild dunkler braun, als die Deckshilde, und überall mit weichen weißlichen Haaren dünne bekleidet. Der Kopf ist breit, stumpf, die Stirn flach, und eben so punktiert, wie das Halschild. Die Augen sind schwarz, etwas vorstehend. Die Fühler sind länger, als der Kopf, stark, roströthlich, das Wurzelglied etwas größer, als das zweite, und auch dieses noch etwas größer, als die folgenden Glieder, von welchen die letzteren wieder an Größe etwas zunehmen, die drei letzten großen Glieder einen länglichen lockern Knopf bildend, dessen Endglied am größten und stumpf-eiförmig ist. Das Halschild hat fast die Breite der Deckshilde, ist quer oder etwa halb so lang, wie breit, der Vorderrand in einen leichten Bogen abgerundet,

der Hinterrand gerade, die Seiten gerundet, vorn etwas eingezogen, mit einem schmalen, scharf abgesetzten Rändchen; die Hinterwinkel fast gerade, die ganze Oberfläche ist deutlich und ziemlich dicht punktiert. Das Rückenschild ziemlich groß, stumpf-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, fast walzig, da die Seiten kaum bemerkbar gerundet sind; sie sind fein und dicht punktiert, hinten abgestumpft, und lassen nur einen kleinen Theil des vorletzten und das letzte Hinterleibssegment unbedeckt, welche sehr fein punktiert sind. Der Bauch ist schwärzlich; die Beine roströthlich.

CXXI. Saamenknopfkäfer.
CARPOPHILUS. *)

Tab. CCXCII.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das Wurzelglied dick, nach aussen erweitert, das zweite mäßig lang, dünn, cylindrisch, etwas dicker, als die folgenden, das dritte noch etwas länger, als das zweite, die folgenden allmählich kürzer und breiter, die drei letzten Glieder einen großen, dicken, kurz-eiförmigen Knopf bildend, dessen zweites Glied kürzer, als das erste und letzte ist. (Fig. C.)

Die Lefze häutig, breit, durch einen tiefen Einschnitt in zwei Lappen getheilt, am Rande gewimpert. (Fig. D.)

Die Kinnbäcken hornartig, breit, in eine scharfe Spitze gebogen, und hinter derselben ein Zähnen. (Fig. E.)

*) *Carpophilus*. Leach. *Nitidula*. Fabr. Oliv. Herbst.
 Deutschl. Fauna. V. Abthl. Bd. 15.

Die Kinnladen am Stamme hornartig, die Lade häutig, breit, am Innenrande und der Spitze mit einem dicken Barte eingefasst. (Fig. F.)

Die Zunge in der Mitte hornartig, mit zwei großen seitlichen, am Innenrande gewinpernten Hautklappen, welche fast bis zur Laster Spitze vorreichen. (Fig. G.)

Die Lippe hornartig, in der Mitte breit, an der Spitze ausgebuchtet, kurz. (Fig. H.)

Die Kinnladentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite größer, als das folgende, verkehrt kegelförmig, das dritte kurz, das Endglied so lang, wie die übrigen zusammen, etwas zugespitzt. (Fig. I.)

Die Zungentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite ziemlich kurz, verkehrt kegelförmig, das Endglied länger, nach der gerade abgeschnittenen Spitze zu, erweitert. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

*

*

*

Der Körper ist breiter oder schmaler länglich eiförmig, flach oder leicht gedrückt, überall dicht punktiert, und mehr oder weniger mit weichen Härchen überkleidet. Der Kopf (Fig. B.) ist breit-eiförmig, stumpf, doch beträchtlich schmaler, als das Halschild, der Kopfschild schmal, vortretend, leicht ausgerandet, bisweilen an der Naht beiderseits von einem Eindruck begrenzt. Die Augen an den Seiten sind kugelig, schwarz, matt, mit einer Netzhaut. Die Lippe ist frei, zweilappig getheilt. Die Kinbacken frei, etwas vorstehend, mit scharfer Spitze. Die Fühler (Fig. C.) sind wenig länger, als der Kopf; das erste Glied ist groß, dick und nach außen erweitert, die drei letzten bilden einen großen eiförmigen Knopf. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes sind kurz, stark, convergirend. Das Halschild hat gewöhnlich die Breite der Deckshilde, und ist nicht viel kürzer, als breit, die Seiten gerundet, der Vorderrand zur Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet, der Hinterrand gerade. Das Rückenschild (Fig. L.) ist groß, stumpf, dreieckig. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, an der Spitze abgestutzt mit gerundeten Aussenecken, und lassen die beiden letzten Hinterleibssegmente unbedeckt. Sie verbergen zwei unter sie eingeschlagene sehr zarte, weiße, von wenigen Nerven durchzogene Flügel

(Fig. m. M.) Beim Weibchen ist das fünfte untere Hinterleibssegment ziemlich breit, beim Männchen ist es tief ansegebuchtet, und hier schiebt sich ein eigenes kreisrundes sechstes Aftersegment ein. Die Beine (Fig. N. O.) sind kräftig, die Schenkel breit, unten mit Rinnen zum Einlegen der Schienen versehen; die Schienen sind gegen die Spitze fast schaufelförmig erweitert, zusammengedrückt, und fein behaart, mit mäßig starken Enddornen; die Füße sind kurz, die drei ersten Glieder mehr oder weniger erweitert, unten haarig, das vierte sehr klein, das Klauenglied so lang, wie die übrigen zusammen, mit kräftigen einfachen Klauen.

Es sind kleine Käferchen, die in Droguerie-Waaren, als Sämereien, Wurzeln u. s. w. öfter vorkommen, aber auch auf blühenden Gewächsen angetroffen werden, und die in ihrer Lebensart mit den übrigen ihnen verwandten Gattungen vieles gemein zu haben scheinen.

1. Halbdeckiger Saamenknospfläfer.

C. hemipterus.

Tab. CCXII. Fig. a. A—O.

Breit-eiförmig, kastanienbraun, dicht punktirt, weichhaarig; die Wur-

zel der Fühler, die Beine, ein mond-
förmiges Fleckchen an der Schulter
und ein größerer, die hintere Hälfte
der Flügeldecken einnehmender Fle-
cken, bleichgelb.

Länge $1\frac{1}{4}$ Linie.

Carpophilus hemipterus. *Germ. Zeitschr.* 4.
p. 256. 4.

Steph. Illustr. of Brit. Ent. III. 50. 1. *Man-*
nual. p. 122. 974.

Schuckard Brit. Col. Del. p. 25. 229. t. 30. f. 6.

Dermestes hemipterus. *Linn. S. N. I. II.*
p. 565. 30. — *Degeer Ins. ed. Goetze.* 5.
p. 131. 3. t. 18. f. 8.

Nitidula flexuosa. *Payk. Fn. Suec.* 1. p. 354.
9. — *Herbst Käf.* 5. p. 246. t. 54. f. 5.

Nitidula bimaculata. *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 6.
t. 2. f. 11. a. b. — *Gyll. Ins. Suec.* 1.
p. 244. 34. — *Schönh. Syn.* 2. p. 147. 58.

Nit. quadrata. *Fabr. Ent. Suppl.* p. 74. —
Syst. El. 1. p. 354. 33.

Nit. cadaverina. *Fabr. S. El.* 1. p. 354. 24.

Stenus Ficus. *Fabr. S. El.* 2. p. 603. 5.

Cateretes dimidiatus. Heer. Fn. Col. Helv. 1.
p. 413. 10.

Bei Berlin, und gewiß noch in vielen andern Gegenden Deutschlands, auf Blüthen. Auch in aufbewahrten Sämereien, Wurzeln u. dgl.

Er hat eine längliche, doch ziemlich breit-eiförmige Gestalt, ist oben sehr leicht gewölbt, und hat eine hellere oder dunklere kastanienbraune Farbe, ist mäßig glänzend, und mit weichen anliegenden Härchen dicht überkleidet. Der Kopf ist breit, winkelig, fein punktirt. Die Fesze und Laster roströthlich. Die Augen schwarz. Die Fühler sind rostgelb, etwa von der Länge des Kopfs, mit einem eirundlichen, aus den drei letzten Gliedern bestehenden, schwärzlichen Knopf. Das Halschild ist viereckig, etwas kürzer, als breit, und vorn wenig verengt, die Seiten sanft gerundet, der Borderrand breit, kaum merklich ausgeschnitten, der Hinterrand fast gerade, bisweilen sind hart an demselben zwei seichte Eindrücke neben einander zu bemerken, die Seiten sind mit einem sehr feinen, auch um den Hinterrand fortlaufenden Rändchen versehen; die ganze Oberfläche ist stark und sehr dicht punktirt. Das Rückenschild ist ziemlich groß, kurz und stumpf dreiwinkelig, punktirt. Die Flügeldecken sind kurz, wenig länger, als breit,

und hinten von außen nach innen etwas schief abgestutzt, so daß sie die zwei letzten Hinterleibssegmente unbedeckt lassen. Sie sind etwas schwächer und minder dicht punktiert, als das Halschild, und die Punktirung durch den dichteren feinen haarigen Ueberzug mehr verdeckt; an der Schulter ist ein kleiner bleichgelber mondformiger Flecken zu bemerken, und ein ähnlicher großer nimmt die ganze hintere Hälfte der Flügeldecken ein, und ist vorn dreiwinkelig zugespitzt. Die beiden unbedeckten Hinterleibssegmente sind auch sehr fein und dicht punktiert, und mit aschgrauen Härchen bekleidet, die an den Seiten dichter stehen und deutliche Flecken bilden. Die ganze Unterseite des Körpers ist etwas heller braunroth, sehr fein dicht punktiert, mit weichen Härchen überkleidet. Die Beine sind bleichgelb.

2. Zweiblatteriger Saamenknospfäfer.

C. bipustulatus.

Tab. CCXCII. Fig. p. P.

Breit-eiförmig, schwarz, glänzend, punktiert, weichhaarig; die Fühler, bis auf den schwarzen Knopf,

und die Beine roströthlich; auf der Mitte jeder Flügeldecke ein blatterähnlicher rother Flecken.

Länge $1\frac{1}{3}$ Linie.

Carpophilus bipustulatus. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 258. 6.

Ips bipustulatus *Kunze. Heer Fn. Col. Helv.* 1. p 416. 7.

Carpoph. bipunctatus. *Sturm Cat.* 1843. p. 89.

In Deutschland; aber in welcher Gegend er gefunden worden, ist mir nicht bekannt.

Er hat ganz die Gestalt des vorigen, doch sind die Flügeldecken im Verhältniß zu dem Halschild etwas länger; oben flacher gedrückt, schwarz und glänzend, und mit feinen, anliegenden Härchen nur sehr dünn überkleidet. Der Kopf, wie bei dem vorigen, fein punktirt, das Kopfschild beiderseits mit einem Grübchen bezeichnet. Die Fühler sind roströth, die drei letzten, einen rundlichen Knopf bildenden Glieder, schwarz. Das Halschild groß, viereckig, und die leicht gerundeten Seiten, vorn nur etwas eingezogen, dicht punktirt, der Hinterrand gerade, sehr wenig ausgeschweift, und in der Mitte, beiderseits des Rückenschildes, ist am Rande ein kleiner Quereindruck zu bemerken. Das Rückenschild ist

groß, stumpf-dreieckig, und nicht ganz bis zur Spitze punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, hinten von außen nach innen etwas schief abgestutzt, und lassen die zwei letzten Hinterleibssegmente unbedeckt. Gegen den Außenrand der Flügeldecken ziehet, unter der etwas vorragenden Schulter beginnend, eine eingedrückte, neben dem Außenrande parallellaufende Linie bis gegen die Spitze herab. Die ganzen Flügeldecken sind, wie das Halschild, doch etwas gröber punktiert, und gegen die Naht und den Hinterrand mit einem gelblichrothen blatterähnlichen Flecken geziert; auch auf der Schultervene ist ein dunkelrothes Fleckchen zu bemerken. Die vorragenden Hinterleibssegmente sind ebenfalls, doch etwas lockerer punktiert. Die Beine sind roströthlich, die Schenkel an der Wurzel schwärzlich.

*3. Sechßblatteriger Saamenknopffäfer.

C. sexpustulatus.

Schmal = eiförmig, pechschwarz, glänzend, fein dicht punktiert, weichhaarig; die Seiten des Halschildes vorn und hinten eingezogen, geran-

det; die Fühler, bis auf den schwarzen Knopf, und die Beine rostroth; ein rostrothes Fleckchen auf der Schulter der Flügeldecken, und ein gleicher Blatterfleck auf der Mitte gegen die Naht.

Länge $1\frac{1}{3}$ Linie.

Carpophilus sexpustulatus. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 263. 23.

Nitidula sexpustulata. *Fabr. Ent. Syst.* 1. p. 260. 21. — *Syst. El.* 1. p. 352. 25.

Lycetus abbreviatus. *Panz. Fn.* 24. 21.

Ips abbreviatus. *Sturm. Fn.* 14. p. 102. 1. t. 286. f. u. N. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 416. 1. — *Dufschm. Fn. Austr.* 3. p. 144. 6.

Carpoph. biguttatus. *Sturm Cat.* 1843. p. 89.

Hier und da in Deutschland, doch wie es scheint überall selten, so auch in der hiesigen Gegend.

Ich habe diese Art, schon an a. D. in unserer Fauna, nach dem Beispiel meiner Vorgänger zu der Gattung *Ips* gestellt.

Raum würde ich in der *Nitidula 6-pustulata.* *Fabr.* unsern Käfer erkannt haben, da er nach dessen

Beschreibung noch ein drittes der Naht genähertes Fleckchen auf den Flügeldecken haben soll, was ich an keinem von meinen Exemplaren bemerken kann und welches auch keiner der angeführten Autoren erwähnt hat. Es scheint dieses wohl eine selten vorkommende Varietät zu sein, die Fabricius bei seiner Beschreibung vor sich hatte.

Die Beschreibung des Käfers ist am angezeigten Orte in unserer Fauna nachzulesen.

CXXII. Saftknopfkäfer.

EPURAEA. *)

Tab. CCXCIII.

Gattungs k e n n z e i c h e n.

Die Fühler elfgliederig: das erste Glied dick, nach außen erweitert, das zweite wenig dicker, als die folgenden, das dritte etwas gestreckter, als das zweite, das vierte bis achte an Länge etwas ab-, und die beiden letzten an Breite etwas zunehmend, die drei Endglieder einen eiförmigen, zusammengedrückten, ziemlich lose gegliederten Knopf bildend. (Fig. C.)

Die Lefze kurz, tief ausgeschnitten, fast zweilappig, mit einer feinen Haarfranse am Rande. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, in eine

*) *Epuraea*. Erichson in *Germ. Zeitschrift für die Entomologie*. 4. p. 267. — *Nitidula*. Fabr.

scharfe hakenförmig nach innen gebogene Spitze ausgehend; hinter derselben noch ein Zähnehen. (Fig. E.)

Die Kinnladen am Stamme hornartig, die Lade kurz, lederartig, an der abgerundeten Spitze und am Innenrande mit einem langen und dichten Barte versehen. (Fig. F.)

Die Zunge hornartig, vorn abgerundet, mit einem Paar spitz dreieckiger, stark divergirender, am Innenrande gewimperter Hautlappen versehen, welche fast bis zur Spitze des dritten Tastergliedes reichen. (Fig. G.)

Die Lippe hornartig, fast viereckig, an den Seiten zu einem vortretenden Winkel erweitert, nach vorn verschmälert, die Vorderecken zahnförmig vortretend, der dazwischen liegende Raum flach ausgeschnitten. (Fig. H.)

Die Kinnladentaster etwas länger, als die Lade mit dem Barte, viergliederig: das erste Glied klein, das zweite verkehrt kegelförmig, das dritte kurz, das Endglied so lange, wie die übrigen zusammen, zugespitzt. (Fig. J.)

Die Zungentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite verkehrt kegel- förmig, das Endglied größer, eiförmig verdickt. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper ist kürzer oder länglicher, fast viereckig, flach gewölbt, mit feinen Härchen bekleidet. (Fig. A.) Der Kopf ist klein, breit, vor den Augen beiderseits mit einem Eindruck versehen; das Kopfschild schmal, vorstehend (Fig. B.). Die Augen kugelig, vorstehend, mit einer starken Netzhaut, und kohlschwarz. Die Fühler sind etwas länger, als der Kopf, dünne, und endigen in einen großen rundlichen dreigliederigen Knopf. Die Fühler- rinnen auf der Unterseite des Kopfes convergirend, aber verloschen. Das Halschild ist gewöhnlich viel kürzer, als breit, hinten so breit, wie die Deck- schilder an der Basis, vorn mehr oder weniger ver-engt, und der Seitenrand bald breiter, bald schmaler flach abgesetzt. Das Rückenschild (Fig. L.) ist ziemlich groß, dreieckig. Die Flügeldecken sind länglich, fast gleichbreit oder etwas eiförmig, die Seiten meist schmal flach gerandet, und bei den mei-

sten Arten so weit verkürzt, daß das letzte Hinterleibssegment frei bleibt. Sie bedecken zwei unter sie eingeschlagene weiße, zarte, mit wenigen Nerven versehene Flügel (Fig. m. M.). Der Hinterleib bestehet aus fünf Segmenten, und beim Männchen zeigt sich an der Spitze noch ein sehr deutliches Afterssegment. Die Beine (Fig. N. O.) sind nicht sehr stark, und die mittelsten nahe an einander eingelenkt; die Schienen einfach, mit einem kleinen Guldorn versehen; an den Füßen sind die drei ersten Glieder sehr kurz, erweitert, unten behaart, das vierte versteckt, das Klauenglied reichlich so lang, wie die übrigen zusammen genommen.

Sie leben unter der Rinde der Bäume, in Schwämmen, von vegetabilischen Säften, daher man sie oft in zahlreicher Gesellschaft an Bäumen, die den Saft fließen lassen, versammelt und denselben lecken sieht.

* 1. Zehntropfiger Saftknospkäfer.

E. decemguttata.

Tab. CCXCIII. Fig. a. A.—O.

Länglich, stumpf-eiförmig, leicht gewölbt, kastanienbraun, die Seiten

des Halsschildes, zehen Tropfen auf den Deckschilden und die Beine bleichgelb; die hintersten Schenkel mit einem Zähnen.

Länge 2, Breite $1\frac{1}{4}$ Linie.

Epuraea 10-guttata. *Erichs. Germ. Zeitschr.* 4. p. 268. 1.

Nitidula 10-guttata. *Fabr. S. El.* 1. p. 350. — *Illig. Verz. d. Käf. Pr.* p. 382. 5. — *Gyllenb. Ins. Suec.* 1. p. 220. 7. — *Dufschm. Fn. Austr.* 3. p. 131. — *Schönherr Syn. Ins.* 2. p. 141. 30. — *Steph. Illustr.* III. p. 41. 2. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 397. 13.

In Preußen; auch in der hiesigen Gegend, an Eichen- und Buchenstöcken, wo sie den ausfließenden Saft lecken; desgleichen in Baumpilzen.

Er hat eine länglich-gleichbreite, abgestumpft eiförmige Gestalt, ist mäßig gewölbt, oben heller oder dunkler Kastanienbraun, glänzend, überall dicht punktiert, und mit feinen, aufliegenden Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist kurz, das Kopfschild schmal vorragend, hinten von zwei Grübchen begrenzt.

Die Augen sind schwarz, etwas vorstehend. Die ganzen Fühler sind dunkel rostroth. Das Halsschild ist quer, fast nur halb so lang, wie breit, nach vorn etwas verengt, die Seiten sanft gerundet, mit einem schmalen, abgesetzten Rande versehen; der Vorderrand tief ausgeschnitten, der Hinterrand gerade, leicht ausgebuchtet, die Hinterwinkel gerade, etwas vorgezogen, die Farbe des Rückens dunkel kastanienbraun, die Seiten breit hellgelb; auch in der Mitte nahe am Hinterrand ein Fleckchen von gleicher Farbe, das sich in einen schmalen Streif bis zum Vorderrand fortsetzt. Das Rückenschild ist ziemlich groß, stumpfdreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, fast gleichbreit, hinten gerade abgestumpft, die Seiten mit einem schmalen abgesetzten, etwas aufgebohenem Rande, und fünf hell rostgelben Tropfen in folgender Ordnung versehen: ein länglicher neben der Naht am Rückenschilde, ein zweiter rundlicher unter demselben gegen die Spitze, und drei am Außenrande, der eine an der Schulter, ein anderer in der Mitte, und ein dritter vor der Spitze. Die Unterseite des Hinterleibs, bis auf den gelben Aster, schwärzlich braun, punktiert. Die Beine sind bleichgelb, die hintersten Schenkel an der Unterseite vor der Spitze mit einem Bähnchen ver-

sehen; auch an der Schiene gegen die Wurzel ist ein solches bemerklich.

2. Gurkengelber Saftknopfkäfer.

E. silacea.

Tab. CCXCIII. Fig. p. P.

Länglich=viereckig, beinahe flach, hell ochergelb, sehr fein, dicht punktiert, weichhaarig; das Halsschild quer, vorn verengt, tief ausgeschnitten, die Seiten fast gerade, in den Hinterwinkeln etwas erweitert, mit einem etwas breiten abgesetzten Rande; die Flügeldecken gleichbreit, hinten gerade abgestumpft, die äußere Ecke gerundet, die Seiten schmal abgesetzt=gerandet.

Länge 2, Breite $1\frac{1}{4}$ Linie, die Männchen etwas schmaler.

Epuraea silacea. *Erchs. Germ. Zeitschr.* 4. p. 269. 5.

Nitidula silacea. *Herbst Kläf.* 5. p. 232. 4.

t. 53. f. 3. c. C. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 229. 18. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 137. 8.

In Oesterreich; auch bei Berlin.

Er kommt in der Gestalt der *E. ochracea* am nächsten, ist aber kürzer und breiter, von hellerer Farbe und im Umrisse des Halsschildes verschieden; auch minder gewölbt, und hell ochergelb, überall gleich, fein, und sehr dicht punktiert, mit gelblich-weißen, anliegenden, seidenglänzenden Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist kurz, das schmale Kopfschild hinten beiderseits durch einen Eindruck bezeichnet, neben welchen sich vor den kleinen schwarzen Augen ein Beulchen erhebt. Die Fühler sind hell ochergelb, das Wurzelglied sehr dick, und das Endglied des eirundlichen Knopfes etwas zugespitzt. Das Halsschild ist hinten breit, vorn merklich schmaler, und etwa halb so lang, wie breit; der Vorderrand ist tief ausgeschnitten, der Hinterrand gerade, die Seiten vorn fast gerade, erst in den Hinterwinkeln gerundet, fast erweitert, und diese etwas vorgezogen, auch mit einem etwas breiten und flach abgesetzten Rande versehen. Das Rückenschild ist mäßig groß, stumpf-dreieckig, und bis auf den glatten Rand dicht punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, die Seiten in der Mitte nur wenig gerundet, und

mit einem flach abgesetzten Rande versehen; hinten sind sie gerade abgestumpft, die äußere Ecke etwas gerundet, und etwas kürzer, als der Hinterleib, indem die Afterspitze noch vorsteht.

* 3. Quittengelber Saftknopfkäfer.

E. melina.

Tab. CCXCIV. Fig. a. A.

Länglich, eiförmig, beinahe flach, dunkel ochergelb, fein dicht punktiert, weichhaarig; das Halsschild quer, vorn etwas verengt, schmal abgesetzt=gerandet; die Flügeldecken länglich, gleichbreit, hinten gerade abgestumpft, mit einem feinen abgesetzten Rändchen an den Seiten, die Außenecken nicht abgerundet.

Länge nicht ganz 2, Breite kaum 1 Linie.

Epuraea melina. *Erichs. Germ. Zeitschr.* 4. p. 269. 6.

Nitidula depressa. *Illig. Käf. Pr.* p. 386. 12.

Bei Berlin; auch in der hiesigen Gegend.

Er ist etwas kleiner und schmaler, als der vorige, die Seiten des Halschildes hinten nicht erweitert, daher solches ein schmäleres Ansehen hat. Der Käfer ist oben beinahe flach, dunkel ochergelb, fast roströthlich, fein und dicht punktiert, und mit feinen, anliegenden, gelblichen, glänzenden Härchen dünn überkleidet. Der Kopf, wie bei dem vorigen; die Augen klein und schwarz. Die Fühler sind roströthlich, das Wurzelglied nicht sehr groß, der Knopf länglich eiförmig, das Endglied klein, etwas zugespitzt und schwärzlich. Das Halschild ist zwar hinten so breit, wie die Deckshilde an der Wurzel, aber die Seiten in den Hinterwinkeln nicht darüber vorragend, und daher auch vorn weniger verengt, der Borderrand auch weniger tief ausgeschnitten; seine Länge beträgt fast nicht mehr, als die Hälfte der Breite. Die Seiten sind nur sehr wenig gerundet, mit einem schmalen, flach abgesetzten Rande versehen, die Hinterwinkel fast stumpf, der Hinterrand gerade. Das Rückenschild ist größer, als bei dem vorigen, stumpf-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, und im Verhältniß länger, als bei dem vorigen, gleichbreit, die Seiten nicht gerundet, und mit einem schmalern, abgesetzten Rändchen versehen; hinten sind sie ganz gerade abgestuft, die äußere Ecke nicht abgerundet; ganz eben, bis auf die schwach erhöhte Schul-

terbeule. Hinter der Mitte, gegen die Spitze ist ein schwärzlicher Schatten, gleich einem Tupsen zu bemerken, auch lassen sie die Asterspitze sehen.

4. Ochergelber Saftknopfkäfer.

E. ochracea.

Tab. CCXCIV. Fig. b. B.

Länglich-viereckig, beinahe flach, dunkel ochergelb, fein dicht punktiert, weichhaarig; das Halschild quer, hinten breit, vorn etwas verengt, der Vorderrand mäßig ausgeschnitten, die Seiten vorn gerade, hinten etwas vorstehend gerundet, mit einem vorn schmälern, hinten breiteren flach abgesetztem Rande; die Flügeldecken gleichbreit, hinten gerade abgestumpft, die Außenecken abgerundet, die in der Mitte etwas gerundeten Seiten mit einem schmalen Rändchen.

Länge nicht ganz $1\frac{1}{2}$ Linie, Breite 1 Linie.

Epuraea ochracea. *Erichs. Germ. Zeitschr.* 4.
p. 269. 7.

Nitidula depressa. *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 228.

17. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 399. 20.

Nit. villosa. *Steph. Illustr.* III. p. 37. 14.

Bei Berlin.

Dem vorigen nahe verwandt, aber weniger niedergedrückt, und vorzüglich durch die stumpf abgerundeten Außenecken der Flügeldeckspitze unterschieden; auch etwas breiter, und das Halschild vorn weniger verengt, sonst von gleicher Farbe, und eben so feindicht punktiert, und mit gelblichen glänzenden, anliegenden Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist etwas breiter, die beiden Eindrückte vor den Augen stärker; die Augen schwarz und etwas vorstehend. Die Fühler haben die Farbe des Körpers, aber die drei letzten, den Knopf bildenden Glieder sind größer, als an jenem, besonders groß und stumpf abgerundet ist das Endglied. Das Halschild ist quer, aber hinten etwas breiter, als an jenem, daher es auch etwas kürzer erscheint, und auch vorn mehr verengt ist; der Vorderrand ist breiter und tiefer ausgeschnitten, der Hinterrand gerade, die Seiten sind nur sehr wenig gerundet, in den Hinterwinkeln etwas ausbeugend, daher es hinten breiter, als bei dem vorigen

ist, und vorn mit einem schmalen, in den Hinterwinkeln breiter werdenden, flach abgesetzten Rande versehen. Das Rückenschild ist etwas schmaler, als bei dem vorigen, und scharf dreieckig, sonst eben so punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit und etwas gewölbt, die Seiten sind kaum merklich gerundet, und mit einem sehr schmalen abgesetzten Rändchen versehen, an der Spitze gerade abgestumpft, aber die äußere Ecke abgerundet; gegen die Spitze scheint ein schwacher schwärzlicher Tupfen durch. Die Unterseite des Körpers und die Beine sind wie der Oberkörper gefärbt.

Diese Art kann mit der vorigen leicht verwechselt werden, hat aber, wie in der Beschreibung angegeben ist, in dem Fühlerknopf ein sicheres Merkmal.

*5. Hellgelber Saftknopfkäfer.

E. deleta.

Tab. CCXCIV. Fig. c. C.

Länglich, leicht gewölbt, hell ochergelb, die Deckschilde bräunlich überlaufen; das Halschild quer, vorn verengt, der Borderrand tief

ausgeschnitten, der Hinterrand gerade, die Seiten vorn gerade, hinten etwas vortretend, die Hinterwinkel breit, vorgezogen, mit einem hinten breiteren, flach abgesetzten Rande; die Flügeldecken hinten sanft gerundet abgestumpft.

Länge $1\frac{1}{2}$, Breite 1 Linie.

Epuraea deleta. *Erichs. Germ. Zeitschr.* 4. p. 269. 8.

Nitidula deleta. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 136.

Nit. silacea. *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 397. 15.

In Oesterreich; auch in dem nördlichen Deutschland.

Er hat ziemlich die Größe und Gestalt des vorigen, weicht aber in der Farbe und im Umriss des Halschildes ab. Die Farbe ist heller ochergelb, glänzend, die Deckshilde auf dem Rücken bräunlich überlaufen; auch wie gewöhnlich die ganze Oberseite dicht, doch etwas feichter punktiert, daher die Punktierung schwerer zu erkennen, und mit weichen seidenglänzenden Härchen dünn überkleidet. Das Kopfschild ist durch einen Quereindruck und einem tiefen

Grübchen beiderseits begrenzt. Die Augen schwarz, etwas vorstehend. Die ganzen Fühler sind einfarbig, hell ochergelb, der Knopf mäßig groß, länglich eiförmig, gedrückt. Der Umriss des Halschildes zeichnet diese Art besonders aus. Es ist quer, doch etwas minder kurz, als bei den beiden vorigen Arten, hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn aber merklich verschmälert. Der Borderrand tief ausgeschnitten, die Seiten fast gerade, hinter der Mitte ein wenig eingezogen, in den Hinterwinkeln wieder vortretend, und diese breit und spitzig vorgezogen, vorn schmal, in den Hinterwinkeln stark erweitert, flach abgesetzt, etwas aufgebogen-gerandet, mit einem schwachen Eindruck, der Hinterrand gerade. Das Rückenschild ist etwas breit-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind gleichbreit, doch hinten etwas schmaler, hinter der Mitte oben ziemlich gewölbt, die Seiten sehr sanft gerundet, schmal, flach abgesetzt und etwas aufgebogen gerandet, hinten gerade, doch etwas gerundet abgestumpft, die Schulter in einem schwachen Venlchen vorragend.

6. Beschmutzter Saftknopfkäfer.

E. immunda.

Tab. CCXCIV. Fig. d. D.

Eiförmig, hinten stumpf, beinahe flach, dunkel ockergelb; der Rücken des Halschildes und der von der Schulter bis in die Mitte der Naht schief verwischt abgeschnittene hintere Theil der Flügeldecken dunkel kastanienbraun; das Halschild quer vorn etwas verengt, und etwas schmaler, als die Deckshilde, die Seiten fast gerade, breit flach=abgesetzt gerandet; die Flügeldecken kurz, gleichbreit, hinten gerade abgestumpft, flach abgesetzt gerandet.

Länge $1\frac{1}{4}$ Linie.

Epuraea immunda. *Erichs. Germ. Zeitschr.*
4. p. 269. 9.

Hier und da in Deutschland.

Er ist etwas kleiner, besonders kürzer, als der vorige, auf den Rücken flach, und hat eine bräunlich ochergelbe Farbe mit sehr mäßigem Glanze; ist oben ziemlich flach, sehr fein, dicht, aber leicht punktiert, und mit greisen Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist etwas breiter, als bei dem vorigen, die Augen größer, schwarz. Die Fühler sind ochergelb, die drei letzten größeren Glieder sind schwärzlich, und bilden einen länglichen, eiförmigen Knopf. Das auf dem Rücken dunkel kastanienbraun überlaufene Halschild ist quer, viel kürzer, als breit, hinten nicht ganz so breit, wie die Deckshilde, und nach vorn noch etwas verengt, der Vorderrand ist breit, aber leicht, ausgeschnitten, daher die Vorderwinkel kaum merklich vortreten; die Seiten sind kaum merklich gerundet, in den Hinterwinkeln nur wenig vortretend, und diese sehr kurz gespitzt, daher mit dem geraden Hinterrande fast gleich, und haben einen ziemlich breiten, und gleichen, flach abgesetzten Rand. Das Rückenschild ist ziemlich groß, gleich und etwas stumpf dreieckig, und bis auf den glatten Rand stark und dicht punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, die Seiten fast gerade, mit einem abgesetzten Rande versehen, hinten gerade und sehr schwach gerundet abgestumpft, hinten und an den Seiten schwärzlich-kastanienbraun

überlaufen, so daß von der hellen Grundfarbe, mit Einschluß der Schulterbeule ein gemeinschaftlich dreieckiger Flecken, auf dem Rücken übrig bleibt. Die ganze Unterseite des Körpers ist schwärzlich-kaftanienbrann. Die Beine hell ochergelb.

7. Geschlechter Saftknopfläfer.

E. variegata.

Tab. CCXCV. Fig. a. A.

Länglich=viereckig, etwas gewölbt, rostrothlich, stark und dicht punktiert, weichhaarig; das Halschild quer, vorn verengt, der Vorderrand tief ausgeschnitten, die Seiten schwach gerundet, breit flach abgesetzt, die Hinterwinkel kurz gespißt; die Flügeldecken länglich=eiförmig, flach abgesetzt=gerandet, an der Spitze rundlich=abgestumpft, auf der Mitte ein schwärzlicher Tupfen.

Länge $1\frac{1}{2}$, Breite $\frac{3}{4}$ Linien.

Epuraca variegata. *Erichs. Germ. Zeitschr.* 4. p. 269. 10.

Nitidula variegata. *Herbst Käf.* 5. p. 245. t. 54. f. 3. c. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 225. 12. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 138. 10. — *Steph. Ill.* III. p. 38. 16. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 398. 17.

Im nördlichen Deutschland, etwas selten.

Er hat die gewöhnliche, länglich-viereckige, doch etwas breitere Gestalt, ist gleich und mäßig gewölbt, von dunkel roströthlicher Farbe, mit mattem Glanze; Kopf und Halschild sind sehr dicht und stark, ebenso die Flügeldecken punktirt, und mit gelblichen steifen Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist leicht gewölbt, ganz eben, ohne die gewöhnlichen Eindrückte vor den Augen. Die Augen schwarz, etwas vorstehend. Die Fühler sind roströthlich, die drei letzten großen Endglieder einen länglich-eiförmigen stumpfen Knopf bildend. Das Halschild ist quer, nicht ganz so breit, wie die Deckshilde, und durch den tiefen Ausschnitt des Vorderrandes in der Mitte beinahe kurz und die Vorderwinkel breit vorstehend, die Seiten sind vorn etwas einwärts geneigt, sehr leicht gerundet, und in der Mitte fast etwas ausgebuchtet, breit und gleich flach abgesetzt, die Absetzungsfläche innen, gegen den

Hinterrand leicht quer eingedrückt, der Hinterand gerade, und die Hinterwinkel breit und kurz gespitzt. Das Rückenschild scharf dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, fast eiförmig, die Seiten leicht gerundet und breit flach abgesetzt gerandet, an der Spitze deutlich abgerundet abgestumpft. Auf der Mitte stehet ein schwärzlicher runder Flecken, und öfter ist auch hinten vor der Spitze ein schwärzlicher größerer Quersflecken vorhanden. Die Unterseite des Körpers hat die Farbe, wie oben, doch ist der Hals und die Brust schwärzlich angelauten. Die Beine sind hell roströthlich.

S. Dunkler Saftknopfkäfer.

E. neglecta.

Tab. CCXCV. Fig. b. B.

Länglich viereckig, hinten etwas schmaler, schwach gewölbt, schwarzbraun, dicht punktiert, weich behaart, der Kopf vorn, der Rand des Halsschildes und der Flügeldecken rothbraun, Fühler und Beine roströthlich; das Halsschild quer, die Seiten

gerundet, vorn einwärts gezogen, breit flach abgesetzt gerandet, die Hinterwinkel kurz=gespitzt; die Flügeldecken länglich, hinten gerade abgestumpft.

Länge $1\frac{1}{2}$, Breite 1 Linie.

Epuraea neglecta. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 269.
11.

Nitidula neglecta. *Heer Fn. Col. Helv.* 1.
p. 396. 8.

Hier und da in Deutschland, selten.

In Gestalt und Größe dem vorigen ähnlich, doch etwas breiter, und oben etwas gedrückter. Die Farbe ist schwarzbrann, mit einem matten Seidenglanze begabt, die ganze Oberseite ist dicht punktiert, und mit feinen anliegenden braunen Härchen ziemlich dicht überkleidet. Der Kopf ist stumpf, hinten schwärzlich, und das Kopfschild hinten, beiderseits vor den kleinen schwarzen Augen, durch ein vorragendes Beulchen begrenzt. Die Fühler sind fast länger, als der Kopf, rostroth, und die drei letzten ziemlich großen Glieder bilden einen länglichen Knopf. Das Halschild ist quer, kaum halb so lang, wie breit, vorn etwas verengt, der Borderrand breit, aber nicht

tief ausgeschnitten, die Seiten gerundet, breit flach abgesetzt, rothbraun, der Hinterrand gerade, sehr leicht ausgeschweift, die Hinterwinkel breit und spitzig. Das Rückenschild ist etwas kleiner, als gewöhnlich, stumpf-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, hinten etwas verschmälert, gerade abgestumpft, die etwas stark vorragende Schulterbenke, und der flach abgesetzte Außenrand rothbraun. Die Unterseite des Körpers ist beinahe schwarz, die Beine rostrothlich.

*9. Schmutziggelber Saftknopfkäfer;

E. obsoleta.

Tab. CCXCV. Fig. c. C.

Länglich, gleichbreit, flach, schmutzig-heller oder dunkler ocher gelb; fein dicht punktiert, weichhaarig; das Halschild quer, der Vorderrand tief ausgeschnitten, die Seiten gerundet, breit flach abgesetzt gerundet, die Hinterwinkel kurz-gespitzt; die Flügeldecken länglich, gestreckt, gleichbreit, mit einem schmalen flach abge-

letzten Rande, an der Spitze gerade abgestumpft.

Länge $1\frac{1}{2}$, Breite $\frac{2}{3}$ Linien.

Eburaea obsoleta. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 270. 12.

Nitidula obsoleta. *Fabr. S. El.* 1. p. 349. 9.

— *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 223. 11. — *Herbst*

Käf. 5. p. 240. 11. t. 53. f. k. K. — *Illig.*

Käf. Pr. p. 384. 9. — *Schönh. Syn. Ins.* 2.

p. 137. 10. — *Dufsch. Fn. Austr.* 3. p. 136.

16. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 398. 16. —

Steph. Illustr. III. p. 38. 15.

In der hiesigen Gegend unter Baumrinden, in Schwämmen, auch auf Blüthen, nicht selten.

Er hat eine länglichere Gestalt, als die vorigen, ist oben beinahe flach, und ändert in der Farbe vom hellen etwas schmutzigen Ochergelb, bis in das dunkel Bräunlichgelbe oder Schwärzliche ab, wobei nur der flache Außenrand des Halsschildes und der Flügeldecken, und einige helle Flecken auf den letzteren die gelbliche Farbe behalten. Die ganze Oberseite ist sehr fein und dicht, doch leicht punktirt, und mit feinen, gelben, anliegenden Härchen dünn überkleidet. Die Augen sind schwarz. Die Fühler länger, als der Kopf, rostgelb, der rundliche Knopf schwärzlich.

Das Halschild ist quer, etwa halb so lang, wie breit, hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn nur etwas verengt, der Borderrand breit und tief ausgeschnitten, die Seiten gerundet, breit flach-abgesetzt gerandet, gegen die Hinterwinkel leicht eingedrückt, diese breit und kurz-spitzig, der Hinterrand gerade. Das Rückenschild dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, gestreckt, nach hinten nur wenig schmaler, und die Seiten kaum merklich gerundet, mit einem schmalen, flach abgesetzten Rande, an der Spitze gerade abgestumpft, die Schulterbeule etwas erhöht. Gewöhnlich zeigt sich gegen die Spitze ein hellerer rundlicher Flecken, auch noch verwischtere auf der Mitte, sowohl bei den heller- als auch dunkler gefärbten Individuen, die nur bei ganz hellen verschwinden. Die Farbe der Unterseite des Körpers ist immer der der Oberseite gleich, die Beine sind heller ochergelb.

10. Gesäumter Saftknopfkäfer.

E. parvula.

Tab. CCXCV. Fig. d. D.

Länglich=viereckig, etwas flach, schwarzbraun, Halschild und Flü-

geldecken breit flach=abgesetzt, roth=braun gerandet, fein dicht punktiert, weichhaarig; das Halschild quer, vorn verengt, der Vorderrand ziemlich tief ausgeschnitten, die Seiten gerundet, die Hinterwinkel kurz=gespitzt; die Flügeldecken gleichbreit, hinten fast gerundet=abgestumpft; die Fühler und Beine roströthlich.

Länge $1\frac{1}{4}$, Breite $\frac{3}{4}$ Linien.

Epuraea parvula. Mihi. Germ. Zeitschr. 4. p. 270. 13.

In Oesterreich; auch bei Berlin.

Er ist kürzer und breiter, als der folgende, und in dem Umriß des Halschildes verschieden. Die Farbe ist, mit Ausnahme des bräunlich-rothen Randes des Halschildes und der Flügeldecken, schwarzbraun, matt glänzend; die ganze Oberseite fein und dicht punktiert, und mit sehr feinen graisen Härchen dünn bekleidet. Der Kopf ist kurz, die Stirn eben, schwärzlich, das schmale, vorgestreckte Kopfschild braunroth, und vor den schwarzen, etwas vorstehenden Augen beiderseits durch ein Grübchen begrenzt. Die

Fühler sind länger, als der Kopf, stark, roströthlich, die drei letzten Glieder einen länglich-eiförmigen Knopf bildend, dessen beide ersten Glieder groß und gleich sind, das Endglied kleiner, rundlich. Das Halschild ist quer, in der Mitte etwa halb so lang, wie breit, hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn merklich verengt, auf dem Rücken quer über leicht gewölbt, wodurch vor dem Hinterrande ein seichter Quereindruck entsteht; der Borderrand ist ziemlich tief ausgeschnitten, daher die Borderecken breit vorstehen, die Seiten sind sanft gerundet, breit flach abgesetzt, in den Hinterwinkeln tiefer niedergedrückt, und diese breit, kurz-zugespitzt, der Hinterrand gerade. Das Rückenschild ist ziemlich groß, dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken länglich, gleichbreit, hinten kaum merklich schmaler, die Seiten fast gerade, und von der Wurzel bis zur Spitze mit einem gleichen, und ziemlich breit flach abgesetzten Rande versehen; unter dem Rückenschilde ist auf jeder Decke ein matter Eindruck zu bemerken; die kleine Schulterbeule ist roströth und erhöht; die Spitze gerade abgestumpft, doch etwas, besonders an den Außenecken, gerundet. Die Unterseite des Körpers ist schwarzbraun, stark und dicht punktiert, mit mäusegrauen Härchen bekleidet; die Afterspitze und die Beine hell roströthlich.

11. Zwerg = Saftknopffäfer.

E. pygmaea.

Tab. CCXCVI. Fig. a. A.

Länglich, gleichbreit, ziemlich flach, kastanienbraun, der flach abgesetzte Außenrand des Halsschildes und der Flügeldecken hell braunroth, fein dicht punktirt, weichhaarig; das Halsschild etwas quer, vorn nicht verengt, der Vorderrand nur leicht ausgeschnitten, die Hinterwinkel gerade; die Flügeldecken länglich, gleichbreit, hinten rundlich-abgestumpft; die Fühler und Beine rost-röthlich.

Länge $1\frac{1}{4}$, Breite $\frac{1}{2}$ Linie.

Epuraea pygmaea. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 270. 14.

Nitidula pygmaea. *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 225.

13. — *Steph. Illustr.* III. 39. 19.

In Schlessien; auf dem Harz; bei München.

Er ist dem vorigen ähnlich, aber etwas schmäl-
ler, noch flacher, und durch das minder kurze, vorn
nicht verengte Halschild unterschieden. Die Farbe
der Oberseite ist dunkel kastanienbraun, und nur die
Außenränder sind heller braunroth. Die Punktirung
ist fein und dicht, aber nicht so seicht, wie bei jenem,
sonst eben so mit weichen greisen Härchen dünn be-
kleidet. Der Kopf ist bei dunkel gefärbten Exem-
plaren schwärzlich, die Augen tiefschwarz. Die Füh-
ler sind roströthlich, die drei letzten größern Glieder
sind dunkler, und bilden einen ziemlich großen rund-
lichen Knopf. Das Halschild ist nur etwas quer,
da die Länge mehr, als die Hälfte der Breite be-
trägt, es ist vollkommen so breit, wie die Deckshilde,
vorn nicht verengt, und ist vor dem Vorder- und
Hinterrande leicht niedergedrückt, der Vorderrand ist
weit, aber seicht ausgeschnitten, daher die Vorder-
ecken kaum vorstehen, die Seiten sind fast gerade,
aber breit flach-abgesetzt gerandet, die Hinterwinkel
mit dem geraden Hinterrande gleich. Das Rücken-
schild ist kurz, dreieckig, punktirt. Die Flügeldecken
sind gleichbreit, kaum zweimal so lang, wie das Hals-
schild, die Seiten gerade, hinten allmählig gerundet,
und abgestumpft, schmal, gleich, flach-abgesetzt geran-
det; das Schulterbeinchen röthlich, und von dem-
selben schief gegen die Naht ist eine schwache

Erhöhung zu bemerken. Die ganze Unterseite des Körpers ist schwarzbraun. Die Beine hell roströthlich, die Schienen der mittleren Beine bei den Männchen gekrümmt und an der Spitze fast schaufelförmig erweitert.

12. Länglicher Saftknopfkäfer.

E. oblonga.

Tab. CCXCVI. Fig. b. B.

Länglich, gleichbreit, flach, kastanienbraun, die Fühler, bis auf den schwärzlichen Knopf, und die Beine roströthlich, sehr fein punktirt, weichhaarig; das Halsschild quer, der Vorderrand seicht ausgeschnitten, die Seiten sanft gerundet, mit einem schmalen abgesetzten Rande, die Flügeldecken lang, fast gleichbreit, schmal gerandet, die Spitze sanft gerundet = abgestumpft.

Länge $1\frac{1}{2}$, Breite $\frac{2}{3}$ Linien.

Epuraea oblonga. Germ. Zeitschr. 4. p. 270. 15.

Nididula oblonga. *Herbst Käf.* 5. p. 245. 20.
t. 54. f. 4. d. D. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p.
226. 14. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 138.
12. — *Steph. Illustr.* III. p. 36. 11. — *Meer*
Fn. Col. Helv. 1. p. 399. 19.

Im nördlichen Deutschland, selten.

Die schmale und lang gestreckte Gestalt zeichnet diese Art von den vorhergehenden aus. Sie ist beinahe gleichbreit, und nach hinten kaum bemerklich schmaler, flach, heller oder dunkler kastanienbraun, mit einem Seidenglanze begabt. Die ganze Oberseite ist fein punktiert, und mit sehr feinen, hellen seidenglänzenden Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist mit einem tiefen Grübchen beiderseits vor den schwarzen, etwas vorstehenden Augen, versehen. Die Fühler sind roströthlich, die drei letzten großen, einen rundlichen Knopf bildenden Glieder schwärzlich. Das Halschild ist quer, und etwa ein Dritttheil kürzer, als breit, hinten so breit, wie die Deckshilbe, und durch die schwach gerundeten, gegen die Vorderecken etwas einwärts geneigten Seiten, scheinbar vorn ein wenig verengt; die Seiten erst vor den Hinterwinkeln etwas stärker gerundet, schmal flach abgesetzt gerandet, und in den Hinterwinkeln leicht eingedrückt. Der Vorderrand ist breit und leicht ausgerandet, so

daß die Borderecken kaum etwas vorstehen; der Hinterrand und die Hinterwinkel gerade. Das Rückenschild ist breit, dreieckig und punktirt. Die Flügeldecken sind länglich, fast gleichbreit, hinten nur sehr wenig schmaler, die Seiten fast gerade, mit einem schmalen abgesetzten Rande versehen, hinten sanft gerundet-abgestumpft. Die Schulterbenke ist etwas erhöht, und unter dem Rückenschilde ein kurzer seichter Quereindruck zu bemerken. Bisweilen ist auf der Mitte des Halschildes ein schwärzlicher Schatten vorhanden, der sich auch über das Rückenschild und die Naht der Deckshilde verbreitet. Die Brust ist schwärzlich, der Hinterleib, besonders der After und die Beine sind hell roströthlich.

13. Schmäler Saftknopfskäfer.

E. angustula.

Tab. CCXCVI. Fig. c. C.

Länglich, schmal, gleichbreit, pechbraun, der flach abgesetzte Außenrand des Halschildes, die Fühler und Beine braunroth; fein dicht punktirt, weichhaarig; das Hals-

Schild viereckig, die Seiten fast gerade, der Vorderrand weit und seicht ausgeschnitten, die Hinterwinkel gerade; die Flügeldecken länglich, gleichbreit, hinten gerade abgestumpft, die Außenecken abgerundet.

Länge $1\frac{1}{3}$, Breite $\frac{3}{4}$ Linien.

Epuraca angustula. *Erichs. Germ. Zeitschr.* 4. p. 270. 16.

Am Harz.

Er ist etwas kürzer, aber noch viel schmaler, als der vorige, oben gewölbt; pechbraun, mit einem matten Glanze, fein und sehr dicht punktiert, und mit feinen greisen anliegenden Härchen dünn bekleidet. Der Kopf hinten pechschwarz, nur der vordere Theil braunroth; die Augen tiefschwarz. Die Fühler rostroth, die drei letzten größern, einen länglichen Knopf bildenden Glieder schwärzlich. Das Halschild fast viereckig, wenig kürzer, als breit, der Vorderrand weit, aber seicht ausgeschnitten, so daß die Borderecken kaum vorstehen; die Seiten sind fast gerade, oder nur wenig bemerklich gerundet, nicht sehr breit, und etwas flach ab-

gesezt gerandet, braunroth, die Hinterwinkel gerade, oben ist es nur flachgewölbt, und nahe vor dem Hinterrande seicht quer eingedrückt. Das Rückenschild ist verhältnißmäßig groß, dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind langgestreckt, gleichbreit, die Seiten gerade, nur mit einem feinen, etwas aufgebohenen Rändchen versehen, an der Spitze gerade abgestumpft, aber die Außenecken stark abgerundet; das Schulterbeulchen klein, und unter dem Rückenschilde an der Naht ist noch ein seichter Quereindruck zu bemerken. Die ganze Unterseite des Körpers ist pechschwarz, die Beine rothbraun.

14. Kleiner Saftknopffäfer.

E. pusilla.

Tab. CCXCVI. Fig. d. D.

Länglich, fast gleichbreit, flachgewölbt, dunkel ochergelb, sehr fein und dicht punktiert, weichhaarig; das Halschild quer, der Vorderrand weit- und seicht-ausgeschnitten, die Seiten sanft gerundet, flach-abgesetzt gerandet, die Hinterwinkel

kurz=spitzig; die Flügeldecken länglich, fast gleichbreit, schmal gerandet, an der Spitze stumpf abgerundet.

Länge $1\frac{1}{2}$ Linie.

Epuraea pusilla. *Germ. Zeitschr.* 4, p. 270. 17.

Nitidula pusilla. *Illig. Käf. Pr.* p. 386. 11. —

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 227. 15. — *Schönh.*

Syn. Ins. 2. p. 138. 13. — *Steph. Illustr.*

III. p. 39. 18. — *Dufschm. Fn. Austr.* 3.

p. 137. 18. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1.

p. 399. 21.

In Preußen; bei Osterode unter der Weidenrinde; selten.

Er hat große Ähnlichkeit mit dem folgenden, ist aber größer und verhältnißmäßig etwas länger und besonders durch das breitere Halschild und die stumpf abgerundete Spitze der Flügeldecken unterschieden. Die Farbe ist heller oder dunkler ochergelb, oft in das Rostrothe ziehend, überall mit einem matten Seidenglanze begabt, fein- und dicht, schwach punktiert, und mit weißgelblichen, feinen, anliegenden Härchen dünn überkleidet. Die Augen sind tiefschwarz. Die Fühler sind länger, als der Kopf, roströthlich, das Wurzelglied dick angeschwollen, die drei letzten großen Glieder einen

länglich eiförmigen Knopf bildend. Das Halschild ist quer und etwas breiter, als die Deckshilde, flach gewölbt, der Vorderrand breit-, aber nicht sehr tief ausgeschnitten, die Seitenecken daher nur wenig, doch spitzig vorstehend; die Seiten sanft gerundet, und vorn nur wenig einwärts gezogen, breit, flach abgesetzt-gerandet, die Hinterwinkel kurz zugespitzt. Das Rückenschild ist sehr stumpf dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, die Seiten nur sehr wenig gerundet, mit einem schmalen abgesetzten Rändchen versehen, außer der etwas vorragenden Schulterbeule ganz eben, und an der Spitze stumpf abgerundet. Die Unterseite und die Beine sind in der Farbe mit der Oberseite gleich.

* 15. Sommer-Saftknopfkäfer.

E. aestiva.

Tab. CCXCVII. Fig. a. A.

Länglich=oval, flach, hell ocher-gelb, sehr fein und dicht punktiert, weichhaarig; das Halschild quer viereckig, der Vorder- und Hinter-rand gerade, die Seiten sehr sanft

gerundet und schmal flach=abgesetzt gerandet, die Hinterwinkel kurz=spitzig; die Flügeldecken hinten gerade abgestumpft.

Länge 1 Linie.

Epuraea aestiva *Germ. Zeitschr.* 4. p. 271. 20.

Nitidula aestiva. *Illig. Käf. Pr.* p. 385. 10. —

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 228. 16. — *Oliv. Ent.*

2. 12. p. 16. 23. t. 3. f. 23. a. b. —

Schönh. Syn. Ins. 2. p. 138. 14. — *Steph.*

Illustr. III. p. 37. 13. — *Heer Fn. Col.*

Helv. 1. p. 399. 22.

Silpha aestiva. *Linn. S. N.* 2. p. 574. 32?

Bei Berlin; auch in der hiesigen Gegend.

Er ist viel kleiner, als der vorige, und vorzüglich durch das schmalere Halschild, und die hinten gerade abgestumpften Flügeldecken unterschieden. Die Farbe ist heller ochergelb, nur die Augen sind schwarz. Der Körper ist länglich=oval, oben flach, sehr fein punktiert, und mit feinen, aufliegenden, goldgelben Härchen dünn überzogen. Die Fühler sind ochergelb, und die drei letzten größeren Glieder bilden einen länglich-eiförmigen Knopf. Das Halschild ist quer=viereckig,

vorn nicht verengt, und auch hinten nicht breiter, als die Deckenschild; der Vorder- und Hinterrand ist gerade, so daß die Vorderecken gar nicht vorstehen, und die Hinterwinkel auch nur in eine kurze Spitze übergehen; die Seiten sind nur sehr wenig gerundet, und mit einem schmalen, flach abgesetzten Rande versehen. Das Rückenschild hat die gewöhnliche Größe, ist dreieckig, und punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, fast gleichbreit, mit einem schmalen, flach abgesetzten Rande an den Seiten, hinten gerade abgestumpft, die Außenecken nur wenig gerundet; das Schulterbeulchen raget kaum merklich empor, und unter dem Rückenschilde an der Naht ist nur ein sehr seichter Quereindruck zu bemerken. Die Unterseite und die Beine sind von der Farbe des übrigen Körpers nicht verschieden.

16. Doppeltgezeichneter Saftknopfkäfer.

E. bisignata.

Tab. CCXCVII. Fig. b. B.

Länglich, fast eiförmig, gewölbt, braunroth, dicht punktiert, weichhaarig; auf der Mitte der Flügel-

decken ein schwarzer Flecken; das Hals-
schild quer, vorn etwas verengt, der
Vorderrand ausgeschnitten, der Hin-
terrund gerade, die Seiten gerundet,
flach=abgesetzt gerundet, die Hinter-
winkel kurz gespißt; die Flügeldecken
länglich=eiförmig, an der Spitze
rundlich=abgestumpft.

Länge $1\frac{1}{3}$, Breite 1 Linie.

Von Herrn Dr. Rosenhauer bei Erlangen
gefunden.

Die längliche, doch nicht völlig gleichbreite und
stark gewölbte Gestalt läßt keine gute Vergleichung
mit einer schon bekannten Art zu. Die Farbe ist
ein schönes Braunroth mit starkem Glanze. Die
ganze Oberseite ist stark und dicht punktiert und mit
feinen, anliegenden, greisen, glänzenden Härchen
dünn bekleidet. Der Kopf, wie gewöhnlich, die
Augen schwarz, die Fühler sind roströthlich, der aus
den drei letzten großen Gliedern gebildete länglich eiför-
mige Knopf schwärzlich. Das Halschild ist etwa
halb so lang, wie breit, vorn verengt; der Vorder-
rand etwas tief und nur in der Breite des Kopfes

ausgeschnitten, daher die Vorderecken breit sind und etwas vorstehen; die Seiten sind leicht gerundet, mit einem nicht sehr breiten und nach hinten nur etwas breiter werdenden flach abgesetzten Rande versehen, welcher ziemlich in der Mitte einen Quereindruck hat; der Hinterrand ist gerade, und die Hinterwinkel breit und spizig, etwas vorgezogen. Das Rückenschild ziemlich groß, stumpf dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich-eiförmig, hinten rundlich abgestumpft, besonders die Außenecken stark gerundet, etwas hinter der Mitte stark gewölbt, die Seiten sanft gerundet, mit einem schmalen abgesetzten Rande versehen, sonst außer der wenig erhöhten Schulterbeule, ganz eben und auf der Mitte nahe an der Naht mit einem großen ovalrunden schwarzen Flecken bezeichnet. Die Unterseite des Körpers ist nur etwas heller, als die Oberseite, und die Beine haben dieselbe, aber noch etwas hellere röthliche Farbe.

Herr Prof. Heer beschreibt in seiner Fauna Coleopt. Helvetica Tom. 1. p. 398. 18. eine der unserigen ähnliche Art unter dem Namen *N. bipunctata*. Die Beschreibung paßt so ziemlich auf unsern Käfer, es ist aber doch nicht derselbe, wie ich mich durch Vergleichung des Original-Exemplares, welches mir Herr Prof. Heer mitzutheilen die

Güte hatte, überzeugt habe. Der Käfer ist flacher, als *E. bisignata*, von dunkler ochergelber Farbe, das Halschild noch kürzer, der Umriss verschieden, und die Mitte jeder Flügeldecke nur mit einem schwärzlichen Tüpfelchen besetzt.

17. Veränderlicher Saftknopfkäfer.

E. melanocephala.

Tab. CCXCVII. Fig. c. C.

Stumpf=eiförmig, leicht gewölbt, röthlich=gelb, die Fühler und Beine von derselben Farbe; fein dicht punktirt, weichhaarig; das Halschild kurz, vorn verengt, die Seiten sanft gerundet, ohne abgesetzten Rand; die Flügeldecken kurz und breit, hinten gerade abgestumpft.

Länge 1, Breite $\frac{3}{4}$ Linien.

Abänderung b: pechbraun, die Deckshilde, Fühler und Beine roströthlich.

Abänderung c: pechbraun, die Fühler und Beine roströthlich.

Epuraea melanocephala. *Germ. Zeitschr.* 4.
p. 272. 27.

Nitidula melanocephala. *Marsh. Ent. Brit.*
p. 136. 22. — *Steph. Illustr.* III. p. 40. 22.

Nitid. truncata. *Steph. Illustr.* III. p. 39. 20.

Nitid. ferruginea. *Heer Fn. Col. Helv.* 1.
p. 400. 23.

Nitid. brunnea. *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 400. 24.

Nitid. affinis. *Steph. Illustr.* III. p. 40. 21.

Bei Berlin; auf dem Harz; in Oesterreich.

Er hat eine kurze, hinten breite, stumpfe, vorn eiförmig-verschmälerte Gestalt, und weicht in derselben etwas von seinen Gattungsverwandten ab, nähert sich dagegen mehr der später folgenden Gattung *Meligethes*. Er ist kurz, stumpf-eiförmig, leicht gewölbt, in der Farbe veränderlich: bald ganz pechbraun, bis auf die roströthlichen Fühler, Mund und Beine; bald nur der Kopf, das Halschild und das Rückenschild pechbraun; bald überall roströthlich-gelb. Die ganze Oberseite ist fein punktirt, und mit sehr feinen, langen, anliegenden, greisen, glänzenden Härchen dünn bekleidet. Die Augen sind tief schwarz; der Kopf ist breit, die Stirn kurz, das Kopfschild und die Mundtheile, so wie die Fühler roströthlich, das Wurzelglied der letztern dick, und die drei letzten

größern Glieder einen rundlichen Knopf bildend. Das Halschild ist kaum halb so lang, wie breit, hinten so breit, wie die Deckshilde, vorn aber bis fast zur Breite des Kopfes verengt, der Vorderrand weit, aber leicht ausgeschnitten, daher die Vorderecken nicht vorstehen; die Seiten sind sanft gerundet, und nur mit einem sehr schmalen abgesetzten Rändchen versehen, der Hinterrand ist sehr leicht gerundet, und beiderseits an den Hinterwinkeln etwas ausgeschweift, dieselben sehr kurz gespißt. Das Rückenschild wie gewöhnlich, etwas stumpf-dreieckig, und punktiert. Die Flügeldecken sind kurz, gleichbreit, hinten gerade breit abgestumpft, und bilden beide zusammen fast ein Viereck. Sie sind auf der Mitte gewölbt, außer dem kleinen Schulterbeulchen ganz eben, und am Außenrande mit einem schmalen abgesetzten Rändchen versehen. Die Beine sind stark, roströthlich.

Die Stammart ist überall roströthlich-gelb. Bei der Abart b. haben die Deckshilde eine etwas dunklere Farbe, als die Beine, und Kopf und Halschild sind schwärzlich-braun; die ganz pechbraune Abart c. erhält oben durch die silberglänzenden Härchen einen graulichen Schimmer, Beine und Fühler sind roströthlich. Da die einfarbig roströthlichen Individuen häufiger vorkommen, als die beiden angeführten Abänderungen, so habe ich diese als die Stammart angenommen.

*18. Bordirter Saftknopfkäfer.

E. limbata.

Tab. CCXCVII. Fig. d. D.

Cirund gewölbt, rostroth, fein
 punktiert, weichhaarig; das Hals-
 schild kurz, vorn verengt, der Vor-
 derrand ausgeschnitten, vor dem Hin-
 terrande quer eingedrückt, die Sei-
 ten gerundet, breit flach=abgesetzt
 gerandet; die Flügeldecken kurz, rund-
 lich, abgestumpft hinten mit einem
 großen gemeinschaftlichen schwarzen
 Flecken.

Länge 1 bis $1\frac{1}{4}$ Linie.

Abänderung: ganz rostroth.

Epuraealimbata. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 273. 28.

Nitidula limbata. *Fabr. S. El.* 1. p. 352.

21. — *Illig. Käfer Pr.* p. 383. 8. — *Gyll.*

Ins. Suec. 1. p. 222. 10. — *Oliv. Ent.* 2.

12. p. 20. 31. t. 3. f. 18. a. b. — *Herbst*

Käf. 5. 239. 10. t. 53. f. 9. i. l. — *Schönh.*

Syn. Ins. 2. p. 143. 37. *Steph. Illustr.* III. p. 40. 23. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 395. 5.

In der hiesigen und mehreren Gegenden Deutschlands unter der Rinde der Apfel- Birn- und anderer Bäume.

Die kurz-eisförmige fast rundliche Gestalt macht diese Art leicht kenntlich. Die Farbe ist bräunlich rostroth, etwas glänzend; oben überall sehr fein, dicht punktirt, und mit feinen, greisen, anliegenden Härchen überkleidet. Der Kopf ist hinten schwärzlich, die Augen tief schwarz. Die Fühler sind länger, als der Kopf, roströthlich, der aus den drei letzten großen Gliedern gebildete Knopf ist länglich: die beiden ersten Glieder kurz, das Endglied größer, rundlich. Das Halschild ist breit, fast nur den dritten Theil so lang, wie breit, hinten so breit, wie die Deckshilde an der Wurzel, vorn verengt, der Vorderrand tief ausgeschnitten, die Vorderecken breit, und vorstehend; die Seiten gerundet, sehr breit flach abgesetzt, der Rücken gewölbt, schwärzlich überlaufen, und vor dem Hinterrande der ganzen Breite nach niedergedrückt; der Hinterrand gerade und nur sehr leicht ausgeschweift, die Hinterwinkel breit und stumpf. Das Rückenschild ziemlich groß, kurz, drei-

eckig, punktiert. Die Flügeldecken sind kurz, an der Wurzel breit, nach hinten allmählig schmaler, an der schmalen Spitze abgestumpft, auf dem Rücken stark gewölbt, die Seiten mit einem breiten flach abgesetzten Rande versehen, das Schulterbeulchen etwas erhaben; die ganze hintere Hälfte ist mit einem großen schwarzen Flecken, der weder den Spitzennoch Außenrand berührt, bedeckt. Die Unterseite ist schwarzbraun, der After und die Beine sind rost-röthlich.

Bisweilen fehlt der schwarze Flecken auf den Flügeldecken, und der ganze Käfer ist einfarbig rost-reth.

CXXIII. Schimmerknopfkäfer.

NITIDULA. *)

Tab. CCXCVIII.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das Wurzelglied groß, nach außen verdickt, das zweite kleiner, doch noch dicker, als die folgenden, das dritte etwas gestreckt, die folgenden allmählich kürzer und etwas dicker werdend, die drei letzten Glieder groß, abgesetzt, einen runden Knopf bildend. (Fig. C.)

Die Lefze hornartig, in der Mitte ausgebuchtet, am Rande mit Haaren gewimpert. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, gebogen, mit zweizähliger Spitze. (Fig. E.)

Die Kinnladen am Stamme hornartig,

*) Nitidula. *Fabr. Ent. Syst. I. 1. p. 255.* — *Germar Zeitschr. 4. p. 273.*

die Lade am Innenrande und der Spitze mit einem starken Bart. (Fig. F.)

Die Zunge häutig, vorn mit einem häutigen Saum eingefast, und an den Borderecken mit einem dreieckigen Hautzipfel. (Fig. G.)

Die Lippe quereckig, vorn ausgebuchtet. (Fig. H.)

Die Kinnlagentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite groß, verkehrt kegelförmig, das dritte halb so lang, wie das zweite, das Endglied fast so lang wie die übrigen zusammen, allmählich zugespitzt. (Fig. I.)

Die Lippentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite größer, verkehrt kegelförmig, so lang, wie das eiförmig zugespitzte Endglied. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper ist ziemlich platt, länglich-rund, oder stumpf-eiförmig, mit feiner Pubescenz bekleidet

(Fig. A.). Der Kopf ist mäßig klein; das Kopfschild schmal-vorstehend, und durch einen grubchenartigen Eindruck hinten beiderseits begrenzt. Die Augen sind kugelig, etwas vorstehend. Die Lefze klein, kurz. Die Kinnbacken an den Seiten sichtbar. Die Fühler überragen kaum in der Länge die Breite des Kopfes, sind dünne, und endigen in einen großen dreigliederigen runden Knopf. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes convergirend. Das Halschild ist quer, hinten genau so breit, wie die Basis der Deckenschilder, nach vorn verengt, der Borderrand leicht angedrückt, der Hinterrand fast gerade, die Seiten leicht gerundet. Das Rückenschild (Fig. L.) ist mäßig groß, gerundet. Die Flügeldecken sind länglich-eiförmig, an der Spitze gerundet oder abgestumpft, und lassen ein oder zwei der letzten Hinterleibssegmente mehr oder weniger unbedeckt. Ein eigenes Afterssegment findet sich bei beiden Geschlechtern nicht. Sie verbergen zwei unter sie eingeschlagene, weiße, zarte, mit wenigen Nerven versehene Flügel (Fig. m. M.). Die Beine sind stark, von mittlerer Länge, die Schenkel breit, walzig, zusammengedrückt; die Schienen fast kürzer, als die Schenkel, schmal, und nach vorn nur wenig breiter, zusammengedrückt, auf den Außenkanten fein gewimpert, die Enddornen von mäßiger

Größe; an den Füßen sind die drei ersten Glieder seitlich erweitert, unten mit dichter Haarbekleidung; das vierte Glied ist sehr klein, versteckt, das Klauenglied so lang, wie die übrigen zusammengenommen, mit einfachen Krallen.

Fig. N. stellt ein vorderes, Fig. O. ein hinterstes Bein vor.

Sie haben ziemlich die gleiche Lebensart, wie die ihnen nächst verwandten Gattungen. Man findet sie unter Baumrinden, beim Nase und in Schwämmen. An heitern Abenden schwärmen sie in der Luft umher.

*1. Zweiblatteriger Schimmerknopfkäfer.

N. bipustulata.

Tab. CCXCVIII. Fig. a. A—O.

Breit-eiförmig, etwas flach, matt, fein punktiert, der Seitenrand des Halsschildes rostroth; auf jeder Flügeldecke ein rother Flecken; die Beine rostrothlich.

Länge 2—2 $\frac{1}{4}$, Breite 1—1 $\frac{1}{4}$ Linien.

Nitidula bipustulata. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 274. 1. — *Fabr. S. El.* 1. p. 347. 2. — *Illiger Käf. Pr.* p. 382. 6. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 221. 8. — *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 4. 1. t. 1. f. 2. a. b. — *Herbst Käf.* 5. p. 229. 1. t. 33. f. 1. A. — *Panz. Fn.* 3. 10. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 135. 2. — *Dustschm. Fn. Austr.* 3. p. 130. — *Steph. Illustr.* III. p. 35. 7. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 395. 6.

Silpha bipustulata. *Linn. S. N.* 2. p. 570. 4.

In hiesiger Gegend nicht selten, unter Baumrinden, in Schwämmen, beim Nase; auch fliegt er gern in die Häuser, wo er den Fettwaaren nachgehen soll.

Seine Gestalt ist ziemlich breit und stumpf-eiförmig, nur sehr leicht gewölbt; die Farbe ist schwarz, bisweilen in das Braune übergehend, und mit einem matten Glanze versehen; die ganze Oberseite ist fein punktiert und mit schwarzen anliegenden Härchen ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind entweder ganz schwarz, oder braunroth, und nur die drei letzten, einen großen runden Knopf bildenden Glieder, schwarz. Das Halschild ist kürzer, als breit, und hinten so breit, wie die Deck-

schilde, nach vorn aber verengt, auf dem Rücken gewölbt, die Seiten nach vorn fast gerade, nur in den Hinterwinkeln gerundet, nicht sehr breit flach abgesetzt, und braunroth, der Hinterrand gerade, sehr leicht ausgeschweift, auch ist beiderseits desselben ein schieß aufsteigender Eindruck zu bemerken; der Vorderrand ist nur leicht ausgeschnitten, die Vorderecken daher kaum vorstehend, auch die Hinterwinkel sind stumpf. Das Rückenschild ist stumpf-dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglich, fast gleichbreit, die Seiten fein gerandet, hinten gerade abgestumpft, die Außenecken etwas gerundet; hinter der Mitte an der Naht auf jeder Flügeldecke mit einem rundlichen rostrothen Flecken bezeichnet. Der After ragt etwas unter den Deckschilden vor. Die Beine sind heller oder dunkler rostbräunlich.

*2. Dunkler Schimmerknopfkäfer.

N. obscura.

Stumpf-eiförmig, beinahe flach, düster schwarz, ohne Glanz, die Wurzel der Fühler und die Beine rostroth; sehr fein punktiert, mit mäu= segrauen Härchen dicht belegt.

Länge $1\frac{3}{4}$ —2, Breite 1— $1\frac{1}{4}$ Linien.

- Nitidula obscura. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 275.
 2. — *Fabr. S. El.* 1. p. 348. 4. — *Illig. Käf. Pr.* p. 383. 7. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 221. 9. — *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 5. 3. t. 1. f. 3. a. b. — *Herbst Käf.* 5. p. 230. 2. t. 53. f. 2. b. B. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 136. 4. — *Dufschm. Fn. Austr.* 3. p. 130. 4. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 395. 7.

Silpha rufipes. *Linn. S. N.* 2. p. 573. 24.?

Nitidula rufipes. *Steph. Illustr.* III. p. 35. 8.

In der hiesigen Gegend an gleichen Orten mit den vorigen.

Er hat dieselbe Gestalt, wie *N. bipustulata*, nur ist er etwas kleiner und noch minder gewölbt; düster schwarz, ohne allen Glanz, und mit mäusegrauen Härchen ziemlich dicht belegt, unter welchen eine sehr feine Punktirung bemerklich ist. Die Kiefer und die Fühler sind rostbraun, die drei letzten, einen großen rundlichen Knopf bildenden Glieder schwärzlich. Das Halschild ist fast viereckig, nur wenig kürzer, als breit, hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn nur sehr wenig verengt, die Seiten sanft gerundet, fein gerandet, der Rücken

leicht gewölbt, die Seiten ziemlich breit niedergedrückt, wodurch die Wölbung des Rückens besonders am Hinterrande beiderseits durch einen Eindruck merklich abgegrenzt ist; der Vorderrand ist leicht bogenförmig ausgeschnitten, die Vorderecken gar nicht vorragend, der Hinterrand und die Hinterwinkel gerade. Das Rückenschild, wie bei dem vorigen. Die Flügeldecken sind länger, als bei jenem, gleichbreit, hinten gerade abgestumpft; aber die Außenecken stark abgerundet, die Seiten schmal gerandet, bisweilen nebst dem Seitenrändchen des Halschildes braunroth durchscheinend; die Beine rostroth.

Auch bei diesem lassen die Flügeldecken die Afterspitze unbedeckt.

3. Vierblatteriger Schimmerknopfkäfer.

N. quatripustulata.

Länglich, schmal-eiförmig, beinahe flach, schwarzbraun, ohne Glanz, dicht runzelig-punktirt, mit feinen Härchen dicht bedeckt; die Fühler und Beine rostgelb; die Flügeldecken braunroth,

jede derselben mit zwei ockergelben Flecken.

Länge $1\frac{1}{4}$ Linie.

Nitidula quadripustulata. *Germ. Zeitschr.* 4. 275. 3. — *Fabr. S. El.* 1. p. 348. 3. — *Illig. Mag.* 1. p. 88. — *Herbst Käf.* 5. p. 231. 3. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 136. 3. — *Steph. Illustr.* III. p. 35. 9. t. 16. 4. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 401. 26.

Carpophilus quadripustulatus. *Sturm Cat.* 1843. p. 89.

Nit. carnaria. *Schall. Act. Hall.* 1. p. 257.

Nit. guttalis. *Herbst Käf.* 5. p. 247. 23. t. 54. f. 7.

Nit. 10-guttata. *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 10. 12. t. 3. f. 24.

Abänderung.

Nit. variata. *Steph. Illustr.* III. p. 36. 10.

Nit. flavipennis. *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 400. 25.

In Preußen und Oesterreich, in sandigen Gegenden, an Knochen.

Von schmaler, ziemlich gleichbreiter, eiförmiger Gestalt, schwarzbraun, ohne Glanz, dicht und fein

ruzzelig-punktirt, mit feinen, anliegenden bräunlichen Seidenhärchen sehr dicht bedeckt. Der Kopf ist groß, die Kiefer stark; die Augen schwarz. Die Fühler sind dünn, roströthlich, die drei letzten Glieder schwärzlich, einen großen rundlichen Knopf bildend. Das Halschild ist so breit, wie die Deckshilde, aber fast ein Dritttheil kürzer, als breit, flachgewölbt, nach vorn fast unmerklich verengt, die Seiten sanft gerundet und in den Hinterwinkeln etwas eingezogen, mit einem schmalen weißfülzigen Rändchen versehen; der Vorder- und Hinterrand sind fast ganz gerade, und an dem letztern beiderseits ein kurzer Eindruck zu bemerken. Das Rückenschild klein, rundlich-dreieckig, punktirt. Die Flügeldecken sind länglich, gleichbreit, beinahe flach, hinten gerade abgestumpft, die Außenecken abgerundet, die beiden letzten Hinterleibssegmente unbedeckt lassend. Auf jeder Flügeldecke stehen zwei große runde, bleich ochergelbe Flecken, der erste an der Schulter, der andere etwas hinter der Mitte, der Naht genähert. Gewöhnlich sind auch noch am Außerrande drei unter einander stehende kleine, bald heller, bald dunkler rothbräunliche Fleckchen, und auch noch eines an der Basis neben dem Rückenschilde sichtbar, welche aber auch öfter ganz, oder mehr oder weniger verloschen sind. Die Beine sind hell rostgelb.

4. Bogenfleckiger Schimmerknopffäfer.

N. flexuosa.

Breit=oval, flach, schwarzbraun, fein punktiert, weichhaarig; die Seiten des Halschildes und die Beine rostgelb; die Flügeldecken hinten abgestumpft mit einem hin- und hergebogenen hellgelben, von der Basis bis hinter die Mitte reichenden, bisweilen unterbrochenen Flecken.

Länge $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$, Breite 1 — $1\frac{1}{3}$ Linie.

Nitidula flexuosa. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 275. 5. — *Fabr. S. El.* 1. p. 351. 17. — *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 7. 6. t. 1. f. 6. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 143. 35. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 397. 12.

Nit. flavomaculata. *Rossi Faun. Etr.* 58. 142.

In Krain.

Er hat die Gestalt der *N. bipustulata*, ist

aber noch flacher und in der Größe veränderlich, bisweilen noch größer, als jene. Die Farbe ist schwarzbraun, matt glänzend, fein punktiert, mit dazwischen stehenden stärkeren Punkten, und von weichen Härchen dünn überkleidet. Der Kopf ist verhältnißmäßig groß, die Augen tief schwarz, die Kiefer rostgelb. Die Fühler sind länger, als der Kopf, dünne, rostgelb, die drei letzten großen Glieder schwärzlich, einen rundlichen Knopf bildend. Das Halschild ist hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn nur etwas verengt, und fast ein Dritttheil kürzer, als breit; die Seiten sind nach vorn fast gerade, nur hinten etwas vortretend gerundet, daher in den Hinterwinkeln etwas einwärts gezogen, und diese gerade. Der Vorder- rand ist weit, aber nur leicht ausgeschnitten, die Vorderwinkel kaum etwas vorstehend. Die Seiten sind breit, etwas flach abgesetzt, hell braunroth; der Hinterrand gerade und nur sehr wenig ausgeschweift. Das Rückenschild ist etwas kurz, stumpf dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind kurz, nach hinten nur wenig schmaler, die Seiten sanft gerundet, mit einem feinen, etwas aufgebogenen Rande, und meist braunrothem Saume versehen, etwas rundlich abgestumpft, so daß sie am Ende der Naht etwas klaffen, die Außenecken aber stärker abgerundet sind, und die Asterdecke nicht ganz bedecken. An

der Basis sind sie mit einem die ganze Breite derselben einnehmenden, hin- und hergebogenen bleich ochergelben Flecken geziert, unter welchem an der Naht noch ein anderer fastmondsförmig ausgeschweif-ter steht, welcher öfter mit dem an der Basis zusammen hängt. Die braunrothen Seiten des Hals- schildes scheinen auf der Unterseite durch. Der ganze Hinterleib ist pechschwarz, glänzend; die Beine stark und rostgelb.

CXXIV. Buntknopffäfer.

SORONIA.*)

Tab. CCXCIX.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das erste Glied sehr stark erweitert das zweite wenig dicker, als die folgenden, länglich eiförmig, das dritte gestreckt, die folgenden allmählich etwas kürzer und dicker, die drei Endglieder einen großen, abgesetzten, eiförmigen, zusammengedrückten Knopf bildend. (Fig. C.)

Die Lefze hornartig, an der Spitze leicht ausgebuchtet, mit feinen Härchen gewimpert. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, mit einfacher nach innen gebogener Spitze, und einem Zähnen hinter derselben. (Fig. E.)

*) Soronia. *Erichson* in *Germ. Zeitschr. für die Entomol.* 4. p. 277. — *Nitidula. Fabr.*

Die Kinnladen am Stamme hornartig, innen und an der Spitze breit häutig, länglich, am Innen- und Spitzeraude mit einem dichten Bart eingefast. (Fig. F.)

Die Zunge hornartig, mit einem breiten häutigen Saum, der an den Vordercken in Lappen vortritt, welche fast bis zur Taster-
spitze reichen. (Fig. G.)

Die Lippe hornartig, an der Spitze faust zweibuchtig. (Fig. H.)

Die Kinnladentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite verkehrt kegelförmig, das dritte kürzer, als dieses, das Endglied walzig, an der Spitze etwas verdünnt, so lang, wie die übrigen zusammen. (Fig. I.)

Die Lippentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite gestreckt, das Endglied walzig und etwas länger, als das zweite. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper (Fig. A.) ist etwas breit, oval, stumpf, und ziemlich flach, mit erweitertem Seitenrande des Halsschildes und der Flügeldecken. Der Kopf ist klein, das Kopfschild schmal vorstehend. (Fig. B.) Die Augen sind klein, kugelig, etwas vorstehend, mit einer starken Netzhaut. Die Fühler sind etwas länger, als der Kopf, das erste Glied ist stark erweitert, und die drei Endglieder zu einem länglich-runden, zusammengedrückten Knopfe vergrößert. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes sind kurz, gerade, convergirend. Das Halsschild ist hinten so breit, wie die Deckenschilder, aber durch die stark eingezogenen Seiten vorn verengt, der Vorderrand tief ausgeschnitten, daher die Vorderecken stark vortreten; der Hinterrand zu beiden Seiten leicht ausgebuchtet, die Seiten breit abgeflacht, fein gerandet. Das Rückenschild (Fig. L.) ist kurz, dreieckig, mäßig groß. Die Flügeldecken sind länglich oval, an der Spitze gemeinschaftlich zugerundet, mit einem breiten fast rinnenförmigen Seitenrande. Sie bedecken den Hinterleib und zwei unter sie eingeschlagene häutige Flügel. (Fig. m. M.) Beim Männchen wird ein kleines oberes Aftersegment kaum sichtbar. Die Mittelbeine stehen nicht sehr weit auseinander. Die Schenkel sind in der Mitte etwas verdickt, zusammen-

gedrückt; die Schienen sind schmal, etwas gedrückt, die Außenseiten fein gewimpert, mit einem kleinen Enddorn versehen; die drei ersten Glieder der Füße sind kurz und schmal, unten mit einzelnen Haaren besetzt, das vierte Glied sehr klein; das Klauenglied aber länger, als die übrigen zusammen, mit einfachen Klauen.

Sie halten sich unter Baumrinden auf.

1. Punktirter Buntknopfkäfer.

S. punctatissima.

Tab. CCXCIX. Fig. a. A—O.

Breit-eiförmig, leicht gewölbt, rostbraun, stark punktirt, mit gelblichen Borstenhärchen dünn bekleidet, schwarzbraun scheckig gefleckt; die Seiten des Halsschildes und der Flügeldecken flach abgesetzt, letztere hinten mit einer hellern zickzackförmigen Querbinde.

Länge $2\frac{1}{2}$ —3, Breite $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ Linien.

Soronia punctatissima. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 278. 1.

Nitidula punctatissima. Illig. *Schneid. Mag.* p. 598 6. — *Panz. Fn.* 25. 7. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 214. 1. — *Schön. Syn. Ins.* 2. p. 142. 31. — *Steph. Illustr.* III. p. 32. 2. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 394. 1.

Silpha maculata. *De Geer. Ins. ed. Goeze.* 4. p. 110. 10.

In Norddeutschland, sehr selten; in Schlesi-

von breit-ovaler Gestalt, mäßig gewölbt, rost-braun, sehr dicht und stark punktiert, und mit gelblichen, steifen Härchen dünn bekleidet. Der Kopf ist klein, etwas gedrückt, uneben. Die Augen schwarz, etwas vorstehend. Die Fühler sind rost-gelb, dünn, die drei letzten größeren Glieder bilden einen eirunden, dunkleren, mit greisen Härchen besetzten Knopf. Das Halsschild ist kurz, hinten so breit, wie die Deckschilde, vorn vereengt, der Vorder-rand tief ausgeschnitten, der Hinterrand gerade, die Seiten wenig gerundet, breit-flach niedergedrückt, die Vorderecken vorstehend, die Hinterwinkel gerade. Das mäßig gewölbte Mittelfeld ist mit einer schwachen Längsfurche und mehreren feichten Eindrückungen besetzt, welche öfter eine schwärzlichbraune Farbe

annehmen, von denen die hinteren in eine Querreihe gestellt, die übrigen vor diesen vertheilt sind. Das Rückenschild ist kurz, stumpf, dreieckig, punktiert. Die Flügeldecken sind breit-eiförmig, hinten abgerundet, auf der Mitte gewölbt, die Seiten flach niedergedrückt, oben von schwach kielförmig erhöhten Linien durchzogen; die Grundfarbe ist rostbräunlich, mit schwärzlichbraunen Figuren und Flecken bezeichnet, welche hinten eine zickzackförmige Querbände von der Grundfarbe einfassen. Die Unterseite des Körpers ist rostbraun, punktiert. Die Beine sind hell rostrothlich.

Die Männchen unterscheiden sich durch ihre vordersten Schienen, welche sanft gekrümmt, gegen die Spitze etwas erweitert, und am innern Rande in der Mitte eingedrückt, fast wie durch eine Einkerbung abgesetzt sind. (Fig. N.)

*2. Greisgrauer Buntknopfläfer.

S. grisea.

Länglich = eiförmig, braungelb, locker punktiert, mit greisen Borstenhärchen dünn bekleidet; das Halschild uneben, schwarz gefleckt, die

Seiten desselben und die der Flügeldecken niedergedrückt, letztere mit schwarzen Linien und Flecken, welche hinten eine Querverbinde bilden, gescheckt.

Länge $1\frac{2}{3}$ — $2\frac{1}{3}$, Breite 1 — $1\frac{1}{3}$ Linien.

Soronia grisea. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 279. 2.

Silpha grisea. *Linn. S. N.* 2. p. 574. 30.

Nitidula grisea. *Marsh. Ent. Br.* p. 134. 15.

— *Steph. Illustr.* III. p. 33. 3.

Nit. varia. *Fabr. S. El.* 1. p. 350. 15. —

Illig. Verz. d. Käf. Pr. p. 380. 2. — *Gyll.*

Ins. Suec. 1. p. 215. 2. — *Herbst Käf.* 5.

p. 232. 5. t. 53. f. 4. d. D. — *Panz. Fn.*

105. 2. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 142. 32.

— *Dufschm. Fn. Austr.* 3. p. 129. 3. —

Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 394. 2.

Nit. variegata. *Ol. Ent.* 2. 12. p. 4. 2. t. 1.

f. 1. a. b. c.

In der hiesigen Gegend im Frühjahr unter der Rinde der Weiden- und Eichenstämmen, im Sommer oft häufig bei dem ausfließenden Saft derselben.

Er ist kleiner, als der vorige, ändert aber in der Größe sehr ab, und hat eine mehr länglich-eiförmige und weniger gewölbte Gestalt. Die Farbe ist

heller oder dunkler rost- oder braungelb, von schwarzen Strichen und Flecken scheckig, schwach chagrinarartig mit eingestreuten Punkten, und hellgelben Borstenhärchen dünn bekleidet. Der Kopf ist ungleich, die vorragenden Augen schwarz. Die Fühler sind rostrothlich, der rundliche Knopf dunkler. Das Halschild, wie bei dem vorigen; durch schwarz gefärbte Eindrücke uneben, welche in derselben Ordnung, wie bei jenem stehen, die Hinterwinkel, die bei dem vorigen einen scharfen Winkel machen, sind bei diesem stumpf. Das Rückenschild ist kurz, fast herzförmig, punktiert. Die Flügeldecken sind länglicheiförmig, auf dem Rücken etwas flach, die Seiten flach niedergedrückt, an der Spitze abgerundet; oben von schwach gefielten Längslinien durchzogen, die unterbrochen schwarz gefärbt sind, und hinten vor der Spitze meist in eine schwarze Querbinde zusammenfließen; auch vor dem abgesetzten Rande stehen noch einige schwarze Fleckchen. Die Unterseite des Körpers ist bei helleren Exemplaren rostgelb, bei dunkleren rostbrann, oder bis auf den helleren After schwärzlich. Die Beine sind hell rostgelb, die vordersten Schienen bei beiden Geschlechtern einfach.

CXXV. Lappenknopffäfer.

AMPHOTIS. *)

Tab. CCC.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das erste Glied nach vorn zu einem breiten, beilförmigen Lappen erweitert, das zweite Glied kaum dicker, als die folgenden, das dritte ziemlich von der Länge des zweiten, die folgenden allmählich etwas kürzer, aber kaum dicker werdend, der aus den drei letzten Gliedern bestehende Knopf fast kreisrund, zusammengedrückt, das erste Glied desselben so groß, wie die andern beiden zusammengekommen. (Fig. C.)

Die Lefze vorn eingeschnitten, die dadurch vorstehenden Ecken einen Lappen bildend. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, nach außen

*) *Amphotis*. *Erichson* in *Germ. Zeitschr. f. d. Ent.* 4. p. 290. *Nitidula*. *Fabr.*

erweitert, und scharf gerandet, mit stark zweizähliger Spitze. (Fig. E.)

Die Kinnladen am Stamme hornartig, die Lade einfach, häutig, an der Spitze und am Innenrande mit einem dichten Bart besetzt. (Fig. F.)

Die Zunge hornartig, von einem häutigen Saum eingefast, der vorn ein Paar kurz abgerundete Lappen bildet. (Fig. G.)

Das Kinn hornartig, vorn leicht ausgebuchtet. (Fig. H.)

Die Kinnladentaster viergliederig; das erste Glied sehr klein, das zweite ziemlich lang, gestreckt verkehrt kegelförmig, das dritte ziemlich kurz, das Endglied fast so lang, wie die übrigen zusammengenommen, walzig. (Fig. I.)

Die Lippentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das dritte ein wenig länger, als das zweite, walzig. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper (Fig. A.) hat eine elliptische Form, ist unten flach, auf der Oberseite mäßig gewölbt, mit breit abgesetztem Rande des Halschildes und der Flügeldecken. Der Kopf (Fig. B.) ist mäßig groß, der Stirnrand vor den Augen unter der Einlenkung der Fühler etwas erweitert; das Kopfschild schmal, und die Kiefer vorstehend. Die Augen ziemlich klein, rund, mit einer starken Netzhaut. Die Fühler sind etwas länger, als der Kopf, dünn, und durch das erste, große Glied ausgezeichnet, das an beiden Seiten des Kopfes, vor den Augen als ein vorstehender Lappen sich zeigt. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes tief, hinter den Augen nach außen gebogen. Das Halschild ist so breit, wie die Deckshilde, die Seiten gerundet, vorn etwas verengt, und der Borderrand tief ausgeschnitten, der Rücken mäßig gewölbt, die Seiten in einen breiten Rand abgesetzt, und durch den aufgebogenen Außenrand rinnenförmig, der Hinterrand fast gerade mit scharfen Hinterwinkeln. Das Rückenschild klein, kurz, dreieckig (Fig. L.). Die Flügeldecken gewölbt, und auf gleiche Art, wie das Halschild gerandet, jede auf dem Rücken von fünf erhöhten Längsreihen durchzogen. Sie bedecken den ganzen Hinterleib und zwei unter sie eingeschlagene häutige Flügel (Fig. m. M.). Die Beine sind

mäßig stark, die Schienen mit feinen Haarreihen auf den Außenkanten, und mit mäßig starken Enddornen versehen; die Füße sind kurz und dünn, die drei ersten Glieder etwas breiter, unten behaart, das vierte sehr klein, das Klauenglied so lang, wie die übrigen zusammengenommen, mit einfachen Krallen. (Fig. N. ein vorderes, Fig. O. ein hinterstes Bein.)

Sie leben unter Baumrinden.

*1. Breitrandiger Lappenknopffäfer.

A. marginata.

Tab. CCC. Fig. a. A—O.

Girund, gewölbt, rostbraun, die Deckshilde schwarzbraun, der Außenrand des Halschildes und der Deckshilde breit-flach-abgesetzt, aufgebogen, rostroth; jede der Flügeldecken mit fünf erhöhten Längslinien, und an der Wurzel und auf der Mitte mit quer neben einander stehenden rostgelben Flecken.

Länge $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$, Breite $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ Linien.

Amphotis marginata. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 291. 1.

Nitidula marginata. *Fabr. S. El.* 1. p. 348. 6. — *Gyll. Ins. Suec.* 1. p. 216. 3. — *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 11, 13. t. 2. f. 15. a. b. — *Herbst Käf.* 5. p. 243. 15. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 136. 6. — *Steph. Illustr.* III. p. 32. 1. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 394. 3.

Nit. (Cerophorus) marginata. *Laporte Hist. nat. des Ins.* 2. p. 10. 2.

Nit. biloba. *Herbst Käf.* 5. p. 238. 9. t. 53. f. 8. h. H. — *Panz. Fn.* 35. 10.

Zu der hiesigen Gegend, etwas selten.

Die ausführliche Beschreibung dieser Art ist schon in den vorangegangenen Gattungsmerkmalen enthalten; überhaupt ist dieselbe an den lappenförmig-erweiterten erstem Gliede der Fühler leicht zu erkennen.

CXXVI. Saumknopfkäfer.

OMOSITA. *)

Tab. CCCI.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das erste Glied stark nach außen verdickt, das zweite etwas dicker, als die folgenden, walzenförmig, das dritte bis achte gleich dick, aber an Länge allmählich abnehmend, der aus den drei letzten größern Gliedern bestehende Knopf rundlich, zusammengedrückt. (Fig. C.)

Die Lefze ist vorn leicht ausgebuchtet, und mit einem Barte langer Haare besetzt. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, mit einfacher Spitze und einem kurzen Einschnitt unter derselben. (Fig. E.)

*) Omosita. *Erichson* in *Germ. Zeitsch. f. d. Ent.* 4. p. 298. — *Nitidula Fabr.*

Die Kiunladen am Stamme hornartig, die Lade pergamentartig, länglich, innen und an der Spitze mit einem Bart von Haaren besetzt. (Fig. F.)

Die Zunge hornartig, mit großen seitlichen Hautlappen, welche die Seiten einfassen, und vorn spitzwinkelig weit vortreten. (Fig. G.)

Das Kinn hornartig, vorn sanft ausgebuchtet. (Fig. H.)

Die Kiunladentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite lang, verkehrt kegelförmig, das dritte kurz, das Endglied etwas länger, als das zweite, nach der Spitze hin etwas verdünnt. (Fig. I.)

Die Lippentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite länglich, das Endglied noch etwas länger, fast eiförmig. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper (Fig. A.) ist etwas breit und kurz eiförmig, oben flach gewölbt. Der Kopf (Fig. B.) ist ziemlich klein, der Stirnrand vor den

Augen nicht erweitert. Die Kiefer über das schmale Kopfschild vorragend. Die Augen rundlich, mit einer feinen Netzhaut. Die Fühler sind etwas kurz und bis auf dem ziemlich großen rundlichen Knopf dünne. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes um die Augen nach außen gebogen. Das Halschild ist breit, durch die vorn stark einwärts gezogenen Seiten, daselbst verschmälert, der Vorderrand tief ausgeschnitten, der Hinterrand ausgebuchtet, die Hinterwinkel scharf gespitzt, das Mittelfeld wenig erhöht, die Seiten breit flach abgesetzt. Das Rückenschild (Fig. L.) ist klein, abgerundet. Die Flügeldecken sind breit, eiförmig gerundet, die Seiten breit gerandet, und bedecken den Hinterleib, so wie zwei unter sie eingeschlagene häutige Flügel. (Fig. m. M.) Die Beine sind alle ziemlich weit auseinander stehend; die Schenkel wenig verdickt, mit einer geringen Andeutung der gewöhnlichen Rinne zum Einlegen der Schienen, diese gerade, schmal, mit fein gewimperten Außenkanten, und ziemlich feinen Gubdornen; die Füße klein und zart, die vordersten (Fig. N.) mächtig, die hinteren (Fig. O.) nur schwach erweitert, unten mit einer von dichten Haaren besetzten Sohle, das vierte Glied sehr klein, das Klauenglied stark, so lang, wie die übrigen Glieder zusammen genommen, mit einfachen Klauen.

Sie leben sowohl unter Baumrinden, als auch im Kase.

1. Beschmuhter Saumknopfkäfer.

O. depressa.

Tab. CCCI. Fig. a. A—O.

Grund, flach, roßroth, fein punktirt, weichhaarig; die Seiten des Halsschildes breit flach abgesetzt, das Mittelfeld schmal, mit zwei Eindrücken am Hinterrande; die Flügeldecken mit einem flach abgesetzten Rande, schwarz gefleckt, und jede derselben mit drei verloschenen Längslinien.

Länge 2—2 $\frac{1}{4}$, Breite 1 $\frac{1}{3}$ —1 $\frac{1}{2}$ Linie.

- Omosita depressa. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 299. 1.
 Silpha depressa. *Linn. Faun. Suec.* 2. n. 463.
 Nitidula depressa. *Steph. Illustr.* III. p. 33. 4.
 Nit. sordida: *Fabr. S. El.* 1. p. 351. 16. —
Gyll. Ins. Suec. 1. p. 217. 4. — *Illig. Käf. Pr.* p. 379. 1. — *Herbst Käf.* 5. p. 249.
 25. t. 54. f. 9. i. — *Schönh. Syn. Ins.* 2.

p. 141. 29. — *Dufsch. Fn. Austr.* 3. p. 128.

2. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 395. 4.

In Oesterreich, Preußen. Unter der Rinde, auch beim Nase.

Er hat eine breit eiförmige, etwas flache Gestalt, ist dunkel rostroth, und oben sehr fein und dicht punktiert, und mit feinen aufliegenden graisen Härchen dünn bekleidet. Der Kopf ist klein, meist schwarz, uneben. Die Fühler rostroth, der rundliche Knopf schwärzlich. Das Halschild ist kurz, hinten so breit, wie die Deckshilde, nach vorn verengt, der Vorderrand tief ausgeschnitten, die Vorderwinkel scharf vorstehend, die Seiten leicht gerundet, breit flach abgesetzt, das Mittelfeld schmal, schwärzlich, an den Seiten von einer eingedrückten Linie begrenzt, und am Hinterrande beiderseits mit einem grubenartigen Eindrucke versehen; der Hinterrand ist gerade, sehr leicht ausgeschweift, die Hinterwinkel zugespitzt. Das Rückenschild ist stumpf, dreieckig, schwärzlich und punktiert. Die Flügeldecken sind breit-eiförmig, auf dem Rücken leicht gewölbt, der Rand etwas breit flach abgesetzt, die Schulterbeule stumpf erhöht, auch sind drei, fast erloschen erhabene Längslinien auf jeder zu bemerken, zwischen welchen längliche, mehr oder weniger zusammenhängende schwärzliche Fleck-

chen stehen, die gewöhnlich an der Wurzel zwei runde Flecken von der roströthlichen Grundfarbe unberührt lassen, und hinter der Mitte zeigt sich auf gleiche Art eine Querbinde. Die Unterseite des Körpers ist gewöhnlich dunkelbraun, die Brust schwarz. Die Beine heller roströth.

*2. Rostfleckiger Saumknopfkäfer.

O. colon.

Eiförmig, stumpf, flach, schwarzbraun, fein punktiert, weichhaarig; die Seiten des Halsschildes flach niedergedrückt, roströth, auf dem Mittelfelde zwei Eindrücke; die Spitze der Flügeldecken und mehrere Flecken roströth.

Länge $1\frac{1}{2}$, Breite 1 Linie.

Omosita colon. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 299. 2.

Silpha colon. *Lin. Faun. Suec.* n. 462.

Nitidula colon. *Fabr. S. El.* 1. p. 351. 20. —

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 218. 5. — *Illig. Verz.*

d. Käf. Pr. p. 380. 3. — *Oliv. Ent.* 2. 12.

p. 13. 16. t. 1. f. 4. a. b. — *Schönh. Syn.*

Ins. 2. p. 143. 38. — *Dufsch. Fn. Austr.* 3. p. 133. 11. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 396. 9.

Abänderung.

Nit. haemorrhoidalis. Fabr. S. El. 1. p. 352. 22. — *Herbst Käf.* 5. p. 335. 7. t. 53. f. 6. f. F.

In der hiesigen Gegend nicht selten, unter Baumrinden, auch an Naase.

Er hat eine mehr gleichbreite, stumpf-eiförmige Gestalt, als der vorige, ist schwarz oder schwarzbrunn, fast ohne Glanz, sehr fein punktirt und mit greifen, steifen Härchen dünn bekleidet. Der Kopf ist klein, ungleich, die Augen tief schwarz. Die Fühler sind rostroth, der rundliche Knopf schwärzlich. Das Halschild ist beinahe kurz, vorn etwas verengt, der Vorderrand weit und nicht sehr tief ausgeschnitten, die Vorderwinkel daher nicht sehr vortretend, die Seiten leicht, und besonders hinter der Mitte gerundet, breit flach niedergedrückt, rostroth, das Mittelfeld schwach gehoben, und hinten mit zwei grubenartigen Eindrückcn versehen; der Hinterrand ist gerade, die Hinterwinkel spizig. Das Rückenschild abgerundet, schwärzlich, punktirt. Die Flügeldecken sind fast gleichbreit, beinahe flach, die Seiten nur schwach gerundet, mit einem schmalen Rändchen versehen, hinten gerade abgestumpft, doch die äußere Ecke etwas

gerundet, und mit einer eingedrückten Linie nächst der Naht versehen, und mit mehreren lebhaftern oder mattern rostgelblichen Fleckchen besäet, deren zwei an der Basis, neben dem Rückenschild, und ein gemeinschaftlicher Quersfleck hinten besonders in die Augen fallen; bisweilen dehnt sich der hintere Flecken bis an den Spitzenrand aus, und zeigt nur ein schwarzes Tüpfelchen auf der Mitte, welches *N. haemorrhoidalis* *Fabr.* ist. Der Körper ist unten pechschwarz, und die Beine sind dunkel rostroth.

*3. Scheibenfleckiger Saumknopfkäfer.

O. discoidea.

Eiförmig, stumpf, flach, schwarz; der breite, niedergedrückte Außenrand des Halschildes rostroth; auf den Deckschilden ein hell rostgelber, gemeinschaftlicher, die größere vordere Hälfte einnehmender Flecken.

Länge $1\frac{3}{4}$, Breite $1\frac{1}{4}$ Linie, auch kleiner.

Omosita discoidea. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 299. 3.

Nitidula discoidea. *Fabr. S. El.* 1. p. 252.

23. — *Illig. Verz. d. Käf. Pr.* p. 381. 4. —

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 219. 6. — *Oliv. Ent.* 2. 12. p. 15. 21. t. 2. f. 8. a. b. — *Herbst Käf.* 5. p. 237. 8. t. 53. f. 7. g. G. — *Panz. Fn.* 83. 5. — *Schönh. Syn. Ins.* 2. p. 144. 39. — *Dufsch. Fn. Austr.* 3. p. 134. 12. —
— *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p. 396. 10.

Gemein; in der hiesigen Gegend mit dem vorigen an gleichen Stellen.

Der *O. colon* sehr ähnlich, von gleicher Größe und Gestalt, doch in der Größe veränderlich. Schwarzbraun, ohne Glanz, sehr fein punktirt, mit graisen Härchen dünn bekleidet. Kopf und Fühler, wie bei dem vorigen. Das Halschild eben so, der Seiten- und Borderrand rostroth, und das etwas gewölbte Mittelfeld gegen hinten mit zwei breiten grubenartigen Eindrücken besetzt. Das Rückenschild, wie bei dem vorigen. Die Flügeldecken schwarz, aber die größere vordere Hälfte mit einem gemeinschaftlichen hell rostgelblichen Flecken bedeckt, welcher vorn den Wurzelrand berührt, an der Seite aber ausgeschnitten ist, und die Schulterbeule frei läßt; hinten ist er halbkreisförmig etwas ausgezackt, und vor der Spitze stehen auch noch in einen halben Kreis einige dunkler rostgelbe Tüpfeln. Die Beine sind rostrothlich.

CXXVII. Loöckerknopffläfer.

P R I A. *)

Tab. CCCII.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig; das erste Glied lang, walzig, nur wenig verdickt, die folgenden vier dünn, das dritte etwas länger, als das zweite, das sechste und siebende kurz, und etwas erweitert, die vier letzten Glieder bilden einen länglichen losen Knopf, dessen drei erste Glieder kurz, allmählich breiter werdend lose von einander stehen, das Endglied rundlich, stumpfspitzig ist. (Fig. C. Mas.)

Weibchen: der Knopf am Ende der Fühler nur aus drei Gliedern bestehend. (Fig. C. Fem.)

Die Lefze tief zweilappig, mit zarten Härchen besetzt. (Fig. D.)

*) Pria. Steph. Illustr. of Brit. Ent. III. p. 49. — Erichson in Germ. Zeitschr. f. d. Ent. 4. p. 307. — Cormyphora. Laporte Hist. nat. d. Ins. 2. p. 12.

Die Kinnbacken hornig, am Außenrande erweitert, mit scharfer Spitze, und ein paar Zähne unter derselben. (Fig. E.)

Die Kinnladen lang, bis auf die äußerste Spitze hornig, dieselbe mit einem Barte besetzt. (Fig. F.)

Die Zunge schmal, die Hautlappen an den Seiten der Spitze lang, schmal, innen mit steifen Härchen gewimpert. (Fig. G.)

Das Kinn hornartig, groß, vorn zusammengezogen, ausgerandet. (Fig. H.)

Die Kinnladentaster viergliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite lang, das dritte etwas kürzer, das Endglied etwas länger, als das zweite, walzig mit abgestutzter Spitze. (Fig. I.)

Die Lippentaster dreigliederig: das erste Glied sehr klein, das zweite länglich, walzig, das Endglied größer, eiförmig mit abgestutzter Spitze. (Fig. K.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper (Fig. A.) ist stumpf-eiförmig, mäßig gewölbt. Der Kopf (Fig. B.) ziemlich breit, die Stirn flach. Die Augen klein, rund, etwas vorstehend. Die Lippen häufig zurück gezogen. Die Fühler sind länger, als der Kopf, zart, und der Knopf aus vier losen Gliedern bestehend, da schon das achte sich zu erweitern anfängt. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes kurz, aber flach. Das Halschild ist ziemlich groß, wenig kürzer, als breit, und genau so breit, wie die Deck- schilde, vorn kaum etwas verengt, die leicht gerundeten Seiten schmal gerandet. Der Vorderrand weit und leicht ausgeschnitten, der Hinterrand fast gerade. Das Rückenschild (Fig. L.) ist ziemlich groß, stumpf dreieckig. Die Flügeldecken sind länglich, fast gleichweit, die Seiten nur sehr wenig gerundet, fein gerandet, ganz eben, hinten sanft abgerundet, gestuft, den Hinterleib nicht ganz bedeckend. Die zwei unter sie eingeschlagenen Flügel (Fig. m. M.) sind sehr zart, fast nervenlos. Die Beine sind kurz (Fig. N. O.), die Schenkel verdickt, die Schienen einfach, breit, die hinteren mit Härchen gewimpert; die Füße sind kurz und zart, die drei ersten Glieder an den vordersten (Fig. N.) kurz erweitert, mit steifen Härchen besetzt, das vierte Glied sehr klein, das Klauenglied stark, so lang, wie

die übrigen zusammengenommen, mit zwei einfachen Klauen besetzt.

Das Weibchen unterscheidet sich von dem Männchen in den Fühlern, (Fig. C. Fem.) welche kürzer sind, und der Knopf nur aus den drei letzten größeren, und nicht so locker aus einander stehenden Gliedern besteht, und demnach wenig von Meligethes verschieden ist, daher solches auch bei Stephens und Laporte bei diesen stehen geblieben ist. Es bieten sich jedoch bei beiden Geschlechtern gemeinschaftliche Unterschiede von Meligethes dar, welche die Trennung rechtfertigen.

Die einzige bisher in Deutschland aufgefundenene Art ist im Sommer häufig auf den gemeinen Bittersüß anzutreffen.

*1. Bittersüß-Lockerknopfkäfer.

P. Dulcamarae.

Tab. CCCH. Fig. a. A—O.

Olivengrünlich, mit einem Seidenglanze, gewölbt; das Rückenschild und der Unterleib schwärzlich; die Flügeldecken hinten abgestumpft,

fürzer, als der Hinterleib; die Beine bräunlich-gelb.

Länge kaum 1 Linie.

Pria Dulcamarae. *Germ. Zeitschr.* 4. p. 308. 1.
Mas. Pria truncatella. *Steph. Illustr.* III. p.
 50. 1. — *Shuckard Coleoptr. delin.* t. 30. f. 1.
Cormyphora mandibularis. *Laporte Hist. nat.*
des Ins. 2. p. 12.

Nitidula pectinicornis. *St. Cat.* 1826.

Fem. Nitidula Dulcamarae. *Illig. Käf. Pr.*
 p. 387. 14. — *Heer Fn. Col. Helv.* 1. p.
 406. 43

Laria Dulcamarae. *Scop. Carn.* 62.

In der hiesigen Gegend, bei Berlin, Braunschweig, in Kärnthen u.; oft häufig auf den Blättern des Bittersüß (*Solanum Dulcamara*.)

Oben olivenbräunlich, sehr fein und dicht punktiert, mit sehr feinen anliegenden greisen Härchen bekleidet, die ihm einen matten Seidenglanz mittheilen. Das Schildchen und die Naht sind dunkler oder schwärzlich. Der Bauch ist schwarz; die Unterseite des Halschildes und die Beine sind hell bräunlich-gelb.

ANOPHTHALMUS.

Blindlaufkäfer.

Neue Gattung aus der Familie der
Caraben.

STRIATYKONIA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Blindlaufkäfer.

ANOPHTHALMUS. *)

Tab. CCCIII.

Gattungskennzeichen.

Die Fühler elfgliederig: das erste Glied länglich, walzenförmig, dicker, als die übrigen Glieder, das zweite etwa halb so lang, wie das folgende, welches mit dem vierten von gleicher Länge ist, die folgenden an Länge ab- an Dicke aber etwas zunehmend. (Fig. C.)

Die Leſze hornig, kurz, leicht ausgeschnitten, die Ecken abgerundet, mit einem borstentragenden Grübchen; der Rand noch mit vier Borstenhaaren besetzt. (Fig. D.)

Die Kinnbacken hornartig, länglich, vorn schmal, etwas gebogen, scharf zugespitzt, auf der Mitte des innern Randes mit einem

*) Anophthalmus. F. J. Schmidt in litt.

doppelt ausgeschnittenen stumpfen Zahn, und unter diesem mit einem starken Bart. (Fig. E.)

Die Kinnlader am Stamme hornartig, auch die Lade hornig, schmal, gebogen, mit scharfer Spitze, am Rande mit starken Borstenhaaren gewimpert. (Fig. F.)

Die Zunge häutig, abgerundet, am Rande mit einzelnen langen Haaren besetzt; die Hautlappen an den Seiten schmal, lang vorstehend, innen gewimpert. (Fig. G.)

Die Lippe hornartig, breit, dreizählig, der mittlere Zahn klein, scharf. (Fig. H.)

Kinnladentaster zwei: der innere Taster zweigliederig, das erste Glied sehr lang, das zweite nur halb so lang (Fig. I.); der äußere Taster viergliederig, das erste Glied sehr klein, das zweite lang, walzig, etwas verdickt, das dritte verkehrt kegelförmig, mit dem etwas zugespitzten Endglied von gleicher Länge, (Fig. K.)

Die Lippentaster dreigliederig: das erste Glied klein, das zweite lang, gegen die

Spitze etwas verdickt, walzig, das Endglied nach vorn etwas zugespitzt. (Fig. L.)

Die Füße alle fünfgliederig.

* * *

Der Körper (Fig. A.) ist länglich-oval, flach, Kopf und Halschild schmal. Der Kopf (Fig. B.) ist länglich-eiförmig, vorgestreckt, an den Seiten des Kopfes steht eine lange, erhöhte, vorn in eine Spitze sich endigende Schwiele; der Raum zwischen diesen Schwielen ist schmaler, als eine derselben und auch etwas erhöht. Das Kopfschild ist durch eine Quernaht unterschieden, und an beiden Seiten mit einem Eindrucke bezeichnet. Die Leuze ist frei, breit, und leicht ausgeschnitten. Die Kinbacken mit ihren Spitzen sich kreuzend, vorstehend. Auch die Taster vorragend. Die Augen fehlen. Die Fühler sind vorn an der Seite der Kopfschwiele eingefügt, etwas länger, als die Deckshilde, an den letzten Gliedern ein wenig dicker werdend, und schon vom zweiten Glied an mit steifen Härchen dicht umgeben. Das Halschild ist länglich-herzförmig, nur halb so breit, wie die Deckshilde, flach gewölbt, in den Hinterwinkeln zusammengeschnürt, letztere gerade und scharf. Die Mitte durch eine tiefe Mittellängsfurche

getheilt, welche nahe am Vorderrande von einem dreiwinkeligen, und hinten von einem Quereindrucke begrenzt ist. Die Seiten schmal gerandet, aufgebogen; der Hinterrand sehr leicht ausgeschnitten, mit einem Eindrucke beiderseits in den Hinterwinkeln. Ein schmaler Hals trennt es von dem Hinterleibe. Der sichtbare Theil des Rückenschildchens ist sehr klein, dreieckig. (Fig. M.) Die Flügeldecken sind länglich oval, an der Spitze abgerundet, auf dem Rücken flach, mit seichten, schwachen Streifen, welche vor der Spitze verschwinden. Auf jeder Flügeldecke stehen zwei seichte mit einem Borstenhaare versehene Grübchen, und an der Spitze ist noch ein halbmondförmiger Eindruck zu bemerken. Die Flügel fehlen. An den vordersten Beinen sind die Schenkel etwas verdickt, die Schienen rund, am Innenrande vorn ausgeschnitten mit ziemlich langem Enddorn, und die zwei ersten Glieder der Füße stark erweitert, die beiden folgenden klein (Fig. N.). Die Schenkel der hinteren Beine (Fig. O.) walzig, sehr wenig verdickt, die Schienen dünn, rund, so lang, wie die Schenkel, mit einem kleinen Enddorn, und gleich denen der vordersten Beine mit steifen Härchen umgeben. Die Füße zart, etwas kürzer, als die Schienen, die Glieder von abnehmender Länge, mit Här-

chen besetzt, das Klauenglied ziemlich lang, mit zwei einfachen, gekrümmten Klauen versehen.

Schmidt's Blindlaufkäfer.

Anopthalmus Schmidtii, mihi.

Tab. CCCIII.

Gelblich = roßroth, glatt, die Beine etwas heller, der Kopf länglich, mit zwei nahe beisammenstehenden Schwielen; das Halschild länglich = herzförmig; die Flügeldecken schwach gestreift, jede mit zwei seichten Grübchen und einem halbmondförmigen Eindruck an der Spitze.

Länge 3 Linien; Breite 1 Linie.

Ich habe diesen merkwürdigen Käfer den Namen des Herrn Kaufmann Ferd. J. Schmidt in Schischka bei Laibach, des glücklichen Entdeckers und genauen Beobachters der Naturproducte seiner Gegend, beigelegt.

Mein Freund Hr. Schmidt schrieb mir über denselben folgendes:

„Der Aufenthalt des *Anophthalmus* ist die Luegger Grotte in Inner-Krain. In der Adelsberger Grotte habe ich dieses Thierchen trotz aller Mühe nicht finden können. Es scheint der Käfer das Tageslicht zu scheuen, denn ich fand ihn in Gesellschaft des *Pristonychus elegans var. Schreibersii mihi* tief in der Grotte, unter Steinen, allein äusserst selten. Er läuft außerordentlich schnell und ist daher sehr schwer zu erhaschen, wird somit bei dem Fange zwischen den Steinen leicht beschädigt. Ich fand den Käfer im Monat Mai 1842 bei einem Besuche der Grotte in Gesellschaft mit Herrn Kofel, der ebenfalls zwei Stücke erbeutete.“

Die Stelle, welche diesen sonderbaren Käfer im System angewiesen werden muß, ist neben *Trechus*, da er mit einigen Arten dieser Gattung, namentlich dem *Tr. littoralis* Ziegl. (*Tr. longicornis* St. Fn. VI. p. 83. t. 151. f. a. A.), *Tr. Longhii* De Christ., *Tr. crassicornis* St., *Tr. Micros* Herbst. und *Tr. discus* Fabr. viele und auffallende Uebereinstimmungen zeigt. Von diesen unterscheidet ihn das letzte Glied der äußern Kinnladen- und der Lippentaster, welche nicht so kurz und pfriemenförmig sind, die breitere und weniger tief ausgeschnittene Leiste, der doppelt ausgeschnittene Zahn in der Mitte des innern Randes der Kinnbäcken, und der von der Wurzel bis zu diesem

Zahn reichende starke Bart; während bei *Trechus* der innere Rand der Kinnbacken unter der Mitte mit einem stumpfen Zähnchen, unterhalb desselben mit einer Einkerbung und nur an der Wurzel mit einem schwachen Barte versehen ist. Am meisten zeichnet ihn der Mangel der Augen aus, und dieser Mangel läßt sich schwer mit der Behändigkeit des Käfers vereinigen, da diese, wo das Augenlicht fehlt, nicht leicht zu begreifen und doch keine Spur eines Schwerfzeuges zu bemerken ist. Der Kopf, das Halschild und die Flügeldecken sind mit langen steifen, ziemlich feinen Borstenhaaren an einigen Stellen besetzt und diese könnten hier als Gefühlsorgane einigermaßen die Stelle der Augen vortretend angesehen werden, wenn bei den Arten der Gattung *Trechus* nicht ganz ähnliche Haare an den gleichen Stellen vorhanden wären.

Nach einer Mittheilung des Herrn Prof. Erichson in Berlin sollen auch unter den *Ptilien* (welche bald in der Fauna folgen werden) sich Arten ohne Augen befinden und sonach stünden die *Claviger* nicht mehr allein als augenlose Käfer da, und bei diesen hat Herr Dr. H. M. Schmidt in Prag (siehe dessen: *Dissertatio inaug. zool. de Pselaphis etc. Pragae 1836. p. 38.*) auf der Stirnfläche zwei schwarze Punkte entdeckt, welche die Augen zu vertreten scheinen.



R e g i s t e r.

| | pag. | | pag. |
|-----------------------------|------|------------------------------|------|
| Amphotis | 110 | Cateretes. | |
| <i>marginata</i> | 113 | <i>atratus. Dej.</i> | 23 |
| Anisocera. | | <i>Caricis. Steph.</i> .. | 14 |
| <i>Spireae. Steph.</i> ... | 6 | <i>cinereus. Chev.</i> .. | 25 |
| Anomococera. | | <i>dimidiatus. Heer</i> | 38 |
| <i>Spireae. Schuck.</i> | 6 | <i>gravidus. Illig.</i> .. | 22 |
| Anophtalmus .. | 131 | <i>Junci. Steph.</i> ... | 14 |
| <i>Schmidtii</i> | 135 | <i>linariae. Steph.</i> ... | 22 |
| Brachypterus ... | 16 | <i>pallidus. Heer</i> .. | 14 |
| <i>cinereus</i> | 24 | <i>pedicularius. Illig.</i> | 5 |
| <i>gravidus</i> | 22 | <i>rubicundus. Heer</i> | 14 |
| <i>pedicularius. Schn.</i> | 6 | <i>rusilabris. Steph.</i> .. | 14 |
| <i>pubescens</i> | 26 | <i>Solani. Heer</i> | 10 |
| <i>quadratus</i> | 19 | <i>Urticae. Heer</i> ... | 29 |
| <i>rubiginosus</i> | 30 | Catheretes. | |
| <i>scutellatus. Kug.</i> .. | 22 | <i>bipustulatus. Gyll.</i> | 8 |
| <i>Urticae</i> | 28 | <i>pedicularius. Gyll.</i> | 5 |
| Carpophilus | 33 | <i>pulicarius. Gyll.</i> .. | 22 |
| <i>biguttatus. St.</i> ... | 42 | Cercus | 1 |
| <i>bipunctatus. St.</i> .. | 40 | <i>bicolor. St.</i> | 10 |
| <i>bipustulatus</i> | 39 | <i>bipustulatus</i> | 7 |
| <i>hemipterus</i> | 36 | <i>dalmatinus</i> | 12 |
| <i>quadripustulatus.</i> | | <i>pedicularius</i> | 5 |
| <i>St.</i> | 97 | <i>pulicarius. Latr.</i> .. | 25 |
| <i>sempustulatus</i> .. | 41 | <i>quadratus. Koy.</i> .. | 20 |
| | | <i>rusilabris</i> | 13 |
| | | <i>Sambuci</i> | 9 |

| | pag. | | pag. |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| <i>Cormyphora.</i> | | <i>Kateretes.</i> | |
| <i>mandibularis.</i> | | <i>pedicularius.</i> | |
| <i>Lap.</i> | 128 | <i>Herbst</i> | 5 |
| <i>Dermestes.</i> | | <i>Laria.</i> | |
| <i>bipustulatus.</i> <i>Payk.</i> | 7 | <i>Dulcamarae.</i> | |
| <i>hemipterus.</i> <i>Panz.</i> | 23 | <i>Scop.</i> | 128 |
| <i>hemipterus.</i> <i>L.</i> . . | 37 | <i>Lycтус.</i> | |
| <i>pedicularius.</i> <i>L.</i> . . | 5 | <i>abbreviatus.</i> <i>Panz.</i> | 42 |
| <i>Urticae.</i> <i>F.</i> | 29 | <i>Nitidula</i> | 89 |
| <i>Epuraea</i> | 44 | <i>aestiva.</i> <i>Illig.</i> . . . | 79 |
| <i>aestiva</i> | 78 | <i>affinis.</i> <i>Steph.</i> . . . | 84 |
| <i>angustula</i> | 74 | <i>biloba.</i> <i>Herbst.</i> . . . | 114 |
| <i>bisignata</i> | 80 | <i>bimaculata.</i> <i>Ol.</i> . . . | 37 |
| <i>decemguttata</i> | 47 | <i>bipustulata</i> | 92 |
| <i>deleta.</i> | 56 | <i>brunnea.</i> <i>Heer.</i> . . . | 84 |
| <i>immunda</i> | 59 | <i>cadaverina.</i> <i>F.</i> . . . | 37 |
| <i>limbata.</i> | 86 | <i>canaria.</i> <i>Schall.</i> | 97 |
| <i>melanocephala</i> . . . | 83 | <i>colon.</i> <i>F.</i> | 120 |
| <i>melina</i> | 52 | <i>decemguttata.</i> <i>F.</i> | 48 |
| <i>neglecta.</i> | 63 | <i>decemguttata.</i> <i>Ol.</i> | 97 |
| <i>oblonga</i> | 72 | <i>deleta.</i> <i>Dej.</i> | 57 |
| <i>obsoleta.</i> | 65 | <i>depressa.</i> <i>Illig.</i> . . . | 52 |
| <i>ochracea</i> | 54 | <i>depressa.</i> <i>Gyll.</i> . . . | 55 |
| <i>parvula</i> | 67 | <i>depressa.</i> <i>Steph.</i> . . | 118 |
| <i>pusilla</i> | 76 | <i>discoidea.</i> <i>F.</i> | 122 |
| <i>pygmaea</i> | 70 | <i>Dulcamarae.</i> | |
| <i>silacea</i> | 50 | <i>Illig.</i> | 128 |
| <i>variegata</i> | 61 | <i>ferruginea.</i> <i>Heer.</i> | 84 |
| <i>Ips.</i> | | <i>flavipennis.</i> <i>Heer</i> | 97 |
| <i>abbreviatus.</i> <i>St.</i> . . . | 42 | <i>flavomaculata.</i> | |
| <i>bipustulatus.</i> | | <i>Rossi</i> | 99 |
| <i>Kunze.</i> | 40 | <i>flexuosa</i> | 99 |
| | | <i>flexuosa.</i> <i>Payk.</i> . . . | 37 |

| | pag. |
|--|------|
| <i>grisea</i> . Marsh. | 108 |
| <i>guttalis</i> . Herbst. | 97 |
| <i>haemorrhoidalis</i>
F. | 121 |
| <i>limbata</i> . F. | 86 |
| <i>marginata</i> . F. | 114 |
| <i>melanocephala</i> .
Marsh. | 84 |
| <i>neglecta</i> . Heer | 64 |
| <i>oblonga</i> . Herbst | 73 |
| <i>obscura</i> | 94 |
| <i>obsoleta</i> . F. | 66 |
| <i>pectinicornis</i> . St. | 128 |
| <i>punctatissima</i> .
Illig. | 106 |
| <i>pusilla</i> . Illig. | 77 |
| <i>pygmaea</i> . Gyll. | 70 |
| <i>quadrata</i> . F. | 37 |
| <i>quadripustulata</i> | 96 |
| <i>rufipes</i> . Steph. | 95 |
| <i>sexpustulata</i> . F. | 42 |
| <i>silaceu</i> . Herbst. | 50 |
| <i>silucea</i> . Heer | 57 |
| <i>sordida</i> . F. | 118 |
| <i>truncatu</i> . Steph. | 84 |
| <i>varia</i> . F. | 108 |
| <i>variata</i> . Steph. | 97 |
| <i>variegata</i> . Herbst | 62 |
| <i>variegata</i> . Ol. | 108 |
| <i>villosa</i> . Steph. | 55 |

| | pag. |
|--|------|
| Omosita | 115 |
| <i>colon</i> | 120 |
| <i>depressa</i> | 118 |
| <i>discoidea</i> | 122 |
| Pria | 124 |
| <i>Dulcamarae</i> | 127 |
| <i>truncatella</i> .
Steph. | 128 |
| Scaphidium .
<i>agaricinum</i> .
Herbst | 22 |
| <i>scutellatum</i> . Panz. | 22 |
| Silpha .
<i>aestiva</i> . L. | 79 |
| <i>colon</i> . L. | 120 |
| <i>bipustulata</i> . L. | 93 |
| <i>depressa</i> . L. | 118 |
| <i>grisea</i> . L. | 108 |
| <i>maculata</i> . Degeer | 106 |
| <i>rufipes</i> . L. | 95 |
| <i>unicolor</i> . L. | 120 |
| Soronia | 102 |
| <i>grisea</i> | 107 |
| <i>punctatissima</i> | 105 |
| Stenus .
<i>Ficus</i> . F. | 37 |