

Über die Schmetterlingsfauna des Schwarzwaldes in Nieder-Österreich.
von Roland Keitter, Hollabrunn

Der Schwarzwald

Der Schwarzwald im westlichen Teile des Viertels unter dem Manhartsberg ist ein ziemlich grosses Waldgebiet, daß sich vom Ernstbrunner-Wald im Osten bis zur Stadt Hollabrunn im Westen erstreckt. Die Nordgrenze des Waldgebietes wird durch die Orte Enzersdorf i/Tale im Osten - Altenmarkt - Weierburg - Eggendorf - Mariatal - Magersdorf, abgegrenzt, die westliche Grenze verläuft von Magersdorf im Norden über Hollabrunn bis Gr.Stelzendorf im Süden. Die südliche Grenze verläuft über die Ortschaften Gr.Stelzendorf - Bergau - Füllersdorf - Unter - und Ober-Nursch. Die größte Ost-westabgrenzung beträgt cca. 20 km, die größte Nord - Südausdehnung cca. 10-12 km. Der Schwarzwald ist ein Hügelland mit Höhenunterschieden von durchschnittlich 100 m absoluter Höhe. Die größten Erhebungen des Schwarzwaldes sind der Hundsberg mit 360 m, Rossberg mit 355m, Sandleiten mit 338 m und die östlichste Erhebung der Ameisenberg mit 353 m Seehöhe.

Der Schwarzwald ist vorwiegend Eichen- oder Eichengebüschwald mit einzelnen Sameneichen. Daneben gibt es auch grössere oder kleiner Kiefern- und Fichtenwälder. Eingesprengelt sind kleine Birkenbestände. Neben grösseren Flächen mit Haselnußsträuchern, Pappel und Ahorngebüsch sind in den tiefer gelegenen Tälern Eschen, Pappeln und Erlen zu finden. Der westliche Teil des Schwarzwaldes, der Kirchenwald, der bis zur Stadt Hollabrunn heranreicht, ist ausgesprochener Mischwald. Entomologisch am besten sind naturgemäß ältere Eichen oder ganz lichte Waldbestände, Lichtungen und ältere Kahlschläge. Das Schwarzwaldgebiet ist vorwiegend sandiger Lehmboden mit warmen Klima, wenig Niederschlägen und im Sommer daher trocken und heiss.

Zu erreichen ist der Schwarzwald am besten von Göllersdorf (Bahnhofstation) oder Hollabrunn aus, doch sind Unterkunftsmöglichkeiten im Waldgebiet selbst ausnahmslos nicht vorhanden. Die Anmarschwege sind von den Bahnstationen oder Orten mit Autobusverbindung durchwegs 3/4 oder 1 Stunde Gehweg. Trotzdem das Gebiet entomologisch gewiss nicht schlecht ist, wurde im Schwarzwald bisher noch wenig gesammelt, obwohl es von Wien unschwer zu erreichen ist; cca. 1 1/2 Stunden Bahnfahrt mit der Nordwestbahn. Allerdings war früher der Schwarzwald als fast durchwegs Herrschaftsbesitz und Jagdgebiet schwer zugänglich.

Apatura ilia, a.clytie 9./7.49	Celerio euphorbiae 20.5., 26./28.7.48
Neptis aceris 3./7.51	" galii 5.46
Melitaea maturna 13.6.48	
" phoebe 30.6.46	Notodontidae
" didyma 30.6.46	Cerura bifida 19.7.49
" trivia 16.6.47	" erminea 19.7.49
" dictynna 1.6.47 häufig an den	" vinula 1.6.47
selben Plätzen wie athalia	Drymonia trimacula April - Mai häufig
Satyrus circe 16.6.46	Pheosia tremula 30.4.48
Pararge achine sehr häufig Juni 47	Notodonta ziczac 30.4.46
Lycaena orion Mai 46, 47	" anceps 20.5.47
Carcharodus alceae 16.5.47	" phoebe 16.5.47
Acherontia atropos 15.10.49 frisch	" dromedarius 16.5.46, 21.7.49
geschlüpft	Spatalia argentina 13.7.47. jedes Jahr
Sphinx ligustri 20.5.47	sehr häufig
" pinastri 6.7.48 an Föhrenstäm.	Lophopterix camelina 16.5.47
Mimas tiliae 6.6., 11.6.48	Pterostoma palpium 16.5.47. jedes Jahr
Smerinthus ocellata 20.5.47	bei Licht
" quercus beim Leuchten nicht	Phalera bucephala 28.5.49. regelm. Mai-
selten, Mai - Juni	Juni bei Licht
Amorpha populi 15.5.48	Pygaera anastomosis Juni 48
Macroglossa titus 22.5., 8.6.46	" anachoreta Juli 48
" stellatarum august 46	" pigra " 48, 49
Choerocampa elpenor 22.6.47	
" porcellus Mai 48	

Drepanidae

Drysana falcataria 7.5.50
 " *lacertinaria* 31.7.48
 " *binaria* 19.8.48
Cilix glaucatus 7.7.47

Saturniidae

Saturnia pyri 30.4.48 im Stadtge-
 biet Hollabrunn häufig,
 Raupen besond. an Marillenb.
 " *pavonia* Ende April 47

Lasiocampidae

Trichiura crataegi kaupenges. häufig
 an *Crataegus oxyacantha*
Malacosoma neustria Juni 47 häufig
 am Licht
Lasiocampa quercus 5.8.48
 " *trifolii* 17.8.47 häufig
 am Licht
Macrothylacia rubi 10.5.50 häufig
Selenephra lunigera 27.8.49
 " " *a. lobulinae* 27.8.49
Cosmotriche potatoria 31.7.48
 häufig am Licht
Epicnaptera ilicifolia 10.5.50
Gastropacha quercifolia 31.7.48
Odonestis pruni Juli 47, 48
Dendrolimus pini 25.5.48

Lymantridae

Orgyia gonostigma 8.7.46
 " *antiqua* Eigelege im März auf
 Eichenst., Falter 5.47
Dasychira pudibunda, Raupen auf Ei-
 chengebüsch, häufig am
 Licht Mai. Darunter
a. concolor.
Arctornis (Laria) l-nigrum 22.6.47
Porthesia similis Juni-Juli ungemein
 häufig am Licht
Lymantria dispar, Raupen häufig an
 Eichen
 " *monacha* nur ab. *eremita* 13.7.
 47. in großer Menge, Nenn-
 form nicht darunter
Ocneria rubea 18.7.48

Noctuidae

Panthea coenobita 28.6.48
Dipthera alpium Mai 48, 49
Colocasia coryli Mai 47, häufig
Acronycta leporina 15.7.49
 " *aceris* April 48
 " *megacephala* 15.7.48
 " *psi* 15.7.48
 " *rumicis* 15.7.48
 " " *a. salicis*
Craniphora ligustrum 30.7.48 häufig
Agrotis fimbria Raupe auf *Primula* of.
 " *ianthina* " Mai 49 an Eichen
 " *pronuba* Juni-Juli häufig

Agrotis triangulum 19.7.47, 22.6.48

" *baja* 21.7.49
 " *candelarum* 22.6.48
 " *c-nigrum* Juni-August häufig
Xanthographa August 48
 " *a. cohaesa* 19.8.48
 " *rubi* 20.8.48
 " *musiva* 19.8.48
 " *forcipula* 5.7.46
 " *putris* 19.8.48
 " *cinerea* sehr häufig April-Mai
 variiert sehr stark
 " *exclamationis* 7.9.46
 " *tritici* lb. *aquilina* 23.6.48
 " *obelisca* 19.8.48
 " *segetum* ungemein häufig 8.46
 " *margaritacea* 20.8.48
 " *strigula* 16.7.49
 " *praecox* 5.7.47
 " *prasina* 19.7.48

Sora (Pachnobia) rubricosa 16.4.50

Epineurcia popularis 26.8.48 häufig

" *cespitis* 19.7.49

Manestra adrena 13.7.47

" *leucophaea* 26.5.47

" *nebulosa* 22.4.46

" *brassicae* 22.4.46 5.5.48

" *persicaria* 22.6.49

" *marmorosa* 15.7.50

" *reticulata* 13.6.48

" *serena* 5.5.48

Dianthocia luteago 12.6.48

" *filigramma* 21.6.49

" *nana (conspersa)* Mai 47 häufig

" *compta* 26.7.49

" *carpophaga* 5.5.48 häufig

Miama literosa Juni-Juli 49, 50

" *strigilis* 20.6.49

" *bicoloria* 6.8.47

Bryophila raptricula Juli häufig

" *ravula* 14.7.50

Thalpophila matura Juni 48, 49

Hadena monoglypha 5.7.47

" " *a. infusata* 5.7.47

" *sublustis* 19.7.49

" *gemina* 19.7.49

" *lateritia* 14.7.50

Polia chi 13.9.47

Brachionycha nubeculosa 4.48 Eichenst.

Chariptera viridana Juli 48, 49

Dichonia aprilina August-Sept.

Rhizogramma detersa Juni 48

Chloanthe radiosa 17.8.49, 14.8.50

" *polyodon* 20.8.49

Trachea atriplicis 21.6.49, 22.7.50

Luceria virens 21.7.48

Calamia lutos 20.10.49

Leucania l-album 11.6.47, 20.8.49

" *vitellina* 16.8.46

" *cnigera* 15.7.50

" *albipuncta* 4.6.48

" *litharygirea* 4.8.47

Caradrina selini 2.9.46
 " taraxaci 14.7.50
 Rhusina umbratica 10.6.47, 14.6.50
 Taeniocampa gothica 24.3.50
 " miniosa Raupe Juni 46
 " pulverulenta 3.50 auf Köder
 " incerta 3.50 " "
 " munda 3.50 " "
 Panolis griseovariegata 20.4.50 auf Weidenkätz. mit Licht
 Mesogona acetosella 9.9.50
 Calymnia pyralina Juni 47, Raupen häufig an Eichen
 " trapezina Mai 48 " "
 Platenis retusa 26.7.46
 Cirrhoedia xerampelina 27.8.46
 Orthosia nitita 9.9.50
 Xylina furcifera 7.9.50
 " ingraca 9.9.50
 Calocampa exoleta 2.4.50 häufig am Köder
 Xylomiges conspicillaria 13.5.48
 Calophasia lunula 6.6.47, 20.8.49
 Cleophana antirrhini 6.6.47
 Cucullia lynchnitides 30.5.48
 " asteris Raupen auf Aster
 " amellus 6.9.47
 " lactucae Juni 47, 48
 " gnaphali 26.7.48
 " arthemisia 19.6.48
 Heliothis dispacea 2.5.46, 30.7.48
 Chariclea delphini August 48
 Acentia lucida 30.7.48
 " luctuosa Juli-August häufig
 Micra respersa 26.5.48 häufig
 Scoliopteryx libatrix 15.7.50
 Habrostola tripartita 5.7.46
 " asclepiadis Mai-Juli
 Plusia chrysitis 26. Mai 48, 49, häufig am Licht
 " bractea 26.7.48
 " festucae 28.7.46
 " gutta Juli - September
 " gamma abends Juni 47
 Pseudophia lunaris Mai 48, 49
 Aedia funesta Juni häufig
 Catacala fraxini 17.9.49
 " a.maerens 17.9.49
 " electa August 47, 48
 " elocata Juli-August am Köder
 " nupta 22.7.49
 " sponsa im Juli 47 so häufig, daß von jedem Stamm 5-6 Falter aufflogen. 5.7.47 33 St von Baumstämmen abgefangen, flogen später abends um die Baumkronen.
 " promissa häufig an Eichen 5.7.47
 " fulminea 26.7.48
 " conversa 5.5.48 Raupen auf Eichenbüschen geschl. 6.48
 Toxocampa lusoria 19.6.47 häufig

Toxocampa pastinum Juni 47, 48
 Laspeyria flexula 28.6.49
 Habrosyne derasa Juni- Juli 48, 49
 Thyatira batis Juni-August häufig
 Cymatophora flavicornis Mai-Juni 46, 47
 Polyplocia ridens 17.3.46
 Brephos parthenias jedes Frühjahr häufigweibchen von Birkenstämmen geklopft, variieren stark März 48

Geometridae

Pseudoterpna pruinata 13.7.47 ungemein häufig
 Geometra papilionaria Juni 47, 48
 Euchloris pustulata Mai-Juni nicht selt.
 " smaragdaria Juni " "
 " Vernaria Juni
 Nemoria pulmentaria 16.6.48, 14.8.50
 Thaleria fimbrialis 18.6.47
 " lactearia 9.4.48
 Acidalia moniliata Juni-Juli 47
 " bisetata 25.7.49
 " trigeminata 18.6.47
 " aversata 31.7.48
 " " a. spoliata 31.7.48
 " immorata 1.6.48, 2.8.48
 " rubiginata 18.6.47, 2.8.48
 " remutaria Mai 47, 48
 " nemoraria 17.7.47
 " umbellaria Mai 49, 50
 " strigillaria 17.7.47
 " imitaria 25.5.49
 " ornata 25.5.49
 Codonia annulata Juli 48
 " porata Raupen auf Eichengeb. Okt.
 " Quercimontaria " " Okt. 48
 " punctaria Raup. " " "
 " ruficilaria " " "
 sonst mit Ausnahme von quercimontaria häufig beim Licht V.-VII.
 Rhodostrophia vibicaria Mai-Juni häufig beim Licht
 Timandra amata 12.5.48 häufig b. Licht
 Lythria purpuraria Juli-August
 Ortholita coarctata 26.5.47
 " plumbaria April-Mai
 " limitata 8.8.47
 " moeniata 9.8.46 beim Licht
 " bipunctaria August häufig
 Lithostege farinata Mai 46, 49
 " griseata April-Mai
 Anaitis plagiata Mai, August häufig
 Scoteria rhamnata 5.6.48
 Larentia dotata Juni
 " fuvata 25.6.49
 " ocellata 25.6.49
 " aptata 31.7.48
 " aqueata Mai 48
 " fluctuata Mai 47, 50
 " suffumata 28.7.49
 " quadrifasciata 22.7.50
 " ferrugata 25.6.49

- Larentia unidentaria* 17.7.47
 " *cucullata* 7.6.50, 31.7.48
 " *galiata* Juni-Juli
 " *procellata* Mai, Juni, Aug. häufig.
 " *tristata* Juni häufig
 " *bilineata* 23.7.48 häufig
 " *corylata* 7.6.50
 " *berberata* Mai, Juli häufig
 " *rubitata* Mai-Juli
 " *comitata* Juli, Aug. häufig
Tephroclystia irriguata 16.8.47
 " *linariata* 5.6.50
 " *extraversaria* 1.8.48
 " *absintiata* 4.8.47
 " *trisignaria*
 " *lariciata* 12.5.47, 18.4.48
 " *succenturiata* v. *subfulvata* 28.7.49
Abraxas grossulariata Juli
 " *adustata* Mai, Juli, Aug. häufig
 " *marginata* 25.4.48
Deilinia pusaria Mai, Juni häufig
Numeria pulveraria Mai 47, 49
 " *caprolaria* Juli 47, 49
Metrocampa margaritata Mai 48
Ennomos fuscantaria 18.7.46
 " *erosaria* Juni häufig
Selenia bilunaria 26.7.49
 " *lunaria* Mai 46, 50
 " " *gen. delunaria* 28.7.49
 " *tetralunaria* 13.7.47
Hygrochroa syringaria Juni-Juli
Therapis evonymaria Juni, Sept.
Gonodontis bedentata 20.5.50
Himera pennaria Okt. 47. häufig
Crocællis elinguaris Juli 47, Aug. 48
Angeroma prunaria ab. *Sordiatia* 10.6.48
Urapteryx sambucaria Juni 46, 48
Eurymene dolabraria Mai, 47, Juli 50.
Opisthograptis luteolata Mai 48, 49
Epione apiciaria 25.6.49
Hypoplectis adpersaria 28.4.46
Caustolosoma flavicaria 12.5.48
Venilia macularia 2.5.46 häufig
Semiothisa notata 25.6.49
 " *alternaria* Mai-Aug. häufig
Hibernia leucophaearia 7.3.50
 " *marginaria* 7.3.50
 " *defoliaria* 30.10.48
Anisopteryx aescularia 7.3.50
Phigalia pedaria 7.3.50
Biston pomonarius 24.4.50
Amphidasia betularia ab. *nigra* 22.7.50
 " *Stammform* nie
Synopsis soziaria Juli 47, 48
Boarmia cinataria April 46
 " *secundaria* Mai, Aug. 47
 " *repandata* 7.6.50
 " *roboraria* Juni 47, 50
 " " *a. infuscata* Juni 47, 50
 " *consortaria* 18.6.47
 " *ab. humperti* 9.8.47
Boarmia selenaria Mai-Aug. häufig, sehr dunkel gezeichnet
 " *crespuclaria a. deffesaria* 6.47
 " *luridata* Mai 46, 47
Gnophos glaucinaria 4.8.46
Hematurga atomaria IV.V.IX. 46, 48
Bupalus piniarius 29.5.46, 8.6.50
 " " *a. anomalarius* 7.6.50
Selidosemia erictaria Aug. 48
Diastictis artesiaria 7.6.50
Phasiana clathrata 16.5., 1.7.46 häufig.
 " *glarearia* 17.4.46
Eubolia arenacearia Mai-Juni
 " " *gen. flavidaria* Juli 47 48
Scoria lineata Mai, häufig
Perconia strigillaria 25.5.49

Nydclidae

Hylophila prasinana Juli, häufig
Chloephora bicolorana 20.6.47

Syntomidae

Syntomis phegea Mai-Juni sehr häufig
Dysauxes ancilla 20.6.47

Arctidae

Spilosoma lubricipeda Juni 49, 50
 " *menthastri* " " häufig
Phragmatobia fuliginosa 21.7.49, 46
Rhyparia purpurata Juni, häufig. a. *Licht*
 " *a. atromaculata u. uralensis*
Diacrisia sanio Mai häufig
Arctinia caesarea Mai 47, 50
Arctia caja Juli häufig. sehr variabel
 " *villica* Mai häufig. b. *Licht*
 " *aulica* 17.5.48
Pleretes (Pericallia) matronula 5.6.48
 " 9.6.50
Callimorpha quadripunctaria Juli häufig.
Miltochrista miniata 30.5.48
Endrosa irromella 19.6., 13.7.47
Cybosia mesomella 21.7.49 mehrfach
Atolmis rubricollis 30.7.48
Ceclistis quadra 22.7.50
Lithosia complana 21.7.49, 50, häufig.
 " *unita* Aug. mehrfach

Antroceridae

Anthrocera (Zygaena) purpuralis Juni
 " *scabiosae* Juni
 " *achillea* Mai
 " *meliloti* Juni, Juli
 " *carniolica* Juli häufig

Psychidae

Pachytelia unicolor Juni 47.
Oreopsyche muscella 20.8.49
Psyche viviella 30.5.48

Cossidae

Coccus cossus 30.5.48 beim Licht
Hypoptya caestrum Mai 46, 48
Zeuzera pyrina 13.7.48

Hepiclus sylvinus 20.8.48

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt](#)

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: [1_1_1954](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Roland

Artikel/Article: [Über die Schmetterlingsfauna des Schwarzwaldes in Nieder-Österreich 4-7](#)