



Band 8
(25. Februar 1941)



Entomologische Beihefte

aus Berlin-Dahlem

Herausgegeben von der Biologischen Reichsanstalt
und dem Deutschen Entomologischen Institut
der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft

Verantwortlich Dr. Hans Sachtleben

INHALT:

Verzeichnis der Dipteren von Formosa.

Von Willi Hennig,
Deutsches Entomologisches Institut, Berlin-Dahlem.

(Mit IV & 239 Seiten und 35 Textfiguren.)

Berlin-Dahlem
Goßler Str. 20

Preis des Bandes im Buchhandel
RM. 8.—

Im Buchhandel zu beziehen durch R. Friedländer & Sohn,
Berlin NW 7, Karlstraße 11
(Printed in Germany)

I 90889

N: F. F. 292/1943

Museum

des Reichsgaues Oberdonau

Linz a. d. D.

Museumstraße 14

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	1
Verzeichnis der Dipteren:	
Familie <i>Petauristidae</i>	6
" <i>Tipulidae</i>	6
" <i>Limoniidae</i>	11
" <i>Phryneidae</i>	28
" <i>Zelmiridae</i>	28
" <i>Lycoriidae</i>	29
" <i>Itonididae</i>	31
" <i>Pachyneuridae</i>	31
" <i>Bibionidae</i>	31
" <i>Scatopsidae</i>	32
" <i>Liriopidae</i>	32
" <i>Psychodidae</i>	32
" <i>Culicidae</i>	32
" <i>Tendipedidae</i>	36
" <i>Heleidae</i>	42
" <i>Melusinidae</i>	46
" <i>Blepharoceridae</i>	46
" <i>Rhagionidae</i>	47
" <i>Tabanidae</i>	48
" <i>Stratiomyidae</i>	52
" <i>Nemestrinidae</i>	57
" <i>Acroceridae</i>	57
" <i>Therevidae</i>	57
" <i>Omphralidae</i>	58
" <i>Asilidae</i>	58
" <i>Mydidae</i>	67
" <i>Bombyliidae</i>	67
" <i>Empididae</i>	70
" <i>Dolichopodidae</i>	75
" <i>Musidoridae</i>	86
" <i>Clythiidae</i>	87
" <i>Phoridae</i>	87
" <i>Termitoxeniidae</i>	91
" <i>Dorylidae</i>	91
" <i>Syrphidae</i>	93
" <i>Conopidae</i>	113
" <i>Pyrgotidae</i>	114
" <i>Platystomidae</i>	114
" <i>Uliidae</i>	117

	Seite
Familie <i>Tyrpetidae</i>	117
<i>Tylidae</i>	129
<i>Sepsidae</i>	131
<i>Piophilidae</i>	134
<i>Megamerinidae</i>	134
<i>Diopsidae</i>	135
<i>Psilidae</i>	135
<i>Sciomyzidae</i>	136
<i>Clyphidae</i>	137
<i>Lauzaniidae</i>	137
<i>Lonchaeidae</i>	144
<i>Chamaemyzidae</i>	146
<i>Helomyzidae</i>	146
<i>Clusiidae</i>	146
<i>Anthomyzidae</i>	146
<i>Drosophilidae</i>	147
<i>Sphaeroceridae</i>	155
<i>Tethinidae</i>	157
<i>Canaceidae</i>	158
<i>Ephydriidae</i>	158
<i>Chloropidae</i>	164
<i>Agromyzidae</i>	172
<i>Milichiidae</i>	176
<i>Hippoboscidae</i>	177
<i>Nycteribiidae</i>	178
<i>Cordyluridae</i>	178
<i>Rhiniidae</i>	179
<i>Calliphoridae</i>	182
<i>Sarcophagidae</i>	183
<i>Melanophoridae</i>	186
<i>Phasiidae</i>	187
<i>Dexiidae</i>	189
<i>Oestridae</i>	191
<i>Prosenidae</i>	191
<i>Tachinidae</i>	191
<i>Exoristidae</i>	193
<i>Anthomyiidae</i>	201
Nachträge	220
Textfiguren	225
Literaturverzeichnis	229

Einleitung.

Die zusammenfassende Darstellung der Tierwelt (oder größerer oder kleinerer Tiergruppen) von Inseln oder Inselgruppen ist eine Aufgabe, die sich recht allgemeiner Beliebtheit erfreut. Frey's „Dipterenfauna der Kanarischen Inseln und ihre Probleme“, Bezzi's „Diptera Athericera of the Fiji-Islands“, die vom British Museum herausgegebenen „Insects of the Salomon-Islands“, sind nur einige in neuerer Zeit erschienene Beweise für die Richtigkeit dieser Feststellung. Ein wesentlicher Grund für die Vorliebe liegt zweifellos darin, daß Inseln als verhältnismäßig kleine und scharf umgrenzte Gebiete eine vollständige Erfassung ihrer Tierwelt als ein Ziel erscheinen lassen, das leichter erreichbar ist als eine entsprechende Erfassung von Festlandgebieten. Dazu kommt, daß sich einige Fragen allgemeinerer Art, zu deren Lösung eine solche Bestandsaufnahme die Voraussetzung ist, bei Inseln deutlicher hervorheben als bei Festlandsgebieten. Und es dürfte allgemein anerkannt sein, daß eine registrierende Bestandsaufnahme der Tierwelt nur dann eine Berechtigung hat, wenn dadurch die Lösung allgemeinerer Probleme herbeigeführt wird. Die meisten Bearbeitungen von Inseltaunen sehen ihre Hauptaufgabe in einer Analyse der tiergeographischen Stellung der untersuchten Insel oder Inselgruppe, d. h. es wird aus dem Prozentsatz der einzelnen vorhandenen Faunenelemente auf die Zugehörigkeit der untersuchten Gebiete zu der einen oder anderen tiergeographischen Region geschlossen und aus dem Prozentsatz an Endemismen der Zeitpunkt der Abtrennung vom Hauptgebiet der betreffenden Region erschlossen. Nach einer wichtigen von Rensch betonten Unterscheidung tiergeographischer Fragestellungen handelt es sich bei solchen Untersuchungen also um Arbeiten mit geographischer Fragestellung, da das Hauptergebnis ja in einer Erklärung der geographischen (bzw. geologischen) Geschichte und Zugehörigkeit der untersuchten Inseln besteht.

Die vorliegende Arbeit hat sich etwas andere Aufgaben gestellt. Wie aus dem später folgenden allgemeinen Teil hervorgehen wird, ist die geologische Geschichte der Insel Formosa recht gut bekannt, d. h. es ist wenigstens sicher, in welcher geologischen Epoche die letzte Verbindung der Insel mit dem Festlande bestanden hat. Da etwas vorher das gesamte

Gebiet der Insel vom Meere bedeckt gewesen war, steht also mit Sicherheit fest, daß in dieser Zeitspanne zwischen dem Auftauchen des Gebietes aus dem Meere und seiner Abtrennung als Insel die erste Besiedlung des Gebietes der heutigen Insel erfolgt sein muß. Aus dem Grade der Abweichung der insularen Tierwelt von Formosa von den Verwandten der benachbarten Gebiete, von denen aus sie nach der Insel gelangt sein muß, werden wichtige Aufschlüsse über den Differenzierungsgrad, den eine Tiergruppe in einer bestimmten Zeitspanne der Isolation erreicht, zu gewinnen sein. In einer Untersuchung dieser Frage besteht die 1. Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Ebenso hat die 2. Aufgabe eine zoologische, keine geographische Fragestellung: Es ist bekannt, daß auf der Insel Formosa paläarktische und orientalische Faunenelemente vorhanden sind, neben einzelnen Tierformen, deren nächste Verwandte heute in der Nearktis oder Neotropis getroffen werden. Im allgemeinen gehört Formosa aber ohne Zweifel der orientalischen Region an. Nun besteht aber die Besiedlung der orientalischen wie die aller übrigen tiergeographischen Regionen keineswegs aus einer einheitlichen Faunenschicht, vielmehr sind die heute in den einzelnen Regionen lebenden Tiergruppen zu sehr verschiedener Zeit und auf sehr verschiedenen Wegen in diese gelangt. Die Untersuchung der Frage, welcher der großen tiergeographischen Regionen ein untersuchtes Gebiet zugerechnet werden muß, führt also nur zu einem oberflächlichen Verständnis seiner Tierwelt. In mancher Beziehung dürfte die Untersuchung einer Insel einer tiefergehenden Analyse der verschiedenen Faunenschichten der Region, der sie angehört, besonders günstig sein, besonders dann, wenn die Insel, wie das für Formosa gilt, am Randgebiet der betreffenden Region liegt. Ließe sich nachweisen, daß eine der im Hauptgebiet der Region zu unterscheidenden Faunenschichten auf der betreffenden Insel fehlt, so könnten überdies daraus Aufschlüsse über die Zeit gewonnen werden, zu der die betreffende Faunenschicht in die fragliche Region gelangte. Das gilt natürlich nur, wenn der Zeitpunkt der Abtrennung der Insel von der Hauptregion bekannt ist, wie das für Formosa zutrifft. Eine Untersuchung dieses ganzen angedeuteten Problemkomplexes bildet die 2. Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Es ist klar, daß in der vorliegenden Arbeit für keine der beiden Hauptaufgaben eine vollständige Lösung erreicht werden kann. Dazu müßte nicht nur die Tierwelt der Inseln Formosa noch besser bekannt sein, sondern vor allem auch die der umgebenden Gebiete. Immerhin dürften auch die bisher verfügbaren Unterlagen schon einige interessante Ergebnisse ermöglichen. Wenn später einmal die Voraussetzungen für eine vollständigere Untersuchung gegeben sein werden, d. h. wenn die Tierwelt Formosas und der benachbarten Gebiete vollständig bekannt sein werden, wird es zweifellos sehr reizvoll sein, die dann möglichen Lösungen beider Fragen-

komplexe mit den in der vorliegenden Arbeit auf unvollkommener Grundlage erarbeiteten zu vergleichen.

Neben den beiden genannten Hauptaufgaben verfolgt die vorliegende Arbeit aber noch einige kleinere Ziele. Sie ergaben sich aus den folgenden Umständen: Die ersten Kenntnisse über die Dipterenformen der Insel Formosa wurden gewonnen aus den Sammlungen des deutschen Lehrers Hans Sauter. Dessen umfangreiche Sammlungen bilden zugleich die Grundlage für den weitaus größten Teil unserer heutigen Kenntnisse von den Dipteren der Insel. Die Sammlungen gelangten zu einem kleinen Teil an verschiedene deutsche Museen. Der Hauptteil wurde jedoch auf das Ungarische Nationalmuseum zu Budapest und das Deutsche Entomologische Institut in Berlin-Dahlem verteilt. Die wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungen ging daher auch in der Hauptsache von den beiden genannten Instituten aus. Im Deutschen Entomologischen Institut habe ich in den letzten Jahren die noch unbearbeiteten Sammlungsteile teils selbst bearbeitet, teils ihre Bearbeitung durch Spezialisten veranlaßt. Auf diese Weise ist jetzt die Bearbeitung der Sauterschen Dipteren-Sammlung im Deutschen Entomologischen Institut vollständig abgeschlossen. Da die Bearbeitungen in vielen Einzelarbeiten in einer Reihe von Zeitschriften verstreut sind (vergleiche das Literaturverzeichnis!), war die Berechtigung einer Zusammenfassung der Ergebnisse in einer größeren Arbeit, die zugleich über die im Deutschen Entomologischen Institut vorhandenen Typen Aufschluß gibt, von vornherein gegeben. In den letzten Jahren haben jüngere japanische Sammlungen in steigendem Maße zu der Erforschung der Dipterenformen von Formosa beigetragen. Die entomologische Erforschung der Insel Formosa ist also einen Weg gegangen, der auch in anderen Gebieten zu verfolgen ist: Nach einer Periode, in der die Grundlage der faunistischen und tiergeographischen Erschließung der Welt ausschließlich von Europa gelegt wurde und für die Aussendung größerer Expeditionen besonders charakteristisch ist (für die Dipteren sind hier die Novara-Expedition und „Eugenies Resa“ besonders wichtig), haben neuerdings die in den verschiedenen Erdteilen entstandenen wissenschaftlichen Institute die planmäßige Vervollständigung der faunistischen Erforschung ihrer Länder in die Hand genommen. Die vorliegende Bearbeitung der Dipterenfauna von Formosa dürfte auch von diesem Standpunkte aus einen gewissen Abschluß des 1. europäischen Kapitels der Erforschung der Dipteren von Formosa bilden. Die folgenden Kapitel werden in erster Linie voraussichtlich von den Japanern geschrieben werden.

Meine ursprüngliche Absicht war es, als 1. Teil meiner Arbeit eine umfassende Behandlung der vorstehend angedeuteten allgemeinen Fragen erscheinen zu lassen. Durch den Krieg wurde diese Absicht vereitelt.

Bei Ausbruch des Krieges war das Verzeichnis der bisher bekannten Dipteren von Formosa, das dem geplanten allgemeinen Teil in der Veröffentlichung folgen sollte, eben in Kartothekform fertiggestellt. Um nun für jeden Fall die darin niedergelegte Arbeit nicht umsonst getan zu haben, habe ich diese Kartothek zunächst für den Druck vorbereitet und lege dieses „Verzeichnis der Dipteren von Formosa“ als 1. Teil der Arbeit vor. Die Bearbeitung des „Allgemeinen Teils“ wird, wenn möglich, nach Beendigung des Krieges in Angriff genommen werden.

Über die Anlage des 1. Teils müssen noch folgende Angaben gemacht werden: Die Anordnung der Verwandtschaftsgruppen bis herab zur Unterfamilie wurde vorgenommen nach der Bearbeitung der Dipteren von Hendel & Beier in „Kükenthal-Krumbach, Handbuch der Zoologie, 4. Band, 2. Hälfte, Insecta 2, Berlin und Leipzig 1937“. Nur in einzelnen Fällen bei den Acalyptraten wurde davon abgewichen. In der Anordnung der Gattungen innerhalb der Unterfamilien folgte ich neueren zusammenfassenden Darstellungen dieser kleineren Verwandtschaftsgruppen, wenn solche vorliegen. In den Fällen, wo solche nicht vorhanden sind, ist die Anordnung $\pm$ willkürlich. Innerhalb der Gattungen sind die Arten alphabetisch angeführt.

Es war ursprünglich geplant, bei den einzelnen Familien und Unterfamilien noch auf vorliegende zusammenfassende Arbeiten hinzuweisen. Auf diese Weise hätte die Arbeit zugleich eine Übersicht über den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse von der Dipterenwelt der orientalischen Region im allgemeinen ermöglicht. Ob sich dieser Plan in irgendeiner Form im „allgemeinen Teil“ nachholend wird verwirklichen lassen, hängt von der Zukunft ab. Literatur und Synonyma sind bei den einzelnen Arten nur insoweit zitiert, wie sie für das Vorkommen der betreffenden Art in Formosa von Bedeutung sind. Vollständig gegeben wurde überall das Zitat der Urbeschreibung jeder einzelnen Art. Die Literaturstellen, die sich auf das Vorkommen einer Art in Formosa beziehen wurden abgekürzt, durch Angabe des Autornamens, des Jahres und Seitenzahl zitiert. Der vollständige Titel der Arbeit ist aus dem Literaturverzeichnis am Schluß zu ersehen. Bei den Formen, die bisher nur aus Formosa bekannt sind, wurde auch die Urbeschreibung so zitiert. Bei den formosanischen Fundorten der einzelnen Arten wurde stets das Material angegeben, das sich im Deutschen Entomologischen Institut, Berlin-Dahlem (abgekürzt DEI) befindet. „Taihoku XI. 1) (DEI; 7—1 Typus)“ bedeutet also z. B., daß die Art von Taihoku (gefangen im November) in der mit 1) bezeichneten Arbeit gemeldet wurde und daß sich 7 gewöhnliche Exemplare und 1 Typus von diesem Fundort im Deutschen Entomologischen Institut befinden. Wenn die Bezeichnung „Typen“ in Anführungsstriche gesetzt ist, handelt es sich um Fälle in denen die Fundorte dieser

„Typen“ nicht durchweg mit den in der Urbeschreibung genannten Fundorten übereinstimmen oder in denen es aus anderen Gründen zweifelhaft ist, ob es sich bei allen diesen Exemplaren um echte Typen handelt. In manchen Fällen sind nämlich offenbar auch nachträglich vom Autor der Art determinierte Exemplare als „Typen“ gekennzeichnet worden. In den Fällen, in denen Arten in vorliegender Arbeit erstmalig von Formosa gemeldet werden, ist der Name des Determinators genannt, der für die Richtigkeit der Bestimmung verantwortlich ist. Nur wo ein solcher Name nicht genannt ist, kann ich selbst die Verantwortung übernehmen.

Das Literaturverzeichnis am Schlusse der Arbeit enthält nur Arbeiten, in denen Dipteren von Formosa gemeldet wurden (alle übrigen für die Tiergeographie usw. von Formosa wichtigen Arbeiten sollen im allgemeinen Teil genannt werden). Aus der großen Zahl der betreffenden Arbeiten geht hervor, wie sehr sich eine Zusammenfassung der darin verstreuten Angaben rechtfertigt.

Bei einzelnen Familien (z. B. Lonchaeiden, Platystomiden, Agromyziden) besitzt das Deutsche Entomologische Institut noch unbeschriebene Arten, deren Beschreibung vor Kriegsausbruch nicht mehr fertiggestellt werden konnte. Desgleichen konnte die Bearbeitung der Fungivoriden, die Herr Dr. Okada-Japan übernehmen wollte, bisher noch nicht abgeschlossen werden. Ich hoffe, daß sich diese Mängel in einem dem allgemeinen Teil beizugebenden Nachtrag später beheben lassen werden.

Die Angaben über die „sonstige Verbreitung“ der einzelnen Arten (außerhalb der Insel Formosa) machen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wurden größtenteils nachträglich während des Krieges unter erheblichen Schwierigkeiten eingefügt und sollen es nur ganz im allgemeinen ermöglichen zu beurteilen, welche Arten auch außerhalb Formosas bisher bekannt sind und ob es sich bei diesen Arten um orientalische oder paläarktische Elemente, Kosmopoliten usw. handelt.

Zum Schluß muß ich dankbar hervorheben, daß der Druck der Arbeit während des Krieges nur durch die fortgesetzte Hilfe meiner Frau und des Kommiss. Direktors des Deutschen Entomologischen Instituts, des Herrn Regierungsrat Dr. H. Sachtleben, ermöglicht worden ist.

Unterordnung *Nematocera*

Superfamilie *Tipuloidea*

Familie *Petauristidae* (*Trichoceridae*)

Petaurista arisanensis Alexander 1935a, p. 339, Taf. 1, Fig. 1 (*Trichocera*)¹⁾

Arisan 7640 feet, V.¹⁾

Paracladura cuneata Alexander 1928, p. 456¹⁾; Alexander 1930d, p. 105²⁾
Noko 9000 feet, VI.¹⁾; Arisan 7300 ft VII.²⁾

Paracladura flavoides Alexander 1923b, p. 467¹⁾ (*Trichocera*); Alexander 1930d, p. 105²⁾

Tattaka 7400 ft (etwa 2250 m) VIII.¹⁾; Arisan 7300 ft, VII.²⁾

Familie *Tipulidae*

Subfamilie *Dolichopezinae*

Dolichopeza issikiella Alexander 1934b, p. 23, Taf. 1, Fig. 3¹⁾

Kanshirei 1500 ft V.¹⁾

Dolichopeza orientalis Brunetti 1913, Fauna Brit. Ind., Nematoc. p. 354;
Edwards 1921, p. 106¹⁾

Ringaurin, Nanto XII.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Indien (terra typica)

Dolichopeza taiwanicola Alexander 1934b, p. 24, Taf. 1, Fig. 3¹⁾

S. Keinensan, 5400 ft, VIII.¹⁾

Dolichopeza (Nesopeza) basistylata Alexander 1929b, p. 519¹⁾

Rantaizan 4000—6000 ft, V.¹⁾

Dolichopeza (Nesopeza) circe Alexander 1928, p. 456¹⁾

Mt. Rantaizan 4000 ft, VI.¹⁾

Dolichopeza (Nesopeza) gracilis de Meijere 1911, Tijds. Ent. 54, p. 60
Riedel 1916, p. 114¹⁾

Taihoku: Okaseki VI. (Exemplar fehlt im DEI)

Sonstige Verbreitung: Java (terra typica)

Dolichopeza (Nesopeza) lugubriventris Alexander 1935a, p. 351, Taf. 1, Fig. 9 und Taf. 2, Fig. 35¹⁾

Arisan 7475 ft, 25. V.¹⁾

Dolichopeza (Nesopeza) profundemarginata Alexander 1934c, p. 137,
Taf. 1, Fig. 3 und Taf. 2, Fig. 28¹⁾
Urai 1500 ft, IV.¹⁾; Giran XI.

Dolichopeza (Nesopeza) rantaizana Alexander 1929a, p. 323¹⁾
Rantaizan 7000 ft, VI.¹⁾

Dolichopeza trichopyga Alexander 1928, p. 457¹⁾
Noko 9000 ft, VI.¹⁾

Oropeza sauteri Riedel 1916, p. 114¹⁾; Alexander 1929a, p. 326²⁾
Taihoku-Distr., Okaseki, VI.¹⁾ (Typus fehlt im DEI); Taihoku IV.²⁾

Oropeza shirakiella Alexander 1926, p. 376; Alexander 1930a, p. 507²⁾
Tamaru (Rato) VIII.¹⁾; Hassan 4500—6000 ft, VIII.²⁾

Subfamilie *Tipulinae*

Tipula (Acutitipula) alboplagiata Alexander 1935a, p. 341, Taf. 1, Fig. 3, Taf. 2, Fig. 25, 26¹⁾
Arisan 7640 ft, I.¹⁾

Tipula (Oreomyza) arisanensis Edwards 1921, p. 109, Taf. 10, Fig. 17¹⁾;
Alexander 1935a, p. 348²⁾
Arisan V.¹⁾; Pianan-ambu V.²⁾

Tipula (Vestiplex) bicornigera Alexander 1938, p. 102, Taf. 2, Fig. 26, 27¹⁾
Oiwake, Noko-gun 7570 ft, VIII.¹⁾

Tipula (Vestiplex) bicornuta Alexander 1920, p. 267¹⁾
Funkiko IV.¹⁾

Tipula (Vestiplex) biserra Edwards 1921, p. 108, Taf. 10, Fig. 18¹⁾
Arisan IV.¹⁾

Tipula coquillettii Enderlein 1912, Zool. Jahrb. Syst. 32, p. 7, nom. nov.
pro *Tipula nubifera* Coquillett; Edwards 1916, p. 259¹⁾
Arisan X.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Japan (terra typica)

Tipula (Oreomyza) coxitalis Alexander 1935a, p. 532, Taf. 1, Fig. 5,
Taf. 2, Fig. 30, 31¹⁾
Hassensan 6532 ft, 4875 ft, 6700 ft, VI.¹⁾; Bukai 2775 ft, VI.¹⁾

Tipula demarcata Brunetti 1911, Rec. Ind. Mus. 6, p. 259; Edwards
1921, p. 110¹⁾
Suisha, Nanto, XII.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Ceylon (terra typica).

Tipula (Oreomyza) edwardsella Alexander 1923a, p. 74, nom. nov. pro
Tipula flavicosta Edwards nec Alexander.
Synonym: *flavicosta* Edwards 1921, p. 106, Taf. 10, Fig. 15¹⁾
Noko V.¹⁾

Tipula (Vestiplex) foliacea Alexander 1924, p. 73¹⁾
Arisan 7500 ft, V.¹⁾

Tipula formosicola Alexander 1920, p. 268 ¹⁾

Koshun IV.—V. ¹⁾

Tipula gressitti Alexander 1935 a, p. 348, Taf. 1, Fig. 7, Taf. 2, Fig. 34 ¹⁾

Arisan 7640 ft, V. ¹⁾

Tipula (Trichotipula) haplotricha Alexander 1934 b, p. 26, Taf. 1, Fig. 5, Taf. 2, Fig. 26 ¹⁾

Kanshirei 1500 ft, V. ¹⁾

Tipula holosericea Matsumura 1916?, p. 456, 457, *Formotipula* Alexander 1920, p. 264 ¹⁾

Synonym (nach Edwards):

nigrorubra Riedel 1916, p. 115 ²⁾; Riedel 1918, p. 320 ³⁾

rufomedia Edwards 1916, p. 259, Taf. 12, Fig. 5—7 ⁴⁾

Horisha ¹⁾ ⁴⁾; Shinchiku, VII. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾ (DEI: 2 Typen); Kosempo III. ³⁾; Mt. Hoozan II. ³⁾; Tainan (DEI: 3 Tiere, 4 weitere ohne Fundort)

Tipula (Acutitipula) lackschewitziana Alexander 1928, p. 458 ¹⁾

Noko 8000 ft, VI. ¹⁾

Tipula microcellula Alexander 1923 a, p. 73 ¹⁾

Funkiko 6000 ft, IV. ¹⁾

Tipula (Vestiplex) nestor Alexander 1934 b, p. 28, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 2, Fig. 27 ¹⁾

Kanzangoe, Taitô-chô, Kaimosu to Kanzananbu VIII. ¹⁾

Tipula (Oreomyza) niitakensis Alexander 1938, p. 104, Taf. 2, Fig. 28 bis 30, Taf. 1, Fig. 7 ¹⁾

Niitakayama VIII. ¹⁾

Tipula (Vestiplex) nokonis Alexander 1928, p. 459 ¹⁾; Alexander 1938, p. 100 ²⁾

Noko 9800 ft, VI. ¹⁾; Kwanzan 9000 ft, VI. ²⁾

Tipula nova Walker 1848, List Dipt. Brit. Mus. 1, p. 71; Alexander 1920, p. 269 ¹⁾

Synonym:

fumifasciata Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind., Nemat., p. 308; Riedel 1916, p. 115 ²⁾; Riedel 1918, p. 320 ³⁾

nohirae Matsumura 1916, p. ? (*Yamatotipula*)

Taito ¹⁾; Taihoku-Distr. Gai-So-Kai, V. ²⁾ (DEI: 1); Macuyama, VI. ²⁾; Kosempo III. ³⁾

Sonstige Verbreitung: Brit. Indien.

Tipula (Vestiplex) obtusiloba Alexander 1934 b, p. 32, Taf. 2, Fig. 30 ¹⁾

Taiheizan, Taihoku-shû, Kamiyodami, VII. ¹⁾

Tipula (Oreomyza) ornata Alexander 1934 b, p. 35, Taf. 1, Fig. 9, Taf. 2, Fig. 32 ¹⁾

- Hassenzan, Taichu-shû, Reimei, VII. 1); Reimei-Piawaikei-Baibaran, VII. 1); Taiheizan, Taihoku, Toganoo, VII. 1)
- Tipula (Vestiplex) parvaviculata* Alexander 1934b, p. 30, Taf. 1, Fig. 7, Taf. 2, Fig. 28, 29 1)
- Taiheizan, Taihoku-shû, X. 1)
- Tipula pluriguttata* Alexander 1920, p. 269 1)
- Funkiko, IV. 1)
- Tipula (Vestiplex) quadrifulva* Edwards 1921, p. 107, Taf. 10, Fig. 19 1)
- Musha, V. 1)
- Tipula rantaicola* Alexander 1929a, p. 321 1)
- Rantaizan 7000 ft, VI. 1)
- Tipula shirakii* Edwards 1916, p. 258 1); Alexander 1920, p. 264 2)
- Arisan 8000 ft, X. 1); Funkiko IV. 2)
- Sonstige Verbreitung: Assam (Khasi Hills 1))
- Tipula sparsissima* Alexander 1928, p. 461 1)
- Noko 8000 ft, VI. 1)
- Tipula (Oreomyza) sternotuberculata* Alexander 1935a, p. 534, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 2, Fig. 32, 33 1)
- Arisan 7640 ft und 6200 ft, V. 1)
- Tipula (Schummelia) strictiva* Alexander 1935a, p. 541, Taf. 1, Fig. 10 1)
- Taiheizan 5500 ft, VII. 1)
- Tipula subapterogyne* Alexander 1920, p. 266 1)
- Noko V. 1)
- Tipula (Vestiplex) takahashiana* Alexander 1938, p. 101, Taf. 1, Fig. 6 1)
- Hattsukan 9000 ft, VIII. 1)
- Tipula (Vestiplex) terebrata* Edwards 1921, p. 109, Taf. 10, Fig. 16 1)
- Musha, V. 1)
- Tipula (Oreomyza) tridentata* Alexander 1920, p. 265 1); Alexander 1935b, p. 123 2); Alexander 1938, p. 106 3)
- Musha 3700 ft, V.—VI. 1); Arisan 8000 ft, 26. VIII. 3); Mt. Gokwan 10000 ft, VIII. 3)
- Tipula yamata* Alexander 1914, Canad. Ent. 46, p. 208, Fig. 3 1); Riedel 1916, p. 115 2); Riedel 1918, p. 320 3); Alexander 1930a, p. 507 4)
- Gai-So-Kai, V. 2); Taihoku-Distr. Okaseki, VI. 2); Macuyama, VI. 2); Taihoku, XI. 2) (DEI: 1); Kosempo, II. 3); Hassensan 3500—5500 ft 4)
- Sonstige Verbreitung: Japan (Tokio) 1)
- Longurio rubriceps* Edwards 1916, p. 261 1)
- Shinten 400 ft 1)
- Longurio variceps* Alexander 1935a, p. 340, Taf. 1, Fig. 2 1)
- Hori 2340 ft, VI. 1)
- Brithura conifrons* Edwards 1916, p. 263, Taf. 12, Fig. 10, 11 1); Alexander 1920, p. 263 2)

Arisan 8000 ft, X. 1) 2)

Sonstige Verbreitung: Indien (terra typica der nach Pierre 1926 synonymen Art *B. imperfecta* Brunetti 1918)

Ctenacroscelis clavipes Edwards 1921, p. 111 1)

Koshun, IV.—V. 1); Taito, II.—III. 1); Kusukusu, V. 1)

Sonstige Verbreitung: Nordchina 1)

Ctenacroscelis similis Edwards 1921, p. 113 1)

? Synonym (nach Edwards)

Tipula sikkimensis (End.) Riedel 1918, p. 320 2)

Arisan, IV. 1); Kosempo, II., V. 2)

Nephrotoma atrolatera Alexander 1935 a, p. 350, Taf. 1, Fig. 8 1)

Hassensan 4875 ft, VI. 1)

Nephrotoma citrina Edwards 1916, p. 265, *Pachyrrhina* 1)

? Synonym (nach Edwards)

Pachyrrhina serricornis (Brunetti) Riedel 1916, p. 116 2)

Taihoku 1); Toa Tsui Kustu, V. 2)

Nephrotoma delta Walker 1856, Ins. Saund. 1, p. 445 1); Edwards 1921, p. 111 2)

Chyoshu, XI. 2)

Sonstige Verbreitung: Indien (terra typica der nach Pierre 1926 synonymen Art *dorsopunctata* Brunetti)

Nephrotoma formosensis Edwards 1916, p. 267 1), *Pachyrrhina*

? Synonym (nach Edwards)

Pachyrrhina palloris (Coquillett) Riedel 1916, p. 116 2); Riedel 1918, p. 320 3)

Kammutu, IV. 1); Macuyama, V.—VI. 2); Daitotai, V.—VI. 2); (DEI: 1); Toa Tsui Kussu, V. 2); Taihoku, IV. 2) 3); Takao XII. 3); Kosempo, III. 3)

Nephrotoma javensis Doleschall 1856, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 10, p. 406; Edwards 1916, p. 266 1)

? Synonym (nach Edwards)

Pachyrrhina bombayensis (Macquart) Riedel 1918, p. 320 2)

Insel Kotosho bei Formosa, VII 1); Polisha III. 2); Takao X. 2)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Java, Sumatra (teste Pierre 1926)

Nephrotoma integra Alexander 1935 c, p. 224, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 3, Fig. 35 1)

Rokki 1000 ft, V. 1)

Nephrotoma makiella Matsumura 1916, p. 468 (*Pachyrrhina*).

Genauer Fundort?

Nephrotoma parva Edwards 1916, p. 266, *Pachyrrhina* 1)

Arisan 8000 ft, X. 1)

Nephrotoma takeuchii Alexander 1924, p. 74 1)

Urai 1500 ft, IV. 1)

Nephrotoma virgata Coquillett 1898, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, p. 306;
 Riedel 1916, p. 116¹⁾; Edwards 1916, p. 266²⁾
 Toa Tsui Kutsu V.¹⁾; Taihoku-Distr., Okaseki VI.¹⁾; Arisan 8000
 ft, XI.²⁾; DEI: 1 Tier „Formosa“, det. Alexander.

Sonstige Verbreitung: Japan.

Tipulodina taiwanica Alexander 1923 a, p. 75¹⁾
 Shinchiku, VII.¹⁾

Subfamilie *Ctenophorinae*

Dictenidia formosana Alexander 1920, p. 261¹⁾

Funkiko, IV.¹⁾

var. *sauteri* Enderlein 1921, p. 225¹⁾; Alexander 1934 b, p. 23
 Toyenmongai bei Tainan¹⁾

Dictenidia inaequipunctata Alexander 1934 b, p. 21, Taf. 1, Fig. 2¹⁾
 Kanshirei 1500 ft, V.¹⁾; Arisan, VI.¹⁾

Pselliophora ctenophorina Riedel 1913, p. 274¹⁾; Riedel 1916, p. 115²⁾;
 Edwards 1916, p. 255³⁾; Riedel 1918, p. 320⁴⁾; Alexander 1920,
 p. 262⁵⁾

Kankau (Koshun) V., VI., VII., IX.¹⁾ (DEI: 4 Typen + 5); Toa
 Tsui Kutsu, V.²⁾; Kuskus, V.³⁾; Koannania, VI.³⁾; Koshun, III.⁴⁾ 5)

Pselliophora formosana Enderlein 1921, p. 222¹⁾
 Toyenmongai bei Tainan¹⁾; Pilan II.¹⁾

Pselliophora hoppo Matsumura 1918, p. 448. Genauer Fundort?

Pselliophora laneipes Edwards 1921, p. 105¹⁾, Taf. 10, Fig. 14
 Taito II.—III.¹⁾

Pselliophora scalator Alexander 1920, p. 262¹⁾

? Synonym (nach Edwards)

Pselliophora Taprobanes (Walker) Riedel 1916, p. 115²⁾; Riedel
 1918, p. 320³⁾

Taito, II.—III.¹⁾; Shinchiku, I.—VII.¹⁾; Toa Tsui Kutsu V.²⁾;
 (DEI: 1 + 12 „Formosa“); Kosempo III.³⁾

Pselliophora semirufa Edwards 1916, p. 255¹⁾
 Taihoku XI.¹⁾

Familie *Limoniidae* (*Limnobiidae*)

Subfamilie *Limoniinae* (*Limnobiinae*)

Elliptera taiwanicola zipanguensis Alexander 1934 b, p. 44¹⁾
 Keinensan 5400 ft, VIII.¹⁾

Taiwanita (Thaumastoptera) issikiana Alexander 1929 b, p. 531¹⁾; Ale-
 xander 1930 c, p. 508

Shorei 7000—8000 ft, X.¹⁾; Hassensan 5600 ft, X.¹⁾

- Antocha javanensis* Alexander 1915, Proc. U. S. Nat. Mus. 49, p. 171, Taf. 43, Fig. 18 ¹⁾; Alexander 1920, p. 252 ²⁾
Shishito, V. ²⁾
Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾
- Antocha styx* Alexander 1930c, p. 517 ¹⁾
Meizi Hot Springs, foot of Hassensan 2500 ft, X. ¹⁾; Hassensan 3500 ft, X.
- Antocha bifida* Alexander 1924, Philipp. Journ. Sci. 24, p. 546 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 508 ²⁾
Hassensan 3600 ft, VIII. ²⁾
Sonstige Verbreitung: Japan ¹⁾
- Antocha* spec. Edwards, 1916, p. 249 ¹⁾
Horisha, V. ¹⁾
- Thripticomys saltans* Doleschall 1857, Naturk. Tijdschr. Nederl. Ind. 14 p. 390 ¹⁾; Riedel 1916, p. 110 ²⁾
Taihoku XI. ²⁾ (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. ²⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾
- Limonia (Geranomyia) alpestris* Alexander 1930b, p. 63 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 508 ²⁾
Heigansan 5800 ft, X. ¹⁾; Hassensan 6500—7800 ft, X. ²⁾
- Limonia (Dicranomyia) alticola* Edwards 1916, p. 246, Taf. 12, Fig. 1 ¹⁾
Arisan X. ¹⁾; Horisha V. ¹⁾; DEI: Fundort? 5000 ft, III. 1 Tier det. Alexander.
- Limonia (Geranomyia) apicifasciata* Alexander, 1930c, p. 516 ¹⁾
Shinten, XII. ¹⁾
- Limonia (Geranomyia) argentifera* de Meijere, 1911, Tijd. Ent. 54, p. 29 ¹⁾; Riedel 1916, p. 110 ²⁾; Riedel 1918, p. 316
Taihoku XI. ²⁾ (DEI: 1); Maruyama 500 ft, XI. ²⁾ (DEI: 1); Jus-hifun, VI. ²⁾ (DEI: 1); DEI: Hokuto, 1 Exemplar det. Alexander.
Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾
- Limonia (Discobola) argus* Say 1824, in Keating, Exp. Peter River 2, p. 358; Alexander 1929b, p. 526 ¹⁾
Shorei, 7000—8000 ft, X. ¹⁾
Sonstige Verbreitung: Weit verbreitet in N.-Amerika und NO.-Asien nach Alexander 1929
- Limonia (Alexandriaria) argyrata* Alexander 1929a, p. 332 ¹⁾
Urai 1500 ft, IV. ¹⁾; Hokuto ¹⁾ (DEI: 1 Paratypus)
- Limonia (Alexandriaria) atayal* Alexander 1929b, p. 529 ¹⁾
Shinten, IV. ¹⁾
- Limonia atridorsum* Alexander 1920, p. 251 ¹⁾
Funkiko, IV. ¹⁾

- Limonia (Geranomyia) atrostriata* Edwards 1921, p. 101 ¹⁾
? Synonym (nach Edwards)
montana (de Meij.) Riedel 1918, p. 316 ²⁾
Ringaurin, Nanto, XII. ¹⁾; Taihorinsho, VII. ²⁾
- Limonia (Dicranomyia) aurita* Alexander 1929b, p. 526 ¹⁾
Ritozan 5000 ft, VIII. ¹⁾
- Limonia (Dicranomyia) cingulifera* Alexander 1928, p. 463 ¹⁾
Mt. Rantaizan 7000 ft und 6000 ft, VI. ¹⁾
- Limonia (Dicranomyia) cingulifera* Alexander 1928, p. 463 ¹⁾
Mt. Rantaizan 7000 ft und 6000 ft, VI. ¹⁾
- Limonia (Libnotes) clitelligera* Alexander 1929b, p. 521 ¹⁾
Rantaizan 4000—6000 ft, V. ¹⁾
- Limonia (Libnotes) comissabunda* Alexander 1934c, p. 140, Taf. 1, Fig. 6 ¹⁾
Taiheizan, V. ¹⁾
- Limonia (Dicranomyia) convergens* de Meijere 1911, Tijds. Ent. 54, p. 24 ¹⁾;
Riedel 1916, p. 109 ²⁾
Taihoku XI. ²⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾
- Limonia (Dicranomyia) curvispina* Alexander 1923b, p. 470 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 507 ²⁾
Tattaka 2250 m, VIII. ¹⁾; Hassensan 6000—7000 ft, VIII. ²⁾
- Limonia (Dicranomyia) depauperata* Alexander 1930c, p. 508 ¹⁾
Hassensan 3500 ft, X. ¹⁾
- Limonia (Pseudoglochina) dimelania* Alexander 1935c, p. 246 ¹⁾
Kanshirei 1500 ft, X. ¹⁾
- Limonia (Limonia) ebriola* Alexander 1928, p. 462 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 507 ²⁾
Mt. Rantaizan 6000 ft, VI. ¹⁾; Hassensan 5600 ft, X. ²⁾
- Limonia esakii* Alexander 1922, p. 78 ¹⁾
Tattaka 7400 ft, VIII. ¹⁾
- Limonia (Limonia) flavoterminalis* Alexander 1922, p. 76 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 507 ²⁾
Hassensan 6000 ft, VIII. ²⁾; Tattaka, 7400 ft, VIII. ¹⁾
- Limonia (Geranomyia) fletcheri* Edwards 1911, Ann. Mag. Nat. Hist. 8, p. 60 ¹⁾; DEI: Hokuto XII. 1 Exemplar, det. Alexander
Sonstige Verbreitung: Ceylon ¹⁾
- Limonia (Rhipidia) rostrifera formosana* Alexander 1923a, p. 61 ¹⁾;
Funkiko 6000 ft, IV. ¹⁾; Hassensan 3500 ft, X., 6000—7000 ft, VIII.
Verbreitung der Nominatform: Malayische Halbinsel, Sumatra, eine weitere Subspecies kommt in Szechwan vor.
- Limonia fraudulentus* Alexander 1928, p. 459 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 507 ²⁾

W side of Mt. Daibu 3000—5000 ft, III.¹⁾; Hassensan 4500—6000 ft, VIII.²⁾

Limonia (Dicranomyia) frivola Alexander 1928, p. 464¹⁾

Mt. Rantaizan 7000 ft, VI.¹⁾

Limonia (Dicranomyia) fullowayi Alexander 1915, Canad. Ent. 47, p. 79¹⁾; Edwards 1916, p. 245²⁾

? Synonym (nach Edwards):

Dicranomyia punctulata (de Meij.) Riedel 1916, p. 109³⁾

Arisan, X.²⁾; Taihoku, XI.³⁾ (DEI: 1); DEI: Toyen-Distr., Shan shikyaku, 1 Exemplar det. Alexander

Sonstige Verbreitung: Guam (Ladrones)¹⁾

Limonia (Libnotes) griseola Alexander 1934b, p. 42, Taf. 1, Fig. 13¹⁾

Hassensan, Taichu-shû, Reimei-Piawaikai-Baibarasan, VIII.¹⁾

Limonia (Libnotes) hassenana Alexander 1930c, p. 514¹⁾

Hassensan 4500—6000 ft, VIII.¹⁾

Limonia imbellis Alexander 1924, p. 61¹⁾

Urai 1500 ft, IV.¹⁾

Limonia immetata Alexander 1935a, p. 546, Taf. 1, Fig. 14, Taf. 3, Fig. 38¹⁾

Rokki 1000 ft, V.¹⁾

Limonia (Limonia) inscita Alexander 1934c, p. 143, Taf. 1, Fig. 8, Taf. 2, Fig. 32¹⁾

Urai 1500 ft, V.¹⁾

Limonia (Idioglochina) kotoshoensis Alexander 1923a, p. 57¹⁾

Insel Kotosho, III.—IV.¹⁾

Limonia (Limonia) koxinga Alexander 1930c, p. 512¹⁾

Hassensan 4500—6000 ft, VIII.¹⁾

Limonia (Libnotes) limpida Edwards, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 17, p. 355¹⁾;

Edwards 1921, p. 102²⁾

Arisan, IV.²⁾

Sonstige Verbreitung: Malayische Staaten¹⁾

Limonia (Libnotes) longistigma Alexander 1921, p. 180¹⁾

Insel Kotosho, III.—IV.¹⁾

Limonia apicalis majuscula Alexander 1930b, p. 65¹⁾

Tozan, near Rato, XI.¹⁾

Limonia (Discobola) margarita Alexander 1924, Philippine Journ. Sci. 24, p. 539¹⁾; Alexander 1929b, p. 526²⁾; Alexander 1930c, p. 507³⁾

Rantaizan 7000 ft, VI.¹⁾; Hassensan 3500—6000 ft, VIII.³⁾

Sonstige Verbreitung: Japan (Sachalin und Hokkaido)¹⁾

Limonia melas Alexander 1934b, p. 37, Taf. 1, Fig. 10, Taf. 3, Fig. 33¹⁾

Keinensan 5400 ft, VIII.¹⁾

Limonia (Pseudoglochina) monocycla Alexander 1935c, p. 244¹⁾, pl. 1, Fig. 26

Kanshirei 1500 ft, X. 1)

Limonia (Dicranomyia) montium Alexander 1929b, p. 527 1)

Shorei 7000—8000 ft, X. 1)

Limonia (Dicranomyia) nesomorio Alexander 1928, p. 465 1); Alexander 1930c, p. 508 2)

Mt. Rantaizan 6000 ft, VI. 1); Rengechi 1500—2000 ft, III. 1);

Hassensan 6500—7800 ft, X. 2)

Limonia nigriceps van der Wulp 1895, Tijd. Ent. 38, p. 38

Synonym (nach Edwards 1921):

rectangularis Riedel 1916, p. 111, Fig. 1 1); Riedel 1918, p. 316 2)

Macuyama VI. 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. 1) (DEI: 1 Typus

„*rectangularis*“); Kosempo, VI. 2)

Sonstige Verbreitung: Java

Limonia (Geranomyia) nitida de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 28 1);

Riedel 1918, p. 317, Fig. 1 2)

Kosempo II. 2)

Sonstige Verbreitung: Java 1)

Limonia (Dicranomyia) nigrithorax Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind.

Nematoc., p. 385 1); Riedel 1916, p. 109 2)

Taihoku, XI. 2) (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Britisch Indien 1)

Limonia nitobei Edwards 1916, p. 247, Taf. 12, Fig. 2 1); Alexander 1935c, p. 244 2)

Arisan 8000 ft, X. 1); Raisya 3000 ft, XI. 2)

Limonia perparvuloides Alexander 1935c, p. 241 1)

Raisya, 2500 ft, XI 1)

Limonia (Dicranomyia) pleurilineata Riedel 1916, p. 109 1)

Taihoku, XI. 1); Taihoku-Distr.: Okaseki VI. 1) (DEI: von beiden Fundorten je 1 Typus)

Limonia (Dicranomyia) puncticosta Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind., Nematoc., p. 377, Taf. 7, Fig. 7 1); Alexander 1920; p. 252 2); Funkiko, IV. 2)

Sonstige Verbreitung: Brit. Indien 1)

Limonia (Limonia) rantaiensis Alexander 1929a, p. 327 1)

Rantaizan 6000 ft, VI. 1)

Limonia (Limonia) regalis Edwards 1916, p. 248 1); Alexander 1920, p. 250 2)

Taihoku 1); Arisan, VI. 2)

Limonia (Limonia) remissa Alexander 1928, p. 460 1); Alexander 1930c, p. 508 2)

Musha, etwa 3500 ft, X. 1); Hassensan 6000—8000 ft, X. 2)

Limonia (Geranomyia) septemnotata Edwards 1916, p. 246 ¹⁾

Synonym (nach Edwards):

pulchripennis (Brunetti) Riedel 1916, p. 110 ²⁾

Arisan, X. ¹⁾; Taihoku-Distr., Maruyama, 500 ft, XI. ²⁾

Limonia (? *Dicranomyia*) *shirakii* Alexander 1923a, p. 58 ¹⁾

Tappan 3000 ft, VI. ¹⁾

Limonia (Dicranomyia) sordida Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind. Nematoc., p. 382 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 508 ²⁾

Hassensan 6000—7500 ft, VIII. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Indien ¹⁾

Limonia subhostilis Alexander 1935a, p. 352, Taf. 1, Fig. 10, Taf. 3, Fig. 36 ¹⁾

Arisan 7312 ft, V. ¹⁾

Limonia (Libnotes) subopaca Alexander 1923b, p. 468 ¹⁾

Urai 1500 ft (450 m), X. ¹⁾

Limonia (Dicranomyia) subpunctulata Alexander 1930c, p. 515 ¹⁾

Meizi Hot Springs, foot of Hassensan 2500 m, X. ¹⁾; Hassensan 3500 ft, X. ¹⁾; Noko 8000 ft, VI. ¹⁾

Limonia (Dicranomyia) subumbrata Alexander 1923a, p. 59 ¹⁾

Horisha, XII. ¹⁾; DEI: Taihoku: 1 det. Alexander; Toyen-Distr., Sanshikyaku: 1 det. Alexander

Limonia (Discobola) taivanella Alexander 1930c, p. 511 ¹⁾

Hassensan 6500—7500 ft, VIII., X. ¹⁾; Shorei 7000—8000 ft, X. ¹⁾

Limonia (Dicranomyia) tattakae Alexander 1923b, p. 469 ¹⁾

Tattaka, etwa 7400 ft (2250 m), VIII. ¹⁾

Limonia (Dicranomyia) tenella de Meijere, 1911, Tijd. Ent. 54, p. 27 ¹⁾;

Riedel 1916, p. 109 ²⁾

Taihoku, XI. ²⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Limonia tenuicula Alexander 1929b, p. 525 ¹⁾

Shinten, IV. ¹⁾

Limonia (Libnotes) transversalis de Meijere 1916, Tijd. Ent. 59, p. 198 ¹⁾

Edwards 1921, p. 102 ²⁾

Arisan, IV. ²⁾ — Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Limonia (Rhipidia) triarmata Alexander 1930c, p. 514 ¹⁾

Hassensan 4500—6000 ft, VIII. ¹⁾

Limonia tuta Alexander 1935a, p. 547 ¹⁾, Taf. 1, Fig. 15

Hassensan 4900 ft, VI. ¹⁾

Limonia umbrata de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 25 ¹⁾; Riedel 1916, p. 112 ²⁾

Taihoku XI. ²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

- Limonia unifilosa* Alexander 1934a, p. 270 ¹⁾
Shinten bei Taikohn, XII. ¹⁾
- Limonia viridula* Alexander 1922, p. 79 ¹⁾
Urai 1500 ft, X. ¹⁾
- Limonia xanthopteroides* Riedel 1916, p. 110 ¹⁾
Toa Tsui Kutsu V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Dicranoptycha formosensis* Alexander 1928, p. 470 ¹⁾
Raurun 1000 ft, VI. ¹⁾
- Dicranoptycha geniculata* Alexander 1929c, p. 471 ¹⁾
Formosa X. ¹⁾
- Dicranoptycha issikina* Alexander 1930c, p. 518 ¹⁾
Hassensan 3500—5500 ft, X. ¹⁾
- Dicranoptycha nigrotibialis* Alexander 1934b, p. 45, Taf. 1, Fig. 15 ¹⁾
Fudieda 4700 ft, VIII. ¹⁾
- Protohelius issikii* Alexander 1928, p. 467 ¹⁾
Rengechi 1500—2000 ft, III. ¹⁾
- Helius (Helius) attenuatus* Alexander 1929a, p. 338 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 508 ²⁾
Chipon, VII. ¹⁾; Hassensan 5600 ft, VIII. ²⁾
- Helius barbatus* Edwards 1921, p. 103, Textfig. ¹⁾
Arisan, IV. ¹⁾
- Helius (Helius) chikurinensis* Alexander 1930b, p. 65 ¹⁾
Chikurin 3000 ft, VII. ¹⁾
- Helius chikurinensis minusculus* Alexander 1930b, p. 66 ¹⁾
Chikurin, 3000 ft, VII. ¹⁾
- Helius (Eurhamphidia) inelegans* Alexander 1928, p. 469 ¹⁾
Musha 3500 ft, X. ¹⁾
- Helius (Helius) liliputanus* Alexander 1929b, p. 533 ¹⁾
Michishita 4000 ft, VII. ¹⁾
- Helius (Rhamphidia) nigriceps* Edwards 1916, Ann. Mag. N. H. (8) 17, p. 358 ¹⁾; Edwards 1921, p. 102 ²⁾
- ? Synonym (nach Edwards):
Rhamphidia unicolor (Brunetti) Riedel 1916, p. 112 ³⁾; Riedel 1918, p. 316 ⁴⁾
Arisan IV. ²⁾; Taihoku XI. ³⁾ (DEI: 3); Kosempo II. ⁴⁾
Sonstige Verbreitung: Siam ¹⁾
- Helius (Eurhamphidia) perelegans* Alexander 1930c, p. 518 ¹⁾
Hassensan 6000—7000 ft, VIII. ¹⁾
- Helius rufithorax* Alexander 1928, p. 468 ¹⁾
Mt. Rantaizan 6000 ft, 7000 ft, VI. ¹⁾
- Helius subfasciatus* Alexander 1924, p. 62 ¹⁾
Musha 3500 ft, V. ¹⁾

Helius (Helius) tenuistylus Alexander 1929a, p. 337 ¹⁾

Kirakei 4000 ft, VI. ¹⁾; Chipon, VII. ¹⁾

Orimarga formosicola Alexander 1924, p. 64 ¹⁾

Kanshirei 1000 ft, IX. ¹⁾

Orimarga fuscivena Alexander 1929b, p. 529 ¹⁾

Shinten, IV. ¹⁾

Orimarga griseipennis Alexander 1934b, p. 55, Taf. 1, Fig. 12 ¹⁾

Tyusinron 3200 ft, VIII. ¹⁾

Orimarga gymnoneura Alexander 1934c, p. 146 ¹⁾, Taf. 1, Fig. 11, Taf. 2, Fig. 34

Keinensan 5400 ft, VIII. ¹⁾

Orimarga taiwanensis Alexander 1924, p. 64 ¹⁾

Urai 1500 ft, IV. ¹⁾

Subfamilie *Hexatominae*

Taiwanomyia fragilicornis Riedel 1916, p. 112, Abb. 2 (*Taseocera*) ¹⁾;
Alexander 1923b, p. 477 ²⁾

Macuyama V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kuraru IX. ²⁾

Adelphomyia ariana Alexander 1930b, p. 69 ¹⁾

Arisan 6500—8000 ft, VII. ¹⁾

Adelphomyia issikina Alexander 1930c, p. 520 ¹⁾

Hassensan 5600 ft, X. ¹⁾

Epiphragma divisa Alexander 1923a, p. 64 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 508
Shinchiku 500—1000 ft, VII. ¹⁾; Musha 3700 ft, V.—VI. ¹⁾; Hassensan 3500—5500 ft, X. ¹⁾

Epiphragma kempfi Brunetti 1913, Rec. Ind. Mus. 8, p. 155 ¹⁾; Edwards 1921, p. 104 ²⁾

Arisan IV. ²⁾

Sonstige Verbreitung: N.-O.-Grenze von Indien ¹⁾

Epiphragma nymphica Alexander 1928, p. 467 ¹⁾

Kirakei 4000 ft, VI. ¹⁾

Pseudolimmophila autumnalis Alexander 1929b, p. 535 ¹⁾; Alexander 1930c, p. 508 ²⁾

Mareppa 6000 ft, X. ¹⁾; Shorei 7000—8000 ft, X. ¹⁾; Hassensan 5600—7800 ft, X. ²⁾

Pseudolimmophila chikurina Alexander 1930b, p. 70 ¹⁾

Chikurin 3000 ft, VII. ¹⁾

Pseudolimmophila descripta Alexander 1928, p. 475 ¹⁾

Mt. Rantaizan 4000 ft, VI. ¹⁾

Pseudolimmophila marcida Alexander 1924, p. 70 ¹⁾

Musha 3500 ft, V. ¹⁾

- Pseudolimmophila nokonis* Alexander 1928, p. 468 ¹⁾
 Noko 8000 ft, VI. ¹⁾
- Limmophila (Dicranophragma) dorsolineata* Alexander 1930a, p. 521 ¹⁾
 Arisan 6500—8500 ft, VII. ¹⁾
- Limmophila (Tricholimmophila) excelsa* Alexander 1928, p. 469 ¹⁾
 Noko 8000 ft, VI. ¹⁾
- Limmophila (Tricholimmophila) ferocia* Alexander 1934c, p. 151, Taf. 1, Fig. 16, Taf. 3, Fig. 37 ¹⁾
 Sozan 1000 ft, XII. ¹⁾
- Limmophila (Dicranophragma) formosa* Alexander 1920, p. 258 ¹⁾;
 Alexander 1930, p. 508 ²⁾
 Funkiko, IV. ¹⁾; Hassensan 6000—7000 ft, VIII. ²⁾
- Limmophila (Prionolabis) harukonis* Alexander 1934b, p. 47, Taf. 1, Fig. 17, Taf. 3, Fig. 37 ¹⁾
 Hassensan, Reimej, VII. ¹⁾
- Limmophila illustris* Alexander 1923b, p. 477 ¹⁾
 Tattaka, etwa 2250 m, VIII. ¹⁾
- Limmophila inaequalis* Alexander 1924, p. 440 ¹⁾
 Musha, etwa 3500 ft, V. ¹⁾
- Limmophila inconcussa* Alexander 1913, Canad. Ent. 45, p. 313 ¹⁾; Riedel 1916, p. 114 ²⁾
 Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 5) ²⁾
 Sonstige Verbreitung: Japan
- Limmophila nesonemoralis* Alexander 1931, p. 358 ¹⁾
 Shinten, XII. ¹⁾
- Limmophila nigronitida* Edwards 1921, p. 104 ¹⁾
 Funkiko, II. ¹⁾
- Limmophila (Prionolabis) oritropha* Alexander 1928, p. 470 ¹⁾
 Noko 8500 ft, VI. ¹⁾
- Limmophila (Tricholimmophila) platystyla* Alexander 1928, p. 478 ¹⁾
 Mt. Rantaizan 7000 ft, VI. ¹⁾
- Limmophila platystyla parallela* Alexander 1930a, p. 524 ¹⁾
 Arisan 6500—8000 ft, VII. ¹⁾; Rantaizan 4000—6000 ft, V. ¹⁾
- Limmophila rantaizana* Alexander 1929b, p. 538 ¹⁾
 Rantaizan 6000—7000 ft, V. ¹⁾
- Limmophila (Prionolabis) serridentata* Alexander 1930c, p. 521 ¹⁾
 Hassensan 3500—8000 ft, X. ¹⁾ (DEI: 1 Paratypus)
- Limmophila (Dicranophragma) taiwanensis* Alexander 1923a, p. 66 ¹⁾;
 Alexander 1930c, p. 508
 Taito 500 ft, II.—III. ¹⁾; Hassensan 6500—7500 ft, VIII. ¹⁾
- Pilaria formosicola* Alexander 1929b, p. 539 ¹⁾
 Sorempi, near Giran 1500 ft, XI. ¹⁾

Eriocera ? *morosa* Osten Sacken 1881, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 16, p. 406; DEI: 2 det. Riedel

Sonstige Verbreitung: Celebes

Eriocera (Androclosoma) verticale Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 56; Edwards 1916, p. 252¹⁾

Taihoku¹⁾

Sonstige Verbreitung: Java, Japan

Hexatoma lygropis Alexander 1920, p. 259¹⁾

Synonym (nach Alexander):

Eriocera unicolor (de Meij.) Edwards 1916, p. 253²⁾

Koshun, IV., V.¹⁾; Horisha 1000 ft²⁾; DEI: „Formosa“, 1 det. Alexander

Hexatoma nigrina Riedel 1913, p. 273¹⁾

Kankau, VII., IX.¹⁾ (DEI: 11 Typen + 3)

Hexatoma rubriceps Edwards 1916, p. 253¹⁾

Taipin, X.¹⁾

Hexatoma sauteriana Enderlein 1912, p. 42¹⁾; Riedel 1913, p. 274²⁾; Riedel 1916, p. 114³⁾; Edwards 1916, p. 253⁴⁾; Riedel 1918, p. 319⁵⁾; Alexander 1920, p. 259⁶⁾

Kankau (Koshun)²⁾ (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V.³⁾ (DEI: 1); Macnyama, VI.³⁾ (DEI: 2); Arisan, X.⁴⁾; Insel Kotosho, VII.⁴⁾; Takao, XI., III.⁵⁾; Kanshiree, VI.⁶⁾

Hexatoma shirakii Edwards 1921, p. 84¹⁾

Koshun, IV.—V.¹⁾

Hexatoma testacea Brunetti 1912, Fauna Brit. India, Nematoc., p. 547¹⁾; Riedel 1918, p. 319, Fig. 4²⁾

Kosempo, IV.²⁾

Sonstige Verbreitung: Britisch Indien (Nilgiri Hills)¹⁾

Atarba (Atarbodes) fuscicornis Edwards 1916, p. 250¹⁾; Alexander 1920, p. 255²⁾; Alexander 1930c, p. 508³⁾

Arisan, X.¹⁾; Funkiko, IV.²⁾; Hassensan 3500 ft, X.³⁾

Atarba (Atarbodes) issikiana Alexander 1930a, p. 525¹⁾

Arisan 6500—8000 ft, VII.¹⁾; Rantaizan 6000—7000 ft, VII.¹⁾; Sankakuko 7000—8000 ft, V.¹⁾

Atarba (Atarbodes) leptoxantha Alexander 1928, p. 478¹⁾; Alexander 1930c, p. 508²⁾

Tattaka 7400 ft, VIII.¹⁾; Arisan 7362 ft, VIII.¹⁾; Hassensan 6000—7000 ft, VIII.²⁾

Atarba (Atarbodes) pallidicornis Edwards 1916, p. 249¹⁾; Alexander 1920, p. 254²⁾; Alexander 1930c, p. 508³⁾

Arisan, X.¹⁾; Funkiko, IV.²⁾; Hassensan 3500—6000 ft, VIII., X.³⁾ (DEI: 1)

- Ephelia fascipennis* Brunetti 1912, Fauna Brit. India, Nematoc., p. 526;
 Edwards 1916, p. 253¹⁾
 Arisan X.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Brit. Indien (Kurseong)
- Troglophila ritozanensis* Alexander 1929b, p. 537¹⁾
 Ritozan 5000 ft, VIII.¹⁾
- Ula flavidibasis* Alexander 1930b, p. 68¹⁾
 Arisan 6500—8000 ft, VII.¹⁾
- Ula fuscistigma* Alexander 1929b, p. 535¹⁾
 Shori 7000—8000 ft, X.¹⁾
- Ula superelegans* Alexander 1929b, p. 534¹⁾
 Shori 7000—8000 ft, X.¹⁾
- Elephantomyia (Elephantomyia) luculenta* Alexander 1928, p. 472¹⁾
 Higashinoko 7500 ft, VI.¹⁾
- Elephantomyia (Elephantomyodes) major* Alexander 1923a, p. 63¹⁾
 Insel Kotosho III.—IV.¹⁾
- Elephantomyia (Elephantomyodes) major uniformis* Alexander 1923b, p. 478¹⁾; Alexander 1930c, p. 508²⁾
 Tattaka 2250 m, VIII.¹⁾; Hassensan 4500—6000 ft, VIII.²⁾
- Elephantomyia serotina* Alexander 1930b, p. 74¹⁾; Alexander 1930c, p. 508²⁾
 Yusho 6000 ft, X.¹⁾; Shorei 7000—8000 ft, X.¹⁾; Hassensan 6500—7800 ft, X.²⁾

Subfamilie *Pediciinae*

- Nipponomyia symphyletes* Alexander 1923b, p. 479, *Tricyphona*¹⁾; Alexander 1930c, p. 508²⁾
 Musha 1060 m, VIII.¹⁾; Hassensan 5600 ft, X.²⁾
- Tricyphona arisana* Alexander 1924, p. 71¹⁾; Alexander 1930c, p. 508²⁾
 Arisan 7500 ft, V.¹⁾; Hassensan 5600—7000 ft, VIII.²⁾
- Tricyphona formosana* Alexander 1920, p. 260¹⁾; Alexander 1929c, p. 475²⁾; Alexander 1930c, p. 508³⁾
 Arisan IV.¹⁾; West side of Mt. Daibu 3000—5000 ft, III.²⁾; Hassensan 4500—7500 ft, VIII.³⁾ (DEI: 1)
- Tricyphona orophila* Alexander 1928, p. 463¹⁾
 Noko 9000 ft, VI.¹⁾
- Dicranota (Rhaphidolabis) atripes* Alexander 1928, p. 464¹⁾
 Higashinoko 7500 ft, VI.¹⁾
- Dicranota (Rhaphidolabis) brunettii* Edwards 1916, p. 254¹⁾, nomen novum pro *aperta* Brunetti, 1912.
 Arisan, X.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Britisch Indien

- Dicranota (Amalopina) delectata* Alexander 1930c, p. 519 ¹⁾
Hassensan 6000—8000 ft, X ¹⁾
- Dicranota (Amalopina) fumicostata* Alexander 1935a, p. 357, Taf. 1,
Fig. 15, Taf. 3, Fig. 40 ¹⁾
Urai 1500 ft, IV. ¹⁾
- Dicranota (Amalopina) gibbera* Alexander [Urbeschreibung z. Zt. nicht
auffindbar, siehe Nachtrag] Alexander 1930c, p. 508, Var. ²⁾
Hassensan 4500—6000 ft, VIII. ²⁾
- Dicranota (Rhaphidolabis) plana* Alexander 1934b, p. 46, Taf. 1, Fig. 16,
Taf. 3, Fig. 36 ¹⁾
Keinensan 5400 ft, VIII. ¹⁾

Subfamilie *Cylindrotominae*

- Phalacroceras formosae* Alexander 1923b, p. 479 ¹⁾
Tattaka, etwa 2250 m, VIII ¹⁾
- Liogma pectinicornis* Alexander 1928, p. 458 ¹⁾
Musha etwa 3500 ft, X. ¹⁾
- Cyttaromyia taiwania* Alexander 1929b, p. 523 ¹⁾
Rantaizan 4000—6000 ft, V. ¹⁾
- Stibadocera formosensis* Alexander 1929b, p. 521 ¹⁾
Rantaizan 4000—6000 ft, V. ¹⁾

Subfamilie *Eriopterinae*

- Erioptera (Erioptera) alboguttata* Edwards 1916, p. 252, Taf. 12, Fig. 4 ¹⁾
Alexander 1920, p. 255 ²⁾
Arisan, X. ¹⁾; Funkiko, IV. ²⁾
- Erioptera (Baeoura) aliena* Alexander 1924, p. 66 ¹⁾
Urai 1500 ft, IV. ¹⁾
- Erioptera angustistigma* Alexander 1930b, p. 81 ¹⁾
Arisan 7300 ft, VII. ¹⁾
- Erioptera (Erioptera) ensifera* Alexander 1930b, p. 78 ¹⁾
Taihoku, V. ¹⁾
- Erioptera flava* Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind., Nematoc., p. 455 ¹⁾;
Riedel 1916, p. 113 ²⁾; Riedel 1918, p. 318 ³⁾
Taihoku, XI. ²⁾; Takao, III. ³⁾
Sonstige Verbreitung: Britisch Indien
- Erioptera (Erioptera) insignis* Edwards 1916, p. 251 ¹⁾
Arisan, X. ¹⁾
Sonstige Verbreitung: Japan (Tokio ¹⁾)
- Erioptera (Empeda) liliputina* Alexander 1930c, p. 530 ¹⁾
Hassensan 3600 ft, VIII. ¹⁾

- Erioptera (Ilisia) luliana* Alexander 1934b, p. 55, Taf. 1, Fig. 23, Taf. 3, Fig. 40¹⁾
Hassensan, Taichû-shû, Reimei, VII.¹⁾
- Erioptera (Empeda) minuscula* Alexander 1920, p. 256¹⁾; Alexander 1930c, p. 509²⁾
Shishito, V.¹⁾; Hassensan 3500—3600 ft, VIII., X.²⁾
- Erioptera (Empeda) nigroapicalis* Alexander 1920, p. 255¹⁾
Funkiko, IV.¹⁾
- Erioptera rogersi* Alexander 1923b, p. 471¹⁾
Kanshirei 300 m, IX.¹⁾
- Erioptera (Erioptera) subsessilis* Alexander 1924, p. 67¹⁾
Kanshirei 1000 ft, IX.¹⁾
- Erioptera (Ilisia) tenuisentis* Alexander 1930b, p. 79¹⁾ und 1930c p. 509²⁾
Arisan 7300 ft, VII.¹⁾; Hassensan 5600 ft, X.²⁾
- Gnophomyia brevicellula* Alexander 1923b, p. 472¹⁾; Alexander 1929b, p. 543²⁾
Tattaka 2250 m, VIII.¹⁾; Chikurin 3600 ft, VII.²⁾
- Gnophomyia dejecta* Alexander 1929b, p. 542¹⁾
Taihoku, IV.¹⁾; Hokuto, II.¹⁾
- Gnophomyia nigra* Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind. Nematoc., p. 494¹⁾; Riedel 1916, p. 113²⁾; Riedel 1918, p. 319³⁾
Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V.²⁾ (DEI: 1); Kosempo, II., III.³⁾
Sonstige Verbreitung: Britisch Indien¹⁾
- Gnophomyia orientalis* de Meijere 1911, Tijds. Ent. 54, p. 46; Edwards 1916, p. 250¹⁾
Arisan, X.¹⁾
Sonstige Verbreitung: Java
- Gnophomyia (Dasymallomyia) signata* Brunetti 1911, Rec. Ind. Mus. 6, p. 304¹⁾; Edwards 1916, p. 249²⁾; Alexander 1920, p. 258³⁾; Alexander 1930c, p. 509⁴⁾
Horisha, V.²⁾; Funkiko, IV.³⁾; Hassensan 3500 ft, X.⁴⁾
Sonstige Verbreitung: Darjiling¹⁾
- Gnophomyia similis* Edwards 1916, p. 251, Taf. 12, Fig. 3¹⁾
Arisan, X.¹⁾
- Gnophomyia strenua* Brunetti, 1912, Fauna Brit. Ind. Nematoc., p. 492¹⁾; Riedel 1916, p. 113²⁾; Riedel 1918, p. 319³⁾
Toa Tsui Kutsu, V.²⁾ (DEI: 1); Takao 300 m, III.³⁾
Sonstige Verbreitung: Britisch Indien¹⁾
- Gonomyia clitellata* Alexander 1934b, p. 53, Taf. 1, Fig. 21, Taf. 3, Fig. 38¹⁾
Rimosan, V.¹⁾
- Gonomyia (Progonomyia) confluenta* Alexander 1924, p. 69¹⁾; Alexander 1930c, p. 523²⁾

- Horisha 1500 ft, V.¹⁾; Urai 1500 ft, IV.¹⁾; Hassensan 3500—5500 ft, X.²⁾
- Gonomyia (Ptilostena) curticellula* Alexander 1930b, p. 76¹⁾
Giran, XI.¹⁾; Taihoku, V.¹⁾
- Gonomyia foliacea* Alexander 1935c, p. 221¹⁾
Sakahen 3000 ft, VII.¹⁾
- Gonomyia gressitti* Alexander 1934c, p. 157, Taf. 3, Fig. 40¹⁾
Rokki 400—500 ft, VI.¹⁾
- Gonomyia metatarsata* de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 48¹⁾; Riedel 1912, p. 27²⁾; Riedel 1916, p. 113³⁾
Tainan II.²⁾ (DEI: 1); Macuyama VI.³⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Java¹⁾
- Gonomyia (Gonomyia) nansei* Alexander 1930c, p. 524¹⁾
Hassensan 2500—5600 ft, VIII., X.¹⁾
- Gonomyia (Lipophleps) nebulosa* de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 42?¹⁾
Edwards 1916, p. 252²⁾
Arisan, X.²⁾
Sonstige Verbreitung: Java¹⁾
- Gonomyia neonebulosa* Alexander 1930c, p. 526¹⁾
Meizi Hot Springs, foot of Hassensan 2500 ft, X.¹⁾; Hassensan 3600 ft, VIII.¹⁾
- Gonomyia proxima* Brunetti 1912, Fauna Brit. Ind., Nematoc., p. 474?
Riedel 1918, p. 319¹⁾
Tainan¹⁾
Sonstige Verbreitung: Bengalen
- Gonomyia pruinosa* Alexander 1920, p. 257¹⁾
Shishito, V.¹⁾
- Gonomyia (Lipophleps) ptilostenoides* Alexander 1928, p. 475¹⁾
Noko 8000 ft, VI.¹⁾
- Gonomyia (Lipophleps) sauteri* Alexander 1930c, p. 525¹⁾
? Synonym (nach Alexander):
Liponeura gracilis (Skuse) Riedel 1916, p. 112²⁾
Daitotei, IV.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Macuyama V.—VI.²⁾ (DEI: 1)
- Gonomyia (Progonomyia) scutellum-album* Alexander 1923a, p. 62¹⁾
Funkiko 6000 ft, IV.¹⁾
- Gonomyia sekiana* Alexander 1934b, p. 54, Taf. 1, Fig. 22, Taf. 3, Fig. 39¹⁾
Sekisan 6000 ft, VIII.¹⁾
- Gonomyia (Lipophleps) sinuosa* Alexander 1930c, p. 527¹⁾
Meizi Hot Springs, foot of Hassensan 2500 ft, X.¹⁾
- Gymnastes hyalipennis* Alexander 1920, p. 253¹⁾
Funkiko, IV.¹⁾

- Gymnastes ornatipennis* de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 47, 48, Taf. 3, Fig. 34¹⁾; Riedel 1913, p. 273, *Gnophomyia*²⁾; Edwards 1916, p. 249³⁾; Riedel 1918, p. 319⁴⁾; Alexander 1920, p. 254⁵⁾ Taihorin, VII.²⁾⁴⁾ (DEI: 1); Arisan, X.³⁾; Koshun, X.⁴⁾; Chip Chip III.⁴⁾; Funkiko, IV.⁵⁾
Sonstige Verbreitung: Java¹⁾
- Gymnastes shirakii* Alexander 1920, p. 254¹⁾
Funkiko, IV.¹⁾
- Teucholabis aberrans* Alexander 1923 a, p. 63¹⁾
Insel Kotosho, III.—IV.¹⁾
- Teucholabis fenestrata* Osten-Sacken 1887, Berl. Ent. Zeit. 31, p. 188¹⁾; Riedel 1918, p. 317²⁾
Taihorinsho, II.²⁾
Sonstige Verbreitung: Ceylon¹⁾
- Teucholabis inornata* Riedel 1918, p. 317, Fig. 2¹⁾
Taihorinsho, VIII.¹⁾; Tapani, III.¹⁾; DEI: 2 ohne genauen Fundort, det. Alexander
- Teucholabis nigerrima* Edwards 1916, p. 248¹⁾
Synonym (nach Edwards 1921, p. 100):
unicolor Riedel 1918, p. 317, Fig. 3²⁾
Horisha, V.¹⁾; Taihoku¹⁾; Toyenmongai²⁾; DEI: 4 ohne genauen Fundort, det. Alexander
- Trentepohlia albogeniculata* Brunetti, Fauna Brit. India, Nematoc., p. 569¹⁾; Riedel 1916, p. 113²⁾
ohne genaueren Fundort²⁾ (DEI: Taihoku XI.: 1, det. Riedel)
Sonstige Verbreitung: Britisch Indien¹⁾
- Trentepohlia (Mongoma) atayal* Alexander 1929 b, p. 544¹⁾
Inzan, near Giran, XI.¹⁾
- Trentepohlia esakii* Alexander 1923 b, p. 475¹⁾
Musha 1060 m, VIII.¹⁾
- Trentepohlia fuscobasalis* Alexander 1934 b, p. 51, Taf. 1, Fig. 20¹⁾
Tansui, X.¹⁾; Jitsugetsutan (Candidius-See), XI.¹⁾
- Trentepohlia (Mongoma) montina* Alexander 1930 c, p. 523¹⁾
Hassensan 4500—6000 ft, VIII.¹⁾
- Trentepohlia (Mongoma) pennipes* Osten-Sacken 1887, Berl. Ent. Zeit. 31, p. 204¹⁾; Riedel 1916, p. 113²⁾
Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V.²⁾
Sonstige Verbreitung: Borneo¹⁾
- Trentepohlia (Mongoma) platyleuca* Alexander 1936, p. 249, Taf. 1, Fig. 21¹⁾
Kuraru, VIII.¹⁾

- Trentepohlia proba* Alexander 1934 c, p. 153, Taf. 1, Fig. 18 ¹⁾
Urai 1500 ft, V. ¹⁾
- Trentepohlia pulchripennis* Alexander 1923 b, p. 474 ¹⁾
Musha 3500 ft (1050 m), VIII. ¹⁾; Sumaan 2500 ft (760 m), VIII. ¹⁾
- Trentepohlia (Mongoma) tarsalba* Alexander 1929 b, p. 544 ¹⁾
Giran, XI. ¹⁾
- Trentepohlia trentepohli* Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 551;
Riedel 1916, p. 113 ¹⁾
Taihoku-Distr., Jushifun, VI. ¹⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Sumatra
- Molophilus albocostalis* Alexander 1928, p. 487 ¹⁾
Mt. Rantaizan 7000 ft, VI. ¹⁾
- Molophilus aricola* Alexander 1930 a, p. 533 ¹⁾
Arisan 6500—8000 ft, VII. ¹⁾
- Molophilus arisanus* Alexander 1923 b, p. 470 ¹⁾; Alexander 1930 c,
p. 509 ²⁾
Arisan 2250 m, VIII. ¹⁾; Hassensan 6500—7500 ft, VIII. ²⁾
- Molophilus costalis* Edwards 1916, p. 251 ¹⁾; Alexander 1920, p. 257 ²⁾
Arisan, X. ¹⁾; Funkiko, IV. ²⁾
- Molophilus editus* Alexander 1928, p. 481 ¹⁾
Noko 8000 ft, VI. ¹⁾
- Molophilus ephippiger* Alexander 1934 b, p. 57, Taf. 1, Fig. 24, Taf. 3,
Fig. 41 ¹⁾
Rantaisan 7000 ft, V. ¹⁾
- Molophilus issikii* Alexander 1928, p. 480 ¹⁾
Noko 9800 ft, VI. ¹⁾
- Molophilus nigripes* Edwards 1921, p. 104 ¹⁾; Alexander 1928, p. 479 ²⁾
Noko, V. ¹⁾; Noko 9800 ft, VI. ²⁾
- Molophilus nigratarsis* Alexander 1930 b, p. 82 ¹⁾
Arisan 7300 ft, VII. ¹⁾
- Molophilus nigratus* Alexander 1930 b, p. 81 ¹⁾; Alexander 1930 c, p. 509 ²⁾
Arisan 6500—8000 ft, VII. ¹⁾; Hassensan 5600 ft, X. ²⁾
- Molophilus nokomis* Alexander 1928, p. 479 ¹⁾
Noko 7000—9000 ft, VI. ¹⁾
- Molophilus pallidibasis* Alexander 1928, p. 487 ¹⁾
West side of Mt. Daibu 3000—5000 ft, III. ¹⁾
- Ormosia anthracopoda* Alexander 1930 c, p. 531 ¹⁾
Hassensan 6500—7800 ft, X. ¹⁾
- Ormosia arisanensis* Alexander 1924, p. 65 ¹⁾
Arisan 7500 ft, V. ¹⁾
- Ormosia diplotergata* Alexander 1928, p. 482 ¹⁾
Higashinoko 7500 ft, VI. ¹⁾

- Ormosia diversipennis* Alexander 1934 c, p. 158, Taf. 1, Fig. 21¹⁾
Sesikan 6000 ft, VIII. 1)
- Ormosia (Rhypholophus) formosanus* Edwards 1921, p. 103¹⁾
Noko, V. 1)
- Ormosia shoreana* Alexander 1929 b, p. 545¹⁾
Shorei 7000—8000 ft, X. 1)
- Styringomyia ceylonica* Edwards 1911, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 62¹⁾;
Riedel 1912, p. 27 „*Pycnocrepis* n. sp.“²⁾; Riedel 1913, p. 273³⁾;
Riedel 1918, p. 316⁴⁾
Vielleicht handelt es sich bei den von Riedel als *ceylonica* bezeichneten Tieren nicht um diese, sondern um eine der von Alexander beschriebenen Arten.
Tainan, II., III. 2) 4) (DEI: 1); Taihorinsho³⁾
Sonstige Verbreitung: Ceylon¹⁾
- Styringomyia flavitarsis* Alexander 1920, p. 252¹⁾
Funkiko, IV. 1)
- Styringomyia formosana* Edwards 1914, p. 219, Fig. 9, 30, 31, 70, 71, 72¹⁾; Riedel 1918, p. 316²⁾
Synonym: *Pycnocrepis annulipes* (Enderlein) Riedel 1912, p. 26 (nach Riedel 1913 Syn. zu *crassicosta*)³⁾
Styringomyia crassicosta (Speiser) Riedel 1913, p. 272 (syn. zu *formosana* nach Edwards)⁴⁾
Tainan II., V. 1) 2) 3) 4) (DEI: 5; Typus fehlt im DEI); Koshun¹⁾
(Typus fehlt im DEI)
- Styringomyia separata* Alexander 1935 a, p. 368, Taf. 1, Fig. 24, Taf. 3, Fig. 49¹⁾
Rimozan, V. 1)
- Styringomyia sinensis* Alexander 1930 c, p. 533¹⁾
Hassensan 2500—3500 ft, X. 1)
Sonstige Verbreitung: China (Mt. Omei, Szechwan¹⁾)
- Styringomyia taiwanensis* Alexander 1930 c, p. 532¹⁾
Synonym (nach Alexander 1930):
Styringomyia flava (Brunetti) Alexander 1920, p. 253²⁾
Hassensan 2500—5500 ft, X. 1); Funkiko, IV. 1) 2) (DEI: 1 Paratypus)
- Taiwanina pandoxa* Alexander 1928, p. 485¹⁾
Mt. Rantaizan 6000 ft, VI. 1); Rengechi 1500—2000 ft, III. 1)
- Cryptolabis (Baeoura) consocia* Alexander 1934 c, p. 159, Taf. 1, Fig. 22, Taf. 3, Fig. 41¹⁾
Heiganzan to Pianan-Anbu, Taichû-shû, VII. 1)
- Cryptolabis (Baeoura) laevilobata* Alexander 1934 c, p. 160, Taf. 1, Fig. 23, Taf. 3, Fig. 43¹⁾
Rimozan, V. 1)

- Cryptolabis (Baeoura) trichopoda* Alexander 1930 c, p. 528 ¹⁾
 Keinensan, near Heito 5000 ft, III. ¹⁾
- Cryptolabis trichopoda hassensensis* Alexander 1934 c, p. 161, Taf. 3, Fig. 44 ¹⁾
 Hassensan, Kahodai to Reimei, Taichû-shû, VII. ¹⁾
- Xipholimnobia formosensis* Alexander 1923 b, p. 473 ¹⁾
 Kanshirei, 300 m, IX. ¹⁾
- Neolimnophila alticola* Alexander 1929 b, p. 540 ¹⁾; Alexander 1930 c, p. 508 ²⁾
 Shirassetsu 6000 ft, X. ¹⁾; Shorei 7000—8000 ft, X. ¹⁾; Hassensan 6000—8000 ft, X. ²⁾
- Lipsothrix pluto* Alexander 1929 b, p. 542 ¹⁾
 Shorei 7000—8000 ft, X. ¹⁾
- Lipsothrix taiwanica* Alexander 1928, p. 480 ¹⁾
 West side of Mt. Daibu 3000—5000 ft, III. ¹⁾
- Cladura decemnotata* Alexander 1924, p. 436 ¹⁾; Alexander 1929 b, p. 540
 Shorei 7000—8000 ft, X. ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Kiushiu
- Dasymolophilus nokoensis* Alexander 1928, p. 478 ¹⁾
 Noko 9000—9800 ft, VI. ¹⁾
- Ceratocheilus formosensis* Alexander 1928, p. 479 ¹⁾
 Mt. Rantaizan 6000 ft, VI. ¹⁾
- Toxorhina (Ceratocheilus) taiwanicola* Alexander 1923 b, p. 475 ¹⁾; Alexander 1930 c, p. 508 ²⁾
 Tattaka, 2250 m, VIII. ¹⁾; Hassensan 3500—7000 ft, VIII. ²⁾
- Ceratocheilus tinctipennis* Alexander 1930 b, p. 75 ¹⁾
 Arisan 6500—8000 ft, VII. ¹⁾
- Conosia irrorata* Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 574; Riedel 1916, p. 113 ¹⁾; Edwards 1916, p. 253 ²⁾; Riedel 1918, p. 319 ³⁾
 Taihoku, X. ¹⁾; Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. ¹⁾; Kotosho Insel, VII. ²⁾; Tainan II. ³⁾; Takao III. ³⁾
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Australien, China, Japan.

Superfamilie *Phrynoidea*

Familie *Phryneidae* (*Rhyphidae*)

- Olbiogaster zonatus* Edwards 1934, p. 185 ¹⁾
 Toyenmongai bei Tainan V. ¹⁾

Superfamilie *Fungivoroidea*

Familie *Zelmiridae* (*Ceroplastidae*)

- Zelmira annandalei formosana* Okada 1938, p. 36, Taf. 1 ¹⁾

Es wäre nachzuprüfen, ob die Form nicht mit der folgenden identisch ist.

Urai, IV. 1)

Zelmira flavioralis Speiser 1911, p. 237 1)

Takao VI. 1)

Familie *Lycoriidae* (*Sciaridae*)

Subfamilie *Lycoriinae*

Hybosciara formosana Shiraki 1913, p. 297 1)

Taihoku 1)

Plastosciara cornuta Lengersdorf 1927, p. 107, Fig. 3 1)

Maruyama, IV. 1) (DEI: 2 Typen); DEI: Kankau, IX. 1 „Typus“ det. Lengersdorf; Polisha, XII.: 1 „Typus“, det. Lengersdorf

Eurysciara rostrata Lengersdorf 1927, p. 106 1)

Macnyama, V.—VI. 1) (DEI: 1 Typus)

Lycoria armata Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 26; Lengersdorf 1927, p. 104; Macnyama, V., VI., XI. 1) (DEI: 8); Taihoku, X—XI. 1) (DEI: 11); Hokuto, XII. 1) (DEI: 1); Chipun, VII. 1); Polisha, XII. 1) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mittel-Europa

Lycoria Bruckii Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 38; Lengersdorf 1927, p. 104 1)

Tainan, II. 1) (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa

Lycoria brunnipes annulata Lengersdorf 1927, p. 104 1); Hokuto, XII. 1) (DEI: 1); Daitotai, VI. 1) (DEI: 2); Macnyama, IV. 1) (DEI: 2); Chosokei 1) (DEI: 4); Taihoku, XI. 1) (DEI: 3); Paroe nördl. Pawan-Distr. 1)

Verbreitung der Nominatform: Europa

Lycoria copiosa Lengersdorf 1927, p. 105, Fig. 2 1)

Tainan, V. 1) (DEI: 1)

Lycoria dissimilis Lengersdorf 1927, p. 104, Fig. 1 1)

Pilam, VII. 1) (DEI: 1 Typus)

Lycoria fera Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 136

Lengersdorf 1927, p. 104 1)

Hokuto, XII. 1) (DEI: 1); Paroe, VIII. 1) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa

Lycoria fungicola Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 137

DEI: Paroe, VIII.: 1 det. Lengersdorf; Hokuto, XII.: 1 det. Lengersdorf

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa

Lycoria insignis Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 49

Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾

Suisharyo, X.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa

Lycoria lugubris Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 62

Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾

Taihoku, X.¹⁾; Chosokei¹⁾ (DEI: 9); Tainan, II.¹⁾ (DEI: 1); Taihorin¹⁾ (DEI: 2); Suisharyo, X.¹⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V¹⁾ (DEI: 10); Hoozan, III.¹⁾ (DEI: 3); Maruyama, V.—VI.: DEI: 1, det Lengersdorf

Sonstige Verbreitung: Europa

Lycoria nemoralis Meigen 1818, Syst. Besch., 1, p. 287

Polisha, XII.; Maruyama, IV.; Paroe, X.: DEI: je 1 Exemplar, det. Lengersdorf

Sonstige Verbreitung: Europa

Lycoria pectoralis Staeger 1840, Naturhist. Tidsskr. 3, p. 285

Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾

Taihoku¹⁾ (DEI: 8); Daitotei, V.—VI.¹⁾ (DEI: 1); Macuyama, V.—VI.¹⁾; Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 1); Polisha, XII., DEI: 1, det Lengersdorf

Sonstige Verbreitung: Europa

Lycoria pullula Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 112

Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾

Macuyama, III.¹⁾; Tainan, II.¹⁾ (DEI: 1); Hokuto, XII.¹⁾; Pilam, VI.¹⁾ (DEI: 1); Kankau, V.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa

Lycoria triseriata Winnertz 1867, Beitr. Mon. Sciar., p. 157

Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾

Daitotei, VI.¹⁾ (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Europa

Lycoria vernalis Zetterstedt 1851, Dipt. Scand., 10, p. 3755

Synonym (nach Lengersdorf 1930, in Lindner, Flieg. pal. Reg. 7, p. 57):

Lycoria vellestris Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾

Taihoku¹⁾ (DEI: 2); Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 1); Daitotei, IV.—VI.¹⁾ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Europa

(Die von Lengersdorf 1927, p. 105 erwähnten Exemplare von *Lycoria thomae* stammen aus dem früheren Österreich!)

Subfamilie *Megalosyphinae*

Phorodonta flavipes Meigen 1804, Klass. Zweifl. Ins. 1, p. 98; Lengersdorf 1927, p. 104¹⁾; Taihoku¹⁾ (DEI: 2); Macuyama, IV.¹⁾ (DEI: 2); Paroe, X.¹⁾ (DEI: 1); Daitotei, VI.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Europa

Superfamilie *Itonidoidea*

Familie *Itonididae* (*Cecidomyiidae*)

Coelodiplosis magnipennis Kieffer 1913, p. 43¹⁾

Taihorin 1¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Eumerosema dispar Kieffer 1913, p. 42¹⁾

Tainan V. 1¹⁾ (DEI: 4 Typen)

Lestremia spec. DEI: Daitotei V.—VI. 1 Exemplar det. Lengersdorf

Campylomyza spec. DEI: Suisharyo X. 1 Exemplar det. Lengersdorf

Zu etwa 5 Arten gehörige unbestimmte Cecidomyiiden befinden sich im DEI

Superfamilie *Bibionoidea*

Familie *Pachyneuridae*

Pachyneura fasciata Zetterstedt 1838, Ins. Lappon. p. 580; Okada 1838, p. 237¹⁾; Okada 1938, p. 40²⁾

„Formosa nach Edwards 1938“ 1²⁾

Sonstige Verbreitung: N-Europa

Familie *Bibionidae*

Bibio formosanus Okada 1938, p. 209¹⁾

Arisan IV., VII. 1¹⁾

Bibio spec. 1. Im Deutschen Entomologischen Institut eine Art, die nach der Beschreibung zu urteilen, mit *flavissimus* Brunetti identisch ist oder als subspecies zu dieser gehört.

DEI: Taihorin 1 ♂ ♀ XII.; Chip-Chip 1 ♂, II.; Tappani 1 ♂, IV.; Formosa 1 ?

Bibio spec. 2. Im Deutschen Entomologischen Institut. Ähnlich der spec. 1 aber mit schwarzer (schwarzbrauner) Behaarung und anders gebautem Kopulationsapparat.

Suisharyo XII. 1 ♂ DEI

Dilophus spec. DEI: Kosempo 1 ♀, IX.

Penthetria takeuchii Okada 1938, p. 205¹⁾

Arisan, V. 1¹⁾

Penthetria spec. Im Deutschen Entomologischen Institut 1 ♂ (ohne näheren Fundort) einer nicht mit *takeuchii* identischen Art.

Plecia longiforceps Duda 1934, Ark. Zool. 26 B 1, p. 3 Fig. 1, 2¹⁾;

DEI: Macuyama V.—VI. 12 ♀; Kankau (Koshun) VII. 4 ♂, 3 ♀;

Toa Tsui Kutsu V.: 16 ♂, 6 ♀; Chosokei 1 ♂, 1 ♀; ohne näheren Fundort 2 ♀, 2 ♂; fraglich zu dieser Art 1 ♀ aus Taihoku-Distrikt und 1 ♀ aus Okaseki VI.

Sonstige Verbreitung: Provinz Kiangsu, China 1¹⁾

Plecia spec. 1 und spec. 2. Beide Arten zur tristis-Gruppe gehörend.
1 ♂ aus Formosa (ohne näheren Fundort) und 1 ♂, 1 ♀ aus Suis-
haryo X. im Deutschen Entomologischen Institut.

Familie *Scatopsidae*

Aldrovandiella formosana Duda 1928, p. 270, Fig. 3 1)

Toa Tsui Kutsu V. 1) (DEI: 1 Typus)

Scatopse fuscipes Meigen 1830, Syst. Besch. Zweifl. Ins. 2, p. 314

DEI: Taihoku X.: 3 det. Duda; Daitotei IV.: 1 det. Duda

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit.

Superfamilie *Liriopeoidea*

Familie *Liriopeidae* (*Ptychopteridae*)

Liriope distincta Brunetti 1912, p. 281 1); Riedel 1918, p. 315 2)

Toyenmongai 2)

Sonstige Verbreitung: Brit. Indien

Liriope formosensis Alexander 1924, p. 49 1)

Funkiko, IV. 1)

Liriope spec. Riedel 1918, p. 315 1)

Kosempo, VI. 1)

Alexander (1921, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 8 p. 100) führt von For-
mosa außer *distincta* Brunetti nur an: *Ptychoptera* cf. *japonica*
Alexander. Es ist unsicher, ob sich diese Bemerkung auf die *Liriope*
spec. Riedels bezieht oder auf die von Alexander später als *formo-*
sensis bezeichnete Art, oder ob beide identisch sind.

Familie *Psychodidae*

Psychoda alternata Say 1824, Exped. Peters River, Appendix, p. 358

DEI: Taihoku: 16 det. Tonnoir; Daitotei V.—VI.: 3 det. Tonnoir.

Sonstige Verbreitung: Holarktisch

Brunettia albonotata Brunetti 1908, Rec. Ind. Mus. 2, p. 373

Synonym (nach Edwards 1928, Entomologist 61, p. 32):

indica Eaton.

DEI: Taihoku: 1, det. Tonnoir („*indica*“)

Sonstige Verbreitung: Indien

Superfamilie *Culicoidea*

Familie *Culicidae*

Subfamilie *Anophelinae*

Anopheles (*Anopheles*) *hyrcanus* Pallas 1771, Reise Russ. Reichs 1, p.
475; Edwards 1921, p. 629 1)

Toyen-Distr., Sanshikyaku¹⁾ (DEI: 4); Macuyama¹⁾ (DEI: 3);
Anping¹⁾ (DEI: 3); Takao¹⁾; DEI: Taihoku: 37 Exemplare.

Sonstige Verbreitung: Mediterran. u. oriental. Reg., China, Japan

Anopheles lindesayi japonicus Yamada 1918, p. 659; Edwards 1926. p. 272

Näherer Fundort?

Sonstige Verbreitung: Japan

Anopheles (Myzomyia) jeyporiensis James 1902, Sci. Mem. Med. San.

Dept. India 2, p. 32¹⁾

Synonym (nach Edwards):

candidienses Koidzumi 1924, p. 98; Koidzumi 1930, p. 233

Genauer Fundort unbekannt (Arbeit liegt nicht vor)

Sonstige Verbreitung: Indien

Anopheles (Myzomyia) ludlowi var. *hatorii* Koidzumi 1920, p. 24

Synonym (nach Edwards):

formosensis Koidzumi 1917, p. 354

Genauer Fundort unbekannt (Arbeit liegt nicht vor)

Verbreitung der Nominatform: Oriental. Region

Anopheles (Myzomyia) minimus Theobald 1901, Mon. Cul. 1, p. 186

Synonym (nach Edwards):

formosaensis I Tsuzuky 1902b, p. 288

Genauer Fundort unbekannt (Arbeit liegt nicht vor)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Anopheles (Myzomyia) splendidus Koidzumi 1920, p. 23. Näherer Fundort?

Anopheles (Myzomyia) subpictus Grassi 1897, Atti R. Acc. Lincei (5)

8 p. 101; Edwards 1921. p. 629¹⁾

Takao¹⁾

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Neuguinea

Anopheles (Myzomyia) tessellatus Theobald 1901, Mon. Cul. 1, p. 175

Synonym (nach Edwards):

formosae Hatori 1901, p. 275¹⁾

taicanensis Koidzumi 1917, p. 135²⁾

Genauer Fundort unbekannt (Arbeit liegt nicht vor)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Anopheles (Myzomyia) vagus Dönitz 1902, Zeitschr. Hyg. 41, p. 80

Synonym (nach Edwards):

formosaensis II Tsuzuky 1902a. p. 98; 1902b, p. 289

Genauer Fundort unbekannt (Arbeit liegt nicht vor)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald 1921, Mon. Cul. 2, p. 180;

Edwards 1921, p. 629¹⁾

Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 6); Hokuto¹⁾ (DEI: 1); Takao¹⁾

Sonstige Verbreitung: Afrika, Oriental. Region, Australien

Subfamilie *Megarrhininae*

- Megarrhinus (Toxorrhynchites) aurifluus* Edwards 1921, p. 631¹⁾
 Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau¹⁾ (DEI: 2 Typen);
 Toyenmongai¹⁾ (DEI: 1 Typus); ohne Daten¹⁾ (DEI: 3 Typen)
- Megarrhinus (Toxorrhynchites) manicatus* Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Subfamilie *Culicinae*

- Culex (Culex) bitaeniorrhynchus* Giles 1901, Journ. Bombay Nat. Hist. 13, p. 607; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Macuyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 3); Daitotei V.—VI.¹⁾ (DEI: 2);
 Chosokei¹⁾ (DEI: 1); Sanshikyaku, Toyen-Distr.¹⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, N.-Australien, Afrika
- Culex fatigans* Wiedemann 1928, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 10; Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Daitotei, V.—VI. (DEI: 2); Toyen-Distr., Sanshikyaku (DEI: 4);
 Taihoku, XI. (DEI: 20); Anping, X. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 16)
 Sonstige Verbreitung: „Tropen und Subtropen“
- Culex (Lutzia) fuscanus* Wiedemann 1821, Dipt. exot. 1, p. 9
 Synonym (nach Edwards):
Lutzia concolor Theobald 1901, Mon. Cul. 2, p. 107; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Macuyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 3)
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region
- Culex (Culex) fuscocephalus* Theobald 1907, Mon. Cul. 4, p. 420; Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Hokuto XII.¹⁾ (DEI: 1); Sanshikyaku¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region
- Culex (Culex) mimeticus* Noé 1899, Bull. Soc. Ent. Ital. 31, p. 240; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Macuyama¹⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Honkong, Indien
- Culex (Lophoceratomyia) rubithoracis* 1908, Leicester, Cul. Malaya, p. 119; Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 2)
 Sonstige Verbreitung: Malaya
- Culex sitiens* Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 543; Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Takao¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Küsten von Somaliland bis Fiji-Inseln
- Culex tritaeniorrhynchus* Giles 1901, Journ. Bombay Nat. Hist. 13, p. 204; Edwards 1921, p. 630¹⁾

- Macuyama V.—VI.¹⁾ (DEI: 3); Daitotei V.—VI.¹⁾ (DEI: 3); Toyen-Distr., Sanshikyaku¹⁾ (DEI: 8); Takao¹⁾, Taihoku XI. (DEI: 2)
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, W.-Afrika, Ägypten, Palästina
Culex vishnui Theobald 1901, Mon. Cul. 1, p. 335; Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 2); Daitotei¹⁾ (DEI: 2); Toyen-Distr., Sanshikyaku (DEI: 1).
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region
Culex whitmorei Giles 1904, Journ. Trop. Med. 7, p. 367; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Toyen-Distr., Sanshikyaku¹⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region
Tripteroides (Tripteroides) spec. (? bambusa Yamada) Edwards 1921, p. 630¹⁾
 Polsha¹⁾
Aedes (Skusea) amesi Ludlow 1903, Journ. N.-York Ent. Soc. 11, p. 139; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Takao¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Philippinen
Aedes (Ecculex) vexans Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 241; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Takao¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Holarktische u. oriental. Region, Fiji, Samoa, Neu-Caledonien
Aedes (Finlaya) hatorii Yamada 1921, p. 70¹⁾
 Taihoku, II.¹⁾
Aedes (Finlaya) formosensis Yamada 1921, p. 67¹⁾
 Kakubanzan, V.¹⁾
Aedes (Ochlerotatus) vigilax Skuse 1889, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) 3, p. 1731; Edwards 1922, Bull. Ent. Res. 13, p. 99¹⁾
 Anping¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Notogaea, Philippinen, Siam
Aedes (Stegomyia) aegypti Linné 1762, Hasselquists Reise Palästina, p. 470
 Synonym:
Aedes argenteus Poiret 1787, Journ. Phys. 30, p. 245; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Anping, X¹⁾ (DEI: 1); Takao¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Tropen u. Subtropen
Aedes (Stegomyia) albopictus Skuse 1895, Ind. Mus. Notes 3, p. 20; Edwards 1921, p. 629¹⁾
 Macuyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 8); Hokuto¹⁾ (DEI: 9); Taihoku¹⁾
 Toa Tsuikutsu, V (DEI: 1); Toyen-Distr., Sanshikyaku (DEI: 2); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Madagaskar, Notogaea

Aedes (Stegomyia) horishensis Yamada 1921, Annot. Zool. Jap. 10, p. 58¹⁾
Horisha, IV¹⁾

Armigeres (Armigeres) obturbans Walker 1860, Proc. Linn. Soc. London
4, p. 91; Edwards 1921, p. 629¹⁾

Tainan¹⁾; Macnyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 1); Chosokei¹⁾ (DEI: 4);
Taihoku-Distr., Jushifun, V.—VI. (DEI: 5); Taihoku-Distr., Gai-So-
Kai, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Notogaea

Armigeres (Leicesteria) annulitarsis Leicester 1908, Cul. Malaya, p. 99;
Edwards 1921, p. 629¹⁾

Macnyama, IV.¹⁾ (DEI: 1); Kankau¹⁾

Sonstige Verbreitung: Malaya

Superfamilie *Tendipedoidea*

Familie *Tendipedidae*

Subfamilie *Orthoclaadiinae*

„*Cricotopus annulatus* S“ [siehe darüber im Nachtrag]

Daitotei, V.—VI. (det. Goetghebuer, DEI: 1)

Cricotopus carbonarius Kieffer 1922, p. 38¹⁾; Tokunaga 1936, p. 18
Daitotei¹⁾ (DEI: 3 Typen); Taihoku¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Cricotopus carnosus Kieffer 1912, p. 32¹⁾; Kieffer 1916, p. 117²⁾;
Kieffer 1916, p. 103³⁾; Kieffer 1921, p. 577⁴⁾; Tokunaga 1936,
p. 19⁵⁾
Tainan¹⁾ 2) 3) (DEI: 114 Typen); Daitotei⁴⁾ (var. !; DEI: 1 [leere
Nadel])

Cricotopus polyannulatus Tokunaga 1936, p. 23¹⁾

Taihoku, I.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Japan (Honshu, Shikoku¹⁾)

Cricotopus silvestris Fabricius 1794, Ent. Syst., p. 252; Kieffer 1922,
p. 39¹⁾; Tokunaga 1936, p. 12²⁾

Daitotei¹⁾ (DEI: 12, teilweise als „var.“ bezeichnet); Taihoku (DEI:
1, det. Kieffer)

Sonstige Verbreitung: „Weit verbreitet in der N.-Hemisphäre“¹⁾

Trichocladus formosanus Kieffer, 1916, p. 102¹⁾

Taihoku¹⁾

Trichocladus nitens Kieffer 1921a, p. 576¹⁾

Daitotei, V.—VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku, 7. XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Psectrocladius formosae Kieffer 1922, p. 40¹⁾

Hokuto XII. (DEI: 1 Typus)

Camptocladius despectus Kieffer 1922, p. 39¹⁾

Taihoku¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Camptocladius formosanus Kieffer 1922, p. 39¹⁾

Taihoku¹⁾; Chosokei¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Subfamilie *Pelopiinae* (*Tanypodinae*)

Clinotanypus formosae Kieffer 1916, p. 99¹⁾; Kieffer 1921a, p. 576²⁾; Tokunaga 1937, p. 22³⁾

Takao¹⁾; Anping²⁾ (DEI: 1)

Clinotanypus immaculatus Kieffer 1916, p. 99¹⁾; Tokunaga 1937, p. 24 Tainan¹⁾

Clinotanypus lampronotus Kieffer 1916, p. 100¹⁾; Tokunaga 1937, p. 25 Takao, 300 m¹⁾

Procladius insularis Kieffer 1921a, p. 574¹⁾ (*Trichotanypus*); Tokunaga 1937, p. 30

Daitotei¹⁾ (DEI: 2 Typen)

var. *transiens* Kieffer 1921a, p. 575¹⁾ (*Trichotanypus*)

Daitotei¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Procladius iris Kieffer 1916, p. 101¹⁾ (*Trichotanypus*); Tokunaga 1937, p. 30

Yentempo¹⁾

Procladius lacteiclava Kieffer 1922, p. 41¹⁾ (*Trichotanypus*); Tokunaga 1937, p. 31

Daitotei V.—VI.¹⁾ (DEI: 3 Typen); Maruyama¹⁾

Pelopia punctipennis Meigen 1818, Syst. Besch. zweifl. Ins. 1, p. 61; Kieffer 1921a, p. 574¹⁾ (*Protenthes*); Kieffer 1922, p. 41²⁾; Tokunaga 1937, p. 33³⁾

Synonym (nach Edwards 1931, Dipt. Patag. S. Chile 2, p. 239):

Procladius formosanus Kieffer 1912, p. 31⁴⁾; Kieffer 1916, p. 116⁵⁾; Kieffer 1916, p. 101⁶⁾

Taihoku^{1) 2) 3)} (DEI: 4); Daitotei^{1) 2)} (DEI: 18); Tainan^{4) 5) 6)} (DEI: 5 Typen + 3)

Sonstige Verbreitung: Honshu, Japan³⁾, Europa

Pentaneura fusciclava Kieffer 1922, p. 40¹⁾ (*Pelopia*); Tokunaga 1937, p. 48

Daitotei¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Pentaneura gracillima Kieffer 1916, p. 102¹⁾ (*Pelopia*); Tokunaga 1937, p. 55

Takao¹⁾

Pentaneura monilis Linné 1758, Syst. Nat. 10, p. 587; Kieffer 1921a, p. 574¹⁾ (*Tanypus*); Tokunaga 1937, p. 44²⁾

Anping X¹⁾ (DEI: 2); Daitotei¹⁾ (DEI: 1); Taihoku (DEI: 1, det. Kieffer)

Sonstige Verbreitung: In der nördlichen Hemisphäre weit verbreitet²⁾
var. *pulchripes* Kieffer 1922, p. 41¹⁾

Daitotei¹⁾ (DEI: 4 Typen); Taihoku¹⁾ (DEI: 1)

Subfamilie *Tendipedinae*

Sectio *Tanytarsini*

Tanytarsus formosae Kieffer 1922, p. 38¹⁾

Daitotei V.—VI.¹⁾ (DEI: 5 Typen)

Lundstroemia formosana Kieffer 1912, p. 42 (*Tanytarsus*)¹⁾; Kieffer 1916, p. 117²⁾; Kieffer 1916, p. 121³⁾; Kieffer 1921a⁴⁾, p. 591 (*Ditanytarsus*); Kieffer 1922, p. 38⁵⁾

Tainan, X., II.^{1) 2) 3)} (DEI: 142 „Typen“); Daitotei⁵⁾ (DEI: 6);

Anping, X.⁴⁾ (DEI: 13); Taihoku 7. XI. (DEI: 1, det. Kieffer)

Rheotanytarsus formosae Kieffer 1921a, p. 592¹⁾

Anping X.¹⁾ (DEI: 9 Typen)

Sectio *Tendipedini*

Polypedilum albicollum Kieffer 1922, p. 37¹⁾

Taihoku¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Polypedilum atrinerve Kieffer 1921a, p. 578¹⁾

Taihoku 7. XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Polypedilum bellipes Kieffer 1922, p. 34¹⁾

Daitotei V.—VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Polypedilum ciliatum Kieffer 1922, p. 36¹⁾

Daitotei V.—VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Polypedilum consobrinum Kieffer 1916, p. 120¹⁾; Kieffer 1921a, p. 580²⁾

Tainan¹⁾; Anping X.²⁾ (DEI: 1); Taihoku 7. XI.²⁾ (DEI: 1)

Polypedilum flaviscapus Kieffer 1922, p. 36¹⁾

Maruyama IV.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Polypedilum iricolor Kieffer 1916, p. 119¹⁾

Takao¹⁾

Polypedilum leucopterum Kieffer 1922, p. 37¹⁾

Hokuto XII¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Polypedilum macrotrichum Kieffer 1921a, p. 578¹⁾

Taihoku 7. XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Polypedilum monostictum Kieffer 1916, p. 120¹⁾

Kosempo¹⁾; Tainan¹⁾

Polypedilum nanulus Kieffer 1916, p. 120¹⁾

Anping¹⁾

- Polypedilum octosema* Kieffer 1922, p. 35 ¹⁾
 Daitotei V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Polypedilum pelostolum* Kieffer 1912, p. 41 ¹⁾; Kieffer 1916, p. 119 ²⁾;
 Kieffer 1921, p. 580 ³⁾
 Tainan X. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 92 Typen); Daitotei V.—VI. ³⁾ (DEI: 3);
 Anping X. ³⁾
- Polypedilum sauteri* Kieffer 1921 a, p. 579 ¹⁾
 Taihoku 7. XI. ¹⁾; Daitotei V.—VI. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Polypedilum tetrasema* Kieffer 1922, p. 35 ¹⁾
 Daitotei V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Polypedilum unifasciatum* Kieffer 1922, p. 34 ¹⁾
 Daitotei, V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Cladopelma? apicale* Kieffer 1922, p. 30 ¹⁾
 Maruyama ¹⁾ (DEI: 3 Typen)
- Endochironomus pekanus* Kieffer 1916, p. 105 ¹⁾; Kieffer 1922, p. 29 ²⁾
 Tainan ¹⁾; Chosokei ²⁾
- Glyptotendipes formosae* Kieffer 1922, p. 29 ¹⁾
 Maruyama ¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- *) *Carteria longilobus* Kieffer 1916, p. 107 ¹⁾; Kieffer 1916, p. 116 ²⁾
 Takao ¹⁾; Anping ²⁾ (DEI: 5)
 var. *fulviventris* Kieffer 1921 a, p. 591 ¹⁾
 Anping ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Pentapedilum pygmaeum* Kieffer 1921 a, p. 592 ¹⁾
 Anping, X. ¹⁾ (DEI: 3 Typen)
- Prochironomus atrinervis* Kieffer 1922, p. 33 ¹⁾
 Daitotei, V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Prochironomus formosanus* Kieffer 1922, p. 32 ¹⁾
 Daitotei ¹⁾ (DEI: 13 Typen); Taihoku ¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Paratendipes astictus* Kieffer 1916, p. 118 ¹⁾
 Tainan ¹⁾
- Paratendipes concoloripes* Kieffer 1916, p. 117 ¹⁾
 Takao ¹⁾
- Paratendipes nigrofasciatus* Kieffer 1916, p. 117 ¹⁾
 Takao ¹⁾; Tainan ¹⁾
- Paratendipes tristicus* Kieffer 1922, p. 33 ¹⁾
 Hokuto ¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Microtendipes dimidiatus* Kieffer 1921 a, p. 581 ¹⁾
 Taihoku 7. XI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Dicrotendipes formosanus* Kieffer 1916, p. 115 ¹⁾
 Tainan ¹⁾

*) Der Name *Carteria* ist präokkupiert.

- Cryptochironomus chlorophorus* Kieffer 1912, p. 38¹⁾; Kieffer 1916, p. 114²⁾; Kieffer 1922, p. 32³⁾; Kieffer 1921a, p. 590⁴⁾
 Tainan^{1) 2)} (DEI: 2 Typen); Chosokei³⁾ (var.!, DEI: 1); Anping X. 4)
 („*Cryptochironomus lacteipennis* Kieffer“
 Im DEI 1 von Kieffer so bezeichnetes Exemplar aus Taihoku, 7. XI.,
 vielleicht = *leucopterus*)
- Cryptochironomus leucopterus* Kieffer 1922, p. 31¹⁾
 Taihoku, 7. XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Cryptochironomus nudiforceps* Kieffer 1922, p. 30¹⁾
 Daitotei, V.—VI.¹⁾: (DEI: 2 Typen)
- Cryptochironomus olivaceus* Kieffer 1921a, p. 584¹⁾
 Taihoku, 7. XI.¹⁾
- Cryptochironomus pelochloris* Kieffer 1912, p. 39¹⁾; Kieffer 1916, p. 113²⁾;
 Kieffer 1921a, p. 584³⁾
 Tainan^{1) 2)} (DEI: 3 Typen); Taihoku, 7. XI. (DEI: 1)
- Cryptochironomus ? petiolatus* Kieffer 1921a, p. 582¹⁾
 Taihoku¹⁾
- Cryptochironomus sauteri* Kieffer 1921a, p. 583¹⁾
 Anping¹⁾ (DEI: 27 Typen)
- Cryptochironomus subroseus* Kieffer 1921a, p. 583¹⁾
 Taihoku¹⁾
- Cryptochironomus viridiclava* Kieffer 1922, p. 31¹⁾
 Daitotei¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Tendipes astenus* Kieffer 1916, p. 109¹⁾
 Tainan¹⁾
- Tendipes aurantiacus* Kieffer 1921a, p. 589¹⁾
 Taihoku, 7. XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Tendipes bihamatus* Kieffer 1922, p. 27¹⁾
 Maruyama¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Tendipes brevilobus* Kieffer 1916¹⁾
 Tainan¹⁾
- Tendipes chlorostolus* Kieffer 1912, p. 38¹⁾; Kieffer 1916, p. 117²⁾;
 Kieffer 1916, p. 114³⁾
 Tainan^{1) 2) 3)} (DEI: 24 Typen + 4); Takao³⁾
- Tendipes circumdatus* Kieffer 1916a, p. 110¹⁾; Kieffer 1916, p. 116²⁾;
 Kieffer 1921a, p. 590³⁾; Kieffer 1922, p. 28⁴⁾
 Tainan^{1) 2)} (DEI: 2); Yentempo¹⁾; Takao¹⁾; Kankau²⁾; (DEI: 2);
 Koshun²⁾; Daitotei, VI.^{4) 3)} (DEI: 5); Maruyama⁴⁾ (DEI: 1);
 Taihoku, 7. VI.³⁾ (DEI: 20)
 var. *anomalus* Kieffer 1921a, p. 590¹⁾
 Taihoku¹⁾ (DEI: 4); Daitotei¹⁾ (DEI: 5)

- Tendipes crassiforceps* Kieffer 1916, p. 111 1)
Tainan 1)
- Tendipes crucifer* Kieffer 1922, p. 28 1)
Daitotei 1) (DEI: 15 Typen); Maruyama 1); (DEI: 3 Typen); Anping 1); Tainan (siehe *prasinellus*)
- Tendipes dystenus* Kieffer 1916, p. 112 1)
Takao 1)
- Tendipes formosae* Kieffer 1912, p. 35 1)
Tainan, X. 1) (DEI: 3 Typen)
- Tendipes formosicola* Kieffer 1912, p. 37 1)
Tainan, X. 1) (DEI: 3 Typen)
- Tendipes frontalis* („var. von *formosanus*“) Kieffer 1916, p. 116 1)
Tainan 1)
- Tendipes glauciventris* Kieffer 1912, p. 40 1)
Tainan, X. 1) (DEI: 5 Typen)
- Tendipes gracilipes* Kieffer 1916, p. 116 1)
Anping 1) (DEI: 1 Typus); Kankau (im DEI 3 als „Typen“ Kieffers bezeichnete Exemplare)
- Tendipes grandilobus* Kieffer 1916, p. 113 1)
Tainan 1)
- Tendipes inermifrons* Kieffer 1916, p. 108 1); Kieffer 1921 a, p. 590 2);
Tainan 1); Anping, X. 1) (DEI: 1)
- Tendipes lamprothorax* Kieffer [Urbeschreibung z. Zt. nicht auffindbar, s. Nachtrag]; Kieffer 1922, p. 29 2)
Taihoku 2) (DEI: 2)
Sonstige Verbreitung: Indien 2)
- Tendipes prasinellus* Kieffer 1912, p. 37 1); Kieffer 1916, p. 113 2);
Kieffer 1922, p. 28 2)
(Die von Kieffer 1916, p. 117, als „*prasinellus* var.“ bezeichneten Tiere aus Tainan sind *crucifer* Kieffer)
Tainan, X. 1) 2) (DEI: 2 Typen); Daitotei 3) (DEI: 3); Maruyama 3)
(DEI: 9)
- Tendipes sauterianus* Kieffer 1921 a, p. 589 1)
Taihoku, 7. XI. 1) (DEI: 1 Typus)
- Tendipes sordidus* Kieffer 1912, p. 36 1); Kieffer 1916, p. 117 2);
Kieffer 1916, p. 110 3)
Tainan, X 1) 2) 3) (DEI: 2 Typen)
- Tendipes striatipennis* Kieffer 1910, Mem. Ind. Mus. 2, p. 236; Kieffer 1922, p. 29 2)
Daitotei 2) (DEI: 3)
Sonstige Verbreitung: Ostindien 1)

Tendipes tainanus Kieffer 1912, p. 36¹⁾; Kieffer 1916, p. 117²⁾; Kieffer 1916, p. 109³⁾; Kieffer 1922, p. 29⁴⁾

Tainan^{1) 2) 3)} (DEI: 22 Typen + 14); Chosokei⁴⁾ (DEI: 1); Maruyama⁴⁾ (var. !; DEI: 1)

Tendipes lobaticeps var. *validus* Kieffer 1912, p. 34¹⁾; Kieffer 1916, p. 106²⁾

Tainan^{1) 2)} (DEI: 10 Typen)

Familie *Heleidae* (*Ceratopogonidae*)

Culicoides albifascia Tokunaga 1937, p. 319¹⁾

Mt. Arisan, 2270 m¹⁾

Culicoides duodenarius Kieffer 1921b, p. 157¹⁾; Tokunaga 1937, p. 314, Fig. 25 u. Taf. 27, Fig. 15²⁾

Daitotei¹⁾ (DEI: 1 Typus); Shijukei, 29. XII. 2)

Culicoides formosae Kieffer 1912, p. 29¹⁾; Tokunaga 1937, p. 275²⁾

Tainan, X. 1) (DEI: 1 Typus)

Culicoides indecora Kieffer 1912, p. 29¹⁾; Tokunaga 1937, p. 275

Tainan X. 1) (DEI: 1 Typus)

Culicoides kagiensis Tokunaga 1937, p. 327, Fig. 31 u. Taf. 29, Fig. 21¹⁾

Kagi, 28. XII. 1)

Culicoides maculatus Shiraki, 1913, p. 294¹⁾; Tokunaga, 1937, p. 286,

Fig. 15 u. Taf. 29, Fig. 24²⁾

Synonym (nach Tokunaga, p. 235)

tainana Kieffer 1916, p. 114³⁾

„Formosa“¹⁾, Arisan (common in the mountainous region, V.—IX. 2);

Anping, VI. 3) (DEI: 1 Typus)

Culicoides nubeculosus Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 263; Tokunaga

1937, p. 280, Fig. 13 u. Taf. 24, Fig. 3¹⁾

Synonym (nach Tokunaga, p. 283):

homotoma Kieffer 1921b, p. 158²⁾

Kagi, 28. XII. 1); Daitotei²⁾ (DEI: 2 Typen); Taihoku (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: weit verbreitet in Europa u. Asien¹⁾; Japan¹⁾

Culicoides oxystoma Kieffer 1910, Mem. Ind. Mus. 2, p. 193; Edwards

1922, p. 164; Tokunaga 1937, p. 295, Fig. 17 u. Taf. 25, Fig. 6¹⁾

Kagi¹⁾; Shijukei, XII. 1)

Sonstige Verbreitung: Kyoto¹⁾; wahrscheinlich weit verbreitet in

Japan, Formosa, Malaya¹⁾

Culicoides peregrinus Kieffer 1910, Mem. Ind. Mus. 2, p. 191; Tokunaga

1937, p. 305, Fig. 21 u. Taf. 26, Fig. 11¹⁾

Shijukei, 29. XII. 1)

Sonstige Verbreitung: „often recorded from various parts of the tropical regions“

Culicoides sugimotonis Shiraki 1913, p. 286 ¹⁾; Tokunaga 1937, p. 290, Fig. 16 u. Taf. 25, Fig. 5 ²⁾

Synonym (nach Tokunaga, p. 275):

alboguttatus Kieffer 1921 a, p. 563 ³⁾

Taihoku ¹⁾ ³⁾ (DEI: 1 Typus von *alboguttatus*); Kagi, 28. XII. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Japan ²⁾; Kyushu ²⁾

Culicoides verbosus Tokunaga 1937, p. 303, Fig. 20 u. Taf. 26, Fig. 9 ¹⁾
Shijukei, 29. XII. ¹⁾

Forcipomyia (Prohelea) arcigera Kieffer 1921 b, p. 150 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Hokuto ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Forcipomyia (Prohelea) brachytomus Kieffer 1921 b, p. 149 ¹⁾

Daitotei ¹⁾; Paroe, X ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Forcipomyia (Prohelea) chrysothrix Kieffer 1921 a, p. 558 ¹⁾

Taihoku, 7. XI. ¹⁾ (DEI: 4 Typen)

Sonstige Verbreitung: Philippinen ¹⁾

Forcipomyia despecta Kieffer 1921 b, p. 152 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Forcipomyia formosana Kieffer 1916, p. 83 ¹⁾

Takao ¹⁾

Forcipomyia (Prohelea) fuscimanus Kieffer 1921 a, p. 559 ¹⁾

Hokuto ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Forcipomyia lagonigera Kieffer 1921 b, p. 151 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 4 Typen); Maruyama, Taihoku-Distr., 500 F., XII. (DEI: 1 „Typus“)

Forcipomyia miricornis Kieffer 1916, p. 81 ¹⁾

Tainan ¹⁾; Chip Chip ¹⁾

Forcipomyia sauteri Kieffer 1912, p. 27 ¹⁾

Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Lasiohelea taiwanus Shiraki 1913, p. 291 ¹⁾ (*Ceratopogon*); Tokunaga 1937, p. 265, Fig. A—E.

Taichiu ¹⁾

Atrichopogon argus Kieffer 1916, p. 86 ¹⁾; Kieffer 1916, p. 115 ²⁾

Chip Chip ¹⁾; Tainan ¹⁾; Paroe, nördl. Paiwan-Distr. ²⁾ (DEI: 1)

Atrichopogon atriceps Kieffer (i. l. ?)

Tainan, X. (DEI: 1 „Typus“)

Atrichopogon citrinipes Kieffer 1921 b, p. 154 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Maruyama ¹⁾; Daitotei ¹⁾ DEI: 1 Typus)

Atrichopogon flaviceps Kieffer 1912, p. 28 ¹⁾; Kieffer 1916, p. 115 ²⁾; Kieffer 1916, p. 85 ³⁾

Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Hoozan (DEI: 2); Chip Chip ³⁾

var. *mendax* Kieffer 1921 b, p. 156 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Atrichopogon formosanus Kieffer 1918, p. 89 ¹⁾

Pilam ¹⁾

Atrichopogon haemorrhoidalis Kieffer 1921a, p. 560 ¹⁾

Hokuto ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Atrichopogon insularis Kieffer 1921a, p. 561 ¹⁾

Hokuto ¹⁾ (DEI: 4 Typen); Taihoku ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Daitotei ¹⁾

Atrichopogon minimus Kieffer 1916, p. 87 ¹⁾; Kieffer 1921b, p. 156 ²⁾

Takao ¹⁾; Tainan ¹⁾; Taihoku ²⁾ (var. ! DEI: 1)

Atrichopogon myrmedon Kieffer 1921a, p. 155 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 9 Typen)

Atrichopogon pruinosus Kieffer 1921b, p. 560 ¹⁾

Taihoku, 7. XI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Atrichopogon ruber Kieffer 1916, p. 86 ¹⁾; Kieffer 1916, p. 115 ²⁾;

Kieffer 1921a, p. 563; Kieffer 1921b, p. 155 ³⁾

Kosempo ¹⁾; Chip Chip ¹⁾; Tainan ¹⁾; Chipun ²⁾ (DEI: 1); Taihoku ²⁾ ³⁾

(DEI: 2); Hokuto ²⁾ ³⁾ (DEI: 2); Paroe ³⁾ (DEI: 3)

Atrichopogon rufescens Kieffer 1921a, p. 563 ¹⁾

Taihoku ¹⁾

Stilobezzia decora Kieffer 1916, p. 89 ¹⁾; Kieffer 1916, p. 115 ²⁾;

Kieffer 1921a, p. 566; Kieffer 1921b, p. 159 ³⁾

Takao ¹⁾ ²⁾; Tainan ²⁾ (DEI: 1); Maruyama ³⁾; Anping, X. (DEI: 6)

Nilobezzia kertészii Kieffer 1916, p. 97 ¹⁾; Kieffer 1921b, p. 161 ²⁾; To-

kunaga 1939, p. 289

Tainan ¹⁾; Maruyama ²⁾

Nilobezzia claripennis Kieffer 1916, p. 97 ¹⁾ (*Bezzia*); Tokunaga 1939,

p. 288

Anping ¹⁾

Nilobezzia formosana Kieffer 1912, p. 30 ¹⁾ (*Bezzia*); Tokunaga 1939,

p. 285

Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Dasyhelea formosana Kieffer 1921b, p. 157 ¹⁾

Daitotei ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Dasyhelea formosana Kieffer, 1921a, p. 565 ²⁾

Hokuto ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Lepidohelea formosae Kieffer 1921b, p. 153 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 3 Typen)

Mixhelea ciliaticrus Kieffer 1921a, p. 568 ¹⁾

Jushifun, Taihoku-Distr., VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Dicrohelea albiclava Kieffer 1921a, p. 566 ¹⁾

Jushifun, Taihoku-Distr., VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Johannsenomyia conjuncta Kieffer 1916, p. 93 ¹⁾ (*Sphaeromyias*)

Tainan ¹⁾

- Johannsenomyia connexa* Kieffer 1916, p. 92 ¹⁾ (*Sphaeromias*)
Tainan ¹⁾
- Johannsenomyia inermipes* Kieffer 1916, p. 115 ¹⁾ (*Sphaeromias*)
Kosempo ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Johannsenomyia sejuncta* Kieffer, 1916, p. 90 ¹⁾ (*Sphaeromias*)
Tainan ¹⁾
- Johannsenomyia uncinata* Kieffer 1916, p. 91 ¹⁾ (*Sphaeromias*)
Taihoku ¹⁾
- Palpomyia aterrima* Kieffer 1921b, p. 159 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 298 ²⁾
Maruyama ¹⁾ (DEI: 6 Typen); Taihoku, IX. ²⁾
- Palpomyia atriclava* Kieffer 1921a, p. 569 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 296
Maruyama, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1)
- Palpomyia divisa* Kieffer 1916, p. 94 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 302
Tainan ¹⁾
- Palpomyia indivisa* Kieffer 1916, p. 95 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 311
Sokotsu ¹⁾
- Palpomyia murina* Kieffer 1921b, p. 160 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 299
Maruyama ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Palpomyia spinifera* Kieffer 1916, p. 94 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 295
Tainan ¹⁾
- Palpomyia tainana* Kieffer 1912, p. 29 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 309
Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
var. *abdominalis* Kieffer 1921b, p. 161 ¹⁾
Chosokei ¹⁾
- Probezzia myrmedon* Kieffer 1921a, p. 571 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 293
Anping, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Probezzia semirufa* Kieffer 1921b, p. 161 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 291
Maruyama ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Bezzia chrysolopha* Kieffer 1912, p. 31 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 274
Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Bezzia insularis* Kieffer 1921a, p. 571 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 276
Anping, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Bezzia micronyx* Kieffer 1921b, p. 162 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 276
Daitotei ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Maruyama ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Bezzia murina* Kieffer 1921b, p. 162 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 275
Hokuto ¹⁾ (DEI: 5 Typen); Maruyama ¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Bezzia nigriclava* Kieffer 1921a, p. 572 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 281
Maruyama, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Bezzia separata* Kieffer 1916, p. 96 ¹⁾; Tokunaga 1939, p. 275
Takao ¹⁾

Superfamilie *Melusinoidea*

Familie *Melusinidae* (*Simuliidae*)

- Simulium ambiguum* Shiraki 1935, p. 71, Taf. 3, Fig. 5, 6, Taf. 13, Fig. 17 — 21 ¹⁾
 Taihoku, III ¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 6)
- Simulium arisanum* Shiraki 1935, p. 80, Taf. 4, Fig. 2, Taf. 14, Fig. 1 — 6 ¹⁾
 Arisan ¹⁾
- Simulium katoi* Shiraki 1935, p. 53, Taf. 3, Fig. 3, Taf. 7, Fig. 8 — 11, Taf. 12, Fig. 15 — 16 ¹⁾
 Taihoku, 18. XI. ¹⁾
- Simulium minutum* Shiraki 1935, p. 62, Taf. 2, Fig. 3, 4, Taf. 13, Fig. 12 — 16 ¹⁾
 Taihoku, III., VIII. ¹⁾
- Odagmia karenkoensis* Shiraki 1935, p. 42, Taf. 9, Fig. 6 — 10 ¹⁾
 Karenko, VII. ¹⁾
- Eusimulium falcoe* Shiraki 1935, p. 13, Taf. 1, Fig. 3, Taf. 9, Fig. 1 — 5 ¹⁾
 Kappansan, ~ 300 m hoch, III., im Gefieder von *Falco tinnunculus japonicus* ¹⁾
- Eusimulium geniculare* Shiraki 1935, p. 19, Taf. 1, Fig. 5, Taf. 8, Fig. 1 — 7 ¹⁾
 Taihoku, III., V., XII. ¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 3); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X. (DEI: 3)
- Eusimulium taipei* Shiraki 1935, p. 15, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 8, Fig. 13 — 18 ¹⁾
 Taihoku, VII. ¹⁾ (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 3)
- Stilboplax quinquestriatum* Shiraki 1935, p. 27, Taf. 3, Fig. 2, 4, Taf. 10, Fig. 1 — 9 ¹⁾
 Kappansan, Shinchiku-Prefecture ¹⁾; Kanshirei, Tainan-Prefect. II. ¹⁾; Suisha, Taichu-Prefect., V. ¹⁾; Funkiko, Tainan-Pref., X. ¹⁾; Arisan, Tainan-Pref., IV.; Taihoku (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 4)
- Thyrsopelma longiunguis* Enderlein 1936, p. 126 ¹⁾
 Taihorin, VII. — VIII. ¹⁾

Superfamilie *Blepharoceroidea*

Familie *Blepharoceridae*

- Blepharocera taiwanica*, Kitakami 1937, p. 125 ¹⁾
 „The upper stream of the Daikokei River“, 22. VII. ¹⁾
- Blepharocera uenoi* Kitakami 1937, p. 125 ¹⁾
 „The upper stream of the Daikokei River“

Philorus taiwanensis Kitakami 1937, p. 123¹⁾

„Mountain Region, ca. 2400 m high from the sea-level, in the Prov. of Taityu, 24. VII.“¹⁾

Unterordnung *Brachycera*

1. *Orthorrhapha*

Familienreihe *Homoeodactyla*

Superfamilie *Tabanoidea*

Familie *Rhagionidae*

Suragina cineta Brunetti 1909, Rec. Ind. Mus. 2, p. 421, Taf. 12, Fig. 1¹⁾; Bezzi 1912, p. 445²⁾, *Atherix*; Bezzi 1914, p. 65³⁾

Sokutsu, VI. — IX. 1)³⁾ (DEI: 1); Formosa I. (DEI: 2); Toyenmongai 2 (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu V. (DEI: 3); Taihorinsho, VIII. 2); Fuhosho V. 2); Koshun X. 2)

Sonstige Verbreitung: Assam 1); Lower Burma 1)²⁾

Chrysopilus ditissimus Bezzi 1912, p. 451¹⁾

Toyenmongai 1); Kosempo III. 1); Formosa (DEI: 1)

Chrysopilus fenestratus Bezzi 1912, p. 448¹⁾

Toyenmongai 1); Fuhosho VII. 1); Tainan (DEI: 2); Formosa (DEI: 1)

Chrysopilus (Heliomyia) ferruginosa Wiedemann 1819, Zool. Mag. 1, p. (3), 4;

Brunetti 1909, Rec. Ind. Mus. 2, p. 436¹⁾; Bezzi 1912, p. 447²⁾; Bezzi 1914, p. 66³⁾; Malloch 1932, *Stylops* I, p. 116⁴⁾

Toyenmongai, Taihorinsho VIII. 2) (DEI: 1); Fuhosho VII. 2) (DEI: 1);

Polisha III. 2); Koshun III. — X. 2)³⁾ (DEI: 19); Kanshirei V. 2);

Chip Chip II. 2); Kankau, IX. 3) (DEI: 5); Banshoryo (Shisha) V.

— VI. 3) (DEI: 2); Hoozan 3) (DEI: 2); Sokutsu, IX. 3) (DEI: 4);

Kosempo, V. 3) (DEI: 2); Kanshirei, V. 3); Alikang, VI. 3); Toa Tsui

Kutsu, V. (DEI: 5); Tainan (DEI: 11); Formosa (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Java 1); Borneo 1); Celebes 1); Ternate 1); Aru Inseln 4); Philippinen 4)

Chrysopilus griseipennis Bezzi 1912, p. 451¹⁾

Kosempo, III. 1)

Chrysopilus luctuosus Brunetti 1909, Rec. Ind. Mus. 2, p. 430¹⁾; Bezzi 1912, p. 449²⁾

Kosempo, VI. 2); Toyenmongai 2); Formosa 2)

Sonstige Verbreitung: Assam 1)

Chrysopilus marmoratus Brunetti 1909, p. 429, Taf. 12, Fig. 10¹⁾

Assam 1)

var. *trypetopterus* Bezzi 1912, p. 449¹⁾; Bezzi 1914, p. 66²⁾;

Kosempo, V., VI. 1) 2) (DEI: 2); Toyenmongai 1); Koshun, III., X. 1); Fuhosho, VII. 1); Sokutsu, VI. 2) (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 4); Tainan (DEI: 1); Formosa (DEI: 4)

Chrysopilus nigripalpis Bezzi 1912, p. 448 1); Bezzi 1914, p. 66 2); Kanshirei, V. 1); Toyenmongai 1); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. 2) (DEI: 1); Tainan (DEI: 15); Toa Tsui Kutsu (DEI: 23); Formosa (DEI: 16)

Chrysopilus poecilopterus Bezzi 1912, p. 450 1); Bezzi 1914, p. 66 2); Toyenmongai 1); Fuhosho, III. 1); Geb. d. Shishastammes, V.—VI. 2) (DEI: 1); Banshoryo (Shisha, VI.—VII. 2) (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Tainan (DEI: 4)

Chrysopilus sauteri Bezzi 1907, p. 564 1); Bezzi 1912, p. 451 2); Bezzi 1914, p. 66

Takao 1) 2); Toyenmongai, Koshun, III. 2); Kankau (Koshun) (DEI: 3); Sokutsu, IX. (DEI: 1)

Chrysopilus sp. nahe *splendidum* Bezzi 1912, p. 451 1)

Kosempo, III. 1)

Rhagio formosus Bezzi 1912, p. 445 1)

Kosempo, III. 1)

Rhagio Shirakii Szilády 1934, p. 9 1)

Chosokeli 1) (DEI: 2 Typen)

Dialysis cispacifica Bezzi 1912, p. 444 1)

Toyenmongai 1); Formosa (DEI: 3)

Familie *Tabanidae*

[*Corizoneura yezoensis* Shiraki 1918, p. 19 1); Surcouf 1921, Gen. Ins. 175, p. 135. Von Surcouf irrtümlich (?) von Formosa gemeldet.]

Tabanus abbreviatus Bigot 1892, Mem. Soc. Zool. France 5, p. 670 1); Ricardo 1913, p. 168 2); Schuurmans-Stekhoven 1926, p. 210 3); Shiraki 1918, p. 267 4)

Takao, VI. 3); wahrscheinlich nur Südformosa 4)

Sonstige Verbreitung: Java, Selangor

Tabanus administrans Schiner 1868, Reise Novara, Dipt., p. 83; Shiraki 1932, p. 277 1)

Synonym (nach Shiraki):

Tabanus okadae Shiraki 1913, p. 285 2)

Nach Shiraki ist die Art vielleicht Synonym zu *amaenus* Walk.

Taihoku 1); Tamsui 1) 2)

[*Tabanus albibasis* Brèthes 1909, Ann. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires 20, p. 477 1); Surcouf 1921, Gen. Ins. 175, p. 58

„Formosa“ 1), gemeint ist wohl Formosa in S.-Amerika!]

- Tabanus amaenus* Walker 1848, List. Dipt. Brit. Mus. 1, p. 163; Ricardo 1913, p. 169²⁾; Shiraki 1918, p. 312³⁾
Takao, VII.²⁾; Koshun, VII.²⁾
Sonstige Verbreitung: China
var. *lateralis* Shiraki 1918, p. 322¹⁾
- Tabanus arisanus* Shiraki 1918, p. 198¹⁾
Arisan, VII.¹⁾
- Tabanus aurotestaceus* Walker 1854, List Dipt. Brit. Mus. 5, Suppl. 1, p. 247; Ricardo 1913, p. 168²⁾; Ricardo 1914, p. 64³⁾; Szilády 1922, p. 125⁴⁾; Shiraki 1932, p. 270
Taihorinsho, IX.³⁾ (DEI: 1); Jushifun, Taihoku-Distr.⁴⁾
Sonstige Verbreitung: Shanghai²⁾; Tongking²⁾
- Tabanus bicinctus* Ricardo 1911, Rec. Ind. Mus. 4, p. 132¹⁾; Ricardo 1914, p. 64²⁾; Shiraki 1918, p. 240³⁾
Sokutsu, IX.²⁾; Rono³⁾; Naniwa³⁾; nach Schuurmans-Stekhoven (1926, Treubia 6, Suppl., p. 310) ist das Vorkommen in Formosa aber fraglich.
Sonstige Verbreitung: Indien¹⁾
- Tabanus birmanicus* Bigot 1892, Mem. Soc. Zool. France 5, p. 653; Shiraki 1918, p. 420¹⁾
Kusukusa in Koshun-Cho, V.¹⁾
Sonstige Verbreitung: Burma.
- Tabanus (Ochrops) bivittatus* Matsumura 1916?, Thous. Ins. Japan, Addit. II., p. 384¹⁾; Szilády 1922, p. 125²⁾; Shiraki 1918, p. 180³⁾
Tainan²⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: ganz Japan³⁾
- Tabanus candidus* Ricardo 1913, p. 172¹⁾; Shiraki 1918, p. 420²⁾
Formosa¹⁾ 2)
- Tabanus exoticus* Ricardo 1913, p. 170¹⁾; Ricardo 1914, p. 64²⁾; Shiraki 1918, p. 371.³⁾
Fuhosho¹⁾ (DEI: 1); Koshun¹⁾; Alikang¹⁾; Kankau²⁾ (DEI: 18); Sokutsu, V., VI.²⁾ (DEI: 5); Kosempo, V.²⁾ (DEI: 11); Takao, V.²⁾ (DEI: 1); viele Fundorte³⁾
- Tabanus formosiensis* Ricardo 1911, p. 220¹⁾; Ricardo 1913, p. 172²⁾; Shiraki 1918, p. 429³⁾
Takao²⁾ 3) (selten³⁾)
- Tabanus fulvicinctus* Ricardo 1914, p. 62¹⁾; Shiraki 1918, p. 246²⁾
Sokutsu, IX.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Hoozan¹⁾ (DEI: 1 Typus); mehrere Fundorte²⁾
- Tabanus fulvemedius* Walker 1848, List. Dipt. Brit. Mus. 1, p. 152; Ricardo 1911, p. 197²⁾; Ricardo 1913, p. 169³⁾; Shiraki 1918, p. 399⁴⁾
Kosempo³⁾ (DEI: 5); Fuhosho³⁾; Toyenmongai³⁾; Sokutsu, VI.

(DEI: 1); Tainan (DEI: 4); Toa Tsui Kutsu (DEI: 1); Formosa (DEI: 6); mehrere Fundorte⁴⁾

Sonstige Verbreitung: Nepal, O.-Indien.

Tabanus fuscicornis Ricardo 1911, p. 144¹⁾; Ricardo 1913, p. 168²⁾; Shiraki 1918, p. 335³⁾

Punkio 1) 2) 3)

Tabanus indianus Ricardo 1911, p. 175¹⁾; Ricardo 1913, p. 169²⁾; Shiraki 1918, p. 284³⁾

Takao, VI. 2) 3)

Sonstige Verbreitung: Indien, Hongkong

[*Tabanus iyoensis* Shiraki 1918, p. 251¹⁾; Surcouf 1921, Gen. Ins. 175, p. 72; von Surcouf als in Formosa vorkommend gemeldet, von Shiraki aber in Formosa nicht gefunden!]

Tabanus karenkoensis Shiraki 1932, p. 277, Fig. 8¹⁾

Karenko, VII. 1)

Tabanus kotoshoensis Shiraki 1918, p. 193¹⁾

Kotosho, VII. 1)

Tabanus mandarinus Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt., p. 83; Ricardo 1913, p. 169²⁾; Ricardo 1914, p. 64³⁾; Shiraki 1918, p. 301⁴⁾

Taihorinsho 2); Suihenkyaku 2); Tainan, V. 3) (DEI: 1); Kankau (Koshun) (DEI: 2); Fuhosho (DEI: 1); Takao, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Japan⁴⁾, China⁴⁾

Tabanus Miyakei Shiraki 1918, p. 273¹⁾

Mansuw (Koshun, S.-Formosa), V. 1)

Tabanus negativus Ricardo 1911, p. 137¹⁾; Ricardo 1913, p. 168²⁾; Shiraki 1918, p. 186³⁾

Takao, VII. 2) 3); Kagi 3)

Sonstige Verbreitung: Hongkong¹⁾

Tabanus okinawanus Shiraki 1918, p. 277¹⁾

Kosempo, V. (DEI: 2, det. Kröber); Kankau (Koshun) (DEI: 4, det. Kröber); „Formosa“ (DEI: 1, det. Kröber)

Sonstige Verbreitung: Oshima (Okinawa)¹⁾

Tabanus pallidepectoratus Bigot, 1892, Mém. Soc. Zool. France 5, p. 658¹⁾; Ricardo 1911, p. 209²⁾; Ricardo 1913, p. 172³⁾; Shiraki 1918, p. 418; Shiraki 1932, p. 270⁴⁾

Formosa 3); Taihoku, VI. 4)

Sonstige Verbreitung: Cochinchina¹⁾; Haifong³⁾; Tongking³⁾

Tabanus perakiensis Ricardo 1911, p. 204¹⁾; Ricardo 1913, p. 172²⁾; Shiraki 1918, p. 425³⁾

Fuhosho, VII. 2) 3); Kosempo, VII. 3)

Sonstige Verbreitung: Malay. Staaten

- Tabanus quinquecinctus* Ricardo 1914, p. 63¹⁾; Shiraki 1918, p. 228²⁾; Kosempo, V. 1)²⁾; (DEI: 1 Typus); Arisan, X. 2); Suisharia²⁾; „Formosa“ (DEI: 6)
- Tabanus rufiventris* Fabricius 1805, Syst. Antl., p. 96
 Synonym (nach Schuurmans-Stekhoven, Treubia 6, Suppl. p. 271):
Tabanus crassus Walker 1850, Ins. Saund., Dipt., p. 50.
 Ricardo 1913, p. 170¹⁾; Shiraki 1918, p. 330²⁾
Tabanus sanguineus Walker 1850, Ins. Saund. Dipt. 1, p. 54; Ricardo 1913, p. 170³⁾; Shiraki 1918, p. 343⁴⁾
 Takao, VI., VII. 1)³⁾; Lake Candidius, X 1); Kankau⁴⁾
 Sonstige Verbreitung: Indien, Hongkong
- Tabanus sapporoensis* Shiraki 1918, p. 202¹⁾
 Sokutsu, IX. (DEI: 1, det. Kröber)
 Sonstige Verbreitung: Japan (Sapporo¹⁾)
- Tabanus sauteri* Ricardo 1913, p. 171¹⁾; Ricardo 1914, p. 64²⁾; Shiraki 1918, p. 337³⁾
 Fuhosho¹⁾; Janano-Taiko¹⁾; Sokutsu, VI. 2) (DEI: 10); Banshoryo (Shisha), VI. 2) (DEI: 1); Kosempo (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 3); mehrere Fundorte³⁾
- Tabanus sexcinctus* Ricardo 1911, p. 133¹⁾; Ricardo 1913, p. 168²⁾; Shiraki 1918, p. 234³⁾
 Toyenmongai²⁾; Rano, V. 3)
 Sonstige Verbreitung: Burma¹⁾
- Therioplectes tarandinus* Linné 1767, Syst. Nat. 12, p. 1000; Shiraki 1918, p. 124¹⁾
 Synonym (nach Shiraki):
Tabanus karafutonis Matsumura 1911, Journ. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ. Sapporo 4, p. 64
 Arisan 7600 ft¹⁾
 Sonstige Verbreitung: N.-Europa
- Chrysops dispar* Fabricius 1798, Ent. Syst., Suppl., p. 567; Ricardo 1913, p. 173¹⁾; Ricardo 1914, p. 65²⁾; Szilády 1922, p. 127³⁾; Shiraki 1918, p. 35⁴⁾
 Kanshirei²⁾; Anping, V. 2) (DEI: 1); Kankau²⁾ (DEI: 9); Tainan, V., VI. 2)¹⁾ (DEI: 2); Sokutsu, V. 2) (DEI: 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. 2) (DEI: 2); Takao, V., X. 2)¹⁾; Lake Candidius, X. 1); Kagi, VIII. 1); Koroton, IX. 1); Koshun, III. 1) (DEI: 1); Suihenkyaku, VIII. 1); Anping, VI. 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 5); Gebiet des Shishastammes (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 31)
 Sonstige Verbreitung: In Paläarktis und Orientalis weit verbreitet.
- Chrysops flavocinctus* Ricardo 1902, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 9, p. 380
 Schuurmans-Stekhoven 1926, Treubia 6, Suppl., p. 20

Toa Tsui Kutsu V. (DEI: 1, det. Szilády)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Hinderindien, Borneo

Chrysops mlokosiewiczi Bigot 1880, Ann. Soc. Ent. France (5) 10, p. 146;
Shiraki 1918, p. 25¹⁾

Viele Fundorte aus Formosa¹⁾

Sonstige Verbreitung: Japan, Yünnan, China, Kaukasus¹⁾

Chrysops sinensis Walker 1856, Ins. Saund., Dipt., p. 453; Ricardo
1913, p. 173¹⁾; Ricardo 1914, p. 65²⁾; Shiraki 1918, p. 43³⁾
Kagi, VIII. 1)³⁾; Tainan, V. 2)³⁾ (DEI: 2); Taihoku³⁾; Tamsui³⁾;
Kosempo³⁾; Anping (DEI: 2); Daitotei (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: China³⁾

Psylochrysops grandis Szilády 1922, p. 127¹⁾ (*Neochrysops*); Shiraki
1932, p. 262²⁾

Toa Tsui Kutsu^{1) 2)} (DEI: 2 Typen); Taihorin^{1) 2)}; Koshun¹⁾ (DEI:
1 Typus); Koshun²⁾; Arisan, X. 2)

Silviochrysops fascipennis Kröber 1922, p. 132¹⁾; Shiraki 1932, p. 259²⁾

Synonym (nach Shiraki):

Silviochrysops flavescens Szilády 1922, p. 126³⁾

Taihoku, VI. 2); Kagi, VIII. 2); Takao, VI. 2)¹⁾; Koshun, IV. 2);
Karenko, V. 2); Tainan³⁾ (DEI: 1 Typus); Anping³⁾

Chrysozona formosana Shiraki 1918, p. 109, Taf. 2¹⁾; Shiraki 1932,
p. 262²⁾

Synonym: *Haematopota ornata* Kröber 1922, p. 140, 154³⁾

Kosempo¹⁾; Tauran¹⁾; ganz Formosa²⁾

Silvius formosensis Ricardo 1913, p. 173¹⁾; Shiraki 1918, p. 12²⁾

Toyenmongai¹⁾; Kanshirei (Kagi)²⁾

Silvius nigripennis Shiraki 1932, p. 259, Fig. 1¹⁾

Musha, V. 1)

Superfamilie *Stratiomyioidea*

Familie *Stratiomyiidae*

Subfamilie *Xylomyiinae* (*Solvinae*)

Solva (*Ceratosolva*) *aurifrons* James 1939, p. 31¹⁾

Toa Tsui Kutsu¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Solva (*Formosolva*) *concaivrons* James 1939, p. 32¹⁾

„Formosa I.“¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Solva inamoena Walker 1860, Proc. Linn. Soc. London 4, p. 98; Brunetti
1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 171¹⁾

Kankau, IX. (DEI: 1, det. Shiraki)

Sonstige Verbreitung: Java, Celebes, Sumatra, Ceylon¹⁾

Solva (Xylomyia) nigricoxis Enderlein 1921, Mitt. Zool. Mus. Berlin 10, p. 170 ¹⁾; Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 174 ²⁾
Hoozan Distr., IV. ¹⁾ ²⁾

Sonstige Verbreitung: Sikkim ¹⁾ ²⁾

Solva (Xylomyia) sauteri James 1939, p. 33 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 11 Typen + 1)

Subfamilie *Rhachicerinae*

Rhachicerus brevicornis Kertész 1914, p. 501 ¹⁾

Fuhosho, V. ¹⁾

Rhachicerus fenestratus Kertész 1914, p. 500 ¹⁾

Janano-Taiko, IX. ¹⁾

Rhachicerus patagiatus Enderlein 1913, p. 538, Fig. 3 ¹⁾; Kertész 1914, p. 504 ²⁾

Hoozan, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Sokotsu ²⁾

Rhachicerus pictipennis Kertész, 1914, p. 502, Fig. 35 ¹⁾

Kosempo, VI. ¹⁾; Janano-Taiko ¹⁾; Sokutsu, VI. (DEI: 1)

Rhachicerus proximus Kertész 1914, p. 504 ¹⁾

Taihorin, V. ¹⁾

Subfamilie *Clitellariinae*

Negritomyia fulvicollis Kertész 1914, p. 514 ¹⁾; Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 98

Kosempo ¹⁾; Koshun ¹⁾ (DEI: „Kankau [Koshun]“ VIII., IX.: 43); Kankau ¹⁾; Pilam, VII. ¹⁾ (DEI: 1); Tapani ¹⁾ (DEI: 1); Taihorin ¹⁾; Suiharyo ¹⁾; Sokotsu, VI. ¹⁾ (DEI: 10); Fuhosho (DEI: 2)

Adoxomyia formosana Kertész 1923, p. 103 ¹⁾ (*Euclitellaria*)

„mehrere Stellen“ ¹⁾; Kankau (DEI: 1); Taihorin (DEI: 1); Sokutsu, VI. (DEI: 1; sämtliche des DEI: det. Kertész)

Hermione apicalis Kertész 1914, p. 495, Fig. 34 ¹⁾

Toyenmongai ¹⁾

Hermione excellens Kertész 1914, p. 497 ¹⁾

Kosempo, IV. ¹⁾; Gebiet des Shishastammes, VI. (DEI: 1, det. Kertész)

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Shiraki)

Hermione fenestrata Kertész 1914, p. 498 ¹⁾

Kosempo, VI. ¹⁾

Subfamilie *Stratiomyiinae*

Cyphomyia orientalis Kertész 1914, p. 505, Fig. 36 ¹⁾

Toyenmongai ¹⁾; Kankau, VI. (DEI: 1); Sokutsu, VI. (DEI: 2);

Banshoryo, VI. (DEI: 1); Tainan (DEI: 13); „Formosa“ (DEI: 5)

Eulalia diffusa Walker 1854, List Dipt. Brit. Mus. 5, p. 53

Kosempo (DEI: 1, det. Kartész); Sokutsu, VI. (DEI: 1, det. Kertész);
Macuyama, VI. (DEI: 1, det. Shiraki)
Sonstige Verbreitung: Java

Subfamilie *Beridinae*

Hoplacantha flavicornis James 1939, p. 34¹⁾

Nördl. Paiwan-Distr., Shinsinei 4000 ft, X.¹⁾ (DEI: 11 Typen + 2)

Hoplacantha amoena Enderlein 1921, p. 165

Toyenmongai; Koshun, VIII., IV.

Spartimas formosanus Enderlein 1921, p. 197¹⁾

Mt. Hoozan, VIII.¹⁾

Spartimas ornatipes Enderlein 1921, p. 196¹⁾

Toyenmongai¹⁾

Allognosta fuscipennis Enderlein 1921, p. 183¹⁾

Toyenmongai¹⁾; Tapaui, III.¹⁾; Koshun, X.¹⁾; Chip Chip., II.¹⁾;
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Shiraki); „Formosa“ (DEI: 10,
det. Shiraki)

Allognosta maxima Enderlein 1921, p. 183¹⁾

Toyenmongai¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1, det. Shiraki)

Allognosta partita Enderlein 1921, p. 184¹⁾

Toyenmongai¹⁾, Chip Chip¹⁾; Kosempo, VI.¹⁾

Subfamilie *Pachygastrinae*

Aidomyia femoralis Kertész 1916, p. 193, Fig. 37¹⁾

Kankau, IV., VII.¹⁾

Lenomyia honesta Kertész 1916, p. 188, Fig. 34—35¹⁾

Kankau, IV.¹⁾

Paracechorismenus intermedius Kertész 1916, p. 165, Fig. 18, 19¹⁾

Toyenmongai¹⁾

Cechorismenus flavicornis Kertész 1916, p. 162, Fig. 17¹⁾

Kankau¹⁾

Abrosiomyia minuta Kertész 1914, p. 532, Fig. 62¹⁾

Toyenmongai¹⁾

Prostomomyia atronitens Kertész 1914, p. 551, Fig. 83¹⁾

Toyenmongai¹⁾

Evaza formosana Kertész 1914, p. 556¹⁾

Toyenmongai¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 4, det. Shiraki); „For-
mosa“ (DEI: 3)

Evaza nigripennis Kertész 1909, p. 372¹⁾; Kertész 1914, p. 557

Kosempo V., VI.¹⁾ (DEI: 1); Toyenmongai²⁾; Kankau (Koshun) (DEI: 5)
Sokutsu V. (DEI: 3); Toa Tsui Kutsu V. (DEI: 5); Tainan (DEI:
20); „Formosa“ (DEI: 2).

Evaza tibialis Walker 1861, Proc. Linn. Soc. London V, p. 258¹⁾; Kertész 1906, p. 285²⁾

? Toyenmongai²⁾

Sonstige Verbreitung: Celebes¹⁾

Culcua simulans Walker 1857, Proc. Linn. Soc. I, p. 109, Taf. 4, Fig. 1; Kertész 1909, p. 371, Taf. 8, Fig. 8, 5¹⁾; Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 65²⁾

Alikang, VI.¹⁾; Kosempo, III.—IV.¹⁾ (DEI: 1); Sokutsu V. (DEI: 1); Gebiet des Shishastammes V.—VI. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V., (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 53).

Sonstige Verbreitung: Darjiling, Malaka, Sumatra, Borneo²⁾

Aulana insularis James 1939, p. 37¹⁾

Kankau (Koshun)¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Wallacea albiseta de Meijere 1907, Tijds. Ent. 50, p. 236¹⁾; Kertész 1909, p. 385²⁾; Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 62³⁾

Takao, I., IV., XII.²⁾; Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 1, det. Kertész); Chipun, VII. (DEI: 2, det. Kertész); Pilam, VII. (DEI: 3, det. Kertész); Tainan, V. (DEI: 3, det. Kertész); Sokutsu, IX. (DEI: 22, det. Kertész); Kankau, VII., IX. (DEI: 31, det. Kertész); „Formosa“ (DEI: 2, det. Kertész).

Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra³⁾, Singapore²⁾

Wallacea tibialis Kertész 1909, p. 385, Taf. 9, Fig. 16¹⁾

Kosempo, IV.¹⁾; Tappani (DEI: 2, det. Kertész)

Craspedometopon frontale Kertész 1909, p. 375, Taf. 8, Fig. 3, 4, 10¹⁾

Kosempo, III.—V.¹⁾ (DEI: 20); Tainan (DEI: 11, det. Kertész); Kanshirei (DEI: 1, det. Kertész); Koshun, III., X. (DEI: 5, det. Kertész); Sokutsu, V. (DEI: 1, det. Kertész); Kankau (DEI: 2, det. Kertész); Hoozan (DEI: 5, det. Kertész); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2, det. Shiraki); „Formosa“ (DEI: 6)

Gnorismomyia flavicornis Kertész, 1914, p. 533, Fig. 65¹⁾

Takao, IV.¹⁾

Cibotogaster (Acanthina) fumipennis Kertész 1914, p. 470, Fig. 13, 19¹⁾

Kosempo, VII.¹⁾ (DEI: 1); Toyenmongai¹⁾; Kankau (Koshun), VI. bis VII.¹⁾ (DEI: 27); Tapani¹⁾; Alikang¹⁾; Tainan (DEI: 8); Sokutsu, VI. (DEI: 8); Taihorinsho, IX. (DEI: 5); Fuhosho, VII. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 8, det. Kertész, wie die übrigen Exemplare des DEI); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Shiraki).

Abiomyia annulipes Kertész 1914, p. 531, Fig. 60—61¹⁾; Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 53²⁾

Chip Chip, III.¹⁾; Kosempo, III., XI.¹⁾; Koshun, X.¹⁾; Toyenmongai¹⁾; Kankau (Koshun), VII. (DEI: 3); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 4); Maruyama IV. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Sumatra²⁾

Pegadomyia pruinosa Kertész 1916, p. 183, Fig. 31¹⁾

Fuhosho, III. ¹⁾; Kankau (Koshun)¹⁾ (DEI: 2, det. Kertész)

Subfamilie *Geosarginae*

Ptecticus aurifer Walker 1854, List Dipt. Brit. Mus. 5, p. 96

Fuhosho (DEI: 2); Kanshirei, V. (DEI: 1); Koshun, VII. (DEI: 1); Yamo no Taiko, IX. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Taihorinsho, XI. (DEI: 4); Kosempo, V. (DEI: 4); Suisharyo, X. (DEI: 4); Kankau, II., IV. (DEI: 3); Taihanroku, VII. (DEI: 4); Bانشoryo (Shisha), (DEI: 8); Tainan (DEI: 2)

Die Exemplare des DEI det. Kertész und Shiraki.

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region.

Ptecticus latifascia[tus] Walker 1857, Proc. Linn. Soc. London 1, p. 110;

Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 143¹⁾

Toa Tsui Kutsu V., IX. (DEI: 15, det. Shiraki); Yamo no Taiko, IX. (DEI: 1); Kankau, IV., IX. (DEI: 8); Suisharyo, X. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 8)

Sämtliche Exemplare des DEI: det. Shiraki.

Sonstige Verbreitung: Sumatra, Java, Borneo, Singapore¹⁾

Formosargus kertészi James 1939, p. 36¹⁾

Kankau (Koshun), VII. ¹⁾ (DEI: 3 Typen)

Geosargus redhibens Walker 1860, Proc. Linn. Soc. London 4, p. 97;

Brunetti 1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 155¹⁾

Kankau, III., VIII. (DEI: 3); Taihoku-Distr., Gai-so-kai, V. (DEI: 1, det. Shiraki)

Sonstige Verbreitung: Makassar, Singapore, Rangoon, Kurseong, Batjan¹⁾

Cephalochrysa stenogaster James 1939, p. 35¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 3 Typen)

Microchrysa flaviventris Wiedemann 1824, Anal. Ent. p. 31; Brunetti

1923, Rec. Ind. Mus. 25, p. 160¹⁾

Hokuto, XII. (DEI: 1); Macuyama (DEI: 1); Hoozan (DEI: 2); Kosempo, V. (DEI: 1); Kankau, VII. (DEI: 81); Pilam VII. (DEI: 19); Daitotei VI. (DEI: 3); Chosokei (DEI: 1); Chipun, VII. (DEI: 9); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. (DEI: 1); Taihoku-Distr. V. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 1)

Exemplare des DEI: det. Shiraki.

Sonstige Verbreitung: Indien, Ceylon, Java, Sumatra, Neuguinea, Seychellen¹⁾

Gongrobus sauteri Enderlein 1914, p. 586¹⁾

Kosempo, I. ¹⁾

Superfamilie *Nemestrinoidea***Familie *Nemestrinidae****Nycterimyia fenestro-clatrata* Lichtwardt 1912, p. 28¹⁾siehe auch *kertészi*Fuhosho VII.¹⁾*Nycterimyia fenestro-inornata* Lichtwardt 1912, p. 28¹⁾; Bequaert 1935 p. 140²⁾Fuhosho V.¹⁾; Hoozan²⁾ (DEI: 1)*Nycterimyia kertészi* Lichtwardt 1912, p. 27¹⁾;nach Bequaert 1935, p. 140, vielleicht Synonym: *fenestro-clatrata*
Fuhosho, V.¹⁾*Atriadops javana* Wiedemann 1824, *Analecta* Ent. p. 18; Lichtwardt 1919, p. 277¹⁾; Bequaert 1935, p. 137²⁾Taihanroku, VIII.¹⁾; Kankau (Koshun), VI., VII., IX.²⁾ (DEI: 16)Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra, Ceylon, Queensland, Palmerston, Mioko, Singapore, China (Foo-chow)²⁾*Hirmoneura (Neohirmoneura) orientalis* Lichtwardt 1909, p. 645¹⁾;Lichtwardt 1919, p. 277²⁾; Bequaert 1935, p. 130³⁾Kosempo, IV., V.^{1) 2)} (DEI: 2); Taihanroku²⁾; Fuhosho (DEI: 1);

Gebiet des Shishastammes (DEI: 1)

Familie *Acroceridae**Philopota aenea* Bigot 1878, *Ann. Soc. Ent. France* (5) 8, Bull. p. LXXI¹⁾;Shiraki 1932, p. 332²⁾

Synonym nach Shiraki:

Philopota globulifera Matsumura 1916, *Thous. Ins. Japan*, Addit. 2, p. 379Formosa, Berggebiete über 1000 m Höhe²⁾; Kosempo, V. (DEI: 3);

Koshun, III. (DEI: 1); Fuhosho, III. (DEI: 11); „Formosa“ (DEI: 56)

Sonstige Verbreitung: Japan (Hokkaido, Honshu)^{2) 1)}*Cyrtus shibakawae formosanus* Shiraki 1932, p. 332¹⁾Arisan, IV.—V.¹⁾; Karenko, VII.—VIII.¹⁾Verbreitung der Nominatform: Japan (Honshu)¹⁾*Opsebius taiwanensis* Ôuchi 1938, p. 34, Taf. 4¹⁾Chiponsan¹⁾; Mt. Taihei¹⁾; Churei¹⁾**Familienreihe *Heterodactyla*****Superfamilie *Therevoidea*****Familie *Therevidae****Psilocephala argentea* Kröber 1912, p. 128¹⁾; Kröber 1913, p. 276²⁾;Kröber 1929, p. 329³⁾

- „Formosa“ 1); Banshoryo 2) 3); Tainan, V. — VII. 2) 3); (DEI: 1); Kankau, VI., VII. (DEI: 3, det. Kröber)
- Psilocephala frontata* Kröber 1912, p. 123 1); Kröber 1913, p. 276 2); Kröber 1929, p. 330 3); Kröber 1930, p. 66 4)
- „Formosa“ 1); Kankau (Koshun) 2) 4) (DEI: 29 Allotypen + 10); Tainan 2) 4) (DEI: 4 Allotypen + 1); Banshoryo (Shisha) 2) 4) (DEI: 7 Allotypen + 2); Anping, V. — VI. 2)
- Psilocephala obscura* Kröber 1912, p. 25 1); Kröber 1929, p. 331 2) Anping, V. 1) 2) (DEI: 1 Typus)
- Psilocephala sauteri* Kröber 1912, p. 135 1); Kröber 1913, p. 276 2); Kröber 1929, p. 329 3)
- „Formosa“ 1); Anping 2) (DEI: 10); Kankau 2) (DEI: 9); Banshoryo, V. — VII. 2) (DEI: 2); Takao, VI. — VII. 3)
- Phycus kertészii* Kröber 1912, p. 4 1)
- „Formosa“ 1)

Familie *Omphralidae*

- Omphrale papuana* Kröber 1912, p. 25 1); Kröber 1937, p. 217 Kanshirei, IV. 1) (DEI: 1 Typus)

Superfamilie *Asiloidea*

Familie *Asilidae*

Subfamilie *Laphriinae*

- Laphria (Epholkiolaphria) auricomata* Hermann 1914, p. 91 1) Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1); Toyenmongai 1)
- Laphria (Epholkiolaphria) azurea* Hermann 1914, p. 107 1) Kankau 1) (DEI: 5 Typen); Tappani 1) (DEI: 1); Kosempo, V. VII. 1) (DEI: 6 Typen); Gebiet des Shishastammes V., VI. 1); Fuhosho VII., IX. 1); Sokutsu, IX. 1) (DEI: 2 Typen); Hoozan, IV., VIII. 1) (DEI: 3 Typen); Taihorinsho, V., IX. 1) (DEI: 1 Typus); Yamo no Taiko, X. 1) (DEI: 2 Typen); Banshoryo V., VI. 1) (DEI: 2 Typen); Taihanroku IX. 1) (DEI: 2 Typen); Paroe (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu (DEI: 2). Im DEI 34 weitere Exemplare von denselben Fundorten.
- Laphria (Epholkiolaphria) basalis* Hermann 1914, p. 93 1) Hoozan 1) (DEI: 3 Typen); Taihanroku 1) (DEI: 1 Typus); Paiwandistrikt 1)
- Laphria (Pagidolaphria) blumei* van der Wulp 1872, Tijd. Ent. 15, p. 170; Hermann 1914, p. 109 1) Taihorinsho 1) (DEI: 4); Banshoryo, V. 1); Kosempo (DEI: 1); Fuhosho (DEI: 1); Gebiet des Shishastammes (DEI: 1)
- Sonstige Verbreitung: Sumatra, Java

- Laphria (Pagidolaphria) chrysotelus* Walker 1855, List Dipt. Brit. Mus. 7, Suppl. 3, p. 552; Hermann 1914, p. 85 ¹⁾
 Taihorinsho ¹⁾ (DEI: 5); Kosempo ¹⁾; Fuhosho ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Indien
- Laphria (Epholkiolaphria) lobifera* Hermann 1914, p. 95 ¹⁾
 Shisha ¹⁾ (DEI: 3 Typen + 1); Kosempo ¹⁾ (DEI: 4 Typen + 1);
 Hoozan ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihorinsho ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 2);
 Banshoryo ¹⁾ (DEI: 3 Typen + 1); Toa Tsui Kutsu ¹⁾ (DEI: 7)
- Laphria (Laphria) mitsukuri* Coquillett 1898, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, p. 316 ¹⁾; Hermann 1914, p. 85 ²⁾
 Shisha ²⁾ (DEI: 1); Hoozan, IV.—VI. ²⁾ (DEI: 6); Taihorinsho VII. ²⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Japan ¹⁾
- Laphria (Epholkiolaphria) pyrrhotrix* Hermann 1914, p. 104 ¹⁾
 Toyenmongai ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Hoozan, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus).
- Laphria (Pagidolaphria) remota* Hermann 1914, p. 87 ¹⁾
 Taihorinsho ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Banshoryo ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Fuhosho ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 1)
 Sonstige Verbreitung: Canton ¹⁾
- Laphria (Epholkiolaphria) vulcanus* Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 514; Hermann 1914, p. 107 ¹⁾
 Taihorinsho VI. ¹⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region
- Smeryngolaphria alternans* Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 511; Hermann 1914, p. 111 ²⁾
 Fuhosho ²⁾ (DEI: 1); Taihorinsho ²⁾; Kosempo ²⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Hinterindien, Java, Borneo.
- Sullaphria asilina* Becker i. l.?
 Polisha XI. (DEI: 1)
- Dasythrix grisea* Hermann 1914, p. 134 ¹⁾
 Koshun ¹⁾ (DEI: 9 Typen); Chipun ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Pilam ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau (DEI: 3 als „Typen“ bezeichnete Exemplare + 8 weitere)
- Maira aterrima* Hermann 1914, p. 110 ¹⁾
 Taihorinsho ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
 Sonstige Verbreitung: Canton ¹⁾
- Nusa (Pogonosoma) funebris* Hermann 1914, p. 129 ¹⁾
 Kankau ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Shisha ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Banshoryo ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Sokutsu ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Fuhosho ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihorinsho, VIII.—IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Suisharyo, X. (DEI: 1); Taihanroku (DEI: 1); Hoozan (DEI: 1); Paroe (DEI: 1);

Subfamilie *Dasypogoninae*

Laphystia sabulicola Loew 1847, Linn. Ent. 2, p. 538; Hermann 1914, p. 44¹⁾

Pilam¹⁾ (DEI: 1); Chipun¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa.

Clinopogon sauteri Bezzi 1910, p. 153¹⁾; Hermann 1914, p. 44²⁾

Kankau VII.²⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Bali (DEI: 1 Exemplar, det. Engel)

Stichopogon peregrinus Osten-Sacken 1882, Berl. Ent. Zeit. 26, p. 108¹⁾;

Hermann 1914, p. 44²⁾

Chipun, VII.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen¹⁾

Damalina nitida Hermann 1914, p. 43¹⁾

Sokutsu¹⁾ (DEI: 6); Shisha¹⁾ (DEI: 2 Typen); Banshoryo (Shisha) (DEI: 1 „Typus“); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)

Damalina pennipes Hermann 1914, p. 42¹⁾

Kankau¹⁾ (DEI: 1 Typus); Sokutsu¹⁾ (DEI: 7 Typen); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 2)

Microstylum amoyense Bigot 1878, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 8, p. 401¹⁾;

Hermann 1914, p. 40²⁾

Kankau²⁾; Kosempo²⁾; von beiden Fundorten im DEI: 22).

Sonstige Verbreitung: Amoy¹⁾

Microstylum oberthüri van der Wulp 1896, Notes Leyden Mus. 18, p. 241;

Hermann 1914, p. 39²⁾

Chipun¹⁾; Sokutsu¹⁾; Kankau¹⁾; Banshoryo¹⁾; Kosempo¹⁾; Pilam¹⁾

Von sämtlichen Fundorten im DEI: 29

Sonstige Verbreitung: Ostasien

Microstylum spectrum Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 368;

Hermann 1914, p. 39¹⁾

Kankau¹⁾ (DEI: 1); Kosempo¹⁾ (DEI: 1); Daitotei (DEI: 1); Ma-cuyama (DEI: 1); Taihoku-Distr. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: China

Microstylum vestitum Rondani 1875, Ann. Mus. Genova 7, p. 447

Taihoku-Distr. (Okasseki) (DEI: 1, det. Hermann)

Sonstige Verbreitung: Borneo

Damalis grossa Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt. p. 161; Hermann 1914, p. 41¹⁾

Sokutsu¹⁾ (DEI: 1); Gebiet des Shishastammes¹⁾

Sonstige Verbreitung: Hongkong¹⁾; Sumatra¹⁾

Damalis immerita Osten-Sacken 1882, Berl. Ent. Zeit. 26, p. 105; Hermann 1914, p. 40¹⁾

Taihorisho, VI.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen

Damalis maculata Wiedemann 1828, Auss. zweifl. Ins. 1, p. 416; Hermann 1914, p. 40¹⁾

Koshun¹⁾ (DEI: 4); Sokutsu¹⁾ (DEI: 14); Tainan (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Borneo

Damalis vitripennis Osten-Sacken 1882, Berl. Ent. Zeit. 26, p. 106; Hermann 1914, p. 40¹⁾

Kankau¹⁾ (DEI: 10); Koshun¹⁾ (DEI: 20); Gebiet des Shishastammes¹⁾; Sokutsu¹⁾ (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: Philippinen

Scylaticus degener Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt. p. 163; Hermann 1914, p. 38¹⁾

Kankau-Koshun V.—VI.¹⁾ (DEI: 35)

Sonstige Verbreitung: Hongkong

var. *lutescens* Hermann 1914, p. 38¹⁾

Chipun (Pujamadistrikt)¹⁾; Pilam¹⁾ (von beiden Fundorten im DEI: 16); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. (DEI: 1)

Neolaparus volcatus Walker 1849, List Dipt. Brit. Mus. 2, p. 346; Hermann 1914, p. 37¹⁾

Kankau (Koshun)¹⁾; Chip-Chip¹⁾ (von beiden Fundorten im DEI: 53)

Sonstige Verbreitung: Sikkim, in Ostasien weitverbreitet¹⁾

Subfamilie *Asilinae*

Philodicus chinensis Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt. p. 192¹⁾; Becker 1925, p. 75²⁾

Anping²⁾; Chipan²⁾

Sonstige Verbreitung: China¹⁾

Philodicus longipes Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt. p. 179¹⁾; Becker 1925, p. 75²⁾

Sokutsu, IX.²⁾ (DEI: 7); Kankau, VI.²⁾ (DEI: 8); Kosempo, IV. (DEI: 1); Taihanroku, VII. (DEI: 1); Alikang, VI. (DEI: 1); Suihenkyaku (DEI: 1); Daitorinsho, VII. (DEI: 1); im DEI: 53 weitere von denselben Fundorten

Sonstige Verbreitung: Philippinen¹⁾

Philodicus ochraceus Becker 1925, p. 75¹⁾

Koshun, IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Machimus aurulentus Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 249¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾; Fuhosho, VII.¹⁾; Taihorin, VII.¹⁾

Oligoschema nuda Becker 1925, p. 136¹⁾

Yentempo, V.¹⁾; Takao VI.¹⁾

Erax ochriventris Becker 1925, p. 77 ¹⁾

Fuhosho ¹⁾

Ommatius chinensis Fabricius 1794, Ent. Syst. IV. p. 383; Becker 1925, p. 79 ¹⁾

Kankau, VIII. ¹⁾; Takao ¹⁾; Yentempo, V. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: China

Ommatinus compactus Becker 1925, p. 127 ¹⁾

Kankau ¹⁾ (DEI: 12 Typen + 2); Sokutsu ¹⁾ (DEI: 4 Typen); ohne näheren Fundort im DEI 10 „Typen“

„*Ommatinus concinens* van der Wulp“ 1872, Tijd. Ent. 15, p. 260

Kankau, VIII., IX. (DEI: 2, det. Becker)

Sonstige Verbreitung: Timor

Ommatinus flavipyga Becker 1925, p. 130 ¹⁾

Kankau (Koshun) ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Ommatinus fulvimanus van der Wulp 1872, Tijd. Ent. 15, p. 264 ¹⁾; Becker 1925, p. 131 ²⁾

Taihorin, V. ²⁾; Kosempo ²⁾; Sokutsu ²⁾

Sonstige Verbreitung: Obi

Ommatinus griseipennis Becker 1925, p. 131 ¹⁾

Koshun, IX. ¹⁾; Kagi, VIII. ¹⁾; Kanshirei, V. ¹⁾.

Ommatinus major Becker 1925, p. 125 ¹⁾

Chipun ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 2); Banshoryo, IX. ¹⁾; Taihorinsho, IX. (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1; „Formosa“ (DEI: 2)

Ommatinus medius Becker 1925, p. 128 ¹⁾

Kankau ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Fuhosho ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Ommatinus nigripes Becker 1925, p. 130 ¹⁾

Taihorin ¹⁾; Sokutsu, V. ¹⁾

Ommatinus pauper Becker 1925, p. 128 ¹⁾

Fuhosho ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau ¹⁾ (DEI: 1 Typus) Kosempo, V. (DEI: 1 „Typus“); Sokutsu, IX. (DEI: 2 „Typen“)

Ommatinus pinguis van der Wulp 1872, Tijd. Ent. 15, p. 275 ¹⁾; Becker 1925, p. 123 ²⁾

Kankau ²⁾; Taihoku ²⁾; Toa Tsui Kutsu ²⁾; Tainan ²⁾; Pilam ²⁾; Koshun ²⁾ (im DEI von allen diesen Fundorten 160 Exemplare) „Varietät“ von Taihoku-Distr., Okaseki, Toa Tsui Kutsu; je 1 Exemplar im DEI

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Ommatinus rubicundus van der Wulp 1872, p. 276 ¹⁾; Becker 1925 p. 131 ²⁾

Fuhosho, VII. ²⁾; Sokutsu VI. ²⁾; Tainan (DEI: 1, det. Shiraki)

Sonstige Verbreitung: Malay. Archipel

Ommatinus similis Becker 1925, p. 129 ¹⁾

Banshoryo (Shisha) ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau ¹⁾ (DEI: 14 Typen);
Sokutsu, IX. (DEI: 4 „Typen“); Koshun, I., IX. (DEI: 2 „Typen“)

Ommatinus torulosus Becker 1925, p. 126 ¹⁾

Kankau ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 2); Koshun, III. ¹⁾ (DEI: 4 Typen + 1);
Fuhosho ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu ¹⁾ (DEI: 4 Typen);
Hoozan (DEI: 2 „Typen“); Kosempo, V. (DEI: 2 „Typen“); Tap-
pani (DEI: 1 „Typus“); Kanshizei, V. (DEI: 1 „Typus“); Tai-
horinsho, V. (DEI: 1 „Typus“); Tainan (DEI: 5); im DEI: wei-
tere 15 Exemplare von denselben Fundorten.

Ommatinus unicolor Becker 1925, p. 124 ¹⁾

Polisha ¹⁾; Koshun, III. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Gebiet des Shishastam-
mes ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Ommatinus spec.

Fuhosho, X. (DEI: 1, det. Becker)

Epiklisis pilarsis Becker 1925, p. 134 ¹⁾

Anping ¹⁾ (DEI: 9 Typen + 1); Tainan, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Tolmerus asiaticus Becker 1925, p. 247 ¹⁾

Kankau ¹⁾ (DEI: 10 Typen + 2); Pilam ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1);
Chipun ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Tainan (DEI: 1 „Typus“)

Tolmerus atratulus Walker 1855, List Dipt. Brit. Mus. 7, Suppl. 3, p. 724
Becker 1925, p. 248 ¹⁾

Kosempo ¹⁾ (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Java

Tolmerus impeditus Becker 1925, p. 246 ¹⁾

Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Promachus anicius Walker 1849, List Dipt. Brit. Mus. 2, p. 392 ¹⁾

Becker 1925, p. 69 ²⁾

Koroton, IX. ²⁾; Koshun, I. ²⁾; Kankau, IX. ²⁾; Pilam, VI. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: China ¹⁾

Promachus canus Wiedemann 1818, Zoolog. Magaz. 1, p. 2; Becker 1925,
p. 70 ¹⁾

Koshun ¹⁾ (DEI: 2); Pilam, VII. ¹⁾ (DEI: 6); Kankau ¹⁾ (DEI: 4);

Tainan ¹⁾ (DEI: 4); Takan, IX. ¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa

Promachus opacus Becker 1925, p. 70 ¹⁾

Taihorin, VII. ¹⁾

Cerdistus laetus Becker 1925, p. 246 ¹⁾

Chosokei ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Tainan (DEI: 12)

Antipalus kochi de Meijere 1913, Nova Guinea IX. p. 336 ¹⁾; Becker
1925, p. 133 ²⁾

Macuyama, VI. ²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Neu-Guinea ¹⁾

Antipalus pedestris Becker 1925, p. 132 ¹⁾

Kosempo, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tainan (DEI: 7, det. Shiraki);
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Shiraki); „Formosa“ (DEI: 1,
det. Shiraki)

Bisapoclea duplicata Becker 1925, p. 76 ¹⁾

Kankau (Koshun) ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Trypanoïdes fulviventris Becker 1925, p. 72 ¹⁾

Taihorinsho, VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1, det. Becker); Hoozan ¹⁾
(DEI: 1 Typus); Koshun VI. (DEI: 1, det. Becker)

Trypanoïdes indigenus Becker 1925, p. 74 ¹⁾

Macuyama, VI. ¹⁾; Sokutsu VI. ¹⁾ (DEI: 17 Typen + 12); Koshun,
VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 2); Banshoryo, VI. ¹⁾ (DEI: 2 Typen);
Taihorinsho, XI. ¹⁾; Suihenkyaku, VII. ¹⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu,
V. ¹⁾ (DEI: 1)

Trypanoïdes nigribarbatus Becker 1925, p. 73 ¹⁾

Kosempo, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Trypanoïdes testaceipes Macquart 1855, Dipt. Exot. Suppl. 5, p. 56 ¹⁾;
Becker 1925, p. 72 ²⁾

Fuhosho, IX. ²⁾ (DEI: 2); Sokutsu, VI. ²⁾; (DEI: 4); Kankau, VI. ²⁾
(DEI: 7); Banshoryo (Shisha) (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: China ¹⁾

Orophotus chrysogaster Becker 1925, p. 240 ¹⁾

Kosempo, IV. ¹⁾

Orophotus fulvidus Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 240 ¹⁾

Banshoryo ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Fuhosho, II., VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus);
Kosempo, V. ¹⁾; Tainan (DEI: 7)

Orophotus univittatus Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 137 ¹⁾

Kankau, IV. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Pilam ¹⁾ Macuyama, V. ¹⁾ (DEI:
1 Typus); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Koshun, IX. (DEI: 1);
Kosempo, V. (DEI: 1); Hoozan, VII. (DEI: 2)

Allocotosia aurata Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 387; Becker 1925,
p. 79 ¹⁾

Koshun, VI. ¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Haplophomerus armatipes Macquart 1855, Dipt. Exot. Suppl. 5, p. 63;
Becker 1925, p. 242 ¹⁾

Fuhosho IX.VII. ¹⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 5); Hoo-
zan, VIII. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2); Sokutsu, IX.
(DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: China

Haplophoromerus hirtiventris Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 241 ¹⁾
Jamuno Taiko ¹⁾; Taihorinsho, VII. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu ¹⁾; Fuhosho ¹⁾

Emphysomera aequalis Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 79 ¹⁾
Paroe, nördl. Paiwan-Dist. VIII. ¹⁾; Kankau (DEI: 4, von Hermann als „Typen“ bezeichnet); Pilam, VII. (DEI: 1 von Hermann als „Typus“ bezeichnet)

Emphysomera biseriata Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 80 ¹⁾
Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. ¹⁾ (DEI: 17); Kankau, VI., IX. (DEI: 4); Koshun IX., X., I. (DEI: 6), Sokutsu VI., IX. (DEI: 3) Tainan (DEI: 2)

Sämtliche Exemplare des DEI sind von Hermann als „Typen“ bezeichnet

Emphysomera conopsoïdes Wiedemann 1828, Aussereurop. zweifl. Ins. I, p. 422; Becker 1925, p. 80 ¹⁾
Kankau (Koshun) ¹⁾ (DEI: 18)

Sonstige Verbreitung: Afrika, oriental. Region

Emphysomera peregrina van der Wulp 1872, Tijdschr. Ent. 15, p. 253; Becker 1925, p. 79 ¹⁾

Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. ¹⁾ (DEI: 16); Kankau, V., VI., VII., IX. ¹⁾ (DEI: 40); Polisha, XII. (DEI: 1); Chipun, VIII. (DEI: 1); Koshun, X., I (DEI: 4); Sokutsu, IX. (DEI: 2). Im DEI weitere 121 von allen Fundorten

Sonstige Verbreitung: Malay. Archipel

Astochia inermis Hermann 1916, p. 29 ¹⁾
Koshun ¹⁾ (DEI: 8 Typen); Takao ¹⁾ (DEI: 5); Tainan ¹⁾ (DEI: 2); Macuyama VI. (DEI: 1 von Hermann als „Typus“ bezeichnetes Tier).

Astochia philus Walker 1849, List Dipt. Brit. Mus. 2, p. 393; Hermann 1916, p. 24 ¹⁾

Kankau VIII. ¹⁾ (DEI: 2); Sokutsu (DEI: 1, det. Shiraki)

Sonstige Verbreitung: Assam, Sikkim ¹⁾

Astochia scalaris Hermann 1916, p. 27 ¹⁾

Taihoku ¹⁾; Tainan ¹⁾; Pilam ¹⁾; Kankau ¹⁾; Chipun ¹⁾; Paroe ¹⁾; Koshun ¹⁾; Anping ¹⁾. Im DEI 122 Typen von diesen Fundorten

Astochia trigemina Becker 1925, p. 244 ¹⁾

¹⁾ ohne Fundort

Neoitamus aurifer Hermann 1916, p. 20 ¹⁾; Becker 1925, p. 242 ²⁾
Taihoku-Distr. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu ¹⁾ (DEI: 3 Typen + 6); Macuyama ¹⁾ ²⁾ (DEI: 4); Kosempo, VI. ²⁾; Jamo no Taiko ²⁾; Kanshirei, V. ²⁾; Tainan (DEI: 1); Hokuto (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Neoitamus cyanurus Loew 1849, Linnaea Entomol. IV, p. 84; Becker 1925, p. 244 ¹⁾

Kosempo ¹⁾; Koshun, III. ¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1, det. Shiraki)

Sonstige Verbreitung: Europa

Neoitamus dolichurus Becker (ex MS Hermann) 1925, p. 244 ¹⁾

Kosempo ¹⁾; Koshun, III. ¹⁾

Neoitamus fertilis Becker 1925, p. 243 ¹⁾

Koshun ¹⁾; Kosempo, III. ¹⁾; Takao, III. ¹⁾

Neoitamus fraternus Macquart 1846, Dipt. exot., Suppl. I, p. 91; Hermann 1916, p. 23 ¹⁾

Koshun, X. ¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Tasmanien, Sumatra

Neoitamus pediformis Becker 1925, p. 242 ¹⁾

Polisha, III. ¹⁾; Sokutsu, V. ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Koshun, VI. ¹⁾

Neoitamus rubripes Hermann 1916, p. 21 ¹⁾

Taihorinsho, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); „Formosa“ (DEI: 1)

Neoitamus serratulus Hermann

Wo ist diese Art beschrieben? Ricardo (1919, Ann. Mag. Nat. Hist. 3) führt sie nicht unter den orientalischen Arten dieser Gattung an und später ist sie auch nicht auffindbar.

Tainan (DEI: 1, det. Shiraki)

Gen. spec.

Pilam, VII. (DEI: 1, det. Becker); Kankau (DEI: 1, det. Becker)

Subfamilie *Leptogastrinae*

Lagynogaster fuliginosa Hermann 1916, p. 13 ¹⁾

Kanshirei, V. (DEI: 1)

Lagynogaster sauteri Hermann 1914, p. 136 ¹⁾, nomen nudum (*Leptogaster*); Hermann 1916, p. 15 ²⁾

Koshun, VII.—IX. ^{1) 2)} (DEI: 8 Typen + 6); „Formosa“ (DEI: 2)

Leptogaster appendiculata Hermann 1914, p. 136, nomen nudum ¹⁾; Hermann 1916, p. 7 ²⁾

Kankau, V. ^{1) 2)}

Leptogaster basilaris Coquillett 1898, Proc. U.S. Nat. Mus. 21, p. 311 ¹⁾; Hermann 1914, p. 136 ²⁾; Hermann 1916, p. 11 ³⁾

Paroe VIII. ^{2) 3)} (DEI: 2); Takao ³⁾; Koshun ³⁾ (DEI: 2); Taihorinsho ³⁾

Sonstige Verbreitung: Japan ¹⁾

Leptogaster bilobata Hermann 1916, p. 8 ¹⁾

Koshun, IX. ¹⁾

Leptogaster coarctata Hermann 1914, p. 136 ¹⁾, nomen nudum; Hermann 1916, p. 10 ²⁾

Kankau ¹⁾ (DEI: 3 Typen + 1); Koroton ¹⁾; Kagi ²⁾; Koshun ²⁾

Leptogaster longicauda Hermann 1916, p. 4 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 6 Typen + 5); Kosempo ¹⁾

Leptogaster pilosella Hermann 1914, p. 136 ¹⁾, nomen nudum; Hermann 1916, p. 6 ²⁾

Koshun, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau, (Koshun) V. ²⁾

Leptogaster spinulosa Hermann 1914, p. 136 ¹⁾, nomen nudum; Hermann 1916, p. 1 ²⁾

Koshun ^{1) 2)} (DEI: 2 Typen); Sokutsu ^{1) 2)} (DEI: 2 Typen)

Leptogaster trimucronata Hermann 1914, p. 136 ¹⁾, nomen nudum; Hermann 1916, p. 3 ²⁾

Kosempo ^{1) 2)} (DEI: 3 Typen); Kankau ^{1) 2)} (DEI: 3 Typen); Shisha ^{1) 2)} (DEI: 1 Typus); Sokutsu, VI. (DEI: 1); Taihorinsho, IX. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)

Leptogaster unihamata Hermann 1916, p. 9 ¹⁾

Koshun, X. ¹⁾

Familie Mydaiidae

Leptomysdas grünbergi Hermann 1914, p. 34 ¹⁾

Chipun ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Pilam ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihorin ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Fuhosho ¹⁾

Familie Bombyliidae

Geron albescens Brunetti 1909, Rec. Ind. Mus. 3, p. 229 ¹⁾; Painter 1932, Lingnan Sci. Journ. 11, p. 357 ²⁾

Kankau, VI. (DEI: 1, det. Bezzi)

Sonstige Verbreitung: Indien ²⁾

Cephenius barbiellinii Bezzi 1905, Redia 2, p. 271 ¹⁾, *Systropus*; Enderlein 1926, p. 75; Painter 1932, Lingnan Sci. Journ. 11, p. 358. Fig. 1 u. 2.

Die anschließend genannten formosanischen Exemplare des DEI sind von Bezzi als „*barbiellinii*“ bezeichnet worden. Sie führen auch in Enderleins Tabelle zu *barbiellinii*, weichen aber von dieser Art durch die Färbung der Vorder- und Mitteltarsen ab. Offenbar stellen sie eine besondere formosanische Subspecies dar.

Yamo no Taiko, X. (DEI: 3); Sokutsu, IX. (DEI: 2); Taihorinsho, XI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: China ¹⁾

Cephenius excisus Enderlein 1926, Wien. Ent. Zeit. 43, p. 81 ¹⁾. Fig. 5—7.

Die Exemplare des DEI sind von Bezzi als *lanatus* in litt. bezeichnet worden. Die Typen von *excisus* wurden im Zool. Museum Berlin verglichen.

Kankau, V., IX. (DEI: 37)

Sonstige Verbreitung: Süd-China (Canton).

Cephenius formosanus Enderlein 1926, p. 77; Painter 1932, Lingnan Sci. Journ. 11, p. 358. Fig. 3 u. 4.

Syn. *Cephenius acuminatus* Enderlein, 1926, p. 77

Die Gestalt der weiblichen Subgenitalplatte ist so variabel, daß ich *acuminatus*, die auf Grund dieses Merkmals von *formosanus* abgetrennt würde, nicht als eigene Art anerkennen kann.

Die angeführten Exemplare des DEI wurden von Bezzi als *chinensis* Bezzi bezeichnet. Wahrscheinlich ist „*formosanus*“ nur als Rasse dieser chinesischen Art zu betrachten

Kankau, IX. (DEI: 3); Pilam, VII. (DEI: 2); Yamo no Taiko (DEI: 2); Taihorinsho, XI. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 8)

Cephenius formosanus Bezzi i. l.

Cephenius Studyi Enderlein 1926, Wien. Ent. Zeit. 43, p. 75 aus S.-China ist sehr ähnlich, doch ist die gelbe Zeichnung des Mesonotum bei den formosanischen Tieren stärker ausgedehnt.

Sokutsu, VI. (DEI: 1, det. Bezzi)

Cephenius hoppo Matsumura 1916, p. 285, Taf. 8, Fig. 28¹⁾; Enderlein 1926, p. 71²⁾; Painter 1932, p. 358

Näherer Fundort unbekannt. (Arbeit nicht vorliegend).

Cephenius sauteri Enderlein 1926, p. 82¹⁾; Painter 1932, p. 359²⁾ Toyenmongai¹⁾; Koroton¹⁾

Cephenius sauteri Bezzi i. l.

C. cantonensis Enderlein 1926, Wien. Ent. Zeit. 43, p. 80 aus Südchina ist sehr ähnlich, doch merklich größer.

Tappani (DEI: 1)

[*Cephenius sikkimensis* Enderlein 1926, p. 78 führt Painter 1932, p. 359 wohl nur irrtümlich aus Formosa an].

Petrorossia fulvula Wiedemann 1821, Dipt. exot. p. 184; Bezzi 1917, p. 128¹⁾ Painter 1932, p. 360

Formosa¹⁾; Sokutsu, IX., VI. (DEI: 1 ♂, 5 ♀, det. Bezzi); Kankau, II., VI., VIII. (DEI: 9 ♂, 6 ♀); Gebiet des Shishastammes V.—VI. (DEI: 1, det. Bezzi); Koshun, VII. (DEI: 1 ♂, det. Bezzi); nördl. Paiwan-Distr., Shinsinei, 4000 ft, X. (DEI: 1 ♂); Pilam, VII. (DEI: 1 ♀)

Sonstige Verbreitung: Orient. Region

Thyridanthrax auctellus Bezzi i. l.

Kankau (DEI: 23); Tainan, V. (DEI: 5); Anping, VI. (DEI: 3)

Bombylius watanabei Matsumura 1916, p. 277, pl. 18, Fig. 20; Painter 1932, p. 354

Näherer Fundort unbekannt. (Arbeit nicht vorliegend).

Villa koshunensis Matsumura 1916, p. 283, Taf. 18, Fig. 26; Painter 1932, p. 364

Fundort offenbar: Koshun (Arbeit nicht vorliegend).

Villa limbata Coquillett 1898, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, p. 318 1); Painter 1932, p. 364

Banshoryo (Shisha) (DEI: 6, det. Bezzi); Taihorinsho, XI. (DEI: 1, det. Bezzi); Kosempo, V. (DEI: 10, det. Bezzi); Gebiet des Shishastammes V.—VI. (DEI: 1, det. Bezzi)

Sonstige Verbreitung: Japan 1)

Villa troglodyta Fabricius 1775, Syst. Ent. p. 759; Painter 1932, p. 364
Tainan, V. (DEI: 2, det. Bezzi); „Formosa“ (DEI: 13)

Sonstige Verbreitung: Indien

Villa spec.

„Formosa“ (DEI: 6)

Anthrax aygula Fabricius 1805, Syst. Antl., p. 121; 1936 Engel in Lindner, Flieg. pal. Reg. 25, p. 425, Taf. 8, Fig. 101

Pilam, VII. (DEI: 1, det. Bezzi); Hoozan (DEI: 1, det. Bezzi); Sokutsu, IX. (DEI: 2, det. Bezzi); Taihorinsho, X., XI. (DEI: 2, det. Bezzi); Koshun, XII. (DEI: 1, det. Bezzi, als „*distigma*“)

Sonstige Verbreitung: Guinea, Ägypten

Anthrax gentilis Brunetti 1909, Rec. Ind. Mus. 2, p. 449, 470, Taf. 12, Fig. 25 1); Painter 1932, p. 361

Kankau (Koshun) (DEI: 3, det. Bezzi)

Sonstige Verbreitung: Indien

Anthrax melania van der Wulp 1885, Notes Leyden Mus. 7, p. 84; Painter 1932, p. 362

Kosempo, V. (DEI: 1, det. Bezzi); Kankau, VII., IX. (DEI: 2, det. Bezzi, und 3, det. Bezzi als „*carbo*“); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. (DEI: 1, det. Bezzi und 1, det. Bezzi als „*carbo*“); Koshun, VII. (DEI: det. Bezzi als „*carbo*“); Takao (DEI: 1, det. Bezzi als „*carbo*“)

Sonstige Verbreitung: Neu-Guinea, Java

Velocia formosana Paramonow 1931, p. 195 1); Painter 1932, p. 368. Fig. 8. S.-W.-Formosa, Takao, IX. (DEI: 1 „Kotype“); Kankau (DEI: 1, det. Paramonow, als *macassarensis* Paramonow); Chipun, VII. (DEI: 1, det. Bezzi als *Audouinii* Macquart); Takao, IX., X. (DEI: 3)

Velocia orientalis Paramonow 1931, p. 198 1); Painter 1932, p. 369. Fig. 9. Kankau (Koshun) (DEI: 2, det. Paramonow + 5); Pilam, VII. (DEI: 10, det. Bezzi als *leuconoë* Jaenicke); Taihorinsho, IX. (DEI: 1, det. Bezzi als *leuconoë*); Chipun, VIII. (DEI: 4, det. Bezzi als *leuconoë*); Paroe (DEI: 1, det. Bezzi als *leuconoë*)

Sonstige Verbreitung: Japan

ab. *latipennis* Paramonow 1931, p. 199¹⁾

Macuyama V.—VI. (DEI: 1 Typus); die folgenden Exemplare des DEI sind von Bezzi teils als *chrysolampis* Jaenn., teils als *tantalus* Fabr. bestimmt worden: Takao (DEI: 1); Fuhosho, IX. (DEI: 6); Tainan (DEI: 4); „Formosa“ (DEI: 3); Yamo no Taiko (DEI: 1); Taihorinsho (DEI: 1); Kankau (Koshun) (DEI: 1)

Velocia Shirakii Paramonow 1931, p. 199¹⁾; Painter 1932, p. 369 Domon¹⁾

Velocia similis Coquillett 1898, Proc. N. S. Nat. Mus. 21, p. 338; Painter 1932, p. 369. Fig. 10.

Chipun, VII. (DEI: 2, det. Bezzi); Pilam, VII. (DEI: 2, det. Bezzi)
Sonstige Verbreitung: Japan

Superfamilie Empidioidea

Familie Empididae

Subfamilie Noezinae (Hybotinae)

Noeza bisetosa Bezzi 1904, Ann. Mus. Nat. Hung. 2, p. 324¹⁾; Bezzi 1912, p. 454²⁾; Bezzi 1914, p. 67³⁾

Tainan, X.³⁾ (DEI: 1); Chip-Chip, III.²⁾³⁾ (DEI: 1); Banshoryo (Shisha), V.—VII. (DEI: 1); Kosempo, VI.²⁾

Sonstige Verbreitung: Indien (Matheran)¹⁾

Noeza geniculata Wulp 1897, Term. Fuzetek 20, p. 137¹⁾ (*Hybos*); Bezzi 1904, Ann. Mus. Nat. Hung. 2, p. 326²⁾; de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 322³⁾; Bezzi 1912, p. 454⁴⁾; Bezzi 1914, p. 67⁵⁾; Frey 1938, p. 60⁶⁾

Toyenmongai⁴⁾; Tappani, III.⁵⁾ (DEI: 2); Taihorin, IX.⁵⁾ (DEI: 1); Gebiet des Shishastammes, V.—VI.⁵⁾; Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII.⁵⁾ (DEI: 1); Chosokei⁶⁾; Toa Tsui Kutsu V.⁶⁾ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Ceylon¹⁾²⁾, Java³⁾; Philippinen (var. *philippina* und *umbripennis*)⁶⁾

Noeza major Bezzi 1912, p. 454¹⁾; Bezzi 1914, p. 66²⁾

Kosempo, IV.—VI.¹⁾; Toyenmongai¹⁾; Sokutsu, VI.²⁾ (DEI: 2); Gebiet des Shishastammes, V.—VI.²⁾ (DEI: 1); Kankau, IX.²⁾ (DEI: 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., XI.²⁾ (DEI: 1)

Noeza plumicornis Bezzi 1914, p. 67¹⁾; Frey 1938, p. 60²⁾

Gebiet des Shishastammes, V.—VII.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Banshoryo (Shisha), VI.—VII.¹⁾²⁾ (DEI: 7 Typen + 4)

Noeza setosa de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 324¹⁾; Bezzi 1914, p. 66²⁾

Synonym:

Noeza papuana Bezzi 1912, p. 454³⁾, nec Kertész

Tappani, III.²⁾ (DEI: 1); Kosempo³⁾

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Noeza tibialis Bezzi 1912, p. 455 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 67 ²⁾

Kosempo, III.—VI. ¹⁾; Koshun, IX. ¹⁾; Kagi, VIII. ¹⁾; Sokutsu, VI. bis IX. ²⁾ (DEI: 1)

Syndyas orientalis Frey 1938, p. 61 ¹⁾

Chosokei ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Syneches bigoti Bezzi 1904, Ann. Mus. Nat. Hung. 2, p. 360 ¹⁾, nomen novum pro *Pterospylus bicolor* Bigot nec Walker, Ann. Soc. Ent. France (6) 9, p. 127, 1889 ²⁾; Brunetti 1913, Rec. Ind. Mus. 9, p. 16 ³⁾; Frey 1938, p. 57 ⁴⁾

Maruyama, IV.—VI. ⁴⁾

Sonstige Verbreitung: Hindostan ¹⁾; Assam ²⁾; Indien ³⁾; Ceylon ³⁾

Syneches (Epiceia) luctifera Bezzi 1912, p. 457, 458 ¹⁾

Kosempo, III.—IV. ¹⁾

Syneches (Syneches) praestans Bezzi 1912, p. 457, 458 ¹⁾

Toyenmongai ¹⁾; Tainan, II. ¹⁾

Syneches (Epiceia) pulla Bezzi 1912, p. 457 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 68 ²⁾

Fuhoshō, VII. ¹⁾; Koshun, IX. ¹⁾; Kankau (Koshun) ²⁾ (DEI: 8); Sokutsu ²⁾ (DEI: 3); Banshoryo (Shisha) ²⁾ (DEI: 1)

Parahybos chaetoproctus Bezzi 1907, p. 565 ¹⁾; Bezzi 1912, p. 458, 463, Fig. 1 ²⁾

Takao, VI. ¹⁾; Kosempo, VI. ²⁾; Koshun, IX. ²⁾

Parahybos chiragra Bezzi 1912, p. 458, 463, Fig. 2 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 68 ²⁾; Frey 1938, p. 57 ³⁾

Koshun, IX. ¹⁾; Sokutsu, VI.—IX. ²⁾ ³⁾ (DEI: 13); Kankau, VII. ²⁾ (DEI: 6)

Parahybos horni Frey 1938, p. 56 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Parahybos incertus Bezzi 1912, p. 458 ¹⁾; Frey 1938, p. 56 ²⁾ siehe dazu unter *orientalis*

Kosempo ¹⁾; Chip-Chip ¹⁾; Macuyama, VI. ²⁾; Koshun, V. ²⁾; Sokutsu, IX. ²⁾; Taihoku-Distr.: Jushifun, VI. ²⁾

Parahybos melas Bezzi 1912, p. 458, 461 ¹⁾

Koshun ¹⁾

Parahybos orientalis de Meijere 1907, Tijd. Ent. 50, p. 250, Taf. 6, Fig. 17 ¹⁾

Im DEI 22 von Frey 1938 determinierte Exemplare von folgenden Fundorten (es ist möglich, daß diese Exemplare, in Freys Arbeit als *incertus* genannten sind, da *orientalis* in Freys Arbeit fehlt, dafür aber *incertus*-Exemplare im DEI, dessen Material der Arbeit zugrunde lag, nicht vorhanden sind)

Maruyama; Sokutsu; Kankau; Taihoku

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Parahybos sauteri Bezzi 1912, p. 458, 464, Fig. 3 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 68, 69 ²⁾; Frey 1938, p. 57 ³⁾

Koshun ¹⁾; Kankau (Koshun), VII. 2) ³⁾ (DEI: 72); Sokutsu, VI.—IX. 2) (DEI: 7)

Parahybos simplicipes Bezzi 1912, p. 458, 461 ¹⁾; Frey 1938, p. 56 ²⁾ Toyenmongai ¹⁾; Chosokei ²⁾ (DEI: 84)

var. *minutulus* Frey 1938, p. 56 ¹⁾

Taihoku-Distr.: Jushifun ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Subfamilie *Ocydromiinae*

Bicellaria spuria Fallén 1816, Dipt. Suec. Empid. p. 33; Bezzi 1912, p. 464 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 70 ²⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾; Hoozan, III. 2) (DEI: 1); Tainan ²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis

Subfamilie *Empidinae*

Hilara melanochira Bezzi 1912, p. 474 ¹⁾

Chip-Chip, II. ¹⁾

Hilara orientalis Bezzi 1912, p. 474 ¹⁾

Chip-Chip, III. ¹⁾

Hilara unicauda Bezzi, 1914, p. 72 ¹⁾

Hoozan, III. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Empis (Coptophlebia) histrichopyga Bezzi 1912, p. 467, 469 ¹⁾

Chip-Chip, III. ¹⁾

Empis (Empis) hyalogyne Bezzi 1912, p. 468, 473 ¹⁾ (*Pterempis*); Bezzi 1914, p. 72 ²⁾

Toyenmongai ¹⁾; Polisha ¹⁾; Kosempo, IV.—V. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 4); Ban-shoryo (Shisha), VI. 2); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. 2) (DEI: 2)

Empis (Coptophlebia) inclinata Bezzi 1912, p. 468, 470 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾

Empis (Coptophlebia) patagiata Bezzi 1914, p. 71 ¹⁾

Kankau (Koshun), VI.—VII. ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Chipun, Puyuma-Distrikt VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Empis (Coptophlebia) plorans Bezzi 1912, p. 468, 470 ¹⁾

Kosempo, III. ¹⁾

Empis raptoria Bezzi 1912, p. 467, 468 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾

Empis (Coptophlebia) sauteriana Bezzi 1914, p. 70 ¹⁾

Chipun, Puyuma-Distr., VII. (DEI: 15 Typen)

Empis (Empis) scopulifera Bezzi 1912, p. 468, 472 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾

Empis (Coptophlebia) tenuinervis Bezzi 1912, p. 468, 471¹⁾

Koshun, IX.¹⁾

Empis (Coptophlebia) velutina Bezzi 1912, p. 468, 471¹⁾

Polisha, III.¹⁾

var. *cineraria* Bezzi 1914, p. 71²⁾

Sokutsu, VI.²⁾ (DEI: 10 Typen)

Rhamphomyia rostrifera Bezzi 1912, p. 465, Fig. 4¹⁾; Bezzi 1914, p. 70²⁾

Kosempo, IV.¹⁾; Chip Chip, II.¹⁾; Hoozan, II.²⁾ (DEI: 1)

Rhamphomyia sauteri Bezzi 1912, p. 466¹⁾

Toyenmongai¹⁾

Subfamilie *Hemerodromiinae*

Hemerodromia xiphias Bezzi 1914, p. 74¹⁾, (*Microdromia*)

Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII.¹⁾ (DEI: 4 Typen)

Chelipoda (Phyllodromia) fusca Bezzi 1914, p. 73¹⁾

Hoozan¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Chelipoda (Chelipoda) fuscicornis Bezzi 1912, p. 478¹⁾ (*Phyllodromia*);

Bezzi 1914, p. 74²⁾

Chip-Chip, I.¹⁾; Polisha, XII.¹⁾; Hoozan, III.²⁾; (DEI: 2)

Chelipoda (Chelipoda) fusciseta Bezzi 1912, p. 477¹⁾ (*Phyllodromia*)

Chip-Chip, I.¹⁾

Cephalodromia pictipennis Bezzi 1912, p. 476, Fig. 5¹⁾ (*Chelipoda*);

Bezzi 1914, p. 73²⁾

Koshun¹⁾; Hoozan²⁾ (DEI: 1)

Tachydromia bistigma Bezzi 1912, p. 490¹⁾ (*Tachista*); Bezzi 1914, p. 78²⁾

Tainan, IX.¹⁾ Anping, VI.²⁾ (DEI: 1)

Tachydromia connexa Meigen 1822, Syst. Besch. 3, p. 70; Bezzi 1914, p. 78¹⁾

Anping, V.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa

Micrempis fuscipes Bezzi 1912, p. 490¹⁾ (*Halsanalotes*)

Takao, V.¹⁾

Drapetis (Eudrapetis) aenescens Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 649; Bezzi 1912, p. 479, 482¹⁾; Bezzi 1914, p. 75²⁾

Tainan, II. — V.¹⁾ (DEI: 2); Takao, VI.¹⁾; Anping, V.²⁾ (DEI: 37); Chipun, VII.²⁾ (DEI: 21)

Sonstige Verbreitung: In der ganzen alten Welt verbreitet¹⁾

Drapetis (Eudrapetis) brevicula Melander 1927, Gen. Ins. 185, p. 310, nom. nov. pro *brevis* Bezzi nec Meunier

Synonym: *brevis* Bezzi 1912, p. 480, 483¹⁾

Takao, IV.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Parahybos sauteri Bezzi 1912, p. 458, 464, Fig. 3 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 68, 69 ²⁾; Frey 1938, p. 57 ³⁾

Koshun ¹⁾; Kankau (Koshun), VII. 2) ³⁾ (DEI: 72); Sokutsu, VI.—IX. 2) (DEI: 7)

Parahybos simplicipes Bezzi 1912, p. 458, 461 ¹⁾; Frey 1938, p. 56 ²⁾ Toyenmongai ¹⁾; Chosokei ²⁾ (DEI: 84)

var. *minutulus* Frey 1938, p. 56 ¹⁾

Taihoku-Distr.: Jushifun ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Subfamilie *Ocydromiinae*

Bicellaria spuria Fallén 1816, Dipt. Suec. Empid. p. 33; Bezzi 1912, p. 464 ¹⁾; Bezzi 1914, p. 70 ²⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾; Hoozan, III. 2) (DEI: 1); Tainan ²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis

Subfamilie *Empidinae*

Hilara melanochira Bezzi 1912, p. 474 ¹⁾

Chip-Chip, II. ¹⁾

Hilara orientalis Bezzi 1912, p. 474 ¹⁾

Chip-Chip, III. ¹⁾

Hilara unicauda Bezzi, 1914, p. 72 ¹⁾

Hoozan, III. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Empis (Coptophlebia) histrichopyga Bezzi 1912, p. 467, 469 ¹⁾

Chip-Chip, III. ¹⁾

Empis (Empis) hyalogyne Bezzi 1912, p. 468, 473 ¹⁾ (*Pterempis*); Bezzi 1914, p. 72 ²⁾

Toyenmongai ¹⁾; Polisha ¹⁾; Kosempo, IV.—V. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 4); Ban-shoryo (Shisha), VI. ²⁾; Gebiet des Shishastammes, V.—VI. ²⁾ (DEI: 2)

Empis (Coptophlebia) inclinata Bezzi 1912, p. 468, 470 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾

Empis (Coptophlebia) patagiata Bezzi 1914, p. 71 ¹⁾

Kankau (Koshun), VI.—VII. ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Chipun, Puyuma-Distrikt VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Empis (Coptophlebia) plorans Bezzi 1912, p. 468, 470 ¹⁾

Kosempo, III. ¹⁾

Empis raptoria Bezzi 1912, p. 467, 468 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾

Empis (Coptophlebia) sauteriana Bezzi 1914, p. 70 ¹⁾

Chipun, Puyuma-Distr., VII. (DEI: 15 Typen)

Empis (Empis) scopulifera Bezzi 1912, p. 468, 472 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾

Empis (Coptophlebia) tenuinervis Bezzi 1912, p. 468, 471¹⁾

Koshun, IX.¹⁾

Empis (Coptophlebia) velutina Bezzi 1912, p. 468, 471¹⁾

Polisha, III.¹⁾

var. *cineraria* Bezzi 1914, p. 71²⁾

Sokutsu, VI.²⁾ (DEI: 10 Typen)

Rhamphomyia rostrifera Bezzi 1912, p. 465, Fig. 4¹⁾; Bezzi 1914, p. 70²⁾

Kosempo, IV.¹⁾; Chip Chip, II.¹⁾; Hoozan, II.²⁾ (DEI: 1)

Rhamphomyia sauteri Bezzi 1912, p. 466¹⁾

Toyenmongai¹⁾

Subfamilie *Hemerodromiinae*

Hemerodromia xiphias Bezzi 1914, p. 74¹⁾, (*Microdromia*)

Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII.¹⁾ (DEI: 4 Typen)

Chelipoda (Phyllodromia) fusca Bezzi 1914, p. 73¹⁾

Hoozan¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Chelipoda (Chelipoda) fuscicornis Bezzi 1912, p. 478¹⁾ (*Phyllodromia*);

Bezzi 1914, p. 74²⁾

Chip-Chip, I.¹⁾; Polisha, XII.¹⁾; Hoozan, III.²⁾; (DEI: 2)

Chelipoda (Chelipoda) fusciseta Bezzi 1912, p. 477¹⁾ (*Phyllodromia*)

Chip-Chip, I.¹⁾

Cephalodromia pictipennis Bezzi 1912, p. 476, Fig. 5¹⁾ (*Chelipoda*);

Bezzi 1914, p. 73²⁾

Koshun¹⁾; Hoozan²⁾ (DEI: 1)

Tachydromia bistigma Bezzi 1912, p. 490¹⁾ (*Tachista*); Bezzi 1914,

p. 78²⁾

Tainan, IX.¹⁾ Anping, VI.²⁾ (DEI: 1)

Tachydromia connexa Meigen 1822, Syst. Besch. 3, p. 70; Bezzi 1914,

p. 78¹⁾

Anping, V.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa

Micrempis fuscipes Bezzi 1912, p. 490¹⁾ (*Halsanalotes*)

Takao, V.¹⁾

Drapetis (Eudrapetis) aenescens Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2,

p. 649; Bezzi 1912, p. 479, 482¹⁾; Bezzi 1914, p. 75²⁾

Tainan, II. — V.¹⁾ (DEI: 2); Takao, VI.¹⁾; Anping, V.²⁾ (DEI: 37);

Chipun, VII.²⁾ (DEI: 21)

Sonstige Verbreitung: In der ganzen alten Welt verbreitet¹⁾

Drapetis (Eudrapetis) brevicula Melander 1927, Gen. Ins. 185, p. 310,

nom. nov. pro *brevis* Bezzi nec Meunier

Synonym: *brevis* Bezzi 1912, p. 480, 483¹⁾

Takao, IV.¹⁾

- Drapetis (Elaphropeza) calcarifera* Bezzi 1907, p. 567, 569¹⁾; Bezzi 1912, p. 481, 488¹⁾; Bezzi 1914, p. 77³⁾
Takao, III., X. 1)²⁾; Anping, II.—V.³⁾ (DEI: 19); Tainan, III.—X.³⁾ (DEI: 3)
- [*Drapetis (Drapetis) fascifemorata* Brunetti 1913, Rec. Ind. Mus. 9, p. 38¹⁾
Diese aus Darjiling beschriebene Art wird von Melander 1927, Gen. Ins. 185, p. 308, irrtümlich aus Formosa angegeben]
- Drapetis (Drapetis) femorata* Melander 1918, Ann. Ent. Soc. Amer. 11, p. 215, nom. nov. pro *femoralis* Bezzi nec Wheeler & Melander
Synonym: *femoralis* Bezzi 1912, p. 480, 483¹⁾
Kosempo, VI.¹⁾
- Drapetis (Elaphropeza) formosae* Bezzi 1907, p. 566¹⁾; Bezzi 1912, p. 480, 487²⁾; Bezzi 1914, p. 77³⁾
Takao 800 m, III.¹⁾, IV.²⁾; Tainan, II., V.²⁾³⁾ (DEI: 1); Anping, VI.³⁾ (DEI: 1); Polisha, XII.²⁾
- [*Drapetis (Ctenodrapetis) hamifera* Bezzi 1912, p. 479, 485
Diese aus Neuguinea beschriebene Art wird von Melander 1927, Gen. Ins. 185, p. 312, fälschlich aus Formosa angegeben]
- Drapetis (Elaphropeza) Kertész* Bezzi 1912, p. 481, 486¹⁾; Bezzi 1914, p. 77²⁾; de Meijere 1914, Tijds. Ent. 56, Suppl. p. 74³⁾
Chip-Chip, I.¹⁾; Tainan, IX.²⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: fraglich Java³⁾
- Drapetis (Elaphropeza) lanuginosa* Bezzi 1914, p. 74¹⁾
Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Drapetis (Elaphropeza) marginalis* Bezzi 1912, p. 481, 489¹⁾
Tainan, IV.¹⁾
- Drapetis (Elaphropeza) melanura* Bezzi 1912, p. 481, 489¹⁾; Bezzi 1914, p. 78²⁾
Takao, V.¹⁾; Tainan, II.—X.¹⁾²⁾ (DEI: 13); Anping, VI.²⁾ (DEI: 5); Chipun, VII.²⁾ (DEI: 1)
- Drapetis (Elaphropeza) pictithorax* Bezzi 1912, p. 482, 486¹⁾
Toyenmongai¹⁾
- Drapetis (Eudrapetis) pubicornis* Bezzi 1912, p. 479, 482¹⁾; Bezzi 1914, p. 75²⁾
Polisha, XII.¹⁾; Chip-Chip, I.¹⁾; Koshun, X.¹⁾; Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII.²⁾ (DEI: 1)
- Drapetis (Elaphropeza) scutellaris* Bezzi 1912, p. 481, 482, 487¹⁾; Bezzi 1914, p. 77²⁾
Chip-Chip, II.¹⁾²⁾ (DEI: 2); Tainan, II.—III.¹⁾²⁾ (DEI: 29); Takao, X.¹⁾; Anping, VI.²⁾ (DEI: 1).

- Drapetis (Elaphropeza) xanthocephala* Bezzi 1912, p. 481, 488 ¹⁾
 Takao, V. ¹⁾
- Platypalpus albiseta* Panzer 1806, Fauna Ins. Germ. 103, Taf. 17; Bezzi 1912, p. 492 ¹⁾ (*Coryneta*)
 Chip-Chip, II. ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Europa, Kaukasus, Nordafrika
- Platypalpus candidiseta* Bezzi 1912, p. 492 ¹⁾, (*Coryneta*)
 Toyenmongai ¹⁾; Koshun, X. ¹⁾; Polisha, XII. ¹⁾; Kosempo, XI. ¹⁾
- Platypalpus longirostris* Bezzi 1912, p. 491 ¹⁾ (*Coryneta*)
 Toyenmongai ¹⁾
 var. *xanthopus* Bezzi 1914, p. 78 ¹⁾
 Kosempo, V. (DEI: 1 Typus)

Familie Dolichopodidae

Subfamilie Dolichopodinae

- Tachytrechus genualis* Loew 1857, Zeitschr. ges. Naturwiss. 10, p. 102, Becker 1922, p. 32 ¹⁾
 Formosa, Koshun ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Ganz Mitteleuropa und Asien ¹⁾
- Tachytrechus salinaris* Becker 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 63; Becker 1922, p. 32 ¹⁾; Parent 1932, p. 239 ²⁾
 Polisha, III. ¹⁾; Takao ¹⁾ (DEI: 2); Tainan ¹⁾ (DEI: 3); Kankau ²⁾ (DEI: 3); Sokutsu, IX. (DEI: 1, det. Parent); „Formosa“ (DEI: 4, det. Parent)
 Sonstige Verbreitung: Ägypten, Bombay, Westbengalen ¹⁾
- Pelastoneurus bifarius* Becker 1922, p. 17, Fig. 6 ¹⁾
 Takao ¹⁾; Kosempo, V. ¹⁾
- Pelastoneurus intactus* Becker 1922, p. 18 ¹⁾
 Koshun ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Takao ¹⁾; Kankau ¹⁾
- Paraclius adligatus* Becker 1922, p. 13 ¹⁾; Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 15 ²⁾
 Takao ¹⁾; Chip-Chip, III. ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Assam ¹⁾; N.-Palawan ²⁾
- Paraclius interductus* Becker 1922, p. 15 ¹⁾
 Takao ¹⁾
- Paraclius luculentus* Parent 1932, p. 238, Fig. 18, 19 ¹⁾
 Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Paraclius maculatus* de Meijere 1916, Tijd. Ent. 59, p. 232 ¹⁾; Becker 1922, p. 15, Fig. 5 ²⁾
 Takao ²⁾; Yentempo ²⁾
 Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾
- Paraclius nudus* Becker 1922, p. 14 ¹⁾

Sokutsu¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1, det. Parent)

Sonstige Verbreitung: Helvak, Kogna-Tal, Satarodistrikt¹⁾ (wohl Indien)

Paraclius pilosellus Becker 1922, p. 14, Fig. 3¹⁾; Becker 1924, p. 121²⁾;

Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 26³⁾; Parent 1932, p. 239⁴⁾

Kankau^{1) 2)} (DEI: 1 Typus); Tapani¹⁾ (DEI: 1 Typus); Hoozan¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihorin¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Madha, Yenna-Tal, Sataro-Distr.¹⁾ (offenbar Indien); ? Luzon³⁾

Hercostomus albidipes Becker 1922, p. 25, Fig. 10—12¹⁾

Chip-Chip¹⁾

Hercostomus blandulus Parent 1932, p. 237, Fig. 16, 17¹⁾

„Formosa“ (DEI: 3 Typen)

Hercostomus congruens Becker 1922, p. 29¹⁾; Parent 1932, p. 238²⁾

Synonym: *Hercostomus aërosus* Becker nec Fallén 1924, p. 120³⁾

Die von Becker 1924 als *aërosus* gemeldeten Tiere sind *congruens*.

Zur Unterscheidung beider Arten vergleiche Fig. 11 mit Fig. 12.

Chosokei³⁾ (DEI: 25); Paroe³⁾; Maruyama, VI. 1)³⁾ (DEI: 1 Typus

+ 6); Hokuto, XII. (DEI: 1); Tainan²⁾ (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu,

V. 1) (DEI: 3 Typen + 1)

Hercostomus gregalis Becker 1922, p. 29¹⁾

Toyenmongai¹⁾; Chip-Chip¹⁾

Hercostomus inclusus Becker 1922, p. 24¹⁾

Tappani¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku¹⁾

Hercostomus incrassatus Becker 1922, p. 25, Fig. 13, 14¹⁾

Chip-Chip, III. 1)

Hercostomus lucidiventris Becker 1922, p. 24¹⁾

Kosempo, VI. 1)

Hercostomus lunulatus Becker 1922, p. 30¹⁾

Kosempo¹⁾; Toyenmongai¹⁾

Hercostomus notatus Becker, 1922, p. 28, Fig. 18¹⁾

Takao, V. 1); Chip-Chip, III. 1); Anping, V. 1) (DEI: 1 Typus)

Hercostomus ovatus Becker 1922, p. 24¹⁾

Sokutsu, V. 1)

Hercostomus porrectus Becker 1922, p. 23¹⁾

Kosempo, V. 1)

Hercostomus promotus Becker 1922, p. 23, Fig. 8¹⁾; Becker 1924, p. 120²⁾

Kankau, V. 1)²⁾ (DEI: 2); Kosempo¹⁾; Sokotsu¹⁾

Sonstige Verbreitung: Indien¹⁾

Hercostomus regularis Becker 1922, p. 28¹⁾

Yentempo¹⁾; Takao¹⁾; Anping¹⁾; Kankau¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu¹⁾

Hercostomus sequens Becker 1922, p. 29¹⁾

Chip-Chip, III.¹⁾

Hercostomus sodalis Becker 1922, p. 26, Fig. 25¹⁾

Chip-Chip¹⁾

Hercostomus spec.

DEI (det. Becker): Maruyama 2 ♀, Chosokei 1 ♀, Tapani 1 ♀

Dolichopus angustinervis Becker 1922, p. 9, Fig. 2¹⁾; Becker 1924, p. 120²⁾

Berg Hoozan, Tachorin¹⁾; Chosokei¹⁾ (DEI: 4); Macuyama, V. (DEI: 2, det. Becker); Tappani (DEI: 1, det. Becker); Taihoku-Distr., Okaseki VI. (DEI: 1, det. Parent)

Sonstige Verbreitung: Assam, Darjiling¹⁾

Dolichopus zickzack Wiedemann 1824, Anal. Ent. 40; Becker 1922, p. 8, Fig. 1¹⁾; Becker 1924, p. 120²⁾; Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 25³⁾; Parent 1932, p. 237⁴⁾

Synonym:

Lichtwardtia formosana Enderlein 1912, p. 407⁵⁾

Sokutsu¹⁾; Kosempo¹⁾ (DEI: 2); Kankau^{1) 2) 4)} (DEI: 7); Chip-Chip¹⁾; Paroe²⁾ (DEI: 10); Takao⁵⁾

Sonstige Verbreitung: Ostindien, Singapore, Java, Ceylon, Burma, Assam, Bismarck-Archipel¹⁾; Philippinen³⁾

Subfamilie *Hydrophorinae*

Phalacrosona amoenum Becker 1922, p. 45, Fig. 34—37¹⁾

Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Phalacrosona imperfectum Becker 1922, p. 46, Fig. 38¹⁾

Berg Hoozan, VIII.¹⁾; Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus, nur Thorax)
Sonstige Verbreitung: Indien¹⁾

Paralleloneurum cilifemoratum Becker 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2 p. 51; Becker 1922, p. 43¹⁾

Tainan, II.¹⁾ (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Ägypten, Kalkutta, Bengalen¹⁾

Liancalus benedictus Becker 1922, p. 41, Fig. 30¹⁾

Tainan, III.¹⁾; Mt. Hoozan, VIII.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Hydrophorus grisellus Becker 1922, p. 40, Fig. 29¹⁾

Anping, IV., V.¹⁾

Hydrophorus praecox Wiedemann in Lehmann 1822, Indic. Schol. Hamburg 42; Becker 1922, p. 41¹⁾

Tainan, II.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Europa, N.- u. S.-Afrika, Indien, Suezkanal¹⁾

- Hypocharassus farinosus* Becker 1922, p. 44, Fig. 32, 33¹⁾
 Tainan, X.¹⁾
- Thinophilus diminutus* Becker 1922, p. 36, Fig. 24, 25¹⁾; Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 24²⁾
 Takao, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tainan, II.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kanchirei, IV.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Indien (Gangesdelta)¹⁾; Manila²⁾
- Thinophilus formosinus* Becker 1922, p. 34¹⁾; Parent 1932, p. 239²⁾
 Tainan¹⁾; Anping, V.¹⁾; „Formose“²⁾ (DEI: Anping, V.: 3, det. Parent)
- Thinophilus indigenus* Becker 1902, Mitt. zool. Mus. Berlin, 2, p. 48; Becker 1922, p. 37, Fig. 27¹⁾; Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 24²⁾
 Tainan¹⁾; Takao¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Ägypten, Philippinen²⁾
- Thinophilus insertus* Becker 1922, p. 38, Fig. 28¹⁾
 Anping, V.¹⁾
- Thinophilus integer* Becker 1922, p. 37¹⁾
 Anping, IV.¹⁾
- Thinophilus seticoxis* Becker 1922, p. 36, Fig. 26¹⁾; Parent 1932, p. 239²⁾
 Kankau, IV.¹⁾; Tainan¹⁾ (DEI: 1 Typus); „Formose“²⁾ (DEI: Kankau: 3, det. Parent)
- Thinophilus tessellatus* Becker 1922, p. 35, Fig. 22, 23¹⁾; Frey 1925 Not. Ent. 5, p. 24²⁾
 Tainan, IV.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Bengalen¹⁾; Philippinen²⁾

Subfamilie *Medeterinae*

- Thrypticus abditus* Becker 1922, p. 54¹⁾
 Tainan, II.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Australien (N.-S.-Wales)¹⁾
- Medetera grisescens* de Meijere 1916, Tijd. Ent. 59, p. 259; Becker 1922, p. 50, Fig. 39¹⁾; Becker 1924, p. 121²⁾
 Anping¹⁾ (DEI: 1); Tainan¹⁾ (DEI: 3); Takao, IV.¹⁾; Taihoku²⁾
 Taihoku-Distr., Maruyama, 500 ft, (DEI: 5)
 Sonstige Verbreitung: Java, Indien, Assam¹⁾
- Medetera longicauda* Becker 1922, p. 50¹⁾
 Kankau¹⁾
- Medetera vivida* Becker 1922, p. 51¹⁾
 Hoozan¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Medetera* spec.
 DEI: Maruyama, IV.: 1 det. Becker

Subfamilie *Rhaphiinae*

- Porphyrops eburnea* Parent 1927, Enc. Ent. B II Dipt. 3, p. 139 ¹⁾;
 Parent 1932, p. 240 ²⁾
 nach Parent (1932) vielleicht Synonym zu *mediocris* Becker
 Hokuto ²⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: China ¹⁾
- Porphyrops mediocris* Becker 1922, p. 59 ¹⁾
 Taihoku, V., XI. ¹⁾; Kankau, IV. ¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 1, det. Becker)
- Porphyrops popularis* Becker 1922, p. 60 ¹⁾; Becker 1924, p. 121 ²⁾
 Taihorin ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Hokuto ¹⁾; Hoozan, XII. ¹⁾ (DEI: 2);
 Taihoku ²⁾ (DEI: 2); Chosokei ²⁾ (DEI: 5)
- Porphyrops relatus* Becker 1922, p. 59 ¹⁾
 Berg Hoozan, VIII. ¹⁾
- Syntormon detritus* Becker 1922, p. 57 ¹⁾
 Toa Tsui Kutsu ¹⁾
- Syntormon exceptus* Becker 1922, p. 56 ¹⁾
 Chip-Chip ¹⁾
- Syntormon flexibilis* Becker 1922, p. 55. Fig. 42 ¹⁾; Becker 1924, p. 121 ²⁾;
 Parent 1932, p. 240 ³⁾
 Taihoku ¹⁾ ²⁾ ³⁾ (DEI: 11); Anping, IV., V. ¹⁾; Tainan, II. ¹⁾
- Syntormon spec.* Becker 1922, p. 57 ¹⁾
 ohne Fundort ¹⁾
- Mastigomyia gratiosa* Becker 1924, p. 122 ¹⁾
 Daitotei ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Subfamilie *Neurogoninae*

- Neurogona composita* Becker 1922, p. 63, Fig. 45 ¹⁾
 Kosempo, III. ¹⁾; Fuhosho ¹⁾; Kankau ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Neurogona denudata* Becker 1922, p. 62 ¹⁾; Becker 1924, p. 122 ²⁾
 Kankau ¹⁾ ²⁾ (DEI: 3); Tainan ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Pilan, II. ¹⁾; Koshun,
 III. ¹⁾; Maruyama, IV. (DEI: 1, det. Becker)
 Sonstige Verbreitung: Kalkutta, Assam, Ceylon, Australien (Ku-
 randa) ¹⁾
- Neurogona exemta* Becker 1922, p. 64 ¹⁾; Becker 1924, p. 122 ²⁾;
 Parent 1932, p. 239 ³⁾
 Kankau ¹⁾ ²⁾ (DEI: 20); Tainan ¹⁾; Paroe ¹⁾ (DEI: 1, det. Parent)
 Sonstige Verbreitung: Ceylon ¹⁾
- Neurogona gemina* Becker 1922, p. 63, Fig. 46, 47 ¹⁾
 Sokotsu, V. ¹⁾
- Neurogona pectinata* Becker 1922, p. 64 ¹⁾
 Tainan, IV. ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Kankau ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: N.-Bengalen ¹⁾; Kalkutta ¹⁾

Neurogona spec. nov. Becker 1922, p. 65 ¹⁾

Kankau, IV. ¹⁾

Subfamilie *Diaphorinae*

Trigonocera lucidiventris Becker 1922, p. 91 ¹⁾

Sokutsu, V. ¹⁾; Kosempo, V. ¹⁾

*Trigonocera rivos*a Becker 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 57; Becker 1922, p. 92 ¹⁾

Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Ägypten ¹⁾

Chrysotus albisignatus Becker 1924, p. 123 ¹⁾

Otago ¹⁾

Chrysotus asiduus Becker 1922, p. 89 ¹⁾

Taihoku, IV. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Australien (N.-S.-Wales); Neuguinea ¹⁾

Chrysotus degener Becker 1922, p. 87 ¹⁾

Taihoku (Polisha), IV. ¹⁾; Daitotei (DEI: 3); Tainan (DEI: 3); Anping (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Ceylon ¹⁾; Indien (Kalkutta, Matheran) ¹⁾

Chrysotus discretus Becker 1922, p. 89 ¹⁾; Becker 1924, p. 124 ²⁾

Daitotei ²⁾

Sonstige Verbreitung: Umgebung Kalkutta ¹⁾

Chrysotus excretus Becker 1922, p. 87 ¹⁾; Frey 1925, p. 23 ²⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 2); Suisharyo ¹⁾; Tainan ¹⁾; Maruyama, IV. (DEI: 1, det. Becker); Daitotei V.—VI. (DEI: 1, det. Becker); Hokuto, XII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea ¹⁾; Philippinen ²⁾

Chrysotus gratiosus Becker 1922, p. 86 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Kalkutta ¹⁾

Chrysotus hawaiiensis Grimshaw 1870, Fauna Hawaiiensis 4, p. 116 ¹⁾;

Becker 1922, p. 87; Becker 1924, p. 124 ²⁾

Maruyama ¹⁾ (DEI: 2); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X. (DEI: 1, det. Becker)

Sonstige Verbreitung: Hawaii ¹⁾

Chrysotus javanensis de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 238 ¹⁾; Becker 1922, p. 86 ²⁾

Takao, IV. ²⁾; Tainan, IX. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Chrysotus incumbens Becker 1924, p. 123 ¹⁾

Maruyama ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Chrysotus lividiventris Becker 1924, p. 123 1)

Chosokei 1) (DEI: 3 Typen); Kankau 1) (DEI: 1 Typus)

Chrysotus mobilis Becker 1924, p. 124 1)

ohne Fundortsangabe 1); Maruyama, IV., XII. (DEI: 2 Typen)

Chrysotus varians Kowarz, 1874, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 24, p. 471 1);

Becker 1918, Nova Acta Ak. Nat. Halle 104, p. 60 2)

Maruyama (DEI: 3); Chosokei (DEI: 3); Daitotei (DEI: 2)

Exemplare des DEI: det. Becker.

Sonstige Verbreitung: Mittel- u. Südeuropa 2)

Chrysotus spec.

Chosokei (DEI: 3, det. Becker); Taihoku (DEI: 2, det. Becker)

Asyndetus calcaratus Becker 1922, p. 84 1)

Anping, V. 1)

Asyndetus latifrons Loew 1857, Neue Beiträge 5, p. 46; Becker 1922, p. 86 1); Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 24 2)

Chipun, VI. 1) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien 1); Zentraleuropa 1); Philippinen 2)

Asyndetus mutatus Becker 1922, p. 84 1)

Tainan, V. 1)

Diaphorus aptatus Becker 1922, p. 73 1); Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 23 u, 1928, l. c. p. 21 2)

Kankau, Koshun, V. 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen 2); Kalkutta 1)

Diaphorus condiguus Becker 1922, p. 74 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1)

Diaphorus impiger Becker 1922, p. 73 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1)

Diaphorus mandarinus Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 212 1); Becker 1922, p. 78 2)

Takao, IV., XII. 2); Tainan, II. 2) (DEI: 2); Akau, S.-W.-Formosa (DEI: 1, det. Parent)

Sonstige Verbreitung: China 1); Indien 2); Philippinen, Java 2)

Diaphorus ochripes Becker 1924, p. 122 1); Parent 1932, p. 237 2)

Syn. *luteipennis* Parent 1926, C. R. Congr. Soc. Sav. Paris, p. 473

1) ohne Fundortsangaben; Taihoku (DEI: 2 Typen), Kankau, IV. (DEI: 2 Typen); Chosokei (DEI: 1 Typus); Tainan 2) (DEI: 6)

Diaphorus minor de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 241; Becker 1922, p. 77 1); Becker 1924, p. 123 2)

Toa Tsui Kutsu, V. 1); Chosokei 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Darjiling, Neuguinea, Australien 1)

Diaphorus protervus Becker 1922, p. 76 1)

Tainan, IV. 1); Toa Tsui Kutsu, V. 1)

Sonstige Verbreitung: Kalkutta ¹⁾

Diaphorus satellus Becker 1922, p. 76 ¹⁾; Parent 1932, p. 237 ²⁾
Kankau, IX. ¹⁾; Sokutsu, V. ¹⁾; „Formosa“ ²⁾ (DEI: 1)

Diaphorus sequens Becker 1922, p. 81 ¹⁾
Sokutsu, V. ¹⁾

Diaphorus similans Becker 1922, p. 77 ¹⁾; Parent 1932, p. 237 ²⁾
Tainan, V. ¹⁾ (DEI: 5 det. Parent); „Formosa“ ²⁾
Sonstige Verbreitung: Indien (Colombo) ¹⁾

Subfamilie *Campsicneminae*

Pycsymnus apicalis de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 251; Becker 1922, p. 96 ¹⁾ (*Sympycnus*); Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 21 und 1928, l. c., 8, p. 19 ²⁾

Kankau, IX. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾; Philippinen ²⁾

Pycsymnus argentipes de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 247 ¹⁾; Becker 1922, p. 102 ²⁾ (*Sympycnus*)
Chip-Chip, II. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Pycsymnus bisulcus Becker 1922, p. 95 ¹⁾ (*Sympycnus*); Frey 1928, Not. Ent. 8, p. 20 ²⁾; Parent 1932, p. 230 ³⁾

Sokutsu, V. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ ³⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Luzon ²⁾

Pycsymnus formosinus Becker 1922, p. 99 ¹⁾ (*Sympycnus*); Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 22 ²⁾

Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: N.-Palawan ²⁾; Luzon ²⁾

Pycsymnus laetus Becker 1922, p. 94, Fig. 42 ¹⁾ (*Sympycnus*); Frey 1928, Not. Ent. 8, p. 20 ²⁾; Parent 1932, p. 230 ³⁾

Kosempo, IX. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu ³⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Luzon ²⁾; Neuguinea ¹⁾; Singapore ¹⁾

Pycsymnus luteo-viridis Parent 1932, p. 230, Fig. 6, 7 ¹⁾

Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Pycsymnus maculatus Parent 1932, p. 231, Fig. 8—10 ¹⁾

Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distrikt (DEI: 1, det. Parent)

Pycsymnus nodicornis Becker 1922, p. 100 ¹⁾ (*Sympycnus*)

Takao, XII. ¹⁾; Tainan, V. ¹⁾

Pycsymnus nudus Becker 1922, p. 104 ¹⁾ (*Sympycnus*)

Formosa, II. ¹⁾

Pycsymnus residuus Becker 1922, p. 104 ¹⁾ (*Sympycnus*); Frey 1928, Not. Ent. 8, p. 20 ²⁾

Polisha, XII. 1); Tainan, VII. 1)

Sonstige Verbreitung: Luzon 2)

Pycsymnus rutilus Becker 1922, p. 98 1) (*Sympycnus*)

Chip-Chip, II. 1); Sokotsu, V. 1); Taihorin, VII. 1); Chosokei (DEI: 1, det. Parent)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea 1)

Pycsymnus scutatus de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 248; Becker 1922, p. 97 1)

Nach Becker wohl Synonym (♀) zu *apicalis*

Kankau, VII., IX. 1); Hoozan 1); Toa Tsui Kutsu (DEI: 1, det. Becker)

Sonstige Verbreitung: Java 1)

Pycsymnus tener Becker 1922, p. 103, Fig. 60, 61 1) (*Sympycnus*)

Tainan 1) (DEI: 1 als Typus bezeichnetes Exemplar)

Pycsymnus triplex Becker 1922, p. 102, Fig. 56, 59 1) (*Sympycnus*)

Kosempo, VI. 1); Kankau, VIII. 1)

Hadrosceles semicinctus Becker 1922, p. 113, Fig. 63, 64 1)

Anping, IV. 1)

Campsicnemus intermittens Becker 1924, p. 125 1)

Paroe, nördl. Paiwan-Distr. 1)

Campsicnemus glaucus Becker 1924, p. 126 1)

Paroe, nördl. Paiwan-Distr. 1) (DEI: 5 Typen)

Campsicnemus lucidus Becker 1924, p. 125 1)

Paroe 1) (DEI: 9 Typen); Maruyama (DEI: 2, det. Becker, und als Typen bezeichnet)

Campsicnemus maculatus Becker 1924, p. 124 1)

Taihoku 1) (DEI: 3); Daitotei (DEI: 1, det. Becker, als Typus bezeichnet)

Campsicnemus obscuratus Becker 1924, p. 127 1)

Paroe 1) (DEI: 1 Typus)

Campsicnemus spec.

Chosokei (DEI: 1, det. Becker)

Subfamilie *Chrysosomatinae*

Sciopus aequalis Becker 1922, p. 202 1); Parent 1928, p. 191 2)

Anping, IV. 1); Takao, V., XI. 1) 2)

Sciopus arctus Becker 1922, p. 197, Fig. 170 1)

Takao 300 m, IV. 1); Suisharyo, X. 1)

Sciopus aurichalceus Becker 1922, p. 198 2)

Koshun, IX. 1)

Sciopus interdictus Becker 1922, p. 201, Fig. 175, 176 1); Becker 1924, p. 131 2)

Maruyama 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Bombay

Sciopus latitarsis Becker 1922, p. 210, Fig. 194, 195 1)

Suisharyo, X. 1)

Sciopus mutatus Becker 1922, p. 200, Fig. 174 1)

Tainan, VI. 1)

Sciopus piger Becker 1922, p. 199 1)

Kankau, VIII. 1)

Sciopus rectus Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 225 1); Becker 1922, p. 206 2); Frey 1925, p. 18 3) (*Psilopus*)

Takao 2); Kankau 2) (DEI: 1, det. Parent); Tainan 2); Suisharyo 2)

Sonstige Verbreitung: Sumatra 1); Krakatau 2); Philippinen 3); Neuguinea 2)

Sciopus subtilis Becker 1924, p. 130 1)

Maruyama 1) (DEI: 3 Typen)

Sciopus tardus Becker 1922, p. 198 1)

Kankau, IV. 1); Tainan 1); Taihoku 1)

Condyllostylus beckeri Frey 1925, Notulae Ent. 5, p. 19 1), nom. nov. pro *vigilans* Becker 1922 nec Becker 1921;

Synonym: *vigilans* Becker 1922, p. 213, 214 2) nec *vigilans* Becker 1921 Taihorin, VII. 2); Koshun, X. 2); Toyenmongai 2); Tainan 2); Kankau 2); Toa Tsui Kutsu 2)

Sonstige Verbreitung: Darjiling 1); Philippinen 2)

Condyllostylus fenestratus Wulp 1891, Tijd. Ent. 34, p. 200, Taf. 12, Fig. 6 bis 7 1); Becker 1922, p. 224, Fig. 210 2); Parent 1928, p. 194 3); Parent 1932, p. 233 4)

Kosempo, II., III., IX. 2) 3); Taihorin 2); Toyenmongai 2); Sokutsu 2); Tainan 4) (DEI: 12); „Formosa“ (DEI: 24)

Sonstige Verbreitung: Java 1)

Condyllostylus filiformis Becker 1921, Abh. zool. bot. Ges. Wien 13, p. 298, Fig. 112, 113 1); Becker 1924, p. 130 2)

ohne Fundortangabe 2) (DEI: 2, det. Becker von Kankau)

Sonstige Verbreitung: Peru, Bolivien 1)

Condyllostylus luteicoxa Parent 1929, Ann. Soc. Sci. Brux. (B) 49, p. 225 1); Parent 1932, p. 233 2)

Kankau 2) (DEI: 9); Tainan (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Assam 1)

Condyllostylus ornatipennis de Meijere 1910, Tijd. Ent. 53, p. 86, Taf. 5, Fig. 16, 17 1); Becker 1922, p. 221, Fig. 205 2)

Koshun, III. 2); Tainan 2); Kankau 2); Chosokei (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java 1)

Condyllostylus striatipennis Becker 1922, p. 223, Fig. 208 1)

Kosempo, III. 1)

- Condyllostylus terminalis* Becker 1922, p. 227, Fig. 255 1); Parent 1928, p. 194; Parent 1932, p. 234 2)
 Toyenmongai 1); Tapani, III. 1); Taihorinsho, VIII. 1); Kosempo, VI. 1);
 Fuhosho, VII. 1); Tainan 2) (DEI: 4)
- Megistostylus longicornis* Fabricius 1775, Syst. Ent. p. 783 1); Becker 1922, p. 230 2); Becker 1924, p. 130 3)
 Suisharyo 2); Tainan 2); Kankau 2) 3) (DEI: 60); Koshun (DEI: 5)
 Sonstige Verbreitung: Antillen 1); Brasilien 2); orientalische und neotropische Region 2)
- Mesorhaga dispar* Becker 1922, p. 232 1)
 Takao, VI. 1); Amping 1); Tainan, V. 1) (DEI: 1 Typus)
- Mesorhaga septima* Becker 1922, p. 234, Fig. 221 1)
 Tainan, IV. 1)
- Mesorhaga stylata* Becker 1922, p. 235, Fig. 218, 219 1)
 Tainan, V. 1)
 Sonstige Verbreitung: Philippinen (var. *halteralis* Frey 1925, Not. Ent. 5, p. 19)
- Chrysosoma apicatum* Becker 1922, p. 151, Fig. 91 1)
 Kankau, IX. 1)
- Chrysosoma elongatum* Becker 1922, p. 153, Fig. 94 1)
 Toyenmongai 1); Sokotsu 1); Toa Tsui Kutsu 1); Kosempo 1)
 Sonstige Verbreitung: Himalaja 1)
- Chrysosoma falcatum* Becker 1922, p. 170, Fig. 132 1)
 „Formosa“ 1)
- Chrysosoma figuratum* Becker 1922, p. 184, Fig. 154 1)
 Kankau 1)
 Sonstige Verbreitung: Hongkong 1)
- Chrysosoma floccosum* Becker 1922, p. 184, Fig. 155 1)
 Kosempo, VI. 1); Kankau, VII. 1)
- Chrysosoma humile* Becker 1922, p. 172, Fig. 135 1)
 Kankau 1); Kosempo, VI. 1); Tainan 1); Takao, IV. 1)
- Chrysosoma ignobile* Becker 1922, p. 171, Fig. 133 1); Becker 1924, p. 128
 Tainan, IV. 1); Takao 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X. (DEI: 1)
- Chrysosoma imitans* Becker 1922, p. 171, Fig. 134 1)
 Amping, V. 1)
- Chrysosoma interrogatum* Becker 1924, p. 129 1)
 Kankau 1) (DEI: 1 Typus)
- Chrysosoma leucopogon* Wiedemann 1824, Analecta Ent. p. 40; Becker 1922, p. 168 1); Becker 1924, p. 129 2); Enderlein 1912, p. 381 3)
 Synonym: *Loewi* Enderlein 1912, p. 378 4)

Formosa¹⁾; Hokuto²⁾ (DEI: 1); Kankau²⁾ (DEI: 3); Tainan, III. (DEI: 1); Takao^{3) 4)}; J. Lambek³⁾; Kyokokado^{3) 4)}

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Java, Sumatra, Indien¹⁾

Chrysosoma limpidipenne Becker 1922, p. 147, Fig. 85, 86¹⁾

Kagi, VIII. 1)

Sonstige Verbreitung: Nimrodsund¹⁾

Chrysosoma muticum Thomson 1869, Eugenes Resa, Dipt., p. 509¹⁾; Becker 1922, p. 183²⁾; Becker 1924, p. 128³⁾; Frey 1924, Not. Ent. 4, p. 123⁴⁾

Tainan, IV. 2); Maruyama³⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen⁴⁾; Keeling¹⁾; Indien²⁾; Neuguinea²⁾; Bismarckarchipel²⁾

Chrysosoma pallidicorne Grimshaw 1901, Fauna Hawaiensis 3, p. 1²⁾, Taf. 1, Fig. 20, 21¹⁾; Becker 1922, p. 152²⁾

Synonym (♀-Form, nach Becker):

fulgidipenne Enderlein 1912, p. 377³⁾

Sokotsu, V. 2); Kosempo, V. 2); Takao³⁾

Sonstige Verbreitung: Hawaii¹⁾

Chrysosoma patelliferum Thomson 1869, Eugenes Resa, p. 507¹⁾; Becker 1922, p. 178, Fig. 144, 145²⁾; Parent 1928, p. 195³⁾

Kankau, IV. 2)

Sonstige Verbreitung: Insel Guam¹⁾; Hawaii²⁾; Java^{2) 3)}; Sumatra²⁾; Borneo²⁾

Chrysosoma pauper Becker 1922, p. 187¹⁾

Mt. Hoozan, V. 1); Kankau, VIII. 1)

Chrysosoma piriforme Becker 1922, p. 161, Fig. 109—111¹⁾; Becker 1924, p. 130²⁾; Parent 1932, p. 233³⁾

Kankau, VII., VIII. 1) 2) 3) (DEI: 5)

Chrysosoma prolongatum Parent 1928, p. 196, Fig. 80—83¹⁾; Parent 1932, p. 233²⁾

„Formosa“¹⁾ (DEI: 1); Tainan²⁾ (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3)

Chrysosoma sauteri Becker 1924, p. 127¹⁾

Chosokei¹⁾ (DEI: 1 Typus)

2. Cyclorrhapha

Familienreihe Aschiza

Superfamilie Musidoroidea

Familie Musidoridae (Lonchopteridae)

Musidora orientalis Kertész 1914, p. 675, Fig. 1)

Chip-Chip, I., III. 1); Kosempo, XI. 1); Pilam, XII. 1)

Superfamilie *Phoroidea*

Familie *Clythiidae* (*Platypezidae*)

Clythia argyrogyna de Meijere 1907, Tijds. Ent. 50, p. 257¹⁾; Oldenberg 1913, p. 341²⁾; Oldenberg 1914, p. 79³⁾; Takao, IV., V. 2); Fuhosho, VII. 2); Koshun, III. 2); Yentempo, V. 2); Kankau (Koshun), V.—VI. 3) (DEI: 47); Tainan, V. 3) (DEI: 15); Taihoku-Distr., Okaseki (DEI: 11, det. Oldenberg); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 9, det. Oldenberg); Macuyama (DEI: 19, det. Oldenberg)
Sonstige Verbreitung: Indien (Matheran, Bombay), Singapore 2); Java 1) ?

Clythia sauteri Oldenberg 1914, p. 78¹⁾

Kankau (Koshun), V., VI. (DEI: 12 Typen)

Clythia kertészii Oldenberg 1913, p. 340¹⁾

Toyenmongai 1) (DEI: 1 Typus + 1 Exemplar ohne Fundortangabe)

Agathomyia nigriventris Oldenberg 1917, p. 119¹⁾

Hokuto, XII. 1) (DEI: 1 Typus)

Agathomyia thoracica Oldenberg 1913, p. 339¹⁾

Kosempo II., XI. 1) (DEI: 1 Typus)

Familie *Phoridae*

Subfamilie *Phorinae*

Diploneura (*Diploneura*) *conventa* Brues 1911, p. 535, Fig. 4¹⁾ (*Phora*); Brues 1924, p. 207²⁾

Takao, IV., V. (300 m) 1); Taihoku 2); Anping 2); Daitotei, V.—VI. (DEI: 5, det. Schmitz); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., X. (DEI: 1, det. Schmitz)

Diploneura (*Dohrniphora*) *cornuta* Bigot 1856 in Sagra, Hist. Isla Cuba 2, 7, p. 348¹⁾ Schmitz 1929, p. 184

Synonym (nach Schmitz):

mordax Brues 1911, p. 531, Fig. 1 (*Phora*) 2); Brues 1924, p. 207³⁾

chlorogastra Becker 1901, Abh. zool. bot. Ges. Wien 1, p. 32

Anping, V., VI. 3) (DEI: 3, det. Schmitz); Takao 2); Chip-Chip 2);

Daitotei, V.—VI. (DEI: 9, det. Schmitz)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis

Diploneura (*Tristoechia*) *bifasciata* Walker 1860, Proc. Linn. Soc. Lond. 4, p. 172¹⁾; Schmitz 1929, p. 105

Synonym (nach Schmitz):

Phora bicolorata Becker 1914, p. 88, Fig. 2)

Phora egregia Brues 1911, p. 534, Fig. 3 3); Brues 1924, p. 206 4)

Kankau, IV., VII., VIII., XII. 2) 4) (DEI: 4 Typen von *bicolorata* + 2); Taihorin, V., VII., VIII. 4); Koshun 3); Kosempo 3); Fuhosho 3);

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 5, det. Schmitz); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 1, det. Schmitz)

Sonstige Verbreitung: Java 4), Celebes 1)

Diploneura (Diploneura) fasciventris Brues 1911, p. 532, Fig. 2 1)
Chip-Chip, I. 1)

Hypocera suspecta Brues 1911, p. 537, Fig. 5 1)

Bei Schmitz 1929 nicht erwähnt

Toyenmongai 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2, det. Schmitz)

Stichillus sinuosus Schmitz 1926, p. 47 1); Schmitz 1929, p. 113, Fig. 25
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 Typus)

Conicera breviciliata Schmitz 1926, p. 48 1); Schmitz 1929, p. 118, Fig. 1—4

Maruyama 1); Daitotei 1) (DEI: 6 Typen)

Conicera formosensis Brues 1911, p. 539, Fig. 6 1)
Takao 300 m, IV. 1)

Subfamilie *Metopininae*

Woodiphora orientalis Schmitz 1926, p. 50 1)

Chosokei 1) (DEI: 1 Typus)

Megaselia (Aphiochaeta) aemula Brues 1911, p. 549, Fig. 13 1)
Polisha, XII. 1); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1, det. Schmitz)

Megaselia (Aphiochaeta) agnata Schmitz 1926, p. 50 1)
Maruyama, IV. 1); Daitotei, IV.—VI. 1) (DEI: 2 Typen)

Megaselia (Aphiochaeta) atriclava Brues 1911, p. 545, Fig. 10 1)
Polisha, XII. 1)

Megaselia (Aphiochaeta) breviscula Brues 1924, p. 217 1)
Anping, IV., V. 1)

Megaselia (Aphiochaeta) brunnicans Brues 1924, p. 215 1)
Tailoku, IV. 1)

Megaselia (Aphiochaeta) chipensis Brues 1911, p. 554, Fig. 15 1)
Chip-Chip, II. 1)

Megaselia congrua Schmitz 1926, p. 52 1)
Maruyama, IV. 1)

Megaselia (Aphiochaeta) curva Brues 1911, p. 552, Fig. 14 1)
Polisha, XII. 1)

Megaselia fasciventris Becker 1914, p. 89, Fig. 1) (*Aphiochaeta*)
Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. 1) (DEI: 1 Typus)

Megaselia flava Fallén, 1823, Dipt. Suec. Phytomyz., p. 7; Becker 1914, p. 89 2) (*Aphiochaeta*)

Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII. 2) (DEI: 2); Tainan, II., IX. 2)

Sonstige Verbreitung: Hotarktis

- Megaselia (Aphiochaeta) flaviclava* Brues 1911, p. 547, Fig. 11 1)
Polisha, XII. 1)
- Megaselia (Aphiochaeta) formosana* Brues 1924, p. 212 1)
Taihoku, V. 1)
- Megaselia (Aphiochaeta) fortinervis* Schmitz 1926, p. 51 1)
Daitotei, V.—VI. 1)
- Megaselia insulana* Brues 1911, p. 542, Fig. 7 1); Brues 1924, p. 215 2)
(*Aphiochaeta*)
Takao, IV., V., XI. 1); Anping, IV.—VI. 2)
- Megaselia (Aphiochaeta) lanceolata* Brues 1924, p. 220 1)
Taihorin, VII. 1)
- Megaselia lateralis* Schmitz 1926, p. 53 1)
Taihoku-Distr., Jushifu, VI. 1); Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 „Syn-
type“); ? Maruyama, IV. 1)
- Megaselia (Megaselia) laticosta* Schmitz 1938, p. 292, Fig. 1 1)
Hoozan, I. 1) (DEI: 1 Holotypus)
- Megaselia (Aphiochaeta) latifrons* Brues 1911, p. 548, Fig. 12 1)
Takao, 300 m, IV. 1)
- Megaselia (Megaselia) lutea* Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 220; Becker
1914, p. 90 1)
Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. 1) (DEI: 1); Kankan, VII. 1)
Sonstige Verbreitung: Europa
- Megaselia luteoides* Schmitz 1926, p. 54 1)
Daitotei IV.—VI. 1) (DEI: 1 Syntype)
- Megaselia (Aphiochaeta) mejerei* Brues, 1915, Journ. New York Ent. Soc.
23, p. 189 1); Brues 1924, p. 211 2)
Anping, IV. 2); Tainan, IV., V., VI. 2) Maruyama, IV. (DEI: 1, det.
Schmitz)
Sonstige Verbreitung: Java 1)
- Megaselia (Aphiochaeta) meracula* Brues 1911, p. 555, Fig. 16 1)
Toyenmongai 1)
- Megaselia nana* Brues 1911, p. 551 1) (*Aphiochaeta*)
Tainan, II. 1); Takao, IV. 1); Maruyama, V.—VI. (DEI: 1, det.
Schmitz); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1, det. Schmitz)
- Megaselia (Aphiochaeta) ochracea* Brues 1911, p. 543, Fig. 8 1); Brues
1924, p. 217 2)
Takao, XI. 1); Taihoku, IV. 2); Daitotei, V.—VI. (DEI: 3)
- Megaselia parasitica* Shiraki 1917, p. 149, Taf. 15, Fig. 2—4 1) (*Aphio-
chaeta*)
Taihoku, VI. 1)
- Megaselia (Aphiochaeta) pedicellata* Brues 1924, p. 213 1)
Taihorin, VII. 1)

- Megaselia (Aphiochaeta) picta* Lehmann 1822, Indic. Schol. Hamb. 43, Tab. 1, Fig. 6; Brues 1924, p. 220¹⁾
Kankau, VII. 1)
Sonstige Verbreitung: Europa¹⁾; N.-Amerika¹⁾; S.-Afrika¹⁾
- Megaselia (Megaselia) pulicaria* Fallén 1823, Dipt. Suec. Phytom. p. 7; Becker 1914, p. 90¹⁾
Paroe, VIII. 1); Tainan, X. 1) (DEI: 1)
Sonst. Verbreitung: Europa, N.-Afrika, Asien, N.-Amerika, Australien
- Megaselia (Aphiochaeta) pygmaea* Zetterstedt 1848, Dipt. Scand. 7, p. 2860; Brues 1911, p. 542¹⁾
Takao, I., III. 1)
Sonstige Verbreitung: Europa, N.-Amerika
- Megaselia (Aphiochaeta) recta* Brues 1911, p. 553¹⁾
Toyenmongai¹⁾
- Megaselia (Aphiochaeta) sauteri* Brues 1911, p. 556, Fig. 17¹⁾
Chip-Chip, II. 1); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1, det. Schmitz)
- Megaselia sauteri* Brues 1924, p. 222¹⁾, (*Mallochina*)
Anping, IV. 1)
- Megaselia scabra* Schmitz 1926, p. 56¹⁾
Marnyama, IV. 1); Daitotei, V., VI. 1) (DEI: 1 „Syntype“)
- Megaselia (Aphiochaeta) simplicior* Brues 1924, p. 219¹⁾
Taihoku, IV. 1); Daitotei, IV. (DEI: 1, det. Schmitz)
- Megaselia (Aphiochaeta) spiracularis* Schmitz 1938, Natuurh. Maandbl. 27, p. 81
Anping, VI. (DEI: 1, det. Schmitz)
Sonstige Verbreitung: Tokio
- Megasilia sulfurella* Schmitz 1926, p. 55¹⁾
Daitotei, IV. 1)
- Megaselia (Aphiochaeta) trivialis* Brues 1911, p. 544, Fig. 9¹⁾
Takao, III., V., 300 m, IV. 1); Daitotei, V.—VI. (DEI: 7)
- Megaselia trochanterica* Schmitz 1926, p. 53¹⁾
Marnyama, IV. 1) (DEI: 1 Holotype)
- Megaselia* spec.
DEI: 16, det. Schmitz
- Phalacrotophora punctifrons* Brues 1924, p. 207¹⁾
Tainan, IV. 1)
- Phalacrotophora quadrimaculata* Schmitz 1926, p. 49¹⁾
Daitotei, V.—VI. 1) (DEI: 1 Typus)
- Puliciphora kertészii* Brues 1911, p. 557, Fig. 18—19¹⁾
Takao, IV. 1)
- Metopina* spec.
Taihoku, XI. (DEI: 1)

Genus spec. Becker 1914, p. 90¹⁾

Kankau¹⁾ (DEI: 1)

Familie *Termitoxeniidae*

Termitoxenia formosana Shiraki 1925, p. 208—210; Schmitz 1933, p. 9¹⁾

Formosa¹⁾ Wirt: *Odontotermes formosanus*

Pseudotermitoxenia nitobei Shiraki 1925, p. 208—210; Schmitz 1933, p. 9¹⁾

Formosa¹⁾; Wirt: *Odontotermes formosanus*

Superfamilie *Syrphoidea*.

Familie *Dorylaidae*.

Dorylas adventicius Kertész 1912, p. 292¹⁾; Becker 1924, p. 14²⁾
(*Pipunculus*) siehe auch *gigas*

Koshun, IX.—X.¹⁾; Kankau²⁾ (DEI: 27); „Formosa I.“ DEI: 2).

Dorylas aeneiventris Kertész 1903, p. 468¹⁾; Kertész 1912, p. 287²⁾
(*Pipunculus*)

Takao, X.²⁾; Tainan, X.²⁾; Kankau (Koshun) IV. (DEI: 1); Taihoku (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Ceylon.

Dorylas aequalis Becker 1924, p. 16¹⁾ (*Pipunculus*)

Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Dorylas bicolor Becker 1924, p. 15¹⁾ (*Pipunculus*)

Paroe, nördl. Paiwan-Distr.¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Dorylas costalis Becker 1924, p. 16¹⁾ (*Pipunculus*)

Maruyama V.—VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Dorylas cruciator Perkins 1905, Bull. Exper. Sta. Hawaii 1, p. 141¹⁾;
Kertész 1912, p. 296²⁾

? Koshun, I.²⁾

Sonstige Verbreitung: Hawaii¹⁾

Dorylas epichalcus Perkins 1905, Bull. Exper. Sta. Hawaii 1, p. 150¹⁾;
Kertész 1912, p. 287²⁾

? Tainan, II.²⁾

Sonstige Verbreitung: Hawaii¹⁾

Dorylas eucalypti Perkins 1905, Bull. Exper. Sta. Hawaii 1, p. 138,
Taf. 5, Fig. 4¹⁾; Kertész 1912, p. 297²⁾

? Takao, X.²⁾

Sonstige Verbreitung: Hawaii¹⁾

Dorylas excellens Kertész 1912, p. 288¹⁾

Kosempo, III.¹⁾

Dorylas formosanus Kertész 1912, p. 298¹⁾; Becker 1924, p. 17²⁾

Takao, X. 1); Tainan, II. 1); Taihoku 2) (DEI: 2); Chipun, VII. (DEI: 1, det. Kertész).

Dorylas fraternus Kertész 1912, p. 289 1)

Chip-Chip, II. 1); Kankau, IX. (DEI: 1, det. Kertész).

Dorylas gigas Kertész 1912, p. 293 1)

Becker bezeichnete *gigas* als Synonym zu *adventicius*. Das trifft nicht zu. Becker hat nur insofern recht, als der Aderanhang im Flügel für *adventicius* nicht charakteristisch ist. Dieser Aderanhang ist aber nicht das einzige von Kertész angegebene Unterscheidungsmerkmal.

Toyenmongai 1); „Formosa I“ (DEI: 1)

Dorylas gracilis Kertész 1912, p. 287 1)

Takao, 300 m, IV. 1)

Dorylas holosericeus Becker 1897, Berl. Ent. Zeit. 42, p. 55 1); Becker 1924, p. 16 2) (*Pipunculus*)

Maruyama V.—VI. 2) (DEI: 2); Taihoku VI. 2); Paroe, nördl. Pailwan-Distr. VIII. (DEI: 1, det. Becker).

Sonstige Verbreitung: Italien 1); Siebenbürgen 1)

Dorylas lentiger Kertész 1915, p. 386 1), nom. nov. pro *mutilatus*; Becker 1924, p. 17 2).

Synonym:

mutilatus Kertész 1912, p. 295 3)

Fuhosho -VII. 3); Kankau IV., V., VIII., IX. 1) 2) (DEI: 5).

Dorylas megacephalus Kertész 1912, p. 297 1)

Koshun, IX. 1)

Dorylas nudus Kertész 1912, p. 294 1)

Chip-Chip, III. 1)

Dorylas pernitidus Becker 1924, p. 14 1) (*Pipunculus*)

Maruyama, IV. 1) (DEI: 1 Typus)

Dorylas platytarsis Kertész 1912, p. 290 1)

Tainan, III. 1)

Dorylas pulvillatus Kertész 1915, p. 387, Fig. 2 1)

Kankau, V. 1); „Formosa I.“ (DEI: 1).

Dorylas roralis Kertész 1915, p. 389, Fig. 3 1)

Tainan, VI. 1); Chipun, VII. (DEI: 1, det. Kertész); Kankau (Koshun) (DEI: 1, det. Kertész).

Dorylas sauteri Kertész 1907, p. 580 1); Kertész 1912, p. 291 2)

Takao, IV. 1); Tainan, II. 2)

Dorylas separatus Kertész 1915, p. 390, Fig. 4 1)

Kankau, IV. 1)

Dorylas similans Becker 1924, p. 15 1) (*Pipunculus*)

Taihoku, 500 m, XII. 1) (DEI: 4 Typen); Kankau, IX. (DEI: 1)

„Typus“); Maruyama, IV. (DEI: 1 „Typus“)

Dorylas spec. nahe *lentiger*

DEI: „Formosa I“: 1 Exemplar

Familie *Syrphidae*

Subfamilie *Chilosini*

Chilosia aterrima Sack 1927, p. 305, Fig. 1¹⁾; Shiraki 1930, p. 263²⁾

Toa Tsukutsu, V. (DEI: 1 Typus); Arisan, X. 2); Taikan, IX. 2)

Sonstige Verbreitung: Japan (Tokyo)²⁾

Chilosia formosana Shiraki 1930, p. 309, Fig. 78¹⁾

Rikiriki, III. 1); Funkiko, VII. 1); Niitakagun, VII. 1)

Chilosia leptorrhyncha Shiraki 1930, p. 269, Fig. 62¹⁾

Shukoran, IX. 1); Kanko, IX. 1); Daisukutsu, IX. 1); Roeichi, IX. 1)

Chilosia makiana Shiraki 1930, p. 272, Fig. 63¹⁾

Karenko, VII.—VIII. 1); Horisha, IV. 1)

Chilosia nopporoana Shiraki 1930, p. 258, Fig. 74¹⁾

„Formosa I“ (DEI: 1, det. Sack)

Sonstige Verbreitung: Hokkaido¹⁾

Chilosia niitakana Shiraki 1930, p. 275, Fig. 64¹⁾

Niitakayama, 4200 m, IX. 1)

Chilosia ochreipila Shiraki 1930, p. 283, Fig. 68¹⁾

Shukoran, IX. 1); Taiheisan, VIII. 1); Roeichi, IX. 1)

Chilosia rakurakuensis Shiraki 1930, p. 265, Fig. 60¹⁾

Rakuraku, IX. 1)

Chilosia splendida Shiraki 1930, p. 302¹⁾

Karenko, VII., VIII. 1); Asahi V. 1); Musha, V., VI. 1)

Chilosia yoshinoi Shiraki 1930, p. 267, Fig. 61¹⁾

Karenko, VII. 1)

Sonatomyia formosana Shiraki 1930, p. 321, Fig. 84¹⁾

Asahi, V. 1); Tenchoson, V. 1); Arisan, X. 1); Shu-Shu, X. 1)

Triglyphus formosanus Shiraki 1930, p. 251, Fig. 58¹⁾

Musha, V. 1)

Orthoneura formosana Shiraki 1930, p. 256, Fig. 59¹⁾

Toseikaku, XI. 1)

Chrysogaster semiopaca Matsumura 1916, p. 242, Taf. 17, Fig. 19¹⁾

„Formosa I“ (DEI: 1, det. Sack)

Sonstige Verbreitung: Japan¹⁾

Pipiza signata Meigen 1822, Syst. Besch. 3, p. 246; Shiraki 1930, p. 255¹⁾

Karenko, VII. 1)

Sonstige Verbreitung: Europa, Japan.

Subfamilie *Spheginiinae**Sphegina apicalis* Shiraki 1930, p. 423, Fig. 96 1)

Musha, V. 1)

Sphegina nigerrima Shiraki 1930, p. 425, Fig. 97 1)

Rantaisan, III. 1)

Sphegina orientalis Kertész 1914, p. 73, Fig. 1 1); Shiraki 1930, p. 420 2)

„Diese Art ist über ganz Formosa stark verbreitet, besonders häufig in den höheren Lagen.“ Kosempo, VI. 1) 2); Chip-Chip, I. 1); Shushu I. 2); Taihorin, VII. 1) 2); Musha, V., VI. 2); Taihoku, VIII. 2); Shinchiku, VII. 2); Tamaru, IX. 2); Arisan, V., IV., X. 2); Kobayashi VIII. 2); Taiheisan VIII. 2); Shishito XII. 2); Taiko II. 2); Karenko VII., VIII. 2)

Sphegina viridissima Shiraki 1930, p. 421, Fig. 95 1) („*varidissima*“)

Horisha, V. 1)

Subfamilie *Brachyopinae**Rhingia binotata* Brunetti 1908, Rec. Ind. Mus. 2, p. 59 1); Sack 1922, p. 261 2); Shiraki 1930, p. 430 3)Synonym (nach Shiraki): „*cincta* de Meijere“ Sack 1927, p. 311 4)

Taihorinsho, XI. 2) (DEI: 1); Chosokei 3) 4) (DEI: 1); Taihoku II. 3); Heirinbi III. 3); Arisan, IV., V. 3); Tamaru, IX 3); Toyen, IV. 3); Taihorin, IX. 3)

Sonstige Verbreitung: Indien.

Rhingia formosana Shiraki 1930, p. 431, Fig. 100 1)

Arisan, X. 1); Musha, V, VI. 1); Tainan, IX. 1); Kanko, IX. 1); Taiheisan, VIII. 1); Asahi, V. 1); Daijurin, III. 1); Rantaisan, III. 1); Karenko, VII., VIII. 1)

Syrphus aegrotus Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 248; Sack 1913, p. 1, Fig. 1 1) Shiraki 1930, p. 391 2)

Shishito, V. 1); Shinchiku, VII. 1); Kobayashi, VIII. 1); Koshun, IV., V., IX. 1) (DEI: 3); Kosempo, V., VI., VIII. 1) (DEI: 1); Niitaka, VII. 1); Tompo, IX. 1); Ryuganrin, V. 1); Naihumpo, IX. 1); Tappan, VI. 1); Choshu, VI. 1); Taito, II., III. 1); Kuskusu, III. 1); Kankau, VI., IX., VII. 1) (DEI: 13); Takao, V. 1) (DEI: 3); Tabo, VIII. 1); Kotosho, III., IV., VII. 1); Kanshirei, V. (DEI: 11); Chip-Chip, I. (DEI: 2); Tainan, II., V. (DEI: 10); Yamo, IX. (DEI: 1); Polisha, XII. (DEI: 1); Hoozan (DEI: 1); Pilam, III. (DEI: 1); Suisharyo, X. (DEI: 1); Toa Tsukutsu, V. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 2); Yamo no Taiko, VI. 1); Kanshirei, VI. 1); Horisha, V. 1); Hozan V. 1); Sack 2) gibt keine Fundorte. Die Tiere des DEI sind von Sack bestimmt und offenbar das von ihm benutzte Material.

Sonst. Verbreitg.: China, Philippinen, Malay. Archipel, N.-Guinea, Indien.

Syrphus ambiguus Shiraki 1930, p. 376, Fig. 89 ¹⁾

Rantaisan, III. ¹⁾

Syrphus arcifer Sack 1927, p. 306, Fig. 2—3 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 385 ²⁾
Kankan, IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 1 Typus + 2); Fuhosho III., VII. ¹⁾ ²⁾;
Koshun, III., IV., V., IX., X. ²⁾; Chipon, V. ²⁾; Taito, II., III. ²⁾;
Kosempo, I., VI., VIII. ²⁾; Shinchiku, VIII. ²⁾; Takao, VIII., XII. ²⁾;
Tainan (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Singapore

Syrphus cinctellus Zetterstedt 1843, Dipt. Scand. 2, p. 742; Sack 1927,
p. 306 ¹⁾

Chip-Chip, I. ¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis, Oriental. Region

var. *formosanus* Shiraki 1930, p. 388 ¹⁾

Shukoran, IX. ¹⁾; Royeichi, IX. ¹⁾; Daisnikutsu, IX. ¹⁾; Arisan IV.
—V. ¹⁾; Hassensan, II. ¹⁾; Musha V.—VI. ¹⁾; Kanko, IX. ¹⁾; Yamo-
notaiko, II ¹⁾; Rantaisan ¹⁾

Tappani ²⁾ (DEI: 1); Musha, V.—VI. ³⁾; Arisan, IV.—VI. ³⁾; Shu-
koran, IX. ³⁾; Daisnikutsu, IX. ³⁾; Toyenmongai ³⁾

Sonstige Verbreitung: Ceylon ¹⁾; Java ¹⁾

var. *monticola* de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 159 ¹⁾; Sack 1927,
p. 310 ²⁾; Shiraki 1930, p. 388 ³⁾

var. *strigifrons* de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 158 ¹⁾; Sack 1927,
p. 306 ²⁾

Tappani ¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java

var. *taiwanus* Shiraki 1930, p. 387 ¹⁾

Musha, V.—VI. ¹⁾; Arisan, X. ¹⁾

Syrphus confrater Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 120; Sack 1913,
p. 2, Fig. 2 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 364 ²⁾

Yamo no Taiko, II., IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 2); Nanto, XII. ²⁾; Arisan, VI. ²⁾;
Chikushimon, II. ²⁾; Shishito, XII. ²⁾; Choshu, XI. ²⁾; Kanshirei, XI. ²⁾;
Rantaisan, III. ²⁾; Shinchiku, VII. ²⁾; Karenko, VII. ²⁾; Naifumpo,
IX. ²⁾; Ranrun, III. ²⁾; Tamaru, IX. ²⁾; Taihoku (DEI: 1); S.-W.-
Formosa, Kyokokudo, I. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Japan

Syrphus corollae Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 306; Sack 1913, p. 5;
Shiraki, 1930, p. 371 ¹⁾

Kagi, XI. ¹⁾; Rokkiri, III. ¹⁾; Kuraru X. ¹⁾; Nanko, I. ¹⁾; Taihoku, VI.,
XI. (DEI: 2); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Japan, Sachalin, Korea, Europa, Madeira, Ka-
narische Inseln, Nordafrika, Asien

Syrphus divertus Walker 1857, Proc. Linn. Soc. London 1, p. 124 1); Shiraki 1930, p. 383 2)

Synonym (nach Shiraki): *claviger* Sack 1927, p. 308, Fig. 4 3)

Taito, II.—III. 2); Tabo, VIII. 2); Koshun, IV., V., IX. 2); Horisha, III. 2); Fuhosho, VII. 2) 3) (DEI: 1 Typus von *claviger*); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Borneo 1)

Syrphus horishanus Matsumura 1917, p. 24 1); Shiraki 1930, p. 372 2)

Synonym (nach Shiraki):

koannanius Matsumura 1917, p. 25 4)

„*Syrphus elongatus* de Meijere“ Sack 1927, p. 308 3)

Chip-Chip, I. 3) (DEI: 1); Tappani 3) (DEI: 1); Yama no Taiko, IX. 3) (DEI: 1); Ako, VI. 2); Horisha, VI. 1) 2); Arisan, X. 2); Kanshirei 2); Kosempo, III. 2); Shu-Shu, I. 2); Koannania Kaushirei 4)

Sonstige Verbreitung: Kyushyu; Indien 2)

Syrphus issikii Shiraki 1930, p. 378, Fig. 90 1)

Kusu Kusu, III. 1); Fuhosho, III. 1); Shushu 1); „Formosa IV.“ (DEI: 1, det. Sack)

Syrphus minimus Shiraki 1930, p. 358, Fig. 88 1)

Noko, V. 1)

Sonstige Verbreitung: Hokkaido 1)

Syrphus serarius Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 128, Sack 1913, p. 5 2); Shiraki 1930, p. 360 3)

Chip-Chip, I. 2); (DEI: 1); Musha, V.—VI. 3); Hassensan, II. 3); Shishito, V., XII. 3); Arisan, X. 3); Taihoku, V. 3); Tabo, VIII. 3); Tamaru, IX. 3); Nanko, I. 3); Mato, I. 3); Rono, IV. 3); Chikushimon, XII. 3); Kauriran, IX. 3); Taito, II.—III. 3); Karenko, VII.—VIII. 3); Yama no Taiko, IX. (DEI: 2); „Formosa I.“ (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Japan, China, Java, Indien, Ceylon, Korea 3)

Syrphus sonani Shiraki 1930, p. 389, Fig. 91, a, b 1)

Arisan, X. 1); Toroen, XI. 1); Asahi, V. 1); Kanko, IX. 1); Karenko, VII.—VIII. 1)

var. *arisanicus* Shiraki 1930, p. 391 1)

Arisan, IV., VI., X. 1)

Syrphus torvus Osten-Sacken 1875, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 18, p. 139; Shiraki 1930, p. 357 1)

Karenko, VII.—VIII. 1)

Sonstige Verbreitung: Japan, Sachalin, Europa, N.-Amerika, Indien

Syrphus vitripennis Meigen 1822, Syst. Besch. 3, p. 308; Shiraki 1930, p. 367 1)

Synonym (nach Shiraki): „*Syrphus ribesii* Linné“ Sack 1913, p. 5 2)

Rantaisan, III. 1); Dajiurin, III. 1); Taiheisan, VIII. 1); Musha, V.,

VI. 1); Arisan, X. 1); Tappani 1); Yamo-no Taiko, I., II., IX. 1) 2)
(DEI: 2); Tappani 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Ganz Europa, Japan

Epistrophe balteatus Degeer 1776, Mém. serv. hist. Ins. 6, p. 116; Shiraki 1930, p. 382 1)

Choshu, XI. 1); Kanshirei, II. 1); Chosokei, III. 1) (DEI: 1); Kankau (Koshun), VIII. (DEI: 1, det. Sack); „Formosa“ (DEI: 10)

Sonstige Verbreitung: Ganze Paläarktis

var. *alternans* Macquart 1842, Dipt. exot. 2, p. 89, Sack 1922, p. 261 1); Shiraki 1930, p. 382 2)

Sansanrin, VI. 2); Chipon, V. 2); Kankau, IX. 1) (DEI: 4); Koshun, IX. (DEI: 1); Paroe, nördl. Paiwan-Dist. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra

var. *nectarinus* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 128; Sack 1922, p. 261 1); Shiraki 1930, p. 382 2);

Synonym (nach Shiraki): *formosae* Sack 1913, p. 5 3)

Formosa, von fast allen Sammelplätzen vertreten, auch von der Insel Kotosho, III.—IV. 2); Taihoku-Distr. 1); Chip-Chip, I., II., III. (DEI: 8 Typen von *formosae* + 1); Koshun, I., III., X., IX., IV., V., VI. (DEI: 3 Typen + 6); „Formosa“ (DEI: 1); Taihoku, XI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, VI. (DEI: 2); Taihoku-Distr., Maruyama 500 F., XI. (DEI: 7); Hokuto, XII. (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 3); Tappani (DEI: 1); Hoozan (DEI: 1); Kankau, III., IV., IX. (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: Japan, Korea, Java, Indien, Singapore, Neu-Guinea, China

Ischiodon scutellare Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 252; Kertész 1913, p. 273 1); Shiraki 1930, p. 397 2)

Synonym (nach Shiraki): *trochanterica* Sack 1913, p. 6 3) nec Kertész Taihoku, XI. 2) (DEI: 2); Koroton, V. 2); Suihenkyaku 2) 3); Horisha, V.—VIII. 2); Toseikaku, XI. 2); Nanto, IV. 2); Shinko, X. 2); Choshu, XI. 2); Takao, VI., V. 1) 2) (DEI: 1); Tainan, II. 1) 3) 2) (DEI: 1 Typus von *trochantericus*); Arisan, VI. 2); Ako, XI. 2); Banshoryo, XI. 2); Piran, IX. 2); Koshun, IV., V., VIII. 1) 2) (DEI: 6); Kanshirei, X. 3) 2); Kyokokudo 1); Kosempo, V. 1); Insel Lambeh 1); Kotosho, III. 2); Polisha 3); Kankau (Koshun), VIII. (DEI: 11); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1); „Formosa, I.“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Malay. Archipel, Afrika, Mariannen

Didea fasciata Macquart 1834, Suites à Buffon 1, p. 508; Shiraki 1930, p. 338 1)

Taihoku, II. 1)

Sonstige Verbreitung: Japan, Europa, N.-Amerika, Indien

Asarcina ericetorum var. *formosae* Bezzi 1908, p. 500 ¹⁾; Sack 1913, p. 3 ²⁾; Sack 1927, p. 306 ³⁾; Shiraki 1930, p. 346 ⁴⁾

Chip-Chip, I, III. ²⁾ (DEI: 2); Kanshirei, V. ⁴⁾ ²⁾ (DEI: 7); Koshun, IX., IV. ²⁾ ⁴⁾ (DEI: 2); Yamo no Taiko, IX. ²⁾ ⁴⁾ (DEI: 1); Tainan, II. ²⁾ ⁴⁾ (DEI: 2); Kankau, VIII., IX. ³⁾ ⁴⁾ (DEI: 11); Takao, XII., VI., VII. ⁴⁾ (DEI: 1); Pilam, II. (DEI: 1); Kosempo, VIII. ⁴⁾; Jukirin, V. ⁴⁾; Shinchiku, VII. ⁴⁾; Tompo, IX. ⁴⁾; Arisan, X. ⁴⁾ Niitaka, VII. ⁴⁾; Shu-Shu ⁴⁾; Kotosho, VII. ⁴⁾

Asarcina ericetorum var. *kelantanensis* Bezzi 1908, p. 499 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 346 ²⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾; Taihoku-Distr., Okaseki, VI. ²⁾ (DEI: 1); Tamaru, VIII. ²⁾; Horisha, III. ²⁾; Kobayashi, VIII. ²⁾; Kagi, I. ²⁾; Suisha, XII. ²⁾; Kanshirei, II. ²⁾; Taito, II.—III. ²⁾; Kusukusu, III. ²⁾; Kosempo, I. ²⁾; Pilan, II. ²⁾; Kankau (Koshun), (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Malakka ¹⁾

Asarcina ericetorum var. *orientalis* Bezzi 1908, Ann. Mus. Nat. Hung. 6, p. 498; Sack 1922, p. 260 ¹⁾

Taihoku-Distr. ¹⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: China

[*Asarcina eurytaeniata* Bezzi 1908, p. 497 u. 501; Sack 1922, p. 261 ¹⁾ Tappani ¹⁾ (DEI: 1; + 1 von Tainan)]

Nach Shiraki 1930, p. 348, ist 1 der von Sack bestimmten Tiere unidentifizierbar, da unausgereift, das 2. Exemplar = *Syrphus confrater* Wied.

Asarcina porcina Coquillett 1898, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, p. 322 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 347 ²⁾

Tenchosan, V. ²⁾; Musha, V.—VI. ²⁾; Toroen, IX. ²⁾; Karenko, VII. bis VIII. ²⁾; „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Japan ¹⁾; Südmandschurei, Indien, China ²⁾

var. *fumipennis* Sack 1913, p. 3—5 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 347 ²⁾

Yamo no Taiko, IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 1 Typus); Chip-Chip, III. ¹⁾ (DEI: 5 Typen); Shinsuiei, III. ²⁾; Horisha, V. ²⁾; Arisan, IV., V. ²⁾; Karenko, VII. ²⁾; Hassensan, II. ²⁾; Funkiko, IX. ²⁾; Rantun, III. ²⁾; Kobayashi, VII. ²⁾; Kusukusu, III. ²⁾; Niitaka, VII. ²⁾; Shushu, III. ²⁾; Tainan, I. (DEI: 1 „Typus“); Tappani (DEI: 1 „Typus“); Taihorinsho, X. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Platychirus formosanus Shiraki 1930, p. 325, Fig. 85 ¹⁾

In Höhen von 1300—4300 m ¹⁾; Arisan, IV., X. ¹⁾; Royeichi, IX. ¹⁾; Shukoran, IX. ¹⁾; Taiheisan, VIII. ¹⁾; Niitakayama, IX. ¹⁾; Rantaisan, III. ¹⁾; Asahi, V. ¹⁾; Daisui Kutsu, IX. ¹⁾; Musha, V.—VI. ¹⁾; Funkiko, II. ¹⁾; Hassensan, II. ¹⁾; Kanko, IX. ¹⁾

- Xanthogramma arisanicum* Shiraki 1930, p. 405, Fig. 93, a, b¹⁾
 Arisan, X.¹⁾; Shishito, VI.¹⁾; Kosempo, III.¹⁾; Fuhosho, V.¹⁾
- Xanthogramma fasciatum* Shiraki 1930, p. 410, Fig. 94¹⁾
 Rakuraku, IX.¹⁾; Kosempo, I.¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1)
- Xanthogramma fumipenne* Matsumura in Matsumura & Adachi 1916, p. 29, Taf. 1, Fig. 20; Shiraki 1930, p. 408¹⁾
 Karenko, VII., VIII.¹⁾; Rakuraku, IX.¹⁾; Taikan, IX.¹⁾; Horisha¹⁾
- Xanthandrus comtus* Harris 1782, Expos. Engl. Ins. p. 108, Taf. 32, Fig. 47; Shiraki 1930, p. 332¹⁾
 Arisan, VI.¹⁾; Taihoku, XII.¹⁾; Rakuraku, IX.¹⁾; Karenko, VII.—VIII.¹⁾; Tainan, II.¹⁾; Asahi, V.¹⁾; Shu-Shu, I.¹⁾; Horisha, XII.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Europa, Japan, Sachalin
- Eriozona nigroscutellata* Shiraki 1930, p. 333, Fig. 87¹⁾
 Royeichi, IV.¹⁾; Daisuikutsu, IV.¹⁾
- Dideoides lauta* Coquillett 1898, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, p. 323¹⁾; Sack 1927, p. 308, Fig. 5—6²⁾; Shiraki 1930, p. 341³⁾
 Tappani²⁾ (DEI: 1); Taihoku, IX.³⁾; Arisan, IV.³⁾; Toroyen, XI.³⁾; Tabani³⁾; Tainan (DEI: 1, det. Sack); „Formosa“ (DEI: 3, det. Sack)
 Sonstige Verbreitung: Japan¹⁾
 var. *formosana* Matsumura 1910a, p. 46 u. 79, Taf. 29, Fig. 8 und 1910b, p. 138, nom. nud.; Matsumura 1911, p. 140; Shiraki 1930, p. 345²⁾
 Toroen, XI.²⁾; Arisan, IV., VI., X.²⁾; Taihoku²⁾; Tainan²⁾; Tappan²⁾
- Sphaerophoria cylindrica* Say 1824, Anal. Ent. 1, p. 22; Shiraki 1930, p. 395¹⁾
 Synonym (nach Shiraki): *formosanus* Matsumura in Matsumura & Adachi, 1916, p. 23
indiana Bigot 1884, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 4, p. 99; Sack 1927, p. 320³⁾
 Taihoku, IX.¹⁾; Kanetoan, IV.¹⁾; Horisha, XII.¹⁾; Chosokei, V.¹⁾³⁾ (DEI: 1); Musha, V.—VI.¹⁾; Shinshiku, VII.¹⁾; Arisan, IV.¹⁾; Taito, III.¹⁾; Horin, VII.¹⁾; Yoshinomura, V.¹⁾; Polisha, XII.³⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Korea, Japan, Amerika, Indien, Ceylon, China
- Sphaerophoria javana* Wiedemann 1824, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 74; Shiraki 1930, p. 394¹⁾
 Synonym (nach Shiraki): *australiensis* Schiner, 1868, Reise Freg. Novara, Dipt. p. 347; Sack 1927, p. 310²⁾
 Taikan, IX.¹⁾; Rantaisan, III.¹⁾; Taiheisan, VIII.¹⁾; Musha, V.,

VI. 1); Shishito, V. 1); Kagi, XI. 1); Shinchiku, VII. 1); Arisan, V. 1); Polisha 2); Chip-Chip, II., III. (DEI: 2, det. Sack)

Sonstige Verbreitung: Indien, Ceylon, Java, Sumatra, Neu-Guinea, Australien, Korea, Japan

Sphaerophoria spec.

Polisha, XII. (DEI: 1)

Paragus hokusankoënsis Shiraki 1930, p. 249, Fig. 56 1)

Hokusanko, V. 1)

Paragus politus Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 89; Sack 1922, p. 259 1); Shiraki 1930, p. 247 2)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) 2); (DEI: 1); Tappani 1) (DEI: 2); Macuyama, VI. 1) (DEI: 3); Hokuto, XII. 2) (DEI: 1); Taihoku, II., VI. 2); Tabani, VI. 2); Suisha, V. 2); Taiheisan, VIII. 2); Musha, VI. 2); Horin, VII. 2); Shinshiku, VII. 2); Karenko, VIII. 2); Kotosho, III. 2); Sansanrin, VI. 2); Chishito, XII. 2); Arisan, IV. 2); Kosempo, VIII. 2); Kayahara, IX. 2); Taito, III. 2); Rikiriki, III. 2); Shinnensho 2)

Sonstige Verbreitung: Kyushu, Okinawa, China

var. *formosanus* Shiraki 1930, p. 247 1)

Shishito, XII. 1); Taihoku, VI. 1)

Paragus serratus Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 186; Kertész 1913, p. 273 1); Sack 1913, p. 1 2); Shiraki 1930, p. 246 3)

Takao, VI., VII., XII. 1) 3); Koshun, III., I., VIII., IX. 1) 2) 3) (DEI: 16); Pilam, VII. 1) (DEI: 1); Koroton, VI. 1) 3); Insel Lambeh 1); Alikang, III. 2) (DEI: 1); Polisha, XI. 2) (DEI: 1); Kanshirei, X. 3); Horisha, XII. 3); Riran, V. 3); Arian, VI. 3); Ampin, V. 3) (DEI: 1); Taihorin, VII., IX. 3) (DEI: 1); Paroe, IX. 3) (DEI: 1); Namakaban, IX. 3); Shinnensho, V. 3); Sansanrin, VI. 3); Kosempo, VIII. 3); Banshoryo, XI. 3); Piran, IX. 3); Kuraru, X. 3); Karenko, VII. 3); Taito, III. 3); Kotosho, VII. 3); Kankau, IX. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, China, Ceylon, Sumatra, Neuguinea

Paragus tibialis Fallén 1817, Dipt. Suec. Syrph. p. 60; Sack 1922, p. 259 1); Shiraki 1930, p. 247 2)

Taihoku, VI. 2); Macuyama 1) (= ein von Sack als *latiusculus* Walk. bezeichnetes Tier im DEI?)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis einschließlich China, Japan, Korea, Sachalin, Indien, Amerika

Melanostoma abdominale Shiraki 1930, p. 330, Fig. 86 1)

Arisan, IV., V., X. 1); Musha, V.—VI. 1)

Melanostoma mellinum Linné 1758, Syst. Nat. 10, p. 594; Sack 1922, p. 259 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Holarktis

Melanostoma orientale Wiedemann 1824, Anal. Ent. p. 36; Sack 1922, p. 259, Fig. 1 1); Shiraki 1930, p. 329 2)

Chip-Chip, I., III. 1) (DEI: 3); Polisha, XII. 1) (DEI: 1); Chipon, VI. 2); Daijurin, III. 2); Kappansan, III. 2); Tamaru, IX. 2); Taiheisan, VIII. 2); Banshoryo, XI. 2); Arisan, X. 2); Funkiko, II. 2); Kobayashi, VIII. 2); Tenchosan, V. 2); Chikuto, III. 2); Musha, V.—VI. 2); Taihoku, II.—X. 2); Shishito, XII. 2); Toroen, XI. 2); Kanetowan, IV. 2); Riran, III. 2); Karenko, VII.—VIII. 2); Kankau, VI., VIII. 2); Kotosho, II.—IV. 2); Horisha, V. 2); Tappan, VI. 2); Shu-Shu, I.—III. 2); Chosokei 2); Toasnikutsu, X. 2); nördl. Paiwan-Distr., Shinsinei, 400 F., X. (DEI: 1, det. Sack)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Indien, Singapore, Birma, Siam, Annam, China, Java, Borneo

Melanostoma scalare Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 308; Sack 1927, p. 306 1); Shiraki 1930, p. 329 2)

Chosokei 1) (DEI: 5); Macuyama 1) (DEI: 9); Taihoku 1) (DEI: 1); Daisukutsu, IX. 2); Taikan, IX. 2); Shukoran, IX. 2); Royeichi, IX. 2); Musha, V.—VI. 2); Basshaho, IV. 2); Yama no taiko, II. 2); Kanko, IX. 2); Kappansan 2); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 8); Hokuto, XII. (DEI: 1); Kankau (Koshun), III. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Japan, Europa

Melanostoma univittatum Wiedemann 1824, Anal. Ent. p. 36; Shiraki 1930, p. 330 1)

Synonym (nach Shiraki): *planifacies* Macquart 1848, Dipt. exot. Suppl. 3 p. 43; Sack 1922, p. 260, Fig. 2 2)

Rokkiri, X. 1); Suisha, XII. 1); Kagi, II. 1); Tabo, VIII. 1); Shishito, XII. 1); Shu-Shu, II. 1); Taihoku, VIII. 1); Sansanrin, VI. 1); Tompo, IX. 1); Kosempo, VIII. 1); Taito, II.—III. 1); Kanshirei, XI. 1); Daitorinsho, III. 2) (DEI: 2); Chip-Chip, II. 2) (DEI: 2); Koshun 2)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Indien, Birma, Siam, Singapore, Sumatra, Queensland

Subfamilie *Bacchinae*

Baccha abdominalis Sack 1927, p. 310, Fig. 7, 8 1); Shiraki 1930, p. 417 2)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) 2) (DEI: 2 Typen); Koshun, V. 2); Kusukusu, VI. 2); Tainan, II. 2); Kosempo, III. 2); Horisha, III. 2); Sokutsu, V. 2); Toyenmongai 2)

Baccha amphithoe Walker 1849, List. Dipt. Brit. Mus. 3, p. 549; Ker-

tész 1913, p. 277, Fig. 5, 6 a¹); Sack 1922, p. 261 2); Shiraki 1930, p. 416 3)

Takao, VI., VII., VIII., XII. 1) 3); Koshun, III., VIII., IV., V. 1) 3); Pilam, II. 1) (Piran, II.) 3); Kaushirei, IV., X. 1) 3); Kosempo, I. 1) 3); Fuhosho, VII. 1) 3); Sokutsu, V., IX. 1) 2) (DEI: 6); Kankau, IX. 2) (DEI: 21); Arisan, X. 3); Banshoryo, V., VI., XI. 3); Horisha, X., XII. 3); Rokkiri, X. 3); Kuraru, X. 3); Karenko, VII. 3); Kotosho, III. 3); Suisha, XII. 3); Sansanrin, VI. 3)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Indien, Borneo, Java, Philippinen

Baccha maculata Walker 1852, Ins. Saund., Dipt. 1, p. 223; Kertész 1913, p. 275 1); Sack 1922, p. 261 2); Shiraki 1930, p. 417 3)

Kosempo, I. 1) 3); Chip-Chip, III. 1) (DEI: 1); Berg Hoozan, V. 3) 1) 2) (DEI: 1); Sokotsu, V. 1); Taihorinsho 2); Shisha 2); Tappani 2) (DEI: 1); Shushu, III. 3); Banshoryo, V. 3); Yama-no-Taiko 3); Toa Tsui Kutsu, V. 3) (DEI: 5); Taihorin, XI. 3); Musha, V., VI. 3); Kobayashi, VIII. 2); Taiheisan, VIII. 2); Tamaru, IX. 2); Arisan, IV., X. 2); Horisha, V. 2); Koshun (DEI: 1); Tainan (DEI: 3); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Japan, Korea

Baccha nubilipennis Austen 1893, Proc. Zool. Soc. London, p. 136, Taf. 4, Fig. 7, 9, Taf. 5, Fig. 14; Kertész 1913, p. 275 1); Sack 1922, p. 261 2); Shiraki 1930, p. 416 3)

Kosempo, I., II., III, V., VI. 2) 3); Sokotsu, V. 2) 3) (DEI: 3); Toa Tsui Kutsu, V. 3) (DEI: 3); Taihoku, XII. 3); Shinshiku, VII. 3); Banshoryo, V., IX. 3); Fuhosho, VII. 3); Tainan, II. 3); Takao, IX. 3); Yamano-Taiko, X. 3); Kankau (Koshun), IV., V., X. 3) (DEI: 1); Biran, V. 3); Taito, II., III. 3); Taihorin (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Ceylon, Japan

Baccha pulchrifrons Austen 1893, Proc. Zool. Soc. London, p. 139, Taf. 4, Fig. 10—11; Kertész 1913, p. 274, Fig. 1 1); Sack 1922, p. 261 2); Shiraki 1930, p. 415 3)

Takao, V., XII. 1) 3); Taihorinsho, VII, VIII. 1) (Taihorin) 3); Koshun, VI., X., V., IV. 1) 3) (DEI: 2); Sokutsu, V. 1) 3); Kankau, IV. 1) 2) (DEI: 2); Tappani III. 1) 2) 3); Daitorinsho, VII. 1); Tainan, V. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. 3) (DEI: 1); Sosan, II. 3); Musha, V., VI. 3); Hokusanko, V. 3); Banshoryo, V. 3); Kosempo, VII. 3); Taito, II., III. 3); Taiheisan, VIII. 3); Chipon, V. 3)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Java, Philippinen, Japan

Baccha sapphirina Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 96; Kertész 1913, p. 279, Fig. 7 a, b 1); Sack 1922, p. 261 2); Shiraki 1930, p. 415 3)

Takao, VI., VII., V., XI, IX. 1) 3); Sokutsu, V. 1); Tainan, II. 1) 2) 3);

Anping²⁾; Rono, VIII.³⁾; Kagi, VIII.³⁾; Banshoryo, V.³⁾; Koshun, IV., V.³⁾

Sonstige Verbreitung: Indien, Ceylon, Aden

Baccha sauteri Kertész 1913, p. 275, Fig. 4¹⁾; Sack 1922, p. 261²⁾; Shiraki 1930, p. 416³⁾

Takao, XI.¹⁾³⁾; Yamano-Taiko, X.¹⁾²⁾; Kosempo, I., III., VI.¹⁾³⁾; Tainan, II., V.¹⁾³⁾; Koshun, X., III., IV., V.¹⁾³⁾; Fuhosho, VII.¹⁾³⁾; Sokotsu, V.¹⁾; Taihorinsho, XI.¹⁾³⁾ (DEI: 1); Taihoku²⁾; Banshoryo, V.³⁾; Toa Tsui Kutsu, VI.³⁾; Karenko, VII.³⁾; Shinchiku, VII.³⁾; Tabo, VIII.³⁾; Taito, II., III.³⁾; Taihoku-Distr., Okaseki, VI. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Subfamilie *Chrysotoxinae*

Chrysotoxum formosanum Shiraki 1930, p. 27, Fig. 7¹⁾

Arisan, IV.¹⁾; Paiwan, X.¹⁾

Chrysotoxum testaceum Sack 1913, p. 9¹⁾; Shiraki 1930, p. 29²⁾

Yama no Taiko, IX.¹⁾²⁾ (DEI: 3 Typen); Tompo, IX.²⁾; Shinnen-sho, VI.²⁾; Namakuban, IX.²⁾; Kiukiokudo, I.²⁾; Kosempo, II.²⁾; Shushu, I., III.²⁾; Piran, II.²⁾; Takao, X., XII.²⁾; Fuhosho, V.²⁾; Musha, V., VI.²⁾; Kanshirei, II.²⁾; Rokkiri, IV.²⁾; Rakuraku, IX.²⁾; Horisha, V., VIII.²⁾; Naifumpo, II., III.²⁾; Niitaka, VII.²⁾; Tabani, IX.²⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: Insel Oshima

Chrysotoxum spec. nov. Shiraki 1930, p. 28¹⁾

Shinsinei, 4000 F., nördl. Paiwan-Distr. X.¹⁾ (DEI: 1)

Subfamilie *Microdontinae*

Parocryptamus sonamii Shiraki 1930, p. 12, Fig. 4¹⁾

Shinchiku, VII.¹⁾; Sokutsu, V.¹⁾; Chipon, VII.¹⁾

Microdon auricinctus Brunetti 1908, Rec. Ind. Mus. 2, p. 93¹⁾; Sack 1922, p. 272²⁾; Shiraki 1930, p. 25³⁾

Taihorinsho, XI.²⁾³⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Ceylon¹⁾

Microdon bicolor Sack 1922, p. 272¹⁾; Shiraki 1930, p. 15²⁾

Anping (Ampin), V.¹⁾²⁾ (DEI: 1 Typus)

Microdon caeruleus Brunetti 1908, Rec. Ind. Mus. 2, p. 92¹⁾; Sack 1927, p. 319²⁾; Shiraki 1930, p. 14³⁾

Kankau, VIII.²⁾³⁾ (DEI: 2); Karenko, VII.³⁾; Riran, V.³⁾; Chipon, V.³⁾; Koshun, V.³⁾; Shinchiku, VII.³⁾; Suisha, V.—VI.³⁾; Toa Tsui Kutsu V. (DEI: 1, det. Sack); Gebiet des Shisastammes, V. bis VI. (DEI: 1); Kotosho, VII.³⁾

Sonstige Verbreitung: Assam¹⁾

var. *simplex* Shiraki 1930, p. 15¹⁾

Asahi, V. 1)

Sonstige Verbreitung: Japan (Yamaguchi)

Microdon formosanus Shiraki 1930, p. 22, Fig. 6¹⁾

Horisha, V. 1); Musha, V. 1)

Microdon (Stenomicrodon) purpureus Hall 1937, p. 26¹⁾

Tainan 1)

Microdon ruficauda Brunetti 1908, Rec. Ind. Mus. 2, p. 93¹⁾; Sack

1922, p. 273²⁾; Shiraki 1930, p. 15³⁾

Toa Tsui Kutsu, V. 2)³⁾ (DEI: 1); Horisha, VI. 3)

Sonstige Verbreitung: Calcutta 1)

Microdon stilboides Walker 1849, List Dipt. Brit. Mus. 3, p. 538; Sack

1922, p. 273¹⁾; Shiraki 1930, p. 17²⁾

Kosempo, V. 1)²⁾ (DEI: 1); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. 1)

(DEI: 1); Horisha, IV. 2); Koshun, IV., V. 2); Suisha, V. 2)

Sonstige Verbreitung: Indien, Java

Myxogasteroides nigripennis Sack 1922, p. 275, Fig. 20, 21¹⁾; Shiraki

1930, p. 11, Fig. 3²⁾

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 2 Typen + 2); Shinchiku, VII. 2);

Tompo, IX. 2); Sansanrin, V. 2); Kosempo, VI. 2); Chipon, VII. 2);

Karenko, VII. 2); „Formosa“ (DEI: 2)

Paramyxogasteroides variegata Sack 1922, p. 274, Fig. 17—19¹⁾; Shi-

raki 1930, p. 9, Fig. 2²⁾

Toa Tsui Kutsu, V. 1)²⁾ (DEI: 2 Typen); Kosempo, VI. 2); „For-

mosa“ (DEI: 2)

Subfamilie *Volucellinae*

Volucella dimidiata Sack 1922, p. 261, Fig. 3¹⁾; Shiraki 1930, p. 228²⁾

Taihorinsho, X., XI. 1)²⁾ (DEI: 1 Typus); Hosan, V. 2)

Volucella nigricans Coquillett 1898, Proc. U. S. Nat. Mus. 21, p. 324;

Shiraki 1930, p. 216²⁾

Fuhosho, V. 2)

Sonstige Verbreitung: Japan, Korea

Volucella taiwana Shiraki 1930, p. 215¹⁾

Tenchosan-Karenko, V. 1)

Volucella terauchii Matsumura 1916, p. 237, Taf. 17, Fig. 15¹⁾; Shiraki

1930, p. 219²⁾

Formosa 2)

Volucella trifasciata Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 196; Shi-

raki 1930, p. 223¹⁾

Synonym (nach Shiraki):

nubeculosa Bigot 1875, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 5, p. 474; Kertész 1913, p. 281²⁾; Sack 1922, p. 262, Fig. 4³⁾

Fuhosho, VII. 1)²⁾ 3) (DEI: 1); Kosempo, I. 2)¹⁾; Polisha, III. 2); Horisha, III. 1); Taito, II., III. 1)

Sonstige Verbreitung: China, Malaya, Borneo, Celebes, Java, Birma, Indien

Volucella vespimima Shiraki 1930, p. 228, Fig. 52¹⁾

Arisan, VI. 1); Kobayashi, VIII. 1); Karenko, VII.—VIII. 1)

Graptomyza arisana Shiraki 1930, p. 236, Fig. 54¹⁾

Arisan, V. 1)

Graptomyza cynocephala Kertész 1914, p. 81, Fig. 4 a, b¹⁾; Shiraki 1930, p. 235²⁾

Chip-Chip, I. 1); Shu-Shu, I. 2)

Graptomyza dentata Kertész 1914, p. 81, Fig. 5 a-c¹⁾; Shiraki 1930, p. 238²⁾

Chip-Chip, I. 1); Toyenmongai¹⁾; Shu-Shu, I. 2)

Graptomyza dolichocera Kertész 1914, p. 79, Fig. 3 a—c¹⁾; Sack 1922, p. 262²⁾; Shiraki 1930, p. 237³⁾

Kosempo, IV. 1)³⁾; Chip-Chip, I. 1); Koshun, III., IV., V. 1)³⁾; Shu-Shu, I. 3); Arisan, VI. 3); Shinchiku, VII. 3); Ryuganrin, V. 3); Chippon, V. 3); Toa Tsui Kutsu, V. 2) (DEI: 1)

Graptomyza fascipennis Sack 1922, p. 262, Fig. 5—8¹⁾; Shiraki 1930, p. 235²⁾

Gebiet des Shishastammes¹⁾; Shisha²⁾; Taihyo, III. 2); Shinshiku, VII. 2); Banshoryo (Shisha), VI. (DEI: 1 „Typus“)

Graptomyza formosana Shiraki 1930, p. 234¹⁾ nom. nov.

Synonym (nach Shiraki):

Graptomyza gibbula Kertész 1914, p. 84, Fig. 6 a—c²⁾, nec Walker; Sack 1922, p. 264³⁾

Chip-Chip, I. 2); Taihorin, IV. 3)¹⁾ (DEI: 1); Shu-Shu, I. 1); Shinchiku, VII. 1); Arisan, X. 1); Kosempo, VI. 1)

Graptomyza nitobei Shiraki 1930, p. 238, Fig. 55¹⁾

Arisan, X. 1)

Graptomyza obtusa Kertész 1914, p. 77, Fig. 2 a—c¹⁾; Sack 1922, p. 264²⁾; Shiraki 1930, p. 236³⁾

Toyenmongai¹⁾ 3); Toa Tsui Kutsu, V. 2)³⁾ (DEI: 2)

Subfamilie *Eristalinae*

Eristalis cerealis Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 232; Shiraki 1930, p. 130¹⁾

Synonym (nach Shiraki):

„*E. orientalis* Wied.“ Sack, 1922, p. 265²⁾

„*E. proserpina* Wied.“ Sack 1927, p. 312³⁾

Chosokei³⁾ (DEI: 9); Suisharyo²⁾; Tappani²⁾ (DEI: 10); Arisan, V., X.,¹⁾; Chikuto, III.¹⁾; Kagi, II.¹⁾; Taiheisan, IV.¹⁾; Hassensan, VI.¹⁾; Kanko, IV.¹⁾; Taito, II.¹⁾; Musha, V.¹⁾; Taihoku, II.¹⁾; Rantaisan, III.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Japan, Korea, Sachalin

Pseuderistalis bicolor Shiraki 1930, p. 148, Fig. 40¹⁾

Suisha, X.¹⁾

Eristalomyia cingulata Sack 1927, p. 311¹⁾; Shiraki 1930, p. 140²⁾

Tappani, VII.¹⁾²⁾ (DEI: 1 Typus); Kanshizei, VI.¹⁾²⁾; Kosempo, VI.²⁾; Horisha, V., VIII.²⁾; Arisan, X.²⁾; Musha, V., VI.²⁾

Eristalomyia formosana Shiraki 1930, p. 144, Fig. 39¹⁾

nur über 2000 m¹⁾; Arisan, X., VI.¹⁾; Taiheisan, VIII.¹⁾; Tencho-san, VIII.¹⁾

Eristalomyia semisplendens Shiraki 1930, p. 140, Fig. 38¹⁾

Synonym (nach Shiraki);

„*Eristalis nigra* Wied.“ Sack 1927, p. 313, Fig. 9, 10²⁾

Sokutsu, IX.²⁾¹⁾; Kankau, VIII.²⁾¹⁾ (DEI: 1); Kosempo, VI.¹⁾; Kotosho, VII.¹⁾

Eristalomyia tenax Linné 1758, Syst. Nat. 10, p. 591; Kertész 1913, p. 281¹⁾; Sack 1922, p. 264²⁾; Sack 1927, 314³⁾; Shiraki 1930, p. 140⁴⁾

Kosempo, IV.¹⁾; Kankau³⁾; Fuhosho, IV.²⁾ (DEI: 3); Chip-Chip, II. (DEI: 2); Chosokei (DEI: 6); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 8)

„Sowohl im Flachland als bis zu einer Höhe von 2700 m“⁴⁾

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit (außer Neotropis)

Eristalodes kobusi de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 252¹⁾; Kertész 1913, p. 282²⁾; Sack 1922, p. 265³⁾; Shiraki 1930, p. 135⁴⁾

Synonym (nach Shiraki):

Eristalis arisanus Matsumura 1915, p. 264, Taf. 18, Fig. 8

Kosempo, IV., IX.²⁾⁴⁾; Chip-Chip, I.²⁾ (DEI: 2); Fuhosho, III.²⁾⁴⁾; Kanshizei, V.³⁾ (DEI: 2); Yama no Taiko, IX.³⁾ (DEI: 2); Tainan (DEI: 2); Shinchiku, VII.⁴⁾; Taikan, IX.⁴⁾; Tabo, VIII.⁴⁾; Horisha, VIII., XII.⁴⁾; Taiheisan, VIII.⁴⁾; Musha, V., VI.⁴⁾; Arisan, V., VI., X.⁴⁾; Namakaban, IX.⁴⁾; Niitaka, VII.⁴⁾; Taiko, II.⁴⁾; Chipon, V.⁴⁾; Karenko, VII., VIII.⁴⁾; Shu-Shu, I.⁴⁾; „Formosa“ (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Kertészomyia violascens Kertész 1913, p. 282¹⁾ (*Eristalis*); Sack 1922, p. 265²⁾ („*violaceus*“); Shiraki 1930; p. 151³⁾

Kosempo, IV, V.¹⁾³⁾²⁾; Fuhosho, VII., IX.¹⁾³⁾ (DEI: 1); Polisha (= Horisha) II., IV., V., VIII.¹⁾³⁾; Alikang, VI.¹⁾³⁾; Koshun, IV.,

V. 3); Shinchiku, VII. 3); Kobayashi, VIII. 3); Karenko, VII., VIII. 3); Taito, II., III. 3).

Dissoptera heterothrix de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 273 1); Shiraki 1930, p. 161 2)

Toa Tsui Kutsu, V. 2); Shinnensho, VI. 2); Shinchiku, VII. 2); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Borneo, Neuguinea, Nord-Queensland

Korinchia apicalis Shiraki 1930, p. 157, Fig. 42 1)

Karenko, VII. 1)

Korinchia formosana Shiraki 1930, p. 154, Fig. 41 2)

Shinchiku, VII. 1); Arisan, X. 1); Karenko, VII. 1); Tabani 1) (DEI: 1)

Megaspis errans Fabricius 1787, Mant. Ins. 2, p. 337; Kertész 1913, p. 281 1); Sack 1922, p. 266 2); Shiraki 1930, p. 153 3)

Takao, XI, IV. 1) 3); Koroton, IX., VIII. 1) 3); Yentempo, V., VIII. 1) 3); Akau, VII., XII. 1) 3); Suihenkyaku, VIII., X. 1) 2) 3) (DEI: 11); Pilam, II. 1); Kosempo, I. V., IX. 1) 3) (DEI: 1); Taihorinsho, VIII., V. 1) 3); Kankau 2) (DEI: 10); Yamono Taiko 2); Kanshirei, V. 2) (DEI: 1); Polisha, XII. (DEI: 2); Chosokei (DEI: 2); Taihoku, X. 3); Shinchiku, VIII. 3); Kappansan, IX. 3); Naifumpo, IX. 3); Pinan, VII. 3); Koshun, IV.—V. 3); Ryuganrin, IX. 3); Taikei, IX. 3); Choshu, XI. 3); Kusukusu, III. 3); Taito, IV. 3); Karenko, IV. 3)

Sonstige Verbreitung: Japan, China, Philippinen, Malay. Archipel, Indien, Java, Borneo, Sumatra.

Megaspis zonata Fabricius 1787, Mant. Ins. 2, p. 337; Kertész 1913, p. 281 1); Sack 1922, p. 266 2); Shiraki 1930, p. 152 3)

Takao, X., XII. 1) 3); Kosempo II., XI., VII., III.—V. 1) 3) (DEI: 8); Polisha, XII. 1); Kanshirei, V., IX. 1) 3) (DEI: 3); Fuhosho, IV., VII. 1) 3) (DEI: 4); Taihorinsho, VIII., XI. 1) 3) (DEI: 3); Chip-Chip, I., II. 1) (DEI: 3); Taihoku, II. 3); Tansui, IV. 3); Taipin, XI. 3); Arisan, X. 3); Taiheisan, VIII. 3); Kagi, II. 3); Shinchiku, VII. 3); Horisha, V.—VIII. 3); Shu-Shu 3); Hoozan (DEI: 2); Kankau (Koshun) IX. (DEI: 7); Yamo no Taiko, IX. (DEI: 7); Suisharyo, X. (DEI: 7); Tainan (DEI: 3); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2); Alikang, VI. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: China, Indien, Sumatra, Borneo, Java, Korea, Mandschurei

Mesembrus formosanus Shiraki 1930, p. 172, Fig. 44 1)

Synonym: „*Tubifera albiceps* Wulp“ Sack 1922, p. 266 2)

Paroe 2); Taihorinsho, XI. 1) 2) (DEI: 1); Shinchiku, VII. 1); Horisha, V., VIII., X. 1); Jukirin, V. 1); Namakaban, IX. 1); Tabo, VIII. 1); Kotoshu, III, IV. 1)

- Mesembrius niveiceps* de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 236, Taf. 7, Fig. 16¹⁾; Shiraki 1930, p. 175²⁾
 Suihenkyaku, VIII. 2); Taihorin, VII. 2); Takao, VI., IX., XI., XII. 2);
 Taihoku-Distr., Jushifun, VI. (DEI: 1, det. Sack)
 Sonstige Verbreitung: Java¹⁾; Okinawa.
- Paramesembrius abdominalis* Sack 1927, p. 314, Fig. 11—13¹⁾ (*Tubifera*); Shiraki 1930, p. 176²⁾
 Suisharyo, X. 1) 2) (DEI: 1 Typus + 2); Kankau (Koshun), IX. 1) 2)
 (DEI: 2 Typen + 1); Taito, VI. 2)
 Sonstige Verbreitung: Japan.
- Paramesembrius horishanus* Shiraki 1930, p. 179, Fig. 45¹⁾
 Horisha, VI. 1)
- Azpeytia flavoscutellata* Kertész 1913, p. 286, Fig. 8¹⁾; Shiraki 1930, p. 209²⁾
 Kosempo, III., IV. 1) 2); Hosan, V. 1) 2)
- Azpeytia maculata* Shiraki 1930, p. 209, Fig. 50¹⁾
 in höherer Gebirgslage im Karenko-Bezirk, VII, VIII. 1)
 Sonstige Verbreitung: Tenasserim
- Lathyrrophthalmus albitarsis* Sack 1927, p. 306¹⁾; Shiraki 1930, p. 136²⁾
 Suisharyo, X. 1) 2) (DEI: 6 Typen); Chosokei¹⁾ (DEI: 1 Typus);
 Takao, VI., XI., XII. 2); Hozan, XII. 2); Kagi, I., VIII. 2); Toseikaku, XI. 2); Sansanrin, VI. 2); Taihu, V. 2); Sozan, VI. 2); Taihoku, VI. 2)
- Lathyrrophthalmus arvorum* Fabricius 1787, Mant. Ins. p. 335; Kertész 1913, p. 281¹⁾; Sack 1922, p. 265²⁾; Shiraki 1930, p. 138³⁾
 Takao, XI., XII., VII., II. 1) 3); Kosempo, I., VI. 1) 3); Kyukyukudo, III., I. 1) 3); Suihenkyaku, VIII., VII. 1) 3); Fuhosho, VIII. 3) (DEI: 1);
 Kanshirei, V. 3) (DEI: 4); Kankau, VII., IV. 3) (DEI: 4); Koshun, VII. 3) (DEI: 2); Suisharyo, X., VIII. 3) (DEI: 19); Taihorin, XI. 3) (DEI: 3); Kagi, II., VIII. 3); Musha, V., VI. 3); Shinchiku, VII. 3);
 Banshoryo, XI. 3); Arisan, X., VI. 3); Nanto, V. 3); Daitotei, VI. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 5)
 Sonstige Verbreitung: Okinawa, China, Malay. Archipel, Java, Indien
- Lathyrrophthalmus obscuritarsis* de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 250, Taf. 7, Fig. 19, 20¹⁾; Sack 1922, p. 265²⁾; Shiraki 1930, p. 137³⁾
 Kankau, V. 2) 3) (DEI: 3); Tainan, VII. 2) 3); Takao, XI., XII., VI. 3);
 Suisharyo, X. 3); Koshun, IV., V. 3); Hozan, XII. 3); Kagi, XI. 3);
 Taichu, VI. 3); Horisha, V., VIII., X. 3)
 Sonstige Verbreitung: Singapore, Indien
- Lathyrrophthalmus ocularis* Coquillett 1898, Proc. U.S. Nat. Mus. 21, p. 325¹⁾ (*Eristalis*); Shiraki 1930, p. 136²⁾
 Shorkuoji, VII. 2)

Sonstige Verbreitung: Japan, Kyushu, Korea

Lathyrrophthalmus quinquestriatus Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 289; Sack 1922, p. 265¹⁾; Shiraki 1930, p. 137²⁾

Kotosho, III., IV., 2); Kuskusu, III., 2); Horisha, V., VIII., XII., 2); Taihoku, II., 2); Suisharyo, VIII., X., 1) 2) (DEI: 5); Takao, VII., VIII., XII., 2); Sokutsu, V., 2); Kosempo, II., 2); Suihenkyaku, VIII., 2) (DEI: 4); Kankau (Koshun), IX. (DEI: 7); Taihorinsho, XI. (DEI: 2); Yamo na Taiko, IX. (DEI: 4); Tappani (DEI: 1); Kanshizei, V. (DEI: 1); Tainan (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 7)

Sonstige Verbreitung: Japan, Sumatra, Java, Indien, Annam, Borneo

Tigridomyia curvigaster Macquart 1842, Dipt. Exot. 2, p. 62, Taf. 11, Fig. 1; Shiraki 1930, p. 208¹⁾

Synonym (nach Shiraki): *Teuchomerus orientalis* Brunetti 1908, Rec. Ind. Mus. 2, p. 74; Sack 1922, p. 266, Fig. 9—11²⁾

Kankau, IX., 1) 2) (DEI: 13); Banshoryo, IX., 1); Kosempo, VIII., 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Java, China

Paramallota formosana Shiraki 1930, p. 196, Fig. 47¹⁾

Horisha, V., VIII., 1); Koshun, V., 1); Kosempo, IV., VI., 1)

Paramallota horishana Shiraki 1930, p. 194, Fig. 46¹⁾

Synonym (nach Shiraki): „*Mallota orientalis* Macquart“ Sack 1927, p. 318²⁾

Fuhosho 1) 2) (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V., 1) 2) (DEI: 1); Horisha, V.—VIII., 1); Kosempo, III., 1); Suisharyo, X., 1)

Paramallota haemorrhoidalis Sack 1927, p. 317, Fig. 16, 17¹⁾; Shiraki 1930, p. 192²⁾

Kosempo, V., 1) 2) (DEI: 1 Typus); Chosokei, IX., 1) 2)

Subfamilie *Ceriodinae*

Ceroides (Monoceromyia) annulata Kertész 1913, p. 407, Fig. 3¹⁾; Sack 1922, p. 276²⁾; Shiraki 1930, p. 5³⁾

Synonym: *Sphiximorpha horishana* Matsumura 1915, p. 186

Toyenmongai 1); Kanshirei, X., 1) 3); Fuhosho, VII., 1); Suihenkyaku, VIII., 1) 3); Sokutsu, IX., 2) (DEI: 1); Karenko, VII., 3); Naihumpo, IX., 3); Shinchiku, VII., 3)

Ceroides (Ceroides) formosensis Shiraki 1930, p. 3, Fig. 1¹⁾

Musha, V., 1); Shinnensho, V., 1)

Ceroides (Monoceromyia) similis Kertész 1913, p. 405, Fig. 1¹⁾; Sack 1922, p. 276²⁾; Shiraki 1930, p. 5³⁾

Kosempo, IV., 1) 2) 3) (DEI: 1); Fuhosho, VII., 1); Toyenmongai 1); Sokutsu, VI., 2) 3) (DEI: 1); Taihoku, IV., 3); Maruyama, VI., 3) (DEI: 1); Horisha, V., 3); Koshun, V., 3); Kankau, V., 3); „Formosa I“ (DEI: 4)

Subfamilie *Cinxinae*

Cinxia completa Curran 1929, p. 502¹⁾ (*Sericomyia*)
Kiluno (Formosa)¹⁾

Subfamilie *Milesiinae*

Milesia fissiformis Speiser 1911, p. 241¹⁾; Sack 1922, p. 272²⁾; Shiraki 1930, p. 116³⁾

Synonym: *Milesia yayeyamana* Matsumura 1915, p. 230

Milesia elegans Matsumura 1915, p. 232

Banshoryo, VI.²⁾ (DEI: 3); Taihorinsho, XI. (DEI: 1, det. Sack); Tainan (DEI: 1, det. Sack); Sokutsu, VI., V., IX.³⁾ (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Sack); Taiheisan, VIII.³⁾; Suihenkyaku, VIII.³⁾; Taihorin, V.³⁾; Taipin, IX.³⁾; Shinchiku, VII.³⁾; Fuhosho, V.³⁾; Kobayashi, VIII.³⁾; Horisha, V.³⁾; Shu-Shu, VII.³⁾; Kosempo, VI., IX.³⁾; Koshun, IV.³⁾; Karenko, VII.³⁾

Sonstige Verbreitung: Riukiu-Inseln (var. *okinawaensis* Shiraki)

Milesia vesparia Shiraki 1930, p. 118, Fig. 35, 36¹⁾

Shinchiku, VII.¹⁾; Horisha, V.¹⁾; Rono, V.¹⁾; Karenko, V.¹⁾; Fuhosho, IV.¹⁾; Kosempo, V., VI.¹⁾

Pseudovolucella mimica Shiraki 1930, p. 41, Fig. 11¹⁾

Asahi, V.¹⁾; Tamaru, IX.¹⁾

Lycastris cornutus Enderlein 1911, p. 136; Sack 1913, p. 7, Fig. 5—6²⁾; Shiraki 1930, p. 47³⁾

Kosempo, I.¹⁾; Hoozan, V., XII.²⁾³⁾ (DEI: 8); Taihorinsho, X., XI.²⁾³⁾ (DEI: 1); Paiwan, X.³⁾; Arisan, X.³⁾; Kanshirei, II.³⁾; Rono, IV.³⁾; Shinsinei, nördl. Paiwan-Distr., 4000 F. (DEI: 1); „Formosa I“ (DEI: 1)

Criorrhina apiformis Shiraki 1930, p. 52, Fig. 15¹⁾

Karenko, VII.¹⁾

Criorrhina formosana Shiraki 1930, p. 51, Fig. 14¹⁾

Rantaizan, III.¹⁾

Criorrhina rufipes Matsumura 1915, p. 218, Taf. 17, Fig. 1¹⁾; Shiraki 1930, p. 50²⁾

Arisan, VI.²⁾; Sankakuho²⁾

Sonstige Verbreitung: Japan (Kyoto)²⁾

Criorrhina setosa Shiraki 1930, p. 54, Fig. 16¹⁾

Karenko, VII.¹⁾

Criorrhina trifasciata Shiraki 1930, p. 56, Fig. 17¹⁾

Rantaizan, III.¹⁾

Ferdinandea formosana Shiraki 1930, p. 103, Fig. 31¹⁾

Musha, V.¹⁾

Temnostoma taiwanum Shiraki 1930, p. 106, Fig. 32¹⁾

Asahi, V. 1)

Takaomyia formosana Shiraki 1930, p. 125, Fig. 37¹⁾

Horisha, V. 1); Musha, V. 1)

Takaomyia johannis Hervé-Bazin 1914, Ann. Soc. Ent. France 83, p. 413, Fig. 13¹⁾; Shiraki 1930, p. 122²⁾

Taihorin, V. 2); Fuhosho, III. 2); Toyenmongai²⁾; „Formosa I“ (DEI: 11)

Sonstige Verbreitung: Japan¹⁾

Syrirta orientalis Macquart 1842, Dipt. Exot. 2, p. 76¹⁾; Sack 1922, p. 270²⁾; Shiraki 1930, p. 89³⁾

Taihoku, VIII. 3); Shinchiku, VII. 3); Kagi, I. 3); Kosempo, VI., IX. 3); Rokkiri, X. 3); Ako, VII. 3); Banshoryo, VIII. 3); Namakaban, IX. 3); Koshun, IV. V., X. 3); Kankau, VIII. 2) 3); (DEI: 14); Chipon, V. 3); Yoshinomara, V. 3); Taito, II., III. 3); Shinjo, V. 3); Tompo, IX. 3); Suishoryo, X. 3); Tabani, III. 3); Tainan, III. 3); Takao, VI. 3); Sokutso, V. 3); Kotosho, III., VII. 3); Macuyama, V.—VI. 2) (DEI: 1); Taihorin (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Singapore, Indien³⁾

var. *femorata* Sack 1913, p. 8, Fig. 7¹⁾; Shiraki 1930, p. 89²⁾

Tainan, II. 1) 2) (DEI: 2 Typen); Shirin, III. 2)

Zelima aeneomaculata de Meijere, Tijds. Ent. 51, p. 227¹⁾; Sack 1922, p. 268²⁾; Shiraki 1930, p. 71³⁾

Arisan, V. 3); Shinchiku, VII. 3); Kobayashi, VIII. 3); Musha, V. 3); Asahi, V. 3); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2, det. Sack)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea

Zelima annulata Brunetti 1913, Rec. Ind. Mus. 9, p. 270, Taf. 14, Fig. 11, 15¹⁾; Shiraki 1930, p. 81²⁾

Horisha, IV. 2); Koshun, IV. 2); Kosempo, III., IV., V. 2); Toyenmongai²⁾; Toa Tsui Kutsu²⁾

Sonstige Verbreitung: Indien¹⁾

var. *ornatipes* Sack 1927, p. 317, Fig. 15¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 Typus)

Zelima armipes Sack 1922, p. 209, Fig. 12, 13¹⁾; Shiraki 1930, p. 80²⁾, Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1 Typus); Fuhosho¹⁾; Banshoryo, V. 2); Koshun, IV. 2); Shinchiku, VII. 2); Kosempo, III., IV., V. 2); Taihorin, V. 2); Toyenmongai²⁾

Zelima bimaculata Shiraki 1930, p. 85, Fig. 26¹⁾

Taikan, IX. 1)

Zelima brachypalpoides Shiraki 1930, p. 70, Fig. 22¹⁾

Sinsuiei, III. 1)

- Zelima coquilletti* Hervé-Bazin 1914, p. 409 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 72 ²⁾
 Tabani, VI. ²⁾; Taihorin, VII. ²⁾; Hozan, VII. ²⁾; Toyenmongai ²⁾
 Sonstige Verbreitung: Japan ²⁾
- Zelima flavipes* Sack 1927, p. 316, Fig. 14; Shiraki 1930, p. 82 ²⁾
 Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Musha, V. ²⁾; Horisha, V. ²⁾
- Zelima formosana* Matsumura 1915, p. 251, Taf. 17, Fig. 26 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 77 ²⁾
 Horisha ²⁾; Arisan, V. ²⁾
- Zelima makiana* Shiraki 1930, p. 65, Fig. 20 ¹⁾
 Arisan, VI. ¹⁾; Kosempo, III. ¹⁾; Toyenmongai ¹⁾; Fuhosho, IV. ¹⁾
- Zelima spinipes* Shiraki 1930, p. 72, Fig. 23 ¹⁾
 Shinchiku, VII. ¹⁾; Karenko, VII. ¹⁾; Koshun, IV. ¹⁾; Taiheizan, VIII. ¹⁾
- Eumerus aurifrons* Wiedemann 1824, Analecta Ent. p. 32; Sack 1922, p. 270 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 98 ²⁾
 Shinchiku, VII. ²⁾; Tappan, VI. ²⁾; Suisha, V. ²⁾; Kosempo, VI. ²⁾; Toasnikutsu, V. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 2); Kankau (Koshun), IX. ²⁾ (DEI: 2); Tainan (DEI: 4)
 Sonstige Verbreitung: Ostindien, Java
- Eumerus doleschallii* Shiraki 1930, p. 97 ¹⁾, nomen novum pro *argyropus* Doleschall nec Loew
 Sokutsu, VI. ¹⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun), VI., VII. ¹⁾ (DEI: 1); Kotosho, VII. ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾
- Eumerus figurans* Walker 1860, Proc. Linn. Soc. London, 4, p. 121; Shiraki 1930, p. 97 ¹⁾
 Synonym: *flavicinctus* de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 215; Sack 1922, p. 270, Fig. 14 ²⁾
 Taihoku, VI., IX., XII., ¹⁾; Taihorin, VI., VII. (DEI: 1); Horisha, XII. ¹⁾; Suisha, V. ¹⁾; Musha, VI. ¹⁾; Sansarin, VI. ¹⁾; Kosempo, VI. ¹⁾; Toasnikutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1); Tainan, V. ¹⁾ (DEI: 1); Hozan, VI. ¹⁾ ²⁾; Kauiran, IX. ¹⁾; Kuraru, X. ¹⁾; Kankau, IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 4); Kotosho, III. ¹⁾; Tabani, III. ¹⁾; Ampin, V. ¹⁾; Fuhosho, III. ¹⁾; „Formosa I“ (DEI: 2); Macuyama, V.—VI. (DEI: 3); Hokuto, XII. (DEI: 1); Polisha, XII. (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Sumatra, Bali, Celebes
- Eumerus japonicus* Matsumura 1915, p. 185, Taf. 16, Fig. 11 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 96 ²⁾
 Hoozan (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Japan, Korea ²⁾
- Eumerus nicobarensis* Schiner 1868, Reise Freg. Novara, p. 368; Sack 1922, p. 271 ¹⁾; Shiraki 1930, p. 96

Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Nicobaren

Eumerus okinawensis Shiraki 1930, p. 98, Fig. 30¹⁾

Kotosho, VII.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Okinawa, Japan, Philippinen

Eumerus rufitibis Sack 1922, p. 271, Fig. 15, 16¹⁾; Shiraki 1930, p. 101²⁾

Kankau, VII., IX.²⁾ (DEI: 34); Sokutsu, IX.²⁾; Takao, V.²⁾ (DEI: 1);

Okaseki, VI.²⁾; Kosempo, VI.²⁾; Chipon, V.²⁾; Kotosho, III.²⁾; Pi-

lam, VII. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Okaseki, VI. (DEI: 1)

Eumerus spec. nahe *kongosanensis* Shiraki

DEI: 2 von „Formosa I, Sauter, R.“

Schizophora.

Superfamilie *Conopoidea*

Familie *Conopidae*

Subfamilie *Conopinae*

Conops nubeculosus fulvicornis Kröber 1913, p. 279¹⁾; Kröber 1916, p. 44²⁾; Kröber 1927, p. 334

Sokutsu, IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Koshun, IX.²⁾

Conops nigripes Kröber 1913, p. 278¹⁾; Kröber 1927, p. 334

Taihorinsho, XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Sokutsu, X.¹⁾ (DEI: 1 Typus);

Toyenmongai¹⁾; Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tappani (DEI:

1 „Typus“); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3, det. Kröber); Tainan

(DEI: 8, det. Kröber); „Formosa“ (DEI: 8, det. Kröber)

Conops punctifrons Kröber i. l.

Nördl. Paiwan-Distr., Shinsine, 4000 F., X. (DEI: 1)

Conops rufomaculatus Kröber 1916, p. 44¹⁾; Kröber 1927, p. 334

Kagi¹⁾; Kanshirei¹⁾; Takao¹⁾; „Formosa“ (DEI: 3, det. Kröber)

Brachyceraea obscuripennis Kröber 1913, p. 277¹⁾; Kröber 1927, p. 333

Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Sokutsu, IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus);

Taihorin, XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3,

det. Kröber)

Occemyia caenovalva Kröber 1916, p. 104¹⁾; Kröber 1927, p. 335

Tappani¹⁾ (DEI: 1 Typus + 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det.

Kröber)

Occemyia sauteri Kröber 1916, p. 103¹⁾; Kröber 1927, p. 335

Kosempo¹⁾ (DEI: 1 Typus); Sokutsu¹⁾; Taihorin, V.¹⁾ (DEI: 1);

„Formosa“ (DEI: 1)

Physocephala limbipennis de Meijere 1910, Tijd. Ent. 53, p. 165¹⁾;
Kröber 1927, p. 333

Synonym (nach Kröber): *annulata* Kröber 1913, p. 281²⁾; Kröber
1915, p. 60³⁾; Kröber 1915, p. 125⁴⁾

Anping, VII. 2) (DEI: 1 Typus von *annulata*); Takao 2) (DEI: 4);
Paroe, VIII. 2) (DEI: 1); Kagi 2); Kosempo 3); Koshun 3); Kankau,
IX. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Bali, Java, Krakatau¹⁾, Ceylon, Burma⁴⁾

Physocephala sauteri Kröber 1913, p. 280¹⁾; Kröber 1927, p. 333
Tappani¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Superfamilie *Acalyptratae* *Trypetides*

Familie *Pyrgotidae*

Apyrgota formosana Hennig 1936, p. 253¹⁾
Kagi, VI. 1)

Adapsilia fascialis Hendel 1934, p. 148¹⁾
„Formosa“¹⁾

Campylocera hirsuta Aldrich 1928, p. 1¹⁾
Taihoku¹⁾

Familie *Platystomidae*

Rivellia basilaris Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 510; Hendel
1914, p. 155

Polisha, VII. (DEI: 1); Anping, IX. (DEI: 2); Macuyama, V.—VI.
(DEI: 1); Kankau, V., IX. (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)
Chipun, Puyuma-Distr. VII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Rivellia fusca Thomson 1868, Eugenes Resa, Dipt., p. 575; Hendel
1914, p. 156

Tainan, V. (DEI: 1); Kankau, IX. (DEI: 1); Kankau (Koshun) VIII.
(DEI: 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. (DEI: 4); Kosempo, V.
(DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Rivellia sauteri Hendel 1914, p. 158¹⁾
Formosa¹⁾

Xenaspis flavipes Enderlein 1924, p. 102¹⁾
Toyenmongai bei Tainan¹⁾

Xenaspis formosae Hendel 1913, p. 36¹⁾; Hendel 1914, p. 40; Ender-
lein 1924, p. 103

Kosempo, V. 1) (DEI: 41 Typen); Alikang, VI. 1) (DEI: 10 Typen);

Anping, VI. (DEI: 11 „Typen“); Tainan (DEI: 9 Typen + 5); „Formosa“ (DEI: 8)

Plagiostenoptera aenea Wiedemann 1819, Zool. Mag. 3, p. 29; Hendel 1913, p. 35¹⁾; Hendel 1914, p. 54; Enderlein 1924, p. 107²⁾

Koshun, VIII.¹⁾ (DEI: 8); Fuhosho, III.¹⁾ (DEI: 2); Kosempo¹⁾; Takao, XII., V.²⁾ (DEI: 1); Polisha, XII. (DEI: 1); Paroe, VIII. (DEI: 2); Tainan (DEI: 10); Kankau (Koshun) IV. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 6)

Sonstige Verbreitung: Oriental. und Notogäische Region

Plagiostenoptera formosana Hendel 1913, p. 35¹⁾; Hendel 1914, p. 56²⁾ („*formosae*“)

Kosempo, IV.—V.¹⁾²⁾ (DEI: 13 Typen + 7); Koshun, X. (DEI: 2 „Typen“); Sokutsu, V. (DEI: 1)

Plagiostenoptera (Meringomeria) olivacea Hendel 1913, p. 36¹⁾; Hendel 1914, p. 67²⁾; Enderlein 1924, p. 109³⁾ („*Meringomeria aenea* Hend.“)

„Formosa“¹⁾²⁾ (DEI: 3 Typen + 1); Toyenmongai³⁾

Plagiostenoptera soror Enderlein 1924, p. 108¹⁾

Toyenmongai¹⁾; Taka¹⁾

Elassogaster aereus Hendel 1913, p. 36¹⁾; Hendel 1914, p. 72²⁾

Kanshirei, V.¹⁾ (DEI: 4); Kagi²⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 11); Tainan (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 9)

Elassogaster quadrimaculatus Hendel 1914, p. 77¹⁾; Enderlein 1924, p. 111²⁾

Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 5); Daitorinsho¹⁾; Toyenmongai²⁾; Tainan (DEI: 10); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 4); „Formosa“ (DEI: 1)

Elassogaster sepsoides Walker 1861, Proc. Linn. Soc. 5, p. 163; Hendel 1913, p. 36¹⁾; Hendel 1914, p. 82²⁾

Koshun, IX.¹⁾ (DEI: 1); Tainan²⁾; Takao²⁾; Pilam, VII. (DEI: 2); Anping, V. (DEI: 2); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea, Amboina, Ceylon

Elassogaster hilyendorfi Enderlein 1924, p. 111; Hennig, 1940, p. Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: „Japan“

Rhytidortalis cribrata Hendel 1914, p. 121¹⁾

Takao¹⁾

Loxoneura formosae Kertész 1909, p. 338¹⁾; Hendel 1913, p. 36²⁾; Hendel 1914, p. 197³⁾; Enderlein 1924, p. 119⁴⁾

Kosempo, V., VII., XI.¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ (DEI: 9); Pilam¹⁾⁴⁾; Anping, VI.²⁾ (DEI: 1); Koshun, VIII., X.²⁾ (DEI: 8); Taihorinsho, IX., XI.²⁾ (DEI: 11); Fuhosho, IX.²⁾ (DEI: 13); Toyenmongai⁴⁾; Tainan (DEI: 1); Banshoryo (Shisha), VI. (DEI: 5); Hoozan (DEI: 1);

- Yamo no Taiko, IX. (DEI: 2); Chip-Chip, I, II. (DEI: 2); Alikang, VI. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 14)
- Tropidogastrella tropida* Hendel 1913, p. 37¹⁾; Hendel 1914, p. 285²⁾; Enderlein 1924, p. 130³⁾
- Fuhosho, III. ¹⁾ (DEI: 23); Taihorinsho ¹⁾; Toyenmongai ³⁾; Kosempo ³⁾; Sokutsu, VI. (DEI: 4); „Formosa“ (DEI: 21)
- Naupoda contracta* Hendel 1914, p. 299¹⁾
- Kosempo, V. ¹⁾; (DEI: 1); Fuhosho ¹⁾; Hoozan, I. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 15)
- Prosthiochaeta cyaneiventris* Enderlein 1924, p. 134¹⁾; Hennig 1940, p. 312
- Toyenmongai ¹⁾; „Formosa“ (DEI: 2)
- Pterogenia eurysterna* Hendel 1913, p. 37¹⁾; Hendel 1914, p. 319²⁾; Enderlein, 1924, p. 132³⁾
- Kosempo, VI. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 7); Alikang, VI. ¹⁾ (DEI: 1); Toyenmongai ³⁾; Sokutsu, VI. (DEI: 25); Chip-Chip (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 18)
- Pterogenia flavopicta* Hennig 1940, p. 313¹⁾
- „Formosa“ ¹⁾
- Pterogenia hologaster* Hendel 1913, p. 37¹⁾; Hendel 1914, p. 311²⁾; Enderlein 1924, p. 132³⁾
- Koshun ¹⁾; Kosempo ²⁾ (DEI: 1); Toyenmongai ³⁾; Sokutsu, VI. (DEI: 10); „Formosa“ (DEI: 10)
- Pterogenia luctuosa* Hendel 1913, p. 37¹⁾; Hendel 1914, p. 308²⁾; Enderlein 1924, p. 13³⁾
- Alikang, VI. ¹⁾; Kosempo, II., V. ²⁾ ³⁾ (DEI: 1); Toyenmongai ³⁾; Banshoryo (Shisha), VI. (DEI: 1); Gebiet des Shisha-Stammes, V. bis VI. (DEI: 2); Sokutsu, VI. (DEI: 4); „Formosa“ (DEI: 5)
- Pterogenia minuspicta* Hennig 1940, p. 314¹⁾
- „Formosa“ ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Pterogenia ornata* Hennig, 1940, p. 315¹⁾
- „Formosa“ ¹⁾
- Pterogenia rectivena* Enderlein 1924, p. 132¹⁾
- Toyenmongai ¹⁾
- Euprosopia curtoides* Hennig, 1940, p. 312¹⁾
- Synonym: „*Euprosopia curta* O.-S.“ Hendel 1914, p. 332²⁾
- Kankau VII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Koshun ²⁾
- Euprosopia longifacies* Hendel 1914, p. 350¹⁾
- Fuhosho ¹⁾
- Euthyplatystoma sauteri* Hendel 1913, p. 36¹⁾; Hendel 1914, p. 400²⁾; Enderlein 1924, p. 150³⁾; Hennig 1940, p. 312, var. ⁴⁾
- Fuhosho, III. ¹⁾ (DEI: 1); Taihorinsho ²⁾; Toyenmongai ³⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 9); Sokutsu, VI. (DEI: 18); Kankau (Koshun), VIII.

(DEI: 4); Kosempo, V. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 17); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. 4) (DEI: 5)
Sonstige Verbreitung: Tonking 2)

Familie *Ulidiidae*

Physiphora (Clio chloria) aenea Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 335;
Hendel 1913, p. 35 1) (*Chrysomyza*)

Tainan, II., III., X. 1) (DEI: 9); Kosempo, VII. (DEI: 1); Anping, V., VI., VII., IX. (DEI: 4); Chip-Chip, I. (DEI: 1); Pilam, VI. (DEI: 3); Chipun, Puyuma-Distr. VII. (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Mauritius, Seychellen

Physiphora (Physiphora) longicornis Hendel 1909, p. 621, Fig. 1 1)
Hendel 1913, p. 35 2)

Takao 2); Tainan, III. 2) (DEI: 1); Koshun, I., VII., IX. 2) (DEI: 19); Fuhosho, III. 2) (DEI: 1); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 355)

Sonstige Verbreitung: Ceylon 1)

Familie *Trypetidae*

Subfamilie *Dacinae*

Adrama apicalis Shiraki 1933, p. 44, Fig. 15, Taf. 1, Fig. 2 1)
nach Munro vielleicht = *austeni*

Koshun, IV. 1)

Adrama austeni Hendel 1912, Wien. Ent. Zeit. 31, p. 12; Munro 1935, p. 199 2)

Maruyama, IV. 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Munro)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Sikkim

Zeugodacus ambiguus Shiraki 1933, p. 85, Fig. 23, Taf. 2, Fig. 2 1)
? var. von *scutellatus*?

Koshun, IV. 1)

Zeugodacus arisanicus Shiraki 1933, p. 81, Fig. 22, Taf. 2, Fig. 3 1)
Arisan, X. 1)

Zeugodacus caudatus Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 276; Shiraki 1933, p. 88 1)

Toroen, X. 1); Funkiko, X. 1); Kayahara, IX. 1); Kuru, IX. 1); Hoozan, III. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Indien, Ceylon

Zeugodacus lipsanus Hendel 1915, p. 427 1); Shiraki 1933, p. 101 2);
Munro 1935, p. 201 3)

Synonym: *Dacus a* Hendel 1912, p. 22 4)

Kankau, V. 3); Koshun, IX., IV. 3) 2) 4) (DEI: 2); Tainan, IV. 2);
Suisharyo, X.

Zeugodacus nigrifacies Shiraki 1933, p. 99, Fig. 3, Taf. 3, Fig. 1¹,
Arisan, IV. 1); Tamaru, IX. 1)

Zeugodacus nubilus Hendel 1912, p. 16—18, Taf. 1, Fig. 2¹); Shiraki
1933, p. 91²); Munro 1935, p. 201³)

Kankau, VIII. 3) (DEI: 4); Anping, V. 3) (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu,
V. 3) (DEI: 3); Hoozan 3); Gebiet des Shishastammes, VI. (DEI: 6);
Banshoryo (Shisha), VI. (DEI: 3); Fuhosho, III. 1) (DEI: 5); Taiho-
rinsho, VIII. (DEI: 3); Taipin, IV. 2); Tabo, VIII. 2); Tamaru,
VIII. 2); Ryuganrin, V. 2); Kagi, VIII. 2); Tainan, II., IV., V., VII. 2) 1)
(DEI: 10); Mato, III. 2); Takao, XII., I. 2); Kosempo, I. 2); Heito,
XII. 2); Kobayashi, VIII. 2); Taito, VI. 2); Arisan, X. 2); Musha, V.,
VI. 2); Jukirin, II. 2); Kayahara, IX. 2); Naihumpo, X. 2), Kauran,
IX. 2); Horisha, XII. 2); Shimpō, IX. 2); Kanshirei, X. 2); Rikiriki,
III. 2); Hatsune, V. 2); Takesaki, XI. 2); Karenko, V. 2); Yeboshi,
IX. 2); Riran, V. 2); Domon, V. 2); Kappansan, IX. 2); Taikei, IX. 2);
Choshu, XI. 2); Tappan, VI. 2); Chikushimon, XII. 2); Yoshinomura,
V. 2); Taihoku, VIII. 2)

Wirtspflanzen: *Cucurbita moschata*, *Luffa cylindrica*, *Lagenaria*
leucantha, *Cucumis melo*

Zeugodacus okunii Shiraki 1933, p. 104, Fig. 27, Taf. 3, Fig. 2¹)
Kotosho, III., IV. 1)

Zeugodacus scutellatus Hendel 1912, p. 20—21, Fig. 4, Taf. 1¹); Shiraki
1933, p. 82²)

Koshun, X. 1) 2) (DEI: 1 Typus)

Sonstige Verbreitung: Japan 2)

Zeugodacus synnephes Hendel 1913, p. 40, Fig. 2¹); Shiraki 1933, p. 92²)
Arisan, X. 2); Fuhosho, III. 2) (DEI: 1 Typus); Kotosho, III. 2); Ka-
renko, VIII. 2); Domon, V. 2); Koshun, IV. 2); Kuraru, V. 2); Taito,
II., III. 2); Kankau, VIII. 2); Kosempo, III., VI. 2); Kagi, VIII. 2);
Suisharyo, X. 2)

Wirtspflanzen: *Bryonopsis laciniosa*, *Melothria formosana*
var. *dobaensis* Shiraki 1933, p. 95¹)

Doba, IX. 1)

Zeugodacus tibialis Shiraki 1933, p. 96, Fig. 25, Taf. 2, Fig. 6¹)
Kashoto, X. 1); Taito, II., III. 1)

Wirtspflanze: *Cucurbita maxima*

Strumeta antennalis Shiraki 1933, p. 56, Fig. 17, Taf. 1, Fig. 4¹)
Tainan 1)

Wirtspflanze: *Solanum xanthocarpum* (Früchte)

Strumeta cilifer Hendel 1912, p. 15—16, Taf. 1, Fig. 1¹); Shiraki
1933, p. 71²); Munro 1935, p. 200³)

Sokutsu, V. 2); Tabani, III. 2); Takao, VIII. 2); Kagi, VIII. 2); Tap-

pan, VI. 2); Niitaka, VII. 2); Naihumpo, IX. 2); Arisan, X. 2); Arisan 2); Namakaban 2); Koshun, I.—XI. 2) 3) 1) (DEI: 4 Typen); Kankau 3); Tainan, IV. (DEI: 4); Kanshizei (DEI: 1); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 1); Alikang 1)

Wirtspflanze: *Momordica cochinchinensis*

Strumeta costalis Shiraki 1933, p. 66, Fig. 20, Taf. 2, Fig. 1)

Karenko, VI. 1); Pinan, VI. 1); Kaudin, V. 1)

Wirtspflanzen: *Bryonopsis laciniosa*, *solanum suratense*

Strumeta cucurbitae Coquillett 1899, p. 129; Shiraki 1933, p. 73 1); Munro 1935, p. 200 2)

Überall in den Ebenen von Formosa 1); Paroe, IX. 2) (DEI: 1); Kanshizei, VIII. 2) (DEI: 1); Suihenkyaku 2); Kankau 2); Chipun, VII. 2) (DEI: 2); Tainan, II. (DEI: 2); Fuhosho, III. (DEI: 1)

Viele Wirtspflanzen 2)

Sonstige Verbreitung: Japan, Indien, Ceylon, Burma, Siam, Malay. Staaten, China, Philippinen, Hawaii

Strumeta diaphora Hendel 1915, p. 425 1); Shiraki 1933, p. 69 2); Munro 1935, p. 200 3)

Synonym: *Dacus* β Hendel 1912, p. 23 4)

Shu-Shu, VII. 2); Tompo, IX. 2); Tappan, V. 2); Tabani, III., V. 2) 1); Suisharyo, X. 2) 1); Kankau, VIII. 2); Koshun 3) 4); Chipun, Puyuma-Distr. VII. (DEI: 1)

Strumeta ferruginea Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 342; Shiraki 1933, p. 58, Fig. 18 1)

Taihorin, VI., VII. 1); Taipin, IX. 1)

Sonstige Verbreitung: Ceylon, Indien, Java, China, Amboina

var. *dorsalis* Hendel 1912, p. 18, Taf. 1, Fig. 3 1); Shiraki 1933, p. 61, Fig. 18 2); Munro 1935, p. 200 3)

Toa Tsui Kutsu, V. 3) (DEI: 5); Bانشoryo (Shisha), VI. 3) (DEI: 6); Hokuto, XII. 3) (DEI: 1); Tainan, V. 3) (DEI: 2); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. 3) (DEI: 10); Koshun, I., IX. 1) (DEI: 17 Typen + 9); Takao, V. (DEI: 2 „Typen“); Kanshizei, IV. (DEI: 1 „Typus“); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 1 „Typus“)

Strumeta latifrons Hendel 1915, p. 425 1); Shiraki 1933, p. 63 2) Tainan, II., III., IV., XI. 2) 1) (DEI: 1 Typus), Heito, IV., V. 2); Kuraru, V. 2); Pinan, V. 2); Riran, V. 2); Takao, XI. 2) 1); Suisharyo, X. 2) 1); Arisan, X. 2)

Wirtspflanzen: *Solanum incanum*, *S. indicum*

Strumeta parvula Hendel 1912, p. 21—22 1); Shiraki 1933, p. 54 2); Munro 1935, p. 200 3)

Kanshirei, IV. 2) 3) (DEI: 3 Typen); Takao, V., VIII. 2); Tainan, III. 2); Heito, IV. 2); Arisan, X. 2); Riran, VI. 2)

- Strumeta tappana* Shiraki 1933, p. 76, Fig. 21, Taf. 2, Fig. 2 1)
Tappan, VI. 1)
- Mellessis apicalis* Shiraki 1933, p. 117, Fig. 30, Taf. 14, Fig. 5 1)
Koshun (Shijyukei) VIII. 1)
- Meracanthomyia arisana* Shiraki 1933, p. 41, Fig. 14, Taf. 1, Fig. 1 1)
Arisan, X. 1)
- Nitobeia formosana* Shiraki 1933, p. 48, Taf. 9, Fig. 5 1)
Arisan, X. 1)
- Pseudopelmatops nigricalis* Shiraki 1933, p. 51, Taf. 1, Fig. 3, Fig. 16 1)
Arisan, VII., X. 1)
- Paranoplomus formosanus* Shiraki 1933, p. 131, Fig. 32, Taf. 3, Fig. 6 1)
Arisan, X. 1)
- Chelyophora plumosa* Hendel 1913, p. 82 1); Shiraki 1933, p. 134 2);
Munro 1935, p. 202 3)
Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1); Taihoku, IX., XI. 2) 3)
(DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. 3) (DEI: 5); Kankau, IX., VIII. 2) 1)
(DEI: 6 Typen + 5); Tainan, IV. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI.
(DEI: 1); Giran, XII. 2); Shinchiku, VII. 2); Toyen, XI. 2); Horisha,
III. 2); Shonoryo, IV. 2); Funkiko, V. 2); Kansaiho, X. 2); Kanshirei,
VI. 2); Heito, XII. 2); Taihorin, VII. 2); Tabani, III. 2); Kosempo,
VI. 2); Takeyama, V. 2); Koshun, V. 2); Antun, VIII. 2); Kijin, VIII. 2)
Wirtspflanzen: *Bambusa dolichoclada*, *B. oldhami*, *B. stenostachya*,
Dendrocalamus latiflorus, *Phyllostachys Mahinoi*, *Ph. nigripes*,
Ph. pubescens
- Paratrithirum nitobei* Shiraki 1933, p. 138, Fig. 30, Taf. 4, Fig. 1 1);
Munro 1935, p. 202
Arisan, IX. 1)
- Acrotaeniostola sexvittata* Hendel 1915, p. 438, Taf. 8, Fig. 4 1); Shi-
raki 1933, p. 146 2); Munro 1935, p. 203 3)
Taihorin, VII. 2) 1); Kanshirei, VI. 2); Hosan, VIII. 2) 1); Koshun, IV.,
V. 2); Kankau, IV. 2) 1); Taito, II., III. 2); Taiheisan, VIII. 2); Shonoryo,
V. 2); Maruyama, VI. 3) (DEI: 3); Okaseki (Taihoku), VI. (DEI: 1)
- Acrotaeniostola flavoscutellata* Shiraki 1933, p. 149, Fig. 34, Taf. 4,
Fig. 2 1)
Shinchiku, VII. 1); Musha, V. 1)
- Taeniostola connecta* Hendel 1915, p. 436 1); Shiraki 1933, p. 143 2);
Munro 1935, p. 203 3)
Suisha, V. 2); Banshoryo, XI. 2); Kosempo, V., VI. 2) 1); Kanshirei,
IX. 2); Kagi, VIII. 2); Okayama, VII. 2); Toa Tsui Kutsu, V. 3)
(DEI: 1)
Wirtspflanze: *Phyllostachys nigripes*

Iaenostola limbata Hendel 1915, p. 435, Taf. 8, Fig. 3 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 140 ²⁾

Sokutsu, VI. 2) ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 2); Kosempo, VI. 2); Kanshirei, IV., IX. 2); Taihorin, VII., VIII. 2) ¹⁾

Gastrozona macquarti Hendel 1913, p. 38—39 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 151 ²⁾ Kanshirei, V. 2) ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Musha, V., VI. 2); Horisha, III. 2); Funkiko, IV., X. 2); Shonoryo, V. 2); Mizuho, VIII. 2); Takesaki, V. 2); Kagi, VIII. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 89); Tainan, IV. (DEI: 6)

Wirtspflanzen: *Bambusa specc.*, *Dendrocalamus latiflorus*, *Phyllostachys specc.*

Gastrozona melanophila Hering 1940, Siruna Seva 1, p. 3 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾

Carpophthorella magnifica Hendel 1915, p. 449, Taf. 9, Fig. 14 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 157 ²⁾; Munro 1935, p. 203 ³⁾

Kankau, IV., V., III. 2) (DEI: 1); Kuraru, VII. 2)

Calosphenisca quinque maculata Shiraki 1933, p. 162, Fig. 36, Taf. 4, Fig. 3 ¹⁾

Kotosho, III., IV. ¹⁾

Calosphenisca volucris Hendel 1915, p. 454 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 160 ²⁾ Toyenmongai ²⁾ (DEI: 1 Typus); Koshun, IV. 2); Kankau, IV. 2)

Pseudospheniscus alboscuteatus v. d. Wulp 1898, Tijds. Ent. 41, p. 217, Taf. 10, Fig. 15; Shiraki 1933, p. 171 ¹⁾; Munro 1935, p. 253 ²⁾ Asahi, V. ¹⁾; Kosempo, V., VI. ¹⁾ (DEI: 1); Kankau, VI. ¹⁾; Kotosho, VII. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Sumatra, Burma

Pseudospheniscus angulatus Hendel 1913, p. 38 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 165 ²⁾ Arian, VI. 2); Alikang, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau, VII. (DEI: 1)

Pseudospheniscus connexus Hendel 1915, p. 453 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 166 ²⁾; Munro 1935, p. 203 ³⁾

Kankau (Koshun), V., VI., VII. 2) ³⁾ ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1)

Pseudospheniscus fossatus Fabricius 1805, p. 320; Shiraki 1933, p. 169 ²⁾; Munro 1935, p. 202 ³⁾

Tabo, VIII. 2); Tappan, VI. 2); Arisan, IV. 2); Sonshoryo, V. 2); Musha, V., VI. 2); Shishito, V. 2); Taichu, XII. 2); Hozan, VIII. 2) (DEI: 1); Kankau, VIII. 2) (DEI: 7); Domon, VII. 2); Taito, II., III. 2); Chipon, V. 2); Karenko, VII., VIII. 2); Chosokei (DEI: 1); Taihoku (DEI: 1); Maruyama, V. ³⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen, Burma, Java, Singapore, Amboina, Indien

- Pseudospheniscus superfluctus* Enderlein 1911, p. 428, Fig. J 1); Shiraki 1933, p. 168 2); Munro 1935, p. 203 3)
Koshun, III. 2) 3); Kankau, VII. 2) (DEI: 3); Kotosho, III. 2); Kosempo, VII. 2); Takao, XII. 2) 1); Ampin, V., VI. 2) (DEI: 10); Heishana, IV. 2); Arisan, VI. 2)
Sonstige Verbreitung: Japan (Okinawa) 2)
- Prospeniscus miyakei* Shiraki 1933, p. 175, Fig. 38, Taf. 4, Fig. 5 1)
Musha, VI. 1)
- Neanomoea approximata* Hendel 1915, p. 455, Taf. 8, Fig. 9 1); Shiraki 1933, p. 179 2)
Toyenmongai 2) 1); Kosempo, V. 2) 1); Arisan, X. 2); Taito, III. 2)
- Neanomoea farinosa* Hendel 1915, p. 455, Taf. 8, Fig. 8 1); Shiraki 1933, p. 181 2)
Shu-Shu, I. 2) 1); Hozan, VII., VIII. 2) 1); Asahi, V. 2); Taichu, XII. 2)
- Neanomoea nummi* Munro 1935, p. 254, Fig. 1 1)
Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 Typus)
- Neanomoea rufescens* Hendel 1915, p. 456, Taf. 8, Fig. 10 1); Shiraki 1933, p. 180 2)
Sokutsu, IV. 2) 1); Koshun, VI. 2); Kankau, VI. 2) 1) (DEI: 1 Typus); Toroku, III. 2); Taichu, XII. 2); „Formosa“ (DEI: 10)
- Phagocarpus connexus* Shiraki 1933, p. 188, Fig. 40, Taf. 5, Fig. 1 1)
Kobayashi, 1300 m, VIII. 1)
- Phagocarpus formosanus* Shiraki 1933, p. 186, Fig. 39, Taf. 4, Fig. 6 1)
Arisan, X. 1); Horisha, III. 1)
- Phagocarpus vulgaris* Shiraki 1933, p. 190, Fig. 41, Taf. 5, Fig. 2 1)
Synonym (nach Shiraki):
„*Phagocarpus immsi* Bezzi“ Hendel 1915, p. 456 2)
Hatsune, IV. 1); Taito, III. 1); Mt. Hoozan 2)
Sonstige Verbreitung: Japan
- Machaomyia caudata* Hendel 1915, p. 458, Taf. IX, Fig. 16 1); Shiraki 1933, p. 193 2); Munro 1935, p. 256 3)
Toyenmongai 2) 1); Taihorin, IV. 2); „Formosa“ (DEI: 44)
- Hemilea formosana* Shiraki 1933, p. 198, Fig. 42, Taf. 5, Fig. 3 1)
Arisan, VI., X. 1)
- Hemilea praestans* Bezzi 1913, Mem. Ind. Mus. 3, p. 141, Taf. 10, Fig. 51 1); Shiraki 1933, p. 197 2)
Sokutsu, V. 2); Shonoryo, V. 2); Taichu, XII. 2)
Sonstige Verbreitung: Indien (Kumaon) 1)
- Pocillothea angustifrons* Hendel 1915, p. 443, Taf. 9, Fig. 2 1); Shiraki 1933, p. 208 2)
Hozan, V. 2) 1); Toyenmongai 2) 1)

- Spilocosmia (Prospilocosmia) octavia* Munro 1935, p. 256 ¹⁾
 Taihoku, 7. XI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Spilocosmia (Prospilocosmia) punctata* Shiraki 1933, p. 214, Fig. 46
 Taf. 5, Fig. 6 ¹⁾
 Musha, V., VI. ¹⁾; Arisan, X. ¹⁾; Rikiriki, III. ²⁾; Taito, II., III. ¹⁾;
 Urai, VII. ¹⁾
 ssp. *kotoshoensis* Shiraki, 1933, p. 216 ¹⁾
 Kotosho ¹⁾
- Pseudacidia ambigua* Shiraki 1933, p. 230, Fig. 53, Taf. 8, Fig. 2 ¹⁾
 Arisan, X. ¹⁾
- Pseudacidia hemileoides* Munro 1935, p. 257 ¹⁾
 „Formosa“ ¹⁾ (DEI: 7 Typen)
- Pseudacidia lineata* Shiraki 1933, p. 232, Fig. 54, Taf. 7, Fig. 3
 Musha, VI. ¹⁾
- Pseudacidia minowai* Shiraki 1933, p. 228, Fig. 52, Taf. 6, Fig. 6 ¹⁾
 Nimandaira (Arisan, IV.) ¹⁾
- Pseudacidia sonani* Shiraki 1933, p. 226, Fig. 51, Taf. 6, Fig. 5 ¹⁾
 Roeichi, IX. ¹⁾
- Pseudacidia yoshinoi* Shiraki 1933, p. 225, Fig. 50, Taf. 6, Fig. 4 ¹⁾
 Musha, VI. ¹⁾
- Vidalia bidens* Hendel 1915, p. 443 ¹⁾; Shiraki 1933, p. 241 ²⁾; Munro
 1935, p. 258 ³⁾
 Hozan, VIII. ²⁾ ¹⁾; Koshun, III. ²⁾; Bakurasu, IV. ²⁾; Musha, V. ²⁾; Ju-
 jiro (Arisan) IV. ²⁾; Taichu, XII. ²⁾; Kosempo, V. (DEI: 1); „For-
 mosa“ (DEI: 25); Toyenmongai ¹⁾
- Moritsugia quadrimaculata* Shiraki 1933, p. 245, Fig. 57, Taf. 7, Fig. 5 ¹⁾
 Taihoku, IV. ¹⁾
- Myiolia (Acidiella) arisanica* Shiraki 1933, p. 258, Fig. 59, Taf. 7,
 Fig. 6 ¹⁾
 Arisan, IV. ¹⁾
- Myiolia (Acidiella) formosana* Shiraki 1933, p. 264, Fig. 61, Taf. 8,
 Fig. 2 ¹⁾
 Tamaru, VIII., IX. ¹⁾
- Myiolia (Acidiella) longipennis* Hendel 1915, p. 457 ¹⁾; Shiraki 1933,
 p. 253 ²⁾; Munro 1935, p. 258
 Tabani, III. ²⁾ ¹⁾; Arisan, V. ²⁾; Tainan, IV. (DEI: 1); „Formosa“
 (DEI: 7)
- Myiolia (Acidiella) mushaensis* Shiraki 1933, p. 261, Fig. 60, Taf. 8,
 Fig. 1 ¹⁾
 Musha, V. ¹⁾
- Myiolia (Acidiella) persimilis* Hendel 1915, p. 457, Fig. 5, Taf. 8 ¹⁾;
 Shiraki 1933, p. 256, Tabani, V. ¹⁾

Myiolia (Acidiella) rectangularis Munro 1935, p. 258¹⁾

„Formosa“ 1) (DEI: 2 Typen)

Trypeta luteonota Shiraki 1933, p. 274, Fig. 63, Taf. 9, Fig. 3¹⁾

Shinchiku, VII. 1); Funkiko, IV. 1)

Phantasmia cylindrica Hendel 1915, p. 435¹⁾; Shiraki 1933, p. 289

Kankau, V. 1) (DEI: 1 Typus)

Callistomyia pavonina Bezzi 1913, Mem. Ind. Mus. 3, p. 125, Taf. 9, Fig. 36¹⁾; Shiraki 1933, p. 293²⁾

Kankau, VII. 2); Koshun, V. 2); Kosempo, III. 2); Taito, II. 2)

Sonstige Verbreitung: Calcutta¹⁾

Acanthoneura formosana Enderlein 1911, p. 419, Fig. C¹⁾; Hendel 1915, p. 444²⁾; Shiraki 1933, p. 296³⁾; Munro 1935, p. 259⁴⁾

Toa Tsui Kutsu, V. 4) (DEI: 1); Hoozan, I. 2) (DEI: 6); Sokutsu, VI. 3) (DEI: 7); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 1); Shinchiku, VII. 3); Shu-Shu, I, II. 3); Suisha, V. 3); Arisan, X. 3); Taihorin, VII. 3); Tabani, III. 3); Fuhosho, III. 3); Kanshirei, X. 3); Kosempo, I., III., IV. 3) 1); Hozan, VII. 3); Tainan, II. 3); Koshun, IV., V. 3); Taito, II., III. 3); Urai, VIII. 3); Taichu, XII. 3); Lambek²⁾; Toyenmongai²⁾

Diarrhagma unicolor Shiraki 1933, p. 303, Fig. 67, Taf. 8, Fig. 6¹⁾; Munro 1935, p. 259²⁾

Kanshirei, X. 1); Arisan, V. 1); Toa Tsui Kutsu, V. 2) (DEI: 2)

Rioxoptilona speciosa Hendel 1915, p. 445, Taf. 8, Fig. 6¹⁾; Shiraki 1933, p. 307²⁾

Hosan, VI. 2) 1); Shishito, V. 2); Kayahara, IX. 2); Mizuho, VIII. 2); Heishana, IV. 2)

Phorelliosoma hexachaeta Hendel 1915, p. 447, Taf. 9, Fig. 13¹⁾; Shiraki 1933, p. 313²⁾; Munro 1935, p. 259³⁾

Hozan, VIII. 2) 3) (DEI: 1 „Typus“ + 2); Taihoku, XII. 2); Arisan, X. 2); Musha, V. 2); Taiko (Shinchiku), II. 2); Fuhosho, V. 2) 1); Taito, II., III. 2); Funkiko, IV. 2); Toroen, VIII. 2); Shikikun, V. 2); Taichu, XII. 2); Toyenmongai¹⁾

Hexacinia palpata Hendel 1915, p. 459, Taf. 9, Fig. 19¹⁾; Shiraki 1933, p. 315²⁾; Munro 1935, p. 259³⁾

Shu-Shu, I.—III. 2) 1); Hosan, VIII. 2) 1); Funkiko, IV. 2); Jujiro, IV. 2); Rantaisan, II., III. 2); Kappansan, III. 2); „Formosa“ 3) (DEI: 1); Toyenmongai¹⁾

Sophira excellens Hendel 1915, p. 441, Taf. 9, Fig. 14¹⁾; Shiraki 1933, p. 322²⁾

Koshun, IV. 2); Kankau, IV. 2)

[*Ptilona brevicornis* v. d. Wulp 1880, Tijds. Ent. 23, p. 44; Bezzi 1913, Phil. Journ. Sci. 8, D, p. 326¹⁾

Formosa¹⁾, nach Shiraki Bestimmung fraglich.]

Ptilona nigriventris Bezzi 1913, Mem. Ind. Mus. 3, p. 110, Taf. 8, Fig. 20¹⁾; Shiraki 1933, p. 325²⁾; Munro 1935, p. 259³⁾

nach Shiraki vielleicht Synonym zu *Rioxa confinis* Walk.

Horisha, III. 2); Shinchiku, VII. 2); Kagi, V. 2); Takazaki, V. 2); Hozan, V. 2); Shonoryo, III. 2); Kanshirei³⁾; Toa Tsui Kutsu, V. 3)
(DEI: 15)

Ptilona persimilis Hendel 1915, p. 446¹⁾; Shiraki 1933, p. 327²⁾

Taihorin, VII., VIII. 2)¹⁾; Horisha, III. 2)¹⁾; Tabani, III. 2); Kagi, X. 2); Takezaki, V. 2); Koshun, I. 2); Kanshirei, X. 1); Jyujiro, VI. 2); Taichu, XII. 2)

Euphranta apicalis Hendel 1915, p. 440, Taf. 8, Fig. 1¹⁾; Shiraki 1933, p. 336²⁾

Tabani, III. 2)¹⁾; Tainan, III. 2); Chikutokaku, XI. 2); Banshoryo, VI. 2); Karenko, XII. 2)

Wirtspflanze: *Aeginetia indica* L. (Stamm)

Euphranta chrysopila Hendel 1913, p. 37—38, Fig. 1¹⁾; Shiraki 1933, p. 334²⁾; Munro 1935, p. 260³⁾

Kobayashi, IX. 2); Shu-Shu, I. 2); Horisha, V. 2); Kagi, VII.—X. 2); Tainan, II. 2); Taihorin, VIII. 2); Fuhosho, IV. 2); Kosempo, III., V. 2) (DEI: 2); Koshun, VIII., IX. 2)¹⁾ (DEI: 3 Typen); Kankau, V., IX. 2) (DEI: 1); Domon¹⁾

Euphranta jucunda Hendel 1915, p. 439¹⁾; Shiraki 1933, p. 338²⁾

Sokutsu, VI. 2)¹⁾ (DEI: 1 Typus); Funkiko, IV. 2)

Euphranta lemniscata Enderlein 1911, p. 426, Fig. G¹⁾; Shiraki 1933, p. 340²⁾

Takao, XII. 2)¹⁾

Euphranta sexsignata Hendel 1915, p. 439, Taf. 8, Fig. 2¹⁾; Shiraki 1933, p. 331²⁾

Shinchiku, VIII. 2); Toyenmongai²⁾¹⁾

Oedaspis formosana Shiraki 1933, p. 348, Fig. 70, Taf. 11, Fig. 2²⁾

Taito, II. 1); Rikiriki, III. 1); Rato, III. 1)

Wirtspflanze: *Artemisia capillaris* (Stammgallen)

Spheniscomyia atilia Walker 1849, List. Dipt. Brit. Mus. 4, p. 1021; Munro 1935, p. 260¹⁾

Synonym (nach Munro): „*Spheniscomyia sexmaculata* Macquart“ Shirakii 1933, p. 354²⁾

Trypeta formosana Enderlein 1911, p. 427³⁾

Taihoku, 1)²⁾ (DEI: 1); Maruyama, V.—VI. 1) (DEI: 1); Polisha²⁾; Tainan, II., IX. (DEI: 9); Kosempo, V. (DEI: 1); Taichu, II. 2); Toseikaku, XI. 2); Taiheisan, VIII. 2); Horisha, III. 2); Ako, II. 2)³⁾;

Banshoryo, XI. 2); Rokkiri, III., IV. 2); Koshun, IV. 2) Chipon, V. 2); Tauran, V. 2); Kotosho, III. 2)

Sonstige Verbreitung: China, Indien, Afrika, Madagaskar, S.-Arabien, Tsingtau

Acidioxantha punctiventris Hendel 1915, p. 451 1); Shiraki 1933, p. 357 2)

Ariko, VI. 2); Arian, VI. 2) 1)

Oxyaciura formosae Hendel 1915, p. 460 1); Shiraki 1933, p. 360 2);

Munro 1935, p. 260 3)

Chikutokaku, XI. 2); Takao, IV. 2); Kotosho, III. 2) 1); Maruyama, VI. 3) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Yayeyama-Ishigaki (Japan?) 2)

[*Okuniomyia bimaculicosta* Shiraki 1933, p. 363, Fig. 72, Taf. 10, Fig. 2 1) Keine Trypetide.

Nach Munro (1935, p. 261) sicher „Ortalide“; das trifft aber sicher nicht zu Musha, V. 1)]

Euribia formosana Shiraki 1933, p. 370, Fig. 75, Taf. 10, Fig. 6 1)

Niitaka-prefecture, VII. 1)

Euribia (Asimoneura) shirakii Munro 1935, p. 261 1)

Anping, X. 1); (DEI: 1 Typus)

Subfamilie *Tephritinae*

Iseadorellia nigrinotum Shiraki 1933, p. 378, Fig. 76, Taf. 9, Fig. 4 1)

Daisuikutsu, IX. 1)

Chaetostomella nigripunctata Shiraki 1933, p. 383, Fig. 77, Taf. 11, Fig. 3 1)

Musha, V. 1); Roeichi, IX. 1); Horisha, V. 1); Kanko, X. 1); Niitaka-prefecture, VII. 1)

Platensina apicalis Hendel 1915, p. 462 1); Shiraki 1933, p. 388 2)

Shu-Shu, V. 2) 1)

Platensina platyptera Hendel 1915, p. 461, Taf. 9, Fig. 17 1); Shiraki 1933, p. 391 2); Munro 1935, p. 262 3)

Taihorin, VII. 2) 1); Taiheisan, VIII. 2); Kappansan, IX. 2); Shinchiku, VII. 2); Arisan, X. 2); Namakaban, IX. 2); Toa Tsui Kutsu, V. 3) (DEI: 2); Taihoku 3) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Flores.

Elaphromyia multisetosa Shiraki 1933, p. 396, Fig. 78, Taf. 11, Fig. 5 1)

Rikiriki, III. 1); Shinchiku, VII. 1)

Elaphromyia pterocallaeformis Bezzi 1913, Mem. Ind. Mus. 3, p. 155, Taf. 10, Fig. 58 1); Shiraki 1933, p. 397 2); Munro 1935, p. 262 3) Tainan 2); Takao, IV., V. 2); Kankau 2); Tauran, IV. 2); Taihoku, V. 2); Taiko, II. 2); Maruyama, IV. 3) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien 1)

- Sphenella indica* Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt., p. 267; Shiraki 1933, p. 402¹⁾; Munro 1935, p. 262²⁾
 Taihoku, V., XI. 1)²⁾ (DEI: 8); Tabani 1); Kanshirei, IV. 1); Tainan, II. 1); Takao, V. 1); Bosan, XI. 1); Koshun, IV., V. 1); Taito, II., III. 1); Hokuto, XII. 1) (DEI: 1); Maruyama, XII. 2) (DEI: 1); Kanshizei, IV. (DEI: 1); Tappani (DEI: 1); Kotosho, III. 2)
 Sonstige Verbreitung: Indien, kleine Sundainseln.
- Paroxyna absinthii* Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 322; Munro 1935, p. 265¹⁾
 Hokuto, XII. 1) (DEI: 3); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X. 1) (DEI: 1); Maruyama, Taihoku-Distr., 500 F., XII. 1) (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Paläarktis
- Paroxyna aeneostriata* Munro 1935, p. 264¹⁾
 Hokuto, XII. 1) (DEI: 2 Typen)
- Paroxyna arisanica* Shiraki 1933, p. 409, Fig. 80, TaI. 12, Fig. 1¹⁾
 Arisan, X. 1)
- Paroxyna formosella* Hendel 1915, p. 465, TaI. 9, Fig. 20¹⁾; Shiraki 1933, p. 422²⁾; Munro 1935, p. 266³⁾
 Kanshirei, IV. 2); Tainan, V., II. 2) (DEI: 2); Ampin, V. 2)¹⁾ (DEI: 1 Typus); Koshun, IV., V. 2); Kuraru, X. 2); Kotosho, IV. 2); Taihorin 1); Takao 1)
 Sonstige Verbreitung: kleine Sundainseln.
- Paroxyna ignobilis* Loew 1861, Berl. Ent. Zeit. 5, p. 293; Munro 1935, p. 265¹⁾
 Hokuto, XII. 1) (DEI: 3); Maruyama, IV. 1) (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Äthiop. Region
 var. *plebeja* Bezzi 1924, Ann. S. Afr. Mus. 19, p. 551; Munro 1935, p. 265²⁾
 Hokuto, XII. 2); Maruyama, IV. 2)
 Sonstige Verbreitung: S.-Afrika
- Paroxyna punctata* Shiraki 1933, p. 424, Fig. 83, Taf. 12, Fig. 5¹⁾ (*Tephritis*); Munro 1935, p. 264
 Musha, V., VI. 1); Kanko, IX. 1)
- Paroxyna sororcula* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 509; Shiraki 1933, p. 462¹⁾; Munro 1935, p. 263²⁾
 Bioritsu, XII. 1); Taihoku, I. 1)²⁾ (DEI: 1); Shinchiku, VII. 1); Musha, V., VI. 1); Kayahara, IX. 1); Arisan, IV., X. 1); Funkiko, II. 1); Kanshirei, II. 1); Ampin, IV., IX. 1)²⁾ (DEI: 6); Takao, X. 1); Hozan, II. 1)²⁾ (DEI: 16); Bozan, XI. 1); Kammotsu 1); Karenko, VII., VIII. 1); Rikiriki, III. 1); Koshun, IV., V. 1); Kuraru, V. 1); Kammon 1); Tauran, IV. 1); Taito, II., III. 1); Gozenjo, IV. 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII., IV., V., VI. 2) (DEI: 25); Tainan,

X. 2) (DEI: 8); Pilam 2), Hokuto, XII. 2) (DEI: 8); Taihoku-Distr., Okaseki, VI. 2) (DEI: 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: nahezu kosmopolitisch

Campiglossa hirayamae Matsumura 1916, p. 424, Taf. 23, Fig. 19;
Shiraki 1933, p. 414, Fig. 81, Taf. 13, Fig. 1 2)

Arisan, X. 2)

Sonstige Verbreitung: Japan, Korea 2)

Tephritis impunctata Shiraki 1933, p. 427, Fig. 84, Taf. 12, Fig. 4 1)
Musha, V., VI. 1); Horisha, V. 1); Niitaka-Prefecture, VII. 1)

Spathulina acroleuca Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt., p. 368;
Shiraki 1933, p. 431 1); Munro 1935, p. 266 2)

Synonym (nach Shiraki):

Euribia parca Bezzi 1913, Mem. Ind. Mus. 3, p. 156, Taf. 10,
Fig. 62 3); Hendel 1915, p. 465 4)

Toroku, III. 1); Kotosho, III., IV. 1); Banshoryo, XI. 1); Arisan, X. 1);
Koshun, IV., V. 1); Rokkiri, III. 1); Tainan, II. 1); Shu-Shu, IV. 1);
Taihoku, XI. 2) (DEI: 8)

Sonstige Verbreitung: Indien, Australien 1)

Paratephritis formosensis Shiraki 1933, p. 438 1)

Tamaru, IX. 1)

Protephritis sauteri Enderlein 1911, p. 456, Fig. A 1); Shiraki 1933,
p. 441 2); Munro 1935, p. 267 3)

Takao, XI., XII. 2) 1); Kuraru, IV. 2); Garambi, X. 2); Koshun, III. 2);
Kankan, IV., V., VIII., IX. 2) 3) (DEI: 4); Ampin, IV. 2); Bansho-
ryo, XI. 2); Banshiden, I. 2); Chipon, V. 2); Toyenmongai, II. 2); Ryu-
kokado, II. 2) 1); Insel Lambeth 1)

Protephritis sonani Shiraki 1933, p. 443, Fig. 86, Taf. 12, Fig. 6 1)

Taikan, IX. 1); Arisan, VI. 1)

Actinoptera formosana Shiraki 1933, p. 447, Fig. 87, Taf. 12, Fig. 2 1)

Shukoran, IX. 1); Royeichi, IX. 1); Arisan, X. 1)

Actinoptera shirakiana Munro 1935, p. 267 1)

Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XI. 1) (DEI: 1 Typus)

Trypanea ambigua Shiraki 1933, p. 454, Fig. 88, Taf. 13, Fig. 5 1)

Ranrun, III. 1)

Trypanea amoena var. *kotoshoensis* Shiraki 1933, p. 453 1)

Kotosho, VII. 1)

Verbreitung der Nominatform: Paläarktis

Trypanea distincta Shiraki 1933, p. 458, Fig. 89, Taf. 13, Fig. 4 1)

Rikiriki, III. 1)

Trypanea formosae Hendel 1927, in Lindner, Flieg. pal. Reg. 49, p. 201

Shiraki 1933, p. 456 2)

Synonym: „*Trypanea stellata* Füessly“ Hendel 1915, p. 467 1)

Arisan, X. 2); Ranrun, III. 2); Takao, IV. 2); Tainan, XII. 2) 1); Polisha, XII 1). (DEI: 2)

Ensina lacteipennis Hendel 1915, p. 464 1); Shiraki 1933, p. 465 2); Munro 1935, p. 267 3)

Tabani, II. 2); Taihoku 3) (DEI: 4); Hokuto, XII. 3) (DEI: 5); Tappan, IV. 1) (DEI: 1 Typus + 2); Tainan, II. 3) (DEI: 1); Maruyama 3); Hoozan, II. (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Japan (Sapporo) 2)

Icterica maculata Shiraki 1933, p. 475, Fig. 90, Taf. 14, Fig. 1 1)
Arisan, X. 1)

Rhabdochaeta asteria Hendel 1915, p. 462, Taf. 9, Fig. 18 1); Shiraki 1933, p. 486 2); Munro 1935, p. 268 3)

Taihoku, XII. 3) 2) (DEI: 3); Shu-Shu, II. 2) 1); Tainan, II. 2) 1) (DEI: 1); Takao, X. 2) 1); Koshun, IV., V. 2); Karenko, VII., VIII. 2); Kotosho, III. 2); Polisha, XII. (DEI: 1)

Rhabdochaeta centralis Hendel 1915, p. 464 1); Shiraki 1933, p. 489 2); Munro 1935, p. 268 3)

Tainan, IV. 2) 1); Kanetowan, IV. 2); Bakurasu, IV. 2); Kammotsu, IV. 2); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII. 3) (DEI: 1)

Rhabdochaeta formosana Shiraki 1933, p. 491, Fig. 92, Taf. 14, Fig. 4 1)
Munro 1935, p. 268 2)

Taito, II.—III. 1); Chipon, V. 1); Koshun, IV. 1); Kanshirei, II. 1); Maruyama, V. 2) (DEI: 1)

Familie Tylidae

Subfamilie Taeniopterinae

Mimegralla albimana galbula Osten-Sacken 1882, p. 202 1); Hendel 1913, p. 42 2); Enderlein 1922, p. 183 3); Czerny 1932, p. 270 4); Hennig 1935, p. 199 5); Hennig 1938, p. 13 6)

Koshun, VII., IX., X. 2) (DEI: 13); Tainan, III., X. 2) 5) (DEI: 1); Insel Lambeh, I. 4); Takao, II., VI., XII. 4) 5) 3); Kanshizei, V. 5) (DEI: 1); Akan, XII. 5); Kosempo, VII. (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1); Maruyama, V.—VI. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2); Kotosho 6)

Sonstige Verbreitung: Philippinen 1); Japan 6); Ryu-Kyu-Inseln 6)

Mimegralla cedens formosana Czerny 1932, p. 269 1) (*Cyclosphen*); Hennig 1935, p. 206 2)

Synonym: *Taenioptera chrysopleura* Osten-Sacken“ Hendel 1913, p. 42 3); Enderlein 1922, p. 183 4)

Koshun, III., X. 3) (DEI: 9); Taihorinsho, VIII. 3) (DEI: 1); Toyen-mongai, V. 4); Takao, XII. 4); Hoozan (DEI: 1); Kanshizei, V. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 2)

Mimegralla sinensis niveitarsis Czerny 1932, p. 279¹⁾ (*Systellapha*);
Hennig 1935, p. 203²⁾

Synonym: *Mimegralla sinensis* Enderlein p. pt. 1922, p. 182³⁾; Czerny
p. pt. 1932, p. 279⁴⁾ (*Systellapha*)

Taihorin, X.³⁾ 2); Toa Tsui Kutsu, V.³⁾ 2) (DEI: 3); Tainan²⁾
(DEI: 4); Tappani, XI. (DEI: 1); „Formosa“¹⁾

Verbreitung der Nominatform: China (Fokien)

Grammicomyia sauteri Enderlein 1922, p. 168¹⁾ (*Ectemnodera*); Hennig
1935, p. 79²⁾

Synonym: *Oocephala grata* Czerny 1932, p. 292³⁾

Taihorin, X.¹⁾; Tainan²⁾ (DEI: 1); „Formosa“³⁾

Rainieria leucochira Czerny 1932, p. 274¹⁾; Hennig 1935, p. 64²⁾

„Formosa“¹⁾ (DEI: 2); Tainan, IV.²⁾ (DEI: 4)

Subfamilie *Trepidariinae*

Trepidarioides cyanea Hendel 1913, p. 43¹⁾ (*Trepidaria*); Enderlein
1922, p. 174²⁾ (*Grammicomyia*); Hennig 1935, p. 306³⁾

Synonym: *Cothornobata striatifrons* Czerny 1932, p. 267⁴⁾

Koshun, X.¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Toyenmongai, V.²⁾; Toa Tsui
Kutsu, V.³⁾ (DEI: 12); Tainan⁴⁾ 3) (DEI: 11); „Formosa“ (DEI: 8)

*) *Formicosepsis tinctipennis* de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 200,
Fig. 1 1);

Synonym: *Lycosepsis hamata* Enderlein 1920, p. 60³⁾

Tainan³⁾; Taihorin, V.³⁾; Toa Tsui Kutsu, V.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Philippinen¹⁾; kleine Sundainseln

*) *Oypselosoma gephyrae* Hendel 1913, p. 105¹⁾;

Hoozan, I.¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Subfamilie *Neriinae*

Gymnonerius fuscus hendeli Hennig 1937, p. 266¹⁾

Synonym: „*Gymnonerius fuscus* Wiedemann“ Hendel 1913, p. 41²⁾;
Czerny 1932, p. 298³⁾

Koshun, III.¹⁾ 2) (DEI: 18); Kosempo, I., VII., XI.¹⁾ 2) 3) (DEI: 2);

Kanshirei, V.¹⁾ 2) (DEI: 10); Chip-Chip, III.¹⁾ 2) (DEI: 14); Ali-

kang²⁾ (DEI: 7); Kankau (Koshun), V., IX. (DEI: 67); Tainan

(DEI: 3); Polisha, XII. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2);

„Formosa“ (DEI: 3); Insel Lambeh³⁾

Verbreitung des Rassenkreises: Orientalische Region

*) *F. t.* galt bisher als Sepsidae, *C. g.* als Typus einer besonderen Subfamilie
der *Sphaeroceridae*. Eine Begründung meiner Annahme, daß es sich bei beiden
um Tytiden handelt, gab ich in einer Arbeit, die vor mehr als 1 Jahr der
Stettiner Ent. Zeitung zum Druck eingereicht wurde.

Stypocladus appendiculatus Hendel 1913, p. 84¹⁾ (*Nerius*); Enderlein 1922, p. 159²⁾; Hennig 1938, p. 13³⁾

Kosempo, V.^{1) 2)} (DEI: 1 Typus); Taihoku-Distr., Jushifun, VI.²⁾ (DEI: 6); Macuyama, V.—VI.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Japan (Honshu)³⁾

Telostylus decemnotatus Hendel 1913, p. 84¹⁾; Enderlein 1922, p. 142²⁾; Kankau (Koshun), III., V., IX.^{1) 2)} (DEI: 1 Typus + 3)

Chaetonerius inermis Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt., p. 248
Enderlein 1922, p. 145²⁾; Czerny 1932, p. 296³⁾

Tainan, V.²⁾ (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3); Taihoku, XI. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Nikobaren, China, Aru-Ins., Celebes

Sciomyzides

Familie *Sepsidae*

Myrmecosepsis hystrix Kertész 1914, p. 245, Fig. 1—2¹⁾

Takao¹⁾; Tainan¹⁾

Toxopoda nitida Macquart 1850, Dipt. exot. 4, p. 299; Duda 1926, p. 45¹⁾

Synonym (nach Duda):

Calobata contracta Walker 1853, Ins. Saund. 4, p. 395; de Meijere 1913, p. 114²⁾ (*Sepsis*)

Sepsis formosanus Matsumura 1911, p. 139

Takao, VI., VIII.²⁾; Yentempo, V.²⁾; Tainan, IV., V., X.²⁾ (DEI: 8); Koshun, I., VIII.²⁾ (DEI: 1); Anping, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Äthiop. Region, Ägypten, Indien, Ceylon, Philippinen

Parameroplus fasciculata Brunetti 1909, Rec. Ind. Mus. 3, p. 365¹⁾; de Meijere 1913, p. 121, Fig. 2²⁾; Duda 1926, p. 47³⁾

Takao, XIII.^{2) 3)}; Kosempo³⁾

Sonstige Verbreitung: Indien, Java, Philippinen, Neuguinea

Meroplus sauteri de Meijere 1913, p. 120, Fig. 1¹⁾; Duda 1926, p. 50²⁾; Kosempo, II.^{1) 2)}; Taihorinsho, VIII.¹⁾ (DEI: 2)

Decachaetophora aeneipes de Meijere 1913, p. 119¹⁾; Duda 1926, p. 45²⁾; Chip-Chip, III.^{1) 2)}; Mt. Hoozan²⁾; Anping (DEI: 1); Tappani, III. (DEI: 1); Yamo no Taiko, IX. (DEI: 2); „Formosa“; (DEI: 2)

Perochaeta orientalis de Meijere 1913, p. 123¹⁾ (*Nemopoda*); Duda 1926, p. 52¹⁾

Chip-Chip, III.^{1) 2)}; ? Polisha, XII.¹⁾

Dicranosepsis bicolor Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 468; Duda 1926, p. 54

- var. *acuta* de Meijere 1913, p. 118¹⁾
 Tainan, II., IV.¹⁾; Kosempo, XI.¹⁾; Takao, X.¹⁾; Chip-Chip, III.¹⁾
- var. *bipilosa* Duda 1926, p. 54²⁾
 Koshun²⁾; Kankau²⁾; Kosempo²⁾; Tainan²⁾; Takao²⁾; Macuyama, V.—VI.²⁾ (DEI: 3); Chosokei²⁾ (DEI: 1)
- var. *breviappendiculata* de Meijere 1913, p. 118¹⁾; Duda 1926, p. 56²⁾
 Kosempo, III., XI.¹⁾²⁾; Koshun, X.¹⁾²⁾; Polisha, XII.¹⁾²⁾; Chip-Chip, I., III.¹⁾²⁾; Takao, V.¹⁾²⁾; Taihoku-Distr., Okaseki (DEI: 1)
- var. *hamata* de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 364; de Meijere 1913, p. 118²⁾; Duda 1926, p. 56³⁾
 Tainan, IV.²⁾³⁾; Taihoku, IV., XI.²⁾³⁾ (DEI: 56); Kosempo, V.²⁾³⁾; Chip-Chip, III.²⁾³⁾; Takao, V.²⁾; Koshun³⁾; Paroe, VIII.³⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V.³⁾ (DEI: 1); Chosokei³⁾ (DEI: 2); Macuyama, V.—VI.³⁾ (DEI: 1) Toyen-Distr. Sanshikyaku³⁾ (DEI: 1)
- var. *javana* de Meijere 1904, Bijdr. Dierk. 17./18., p. 107; de Meijere 1913, p. 118²⁾; Duda 1926, p. 58³⁾
 Chip-Chip, I., III.²⁾; Kosempo, II., III., XI.²⁾; Takao, III., V., X.²⁾; Tainan, III., V.²⁾; Taihoku, IV.²⁾; Koshun, X.²⁾; Kankau³⁾; Daitotei, V.—VI.³⁾ (DEI: 13); Chosokei³⁾ (DEI: 7); Toa Tsui Kutsu, V.³⁾ (DEI: 4); Hokuto, XII.³⁾; (DEI: 1); Macuyama, V.—VI.³⁾ (DEI: 3); Taihoku-Distr., Okaseki, V. (DEI: 1)
- var. *mediotibialis* Duda 1926, p. 58¹⁾
 Koshun¹⁾; Kosempo, XI.¹⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 1 „Typus“); Kankau (Koshun), IV.¹⁾ (DEI: 30); Tainan, II., V. (DEI: 3); Polisha (DEI: 1); Paroe, VIII. (DEI: 5); Hoozan, II. (DEI: 1); Anping, V. (DEI: 1); Tappani, III. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 2)
- var. *gracilis* Duda 1926, p. 59¹⁾
 Kosempo¹⁾; Kankau¹⁾; Takao¹⁾; Chosokei¹⁾
- var. *unipilosa* Duda 1926, p. 55¹⁾
 Takao¹⁾; Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 3); Taihorin¹⁾; Chip-Chip¹⁾; Kosempo¹⁾; Chosokei¹⁾ (DEI: 3); Daitotei¹⁾ (DEI: 3); Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 2); Macuyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 3); Paroe, X. (DEI: 3); Hokuto, XII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung der Gesamtart: Oriental. Region, Neu-Guinea
Saltelliseps niveipennis Becker 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 143;
 Duda 1926, p. 45¹⁾

Synonym (nach Duda): *Sepsis albolimbata* de Meijere p. pt. 1913, p. 115

„Formosa“¹⁾; Paroe, VIII. (DEI: 36); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 5); Chipun, VII. (DEI: 1); Tainan, V. (DEI: 1); Pilam, VII. (DEI: 1); Anping, X. (DEI: 3); Taihoku, XI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Ägypten, Afrika, Philippinen, Australien

Saltelliseps robusta Duda 1925b, p. 31¹⁾

„Formosa“¹⁾; Anping, VI. (DEI: 2); Paroe, VIII. (DEI: 4); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 5)

Saltelliseps tenella de Meijere 1906, Ann. Mus. Nat. Hung. 4, p. 183¹⁾; de Meijere 1913, p. 117²⁾; Duda 1926, p. 43³⁾

Kosempo, VI., XI. 2) 3); Anping, VII. 2) 3); Tainan, VI. 2) 3); Kankau, VIII. 2) 3); Yentempo, V. 2) 3); Pilam 3)

Sonstige Verbreitung: Singapore¹⁾

Sepsis albopunctata Lamb 1914, Trans. Linn. Soc. Zool. 16, p. 323¹⁾; Duda 1926, p. 67²⁾

Synonym (nach Duda): *Sepsis albolimbata* de Meijere 1913, p. pt., p. 115³⁾

„Formosa“²⁾; Paroe, VIII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Seychellen, Philippinen

Sepsis barbata Becker 1907, Ann. Mus. Zool. Petersb. 12, p. 292¹⁾; Duda 1926, p. 67²⁾

„Formosa“¹⁾; Taihoku, XI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis

Sepsis coprophila de Meijere 1916, Ann. Mus. Nat. Hung. 4, p. 176¹⁾; de Meijere 1913, p. 117²⁾; Duda 1926, p. 65³⁾

Kosempo, VI., XI. 2) 3); Kankau, VI., VIII. 2) 3) (DEI: 18); Chip-
Chip, II., III. 2) 3) (DEI: 1); Yentempo, V. 3); Takao, XI. 3); Tai-
hoku, IV., XI. 3) (DEI: 1); Sokutsu, V. 3); Maruyama (DEI: 1);
Paroe, VIII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Vorder- u. Hinterindien, Philippinen, China, Japan

Sepsis lateralis Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 468; Duda, 1926, p. 62¹⁾

Synonym (nach Duda): *Sepsis rufa* Macquart 1850, Dipt. exot. Suppl. 4, p. 296; de Meijere 1913, p. 117²⁾

„Formosa“¹⁾; Macnyama, V.—VI. (DEI: 2); Kanshizei (DEI: 1); Chip-
Chip, III., II. 2) (DEI: 1); Taihoku, IV. 2)

Sonstige Verbreitung: Äthiop. Region, S.-Europa, Indien, China, Neu-
guinea

Sepsis latiforceps Duda 1926, p. 67¹⁾

Synonym (nach Duda): *Sepsis violacea* de Meijere 1913, p. 116²⁾
nec Meigen

Taihoku, IV., XI.^{1) 2)} (DEI: 1 „Typus“ Dudas); Taihorin¹⁾; Chosokei¹⁾ (DEI: 6 „Typen“ Dudas); Daitotei, V.—VI.¹⁾ (DEI: 3 „Typen“ Dudas); Toa Tsui Kutsu¹⁾; Tappani, III. (DEI: 1)

Sepsis spectabilis de Meijere 1906, Ann. Mus. Nat. Hung. 4, p. 183¹⁾; de Meijere 1913, p. 117²⁾; Duda 1926, p. 60³⁾

Polisha, III.²⁾; Chip Chip II.²⁾

Sonstige Verbreitung: Vorder- u. Hinterindien, Ceylon, Malay. Archipel, Neuguinea.

Sepsis thoracica Robineau-Desvoidy 1830, Essai Myodaires, p. 742; Duda 1926, p. 67¹⁾

„Formosa“

Sonstige Verbreitung: Paläarktis, Madagaskar, Afrika

Sepsis trivittata Bigot 1886, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 6, p. 388; de Meijere 1913, p. 117¹⁾; Duda 1926, p. 62²⁾

Taihoku¹⁾; Toa Tsui Kutsu¹⁾; Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 2); Macnyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 2); Chip-Chip, I., II., III. (DEI: 2); Kosempo, V. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kei, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 16)

Sonstige Verbreitung: Singapore, Ceylon

Sepsis tuberculata Duda 1926, p. 64¹⁾

Yentempo, V.¹⁾; Taihoku, IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Macnyama¹⁾ (DEI: 2); Kankau, III.¹⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun), V. (DEI: 1); Paroe, VIII. (DEI: 1)

Familie *Piophilidae*

Piophila casei Linné 1761, Fauna Suec. p. 456; de Meijere 1913, p. 124¹⁾

Synonym: *Piophila dictaeta* Hendel 1913, p. 85²⁾

Anping, IV., V.^{1) 2)} (DEI: 1 Typus von *dictaeta*); Takao, II., V.¹⁾; Taihoku, IV.¹⁾; Tainan, V. (DEI: 1 „Typus“ von *dictaeta*)

Sonstige Verbreitung: „Kosmopolit“

Protopiophila contecta Walker 1860, Proc. Linn. Soc. London 4, p. 167; Duda 1924, Konowia 3, p. 197¹⁾

Chip Chip, III.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Sumatra, Java, Celebes, Neuguinea.

Familie *Megamerinidae*

Megamerina femorata de Meijere 1914, Tijd. Ent. 57, p. 180¹⁾; Enderlein 1920, p. 61²⁾

Taihorin, X. 2); Kosempo, II. 2)

Sonstige Verbreitung: Java

var. *rufifemur* Enderlein 1920, p. 61 1

Taihorin, X. 1); Pilan, II. 1)

Texara dioctrioides Walker 1860, Journ. Proc. Linn. Soc. London 4, 166; Hendel 1913, p. 93 1)

Hoozan, IV.—V., II. 1) (DEI: 2); Kosempo, V. (DEI: 1); Kankau (Koshun) III., IV. (DEI: 9); Tainan, VII. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Celebes

Syritomyia syrphoides Hendel 1913, p. 92, Fig. 2 1); Enderlein 1920, p. 60 2)

Kosempo, V. 1) (DEI: 1 Typus + 1); Kankau, V. 1); Toyenmongai 2); Sokutsu, IX. (DEI: 1); Fuhosho, VII. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3)

Familie Diopsidae

Megalabops Bigotii Hendel 1914, p. 94 1)

Synonym (nach Hendel): „*Teleopsis belzebuth* Bigot“ Hendel 1913, p. 37 2)

vielleicht ist die Art Synonym zu *Megalabops quadriguttatus* Walk. „Formosa“ 1) (DEI: 7); Kosempo, V., VI., X. (DEI: 9 Typen + 17); Kankau, IX. (DEI: 3); Chip-Chip, I.—III. 2) (DEI: 14); Hoozan, I. (DEI: 7 Typen + 16); Kankau (Koshun), V., IX. (DEI: 3 Typen + 3); Tainan, IV., X. (DEI: 56); Polisha, XII. (DEI: 3); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 5). Von allen diesen Fundorten im DEI noch weitere 246 „Typen“

Pseudodiopsis cothurnata Bigot 1874, Ann. Soc. Ent. France (5) 4, p. 115; Hendel 1914, p. 94 1)

Kosempo, V. 1) (DEI: 2); Kankau, IX. (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Philippinen, Celebes, Neu-Guinea

Familie Psilidae

Loxocera maculipennis Hendel 1913, p. 86 1)

Hoozan, I. 1) (DEI: 1 Typus); Chip-Chip, III. 1) (DEI: 1 Typus); Sokutsu, VI. 2) (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 6)

Loxocera formosana Hennig 1940, p. 306 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 2)

Chyliza limpidipennis Hendel 1913, p. 41 1)

Kanshirei, V. (DEI: 1 Typus)

Chyliza selectoides Hennig 1940, p. 304 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 22); Tainan, IV. 1) (DEI: 4); Kankau (Koshun), VII. 1) (DEI: 1)

Chyliza elegans Hendel 1913, p. 88¹⁾

Kankau (Koshun), V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau, III., IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Tappani¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3)

Chyliza fumipennis Hendel 1913, p. 90¹⁾

Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Strongylophthalmyia coarctata Hendel 1913, p. 87, Fig. 1¹⁾

Kankau (Koshun), III., V., IV., VI., VII., IX.¹⁾ (DEI: 8 Typen + 11); Hoozan, I. (DEI: 1 „Typus“); Kosempo, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 12)

Strongylophthalmyia crinita Hennig 1940, p. 311¹⁾

Kosempo (DEI: 1 Typus); Tainan, X. (DEI: 1 Typus); Tappani, III. (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 Typus)

Strongylophthalmyia immaculata Hennig 1940, p. 309¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 10 Typen)

Strongylophthalmyia maculipennis Hendel 1913, p. 88¹⁾

Sokutsu, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Strongylophthalmyia punctata Hennig 1940, p. 312¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Strongylophthalmyia trifasciata Hennig 1940, p. 310¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 8 Typen); Banshoryo (Shisha), V.—VII. (DEI: 1 Typus); Tainan, X. (DEI: 1 Typus)

Familie Sciomyzidae

Melina spec.

Taihoku, XI. (DEI: 1, det. Malloch)

Sepedon lobiferus Hendel 1911, p. 271¹⁾

Synonym: *Sepedon lobularis* Hendel 1913, p. 34²⁾

Takao¹⁾; Daitorinsho, VIII.²⁾ (DEI: 28)

Sepedon neanias Hendel 1913, p. 34¹⁾

Tainan, II.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1);

Sepedon sauteri Hendel 1911, p. 270¹⁾; Hendel 1913, p. 33²⁾

Takao, VIII.¹⁾ (DEI: 1); Tainan, II., III.²⁾; Taihoku, XI. (DEI: 2); Taihorin (DEI: 1); Kosempo, XI. (DEI: 25); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2); Hokuto, XII. (DEI: 1); Daitorinsho, V. (DEI: 1)

Sepedon senex Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 578; Hendel 1911, p. 268²⁾; Hendel 1913, p. 33³⁾

Takao, VI., V.²⁾ (DEI: 2); Tainan, II.—IV.³⁾ (DEI: 10); Kan-shizei, IV. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1); Daitorinsho, VIII. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: oriental. Region.

Sepedon violaceus Hendel 1909, Wien. Ent. Zeit. 28, p. 86 ¹⁾; Hendel 1911, p. 270 ²⁾; Hendel 1913, p. 33 ³⁾

Tainan, I.—IV., X. ²⁾ (DEI: 56); Takao, V. (DEI: 10); Taihorinsho, VIII. (DEI: 3); Chip Chip, II. (DEI: 2); Kanshizei, IV. (DEI: 1); Anping, IX. (DEI: 1); Daitotei, V.—VI. (DEI: 18); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Hongkong ¹⁾

Dichrochira leucodactyla Hendel 1913, p. 81 ¹⁾

Tainan, II. (DEI: 3 Typen + 3)

Sciomyza causta Hendel 1913, p. 81 ¹⁾

Chip-Chip, II., III. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 2).

Lauxaniides.

Familie *Celyphidae.*

Acelyphus stigmaticus Hendel 1914, p. 93 ¹⁾ (*Spaniocelyphus*); Malloch 1927, p. 161 ²⁾; Malloch 1929, p. 5 ³⁾

Tappani ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau, IX. ¹⁾; Suisharyo, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾ (DEI: 2); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 1 „Typus“); Kosempo, V. (DEI: 1).

Celyphus punctifer Hendel 1914, p. 92 ¹⁾

Synonym (sec. typ.):

Celyphus difficilis Malloch 1927, p. 161 ²⁾; Malloch 1929, p. 9 ³⁾
„*Celyphus obtectus* Dalman“ Hendel 1914, p. 91 ⁴⁾

Hoozan, III. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Taihoku, Gai-So-Kai, V. ²⁾ (DEI: 1 Typus von *difficilis*); Kosempo, V. ⁴⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun), VI. (DEI: 30); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., IX. (DEI: 2)

Spaniocelyphus formosanus Malloch 1927, p. 161 ¹⁾; Malloch 1929, p. 10, Fig. 3, 4 ²⁾

Synonym:

„*Spaniocelyphus scutatus* Wiedemann“ Hendel 1914, p. 93 ³⁾
Macuyama, IV., V.—VI. ¹⁾ (16 Typen + 6); Honato, XII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku, XI. (DEI: 2 „Typen“); Chipun, Puyuma-Distr., VII. ³⁾ (DEI: 11); Pilam, VIII. ³⁾ (DEI: 5).

Familie: *Lauxaniidae.*

Amphicyphus reticulatus Doleschall 1856, Naturk. Tijds. Ned. Ind., p. 412; Kertész 1915, p. 515 ¹⁾

Kankau IV. ¹⁾; Takao IV. ¹⁾; Daitorinsho, VIII. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Malay. Archipel, Philippinen, Australien.

Cerataulina subapicalis Hendel 1913, p. 103 ¹⁾

Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

- Chaetolauxania sternopleuralis* Kertész 1915, p. 498, Fig. 4¹⁾
Kosempo, VI. 1)
- Dioides pictipennis* Kertész 1915, p. 493, Fig. 1, 2¹⁾
Chip-Chip, I, III. 1)
- Drepanephora piliseta* Hendel 1913, p. 101¹⁾
Sokutsu, IX. 1) DEI: 1 Typus + 1); Kankau, VII. (DEI: 1 „Typus“)
- Lauxaniella tenuicornis* Malloch 1927, p. 162¹⁾
Kankau (Koshun)¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 8 Typen + 1); Sokutsu, V., IX. (DEI: 2, det. Malloch); „Formosa“ (DEI: 1)
- Melanopachycerina leucochaeta* de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 256; Kertész 1915, p. 514¹⁾; Malloch 1927, p. 262²⁾; Malloch 1929, p. 21³⁾
Chip-Chip, III. 1); Toa Tsui Kutsu, V. 2) (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Niederl. Indien, Philippinen³⁾
- Melinomyia flava* Kertész 1915, p. 500, Fig. 5¹⁾
Kosempo, III. 1)
- Minettia fuscifasciata* de Meijere 1910, Tijds. Ent. 53, p. 125, siehe auch S. 144 (*fuscovittata* de Meij.)
Im DEI von Malloch determinierte Exemplare von folgenden Fundorten:
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 15); Hoozan, II. (DEI: 6); Sokutsu, VI. (DEI: 3); Tappani, IV. (DEI: 2); Kosempo, V. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1); Chip-Chip, III. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 2)
Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra
- Minettia hoozanensis* Malloch 1927, p. 166¹⁾
Hoozan, II. (DEI: 2 Typen + 2)
- Minettia nigrohalterata* Malloch 1927, p. 166¹⁾
Nördl. Paiwan-Distr., Shinsinei, X., 4000 F. 1) (DEI: 1 Typus).
- Minettia quadrispinosa* Malloch 1927, p. 166¹⁾
Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 9 Typen + 2); Chip-Chip, I., II., III. 1) (DEI: 11 Typen + 3); Kosempo¹⁾; Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. 1) (DEI: 1 Typus); Taihorin, IX. (DEI: 1); Tappani, IV. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2)
- Minettia rufiventris* Macquart 1847, Dipt. exot., Suppl. 3, p. 68; Kertész 1915, p. 523¹⁾
Takao, IV., V., XII. 1) (DEI: 3); Koshun, III. 1); Chip-Chip, II., III. 1) (DEI: 10); Pilam, VII. (DEI: 3); Chipun, VII. (DEI: 5); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2); Tainan, V. (DEI: 2); Kanshirei, IV. (DEI: 1); Kankau, IX., III. (DEI: 3); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 3).

Sonstige Verbreitung: Philippinen, Malay. Archipel

Minettia tubifera Malloch 1927, p. 165¹⁾

Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Chip-Chip, III. (DEI: 1 Typus);
Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾

Monocera cornuta Hendel 1913, p. 100¹⁾; Kertész 1915, p. 505, Fig. 7.²⁾

Kankau (Koshun), VII.^{1) 2)} (DEI: 1 Typus); Taihanroku, VII.²⁾

Pachycerina javana Macquart 1850, Dipt. exot., Suppl. 4, p. 274.

Kertész, 1915, p. 512¹⁾; Malloch 1929, p. 20²⁾

Fuhosho, III.¹⁾; Chip Chip, I.¹⁾; Sokutsu, V.¹⁾; Taihoku-Distr., Gai-
So-Kai, V. (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1); Tappani (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Philippinen²⁾

Pachycerina ocellaris Kertész 1915, p. 512¹⁾

Nach Malloch 1929 vielleicht = *latifrons* Thomson

Kosempo, VI.¹⁾; Chip-Chip, I.¹⁾

Pachycerina plumosa Kertész 1915, p. 513¹⁾

Chip-Chip, I.¹⁾; Kosempo, VI.¹⁾

Paralauzania albiceps Fallén 1820, Dipt. Suec., Ortol., p. 33; Malloch
1927, p. 163¹⁾

Daitotei, VI.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mittel- und N.-Europa

Phobecitomyia lunifera de Meijere 1910, Tijd. Ent. 53, p. 134; Kertész
1915, p. 502, Fig. 6¹⁾; Malloch 1929, p. 23²⁾

Kosempo, V., XI.¹⁾ (DEI: 3); Chip-Chip, II.¹⁾ (DEI: 1), Sokutsu V.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Java

Sapromyza deceptor Malloch 1927, p. 167¹⁾

Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 1 Typus).

Sapromyza fasciatifrons Kertész 1913, p. 92¹⁾

Chip-Chip, I., III.¹⁾ (DEI: 1).

Sapromyza flavopleura Malloch 1927, p. 167¹⁾

Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Maruyama, IV. (DEI: 3)

Sapromyza hirsutiseta de Meijere 1910, Tijd. Ent. 53, p. 131; Malloch
1927, p. 166¹⁾

Kankau (Koshun), IV.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java.

Sapromyza pleuralis Kertész 1913, p. 96¹⁾ (*Minettia*)

Yentempo¹⁾

Sapromyza pollinifrons Malloch 1927, p. 168¹⁾

Hoozan, I.¹⁾ (DEI: 5 Typen); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2 „Typen“)

Sauteromyia alboapicata Malloch 1927, p. 163¹⁾

Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sauteromyia sauteri Hendel 1912, p. 19¹⁾ (*Trigonometopus*)

Chip-Chip, II.¹⁾

- Sciasmomyia Meijerei* Hendel 1907, Wien. Ent. Zeit. 26, p. 234¹⁾
 Sokutsu, IX. (DEI: 2, det. Hendel)
 Sonstige Verbreitung: Hinterindien¹⁾
- Steganopsis convergens* Hendel 1913, p. 102¹⁾; Kertész 1915, p. 510, Fig. 8²⁾; Malloch 1929, p. 14³⁾
 Anping, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Chip-Chip, II.²⁾; Takao, VI.²⁾; Tainan, II.²⁾; Hokuto, XII. (DEI: 1, det. Malloch); Taihoku, XI. (DEI: 1, det. Malloch); Taihoku-Distr., Reisuike (DEI: 1, det. Malloch)
 Sonstige Verbreitung: Philippinen³⁾
- Trigonometopus brunneicosta* Malloch 1927, p. 164¹⁾; Malloch 1929, p. 34
 Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Trigonometopus submaculipennis* Malloch 1927, p. 164¹⁾; Malloch 1929 p. 34
 Taihoku¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Trypaneoides fenestrata* de Meijere 1910, Tijd. Ent. 53, p. 139
 Macuyama, IV. (DEI: 1, det. Malloch)
 Sonstige Verbreitung: Java
- Turriger flavoscutellatus* de Meijere 1910, Tijd. Ent. 53, p. 142¹⁾; Malloch 1929, p. 40
 Synonym oder Subspecies (nach Malloch)
nigrifemoratus Hendel (Beschreibung nicht auffindbar)
 Kosempo, V. (DEI: 2); Kankau (Koshun), XI. (DEI: 4); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 3). Sämtlich: det. Malloch
 Sonstige Verbreitung: Java¹⁾
- Panurgopsis flava* Kertész 1915, p. 496, Fig. 3¹⁾
 Takao, 300 m, IV., V.¹⁾
- Homoneura (Homoneura) acrostichalis* de Meijere 1915, Tijd. Ent. 58, Suppl., p. 51¹⁾; Malloch 1927, p. 171²⁾
 Takao, V.²⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun), V., VIII.²⁾ (DEI: 2); Chip-pun, Puyuma-Distr., VII. (DEI: 1, det. Malloch)
 Sonstige Verbreitung: Simalur, Anuda-Ins., Sikaiana-Ins.
- Homoneura (Homoneura) Beckeri* Kertész 1900, Term. Füzetek 23, p. 266¹⁾; Kertész 1915, p. 529²⁾ (*Lauxania [Minettia]*)
 Takao²⁾; Kosempo, V., XI.²⁾ (DEI: 11); Koshun, X.²⁾ (DEI: 15); Kankau (Koshun), III., V., VI., VII., IX. (DEI: 58); Chip-Chip, II., III.²⁾ (DEI: 7); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. IX. (DEI: 8); Taihoku-Distr., Macuyama, 500 F., V.—VI., IX., XI. (DEI: 8); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 8); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 4); Tappani (DEI: 1); Chosokei (DEI: 1); Tainan, II. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 25)
 Sonstige Verbreitung: Singapore¹⁾, Sumatra, Neuguinea

- ? *Homoneura (Homoneura) bioculata* de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 225 nach Curran 1936, Proc. Calif. Ac. Sci. (4) 22, p. 37 Syn. zu *orientis* Hendel 1908, Gen. Ins. 68, p. 42
Kankau, IX. (DEI: 2)
Sonstige Verbreitung: Java, Samatra
- Homoneura (Homoneura) bistrigata* Kertész 1915, p. 524, Fig. 13¹⁾ (*Lauzania [Minettia]*)
Takao, XII.¹⁾; Kankau (Koshun), V., VII., VIII., IX.¹⁾ (DEI: 11); Tainan, II., V.¹⁾ (DEI: 5); Yentempo, V.¹⁾; Kagi, VIII.¹⁾; Taihanroku, VII.¹⁾; Tappani, III. (DEI: 1)
- Homoneura (Homoneura) brevicornis* Kertész 1915, p. 525, Fig. 14¹⁾ (*Lauzania [Sapromyza]*)
Tainan, II.¹⁾ (DEI: 55); Takao¹⁾; Kagi¹⁾; Koshun¹⁾; Chip-Chip, II. (DEI: 1); Anping, VI. (DEI: 4); Daitotei, V.—VI. (DEI: 6); Taihoku (DEI: 17); Pilam, VII. (DEI: 2); Chipun, VII. (DEI: 7)
- Homoneura (Homoneura) caloptera* Kertész 1915, p. 519, Fig. 11¹⁾ (*Lauzania [Minettia]*)
Kankau (Koshun),¹⁾ VI., VII., VIII., IX. (DEI: 15); Kosempo, VI.¹⁾; Tainan, X. (DEI: 1); Paroe, nördl. Paiwan-Distr. III. (DEI: 1)
- Homoneura (Homoneura) crassicauda* Malloch 1927, p. 171¹⁾; Malloch 1929, p. 67, Fig. 54²⁾
Chipun, Puyama-Distr., VII.¹⁾ (DEI: 4 Typen); Pilam¹⁾
Sonstige Verbreitung: ? Ceylon²⁾
- ? *Homoneura (Homoneura) diachrostichalis* Malloch 1929, p. 68 (nom. nov. pro *monticola* de Meij nec Melander)
Paroe, nördl. Paiwan-Distr. X. (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Java
- Homoneura (Homoneura) discoidalis* Kertész 1915, p. 517, Fig. 10¹⁾ (*Lauzania [Minettia]*)
Takao, VI., VII.¹⁾
- Homoneura (Homoneura) diversa* Kertész 1913, p. 102, Fig. 3, c, g¹⁾ (*Lauzania [Minettia]*)
Takao, XI.¹⁾; Tainan, II., X.¹⁾ (DEI: 1, det. Malloch)
- Homoneura (Homoneura) fasciventris* Malloch 1927, p. 169¹⁾
Chip-Chip, III.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 25 Typen + 1); Hoozan, II.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Koshun¹⁾; Tainan¹⁾; Kosempo¹⁾; „Formosa“ (DEI: 2)
- Homoneura (Homoneura) flavomarginata* Kertész 1915, p. 529¹⁾ (*Lauzania [Minettia]*)
Toyeunmongai¹⁾
- Homoneura forcipata* Kertész 1913, p. 100, Fig. 2¹⁾ (*Lauzania [Minettia]*)

- Takao, V., VI.¹⁾ (DEI: 1); Anping, VI. (DEI: 1, det. Malloch)
Homoneura formosae Kertész 1913, p. 99¹⁾ (*Lauxania* [*Sapromyza*])
 Yentempo, V.¹⁾
Homoneura (*Minettioides*) *fumipennis* Malloch 1927, p. 169¹⁾; Malloch
 1929, p. 66²⁾
 Kankau, VII.¹⁾ (DEI: 1 Typus).
Homoneura (*Homoneura*) *grandis* Kertész 1915, p. 529, Fig. 15¹⁾
 (*Lauxania* [*Minettia*])
 Taihorinsho, VIII.¹⁾
Homoneura (*Neohomoneura*) *honesta* Kertész 1915, p. 532, Fig. 17¹⁾;
 Malloch 1929, p. 62, Fig. 49
 Kosempo, III. IV.¹⁾; Koshun, X.¹⁾ (DEI: 21); Kanshirei, V.¹⁾
 (DEI: 1); Fuhosho, III.¹⁾; Chip-Chip, I., II.¹⁾; Tainan, V. (DEI:
 8); Banshoryo (Shisha), VI. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI:
 75); Hoozan, II. (DEI: 14); „Formosa“ (DEI: 13).
Homoneura (*Homoneura*) *latifrons* Malloch 1927, p. 169¹⁾
 Taihoku¹⁾ (DEI: 1 Typus).
Homoneura lucida de Meijere, Tijds. Ent. 53, p. 132
 Daitotei, V.—VI. (DEI: 1, det. Malloch)
 Sonstige Verbreitung: Java, Philippinen
Homoneura (*Neohomoneura*) *nigronotata* Kertész 1915, p. 530¹⁾; Mal-
 loch 1929, p. 63, Fig. 45
 Kosempo, III.¹⁾; Toa Tsui Kutsu, II. (DEI: 1); Hoozan, II.
 (DEI: 2).
Homoneura (*Homoneura*) *notostigma* Kertész 1913, Fig. 94¹⁾ (*Lauxania* [*Minettia*])
 Chip-Chip, I., II., III.¹⁾; Yentempo, V.¹⁾; Takao, I., VI., XI.¹⁾;
 Kosempo, III.¹⁾; Sokotsu, V.¹⁾; Tainan, X. (DEI: 4); Macuyama,
 V.—VI. (DEI: 3); Hoozan, II. (DEI: 1); Tappani, II. (DEI: 2);
 „Formosa“ (DEI: 1)
Homoneura (*Homoneura*) *nudifrons* Kertész 1913, p. 99¹⁾ (*Lauxania*
 [*Sapromyza*])
 Kosempo, VI.¹⁾; Kankau (Koshun), VII., IX. (DEI: 11, det. Mal-
 loch); Chipun, Puyama-Distr., VII. (DEI: 1); Paroe, nördl. Pawan-
 Distr., VIII., IX. (DEI: 2).
Homoneura (*Homoneura*) *occipitalis* Malloch 1927, p. 170¹⁾
 Chip-Chip, III.¹⁾ (DEI: 5 Typen); Hoozan, II.¹⁾ (DEI: 5 Typen);
 Koshun, X.¹⁾ (DEI: 3 Typen); Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 3
 Typen + 1); Kankau¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1)
Homoneura (*Homoneura*) *ornatifrons* Kertész 1913, p. 91, Fig. 1 a, b¹⁾
 (*Lauxania* [*Minettia*])
 Kosempo, VI.¹⁾; Chip-Chip, II.¹⁾ (DEI: 1); Taihoku, IV.¹⁾ (DEI:

- 2); Sokotsu, V.¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 3); Pilam, III. (DEI: 2); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., V.—VI., XI., XII. (DEI: 9); Taihoku-Distr., Reisuiko (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 2); Chipun, Puyama-Distr. VII. (DEI: 1);
- Homoneura (Homoneura) pallidula* Malloch 1927, p. 170¹⁾
 Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Homoneura (Neohomoneura) paroeca* Kertész 1915, p. 531, Fig. 16¹⁾:
 Malloch 1929, p. 63, Fig. 44
 Kosempo, I., III.¹⁾; Koshun, X.¹⁾; Chip-Chip, I¹⁾; Sokutsu, VI. (DEI: 6, det. Malloch); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 6, det. Malloch); Hoozan, II. (DEI: 1, det. Malloch)
- Homoneura (Homoneura) picta* de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 14
 Synonym (nach Malloch 1927, Ent. Mitt. 16, p. 171):
- Homoneura parviceps* Kertész 1915, p. 521, Fig. 12¹⁾ (*Lauxania [Sapromyza]*)
 Tappani, III. (DEI: 2, det. Malloch); „Formosa“ (DEI: 1, det. Malloch); Chip-Chip, I., II., III.¹⁾; Taihorinsho, VIII.¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Sumatra
- Homoneura (Homoneura) quinquenotata* Kertész 1915, p. 526¹⁾ nom. nov. pro *quinguepunctata* de Meijere 1908, nec Kertész
 Chip-Chip, II.¹⁾ (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Java
- Homoneura (Homoneura) quinevittata* Kertész 1915, p. 517, Fig. 9¹⁾ (*Lauxania [Minettia]*)
 Chip-Chip, I., III.¹⁾ (DEI: 1); Koshun, X., XI.¹⁾ (DEI: 1); Kosempo, II., V., VI.¹⁾ (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 12); Hoozan, II. (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3); Tappani, IV. (DEI: 4); Sokutsu, VI. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 3)
- Homoneura (Homoneura) sauteri* Malloch 1927, p. 171¹⁾
 Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tainan, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Macuyama, V.—VI.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Toa Tsui Kutsu¹⁾; Chip-Chip, III. (DEI: 1 „Typus“)
- Homoneura (Homoneura) simplicissima* de Meijere, 1910, Tijds. Ent. 53, p. 132; Kertész 1915, p. 528²⁾ (*Lauxania [Minettia]*)
 Koshun, IX.²⁾
 Sonstige Verbreitung: Java, Krakatau
- Homoneura (Homoneura) subvittata* Malloch 1927, p. 170¹⁾
 Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 6 Typen + 2); Kankau, IX.¹⁾ (DEI: 1); Chip-Chip, III. (DEI: 1 Typus); Taihoku¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Sokutsu¹⁾; „Formosa“ (DEI: 3)

Homoneura (Homoneura) unguiculata Kertész 1913, p. 100, Fig. 3b—f¹⁾ (*Lauxania [Minettia]*)

Takao, III, VI, X., XI., XII.¹⁾; Yentempo, V.¹⁾; Koshun, IX., X., I.¹⁾; Tainan, IV., V.¹⁾; Taihoku, IV., XI.¹⁾; (DEI: 10); Daitotei, (DEI: 5); Kankau, VII. (DEI: 5); Chipun, Puyuma-Distr. V—VI, VII. (DEI: 4); Pilam, VIII. (DEI: 3); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII., X. (DEI: 6); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., IV., XII. (DEI: 6)

Homoneura (Homoneura) variinervis Kertész 1915, p. 527¹⁾ (*Lauxania [Minettia]*)

Chip-Chip, II.¹⁾; Hoozan, II. (DEI: 1, det. Hendel, Malloch)

Homoneura (Homoneura) viatrix de Meijere, 1910, Tijds. Ent. 53, p. 124¹⁾; Kertész 1913, p. 91²⁾ (*Lauxania [Minettia]*)

Koshun, IX.²⁾; Kankau, III., IV., IX.²⁾ (DEI: 2); Potanwan, Paiwan-Distr., VII. (DEI: 1); Sokutsu, V.²⁾; Paroe, nördl. Paiwan-Distr. VIII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Krakatau, Salomon-Ins.

Homoneura (Homoneura) spec. 1 Kankau, III., IX. (DEI: 2); spec. 2 Paroe, nördl. Paiwan-Distr., X. (DEI: 1)

„*Lauxania (Sapromyza) agromyzina*“ Kertész 1913, p. 93¹⁾
Chip Chip, III.¹⁾

„*Lauxania (Minettia) breviseta*“ Kertész 1913, p. 93¹⁾
Chip Chip, III.¹⁾

„*Lauxania (Minettia) cuneifera*“ Kertész 1913, p. 96¹⁾
Kosempo, I.¹⁾; Insel Lambek, I.—II.¹⁾

„*Lauxania (? Minettia) fuscovittata*, de Meijere“ (wohl = *fuscifasciata* Meij., siehe S. 138)
Kertész 1915, p. 522²⁾

Fuhosho, III.²⁾; Chip Chip, I.²⁾; Kosempo, III.²⁾

„*Lauxania (Sapromyza) heterosticta*“ Kertész 1913, p. 97¹⁾
Koshun, IX.¹⁾; Takao, XII.¹⁾

„*Lauxania (Sapromyza) multisetosa*“ Kertész 1915, p. 523¹⁾
Chip Chip, I.¹⁾

„*Lauxania (Minettia) zebra*“ Kertész, 1913, p. 95¹⁾
Chip Chip, I.¹⁾

Familie Lonchaeidae

Lonchaea chorea Fabricius 1781, Spec. Ins. 2, p. 444.

Taihoku, V. (coll. Takahashi, DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Holarktis.

Lonchaea taipinensis Matsumura 1918, p. 426, Taf. 23, Fig. 21¹⁾
Formosa¹⁾

Lonchaea spec.

Kankau (Koshun), V., IX. (DEI: 10); Anping, V. (DEI: 1); Chipun, Puyuma-Distr., VII. (DEI: 5); Pilam, VII. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1).

Dasyops spec.

Chip Chip, III. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 2)

Lamprolonchaea aurea Macquart 1852, Dipt. exot., Suppl. 4, p. 273

Kankau (Koshun), IV., VI., VII. (DEI: 11); Pilam, VII. (DEI: 4); Chipun, Puyuma-Distr., VII. (DEI: 5); Tainan, II. (DEI: 2); Anping V., (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Oriental. u. Notogae. Region, O.-Afrika, Mediterrane Gebiete.

Carpolonchaea atratula Walker 1840, Proc. Linn. Soc. London 4, p. 146

? Synonym (♀-Form?): *bisulcata* Bezzi 1920, Bull. Ent. Res. 11, p. 208 „Formosa“ (DEI: 2); Kankau (Koshun) VII., IX. (DEI: 2 u. 1 *bisulcata*); Hoozan (DEI: 1, *bisulcata*)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Neuguinea

Carpolonchaea cyaneonitens Kertész 1901, Term. Füzetek, 24, p. 86;

Hendel 1913, p. 41²)

Chip Chip, I. 2)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea, Fiji.

Carpolonchaea excisa Kertész 1901, Term. Füzetek 24, p. 87

Taihorin, XI. (DEI: 1); Kankau (Koshun), III., VII., IX. (DEI: 9); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 3); Macnyama, V.—VI. (DEI: 4); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII. (DEI: 3); Tappani (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Seychellen.

Carpolonchaea setifera de Meijere 1910, Tijds. Ent. 53, p. 119

Kankau (Koshun), IV., VII. (DEI: 28); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Tainan, V. (DEI: 1); Anping, VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Neuguinea, Fiji, Samoa

Carpolonchaea spec. 1

„Formosa“ (DEI: 1 ♂)

Carpolonchaea spec. 2

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3); Chip Chip, I., III. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 2); Hoozan, I (DEI: 6) Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 2); Macnyama, V.—VI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Okaseki, VI. (DEI: 1)

Carpolonchaea spec. 3

Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1)

Carpolonchaea spec. 4

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Tainan, II. (DEI: 1); Hoozan, I. (DEI: 1); Taihoku, XI. (DEI: 1)

Familie: Chamaemyiidae

Leucopis apicalis Malloch 1914, p. 332 ¹⁾; Hennig, 1938, p. 207 ²⁾
Tainan, II. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 140)

Leucopis formosana Hennig 1938, p. 209, Fig. 8, 9 ¹⁾
Tainan, XI. ¹⁾ (DEI: 3 Typen)

Cryptochaetum aenescens de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 193 ¹⁾
Polisha, XII. (DEI: 2, Subspec.?)
Sonstige Verbreitung: Java

Cryptochaetum grandicorne Rondani 1875, Bull. Soc. Ent. Ital. 7, p. 172,
Malloch 1914, p. 333 ²⁾
Polisha, XII. ²⁾
Sonstige Verbreitung: Italien, N.-Afrika

Familie: Helomyzidae

Suillia prima Hendel 1913, p. 104 ¹⁾; Czerny 1924, p. 60 ²⁾
Hoozan, I ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Chip Chip, III. ²⁾

Suillia nova spec.
Hoozan, I (DEI: 1 ♂)

Aphaniosoma thoracalis Hendel 1913, p. 111 ¹⁾
Anping, V., X. ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 1)

Chiromyia hedia Hendel 1913, p. 111 ¹⁾
Anping, V. ¹⁾ (DEI: 5 Typen); Chipun, VII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Familie: Clusiidae

Czernyola biseta Hendel 1913, p. 80 ¹⁾; Hennig 1938, p. 131 ²⁾
Kosempo, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Paroe, X. ²⁾ (DEI: 3); „Formosa“
(DEI: 1)

Clusiodes formosana Hennig 1938, p. 128 ¹⁾
Paroe, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Phyllochusia steleocera Hendel 1913, p. 78 ¹⁾
Kankau (Koshun) V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Isoclusia atromaculata Hennig 1938, p. 129 ¹⁾
Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Familie: Anthomyzidae

Amygdalops geniculata de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 207 ¹⁾; Duda
1924, Arch. Nat. 90 A 3, Taf. I, Fig. 2; Hennig 1939, p. 91 ²⁾

Das Exemplar von Formosa stimmt völlig mit der Beschreibung überein, doch sind die Schenkel einfarbig gelb, nicht „die Spitze aller Schenkel breit schwarz“.

Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII. 2)

Sonstige Verbreitung: Java 1)

Drosophilides

Familie: *Drosophilidae*

Stegana nigrifrons de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 418 1); Duda 1923, p. 37 2); Duda 1926a, p. 45

Takao, 300 m, III. 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra, Südafrika

Stegana nigrolimbata Duda 1923, p. 37 2), nomen nudum; Duda 1924, p. 181 1)

Chip Chip, III. 2)

Protostegana curvinervis Hendel 1914, p. 115 1) (*Orthostegana*)

Kosempo, V. 1) (DEI: 1 Typus + 1)

Protostegana femorata Duda 1923, p. 33 1)

Polisha, XII. 1)

Phorticella bistrata de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 397 1); Duda 1923, p. 36 2)

Toyenmongai 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra

Phorticella fenestrata Duda 1923, p. 36 2)

Chip Chip, I. 2)

Sonstige Verbreitung: Java

Amiota (Phortica) foliiseta Duda 1923, p. 35 1)

Chip Chip 1); Mt. Hoozan 1); Kankau 1)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea 1)

Amiota orientalis Hendel 1914, p. 116 1)

Synonym: „*Phortica maculiceps* de Meij. in litt.“ Duda 1924, p. 183; Duda 1926a, p. 46

„*Amiota variegata* Fallén“ Duda 1923, p. 35 2); Duda 1924, p. 240 3); Duda 1926, p. 248 4)

Die von Duda als *maculiceps* und *variegata* bezeichneten formosanischen Tiere des DEI sind *orientalis* Hend.

Kosempo, III. 2) 4); Chip Chip 2); Macnyama, V.—VI. 1) 3) (DEI: 5);

Kankau (Koshun), VI. 1) (DEI: 5 Typen + 17)

Amiota spec.

Chip Chip, III. (DEI: 1)

Oxyphortica convergens de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 400 1); Hen-

del 1914, p. 115²⁾ (*Orthostegana*); Duda 1923, p. 34³⁾; Duda 1924, p. 240, Taf. 2, Fig. 30⁴⁾

Taihorin³⁾; Kosempo, V. 2)³⁾ (DEI: 4); Chip Chip, II. ³⁾ (DEI: 1); Sokutsu³⁾; Toa Tsui Kutsu, V. 4) (DEI: 14); Macnyama, V.—VI. (DEI: 2); Hoozan (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Neuguinea

Oxyphortica nigripennis Hendel 1914, p. 115¹⁾ (*Orthostegana*)

Synonym: *Chaetocnema* (*Oxyphortica*) *poeciloptera* Duda 1926, p. 243, Fig. 1²⁾

Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1 Typus); Kosempo²⁾; Koshun²⁾; Tapani²⁾; Toyenmongai²⁾

Parascaptomyza substrigata de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 268¹⁾; Duda 1923, p. 47²⁾

Chip Chip²⁾; Tainan, II. 2) (DEI: 1); Taihoku²⁾ (DEI: 3); Macnyama, V.—VI. (DEI: 1)

Cacoxenus punctatus Duda 1923, p. 25¹⁾, nomen nudum; Duda 1924, p. 225²⁾; Duda 1926, p. 246³⁾

Tainan³⁾; Takao, X. 1)

Leucophenga abbreviata de Meijere 1911, Tijds. Ent. 3, p. 113¹⁾ (*Drosophila*); Hendel 1914, p. 113²⁾ (*Drosomyiella*); Duda 1923, p. 26³⁾

Chip Chip, II. ³⁾ (DEI: 1); Taihorin, VII. ³⁾; Tappani²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Leucophenga albiceps Meijerea Duda 1924, p. 190¹⁾ nom. nov. pro „lineata“ (Duda 1924, p. 240: „Meijerei“)

Synonym (nach Duda): „*Leucophenga lineata* de Meij. in litt.“ Duda 1924, p. 240²⁾

Taihoku²⁾ (DEI: 11); Sokutsu, VI. (DEI: 2); Chip Chip, III. (DEI: 2); Tainan, X. (DEI: 1); Hoozan (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 3)

Verbreitung der Nominatform: Java.

Leucophenga argentata de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 258¹⁾; Duda 1924, p. 238²⁾; Sturtevant 1927, Philipp. Journ. Sci. 32, p. 364³⁾

Paroe, nördl. Paiwan-Distr., X. 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾; Philippinen³⁾

Leucophenga bifasciata Duda 1923, p. 30¹⁾

Chip Chip, II. 1)

Leucophenga fuscipennis Duda 1923, p. 28¹⁾

nach Duda vielleicht ♂ der folgenden Art

Takao 800 m., IV. 1)

Leucophenga guttiventris de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 331¹⁾; Duda 1923, p. 28²⁾; Duda 1924, p. 239, Taf. 2, Fig. 27³⁾; Bezzi 1928, Dipt. Fiji Islands p. 155

Paroe, VIII., X. ³⁾ (DEI: 6); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. ³⁾ (DEI: 6)

1); Macuyama, IV., V.³⁾ (DEI: 4); Takao²⁾; Chip Chip²⁾; Yentempo²⁾; Chipun, VII. (DEI: 24); Pilam, VII. (DEI: 1); Kankau (Koshun) (DEI: 1); Tainan, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java

Leucophenga halteropunctata Duda 1923, p. 28¹⁾; Duda 1924, p. 239²⁾; Sturtevant 1927, Philipp. Jl. Sci. 32, p. 364³⁾

Paroe, X.²⁾¹⁾ (DEI: 1 Typus); Takao, IV.¹⁾²⁾; Sokotsu, V.¹⁾²⁾

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 „Typus“)

Leucophenga interrupta Duda 1924, p. 187, 237¹⁾

Paroe, VIII.¹⁾ (DEI: 2 Typen + 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Leucophenga latifrons Duda 1923, p. 32¹⁾

Takao, X.¹⁾

Leucophenga limbipennis de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 150¹⁾;

Duda 1924, p. 237, Taf. 2, Fig. 21²⁾

Paroe, X. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Leucophenga maculata confluens Duda 1923, p. 32¹⁾

Chip Chip, X.¹⁾; Mt. Hoozan¹⁾

Leucophenga magnipalpis Duda 1923, p. 27¹⁾

Chip Chip, I.¹⁾

Leucophenga nigroscutellata Duda 1924, p. 186, 237¹⁾

Toa Tsui-Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 2)

Leucophenga nigrinervis Duda 1924, p. 236¹⁾

Kosempo, VIII.¹⁾

Leucophenga nigripalpis Duda 1923, p. 29¹⁾

Chip Chip, II.¹⁾

Leucophenga paraguttiventris Duda in litt.?

Macuyama, IV.—VI. (DEI: 2); Paroe, X. (DEI: 4); Taihoku-Distr.

Gai-So-Kai V. (DEI: 1)

Leucophenga setipalpis Duda 1923, p. 31¹⁾

Takao, VII.¹⁾

Leucophenga sordida Duda 1923, p. 31¹⁾

Koshun, IX.¹⁾

Leucophenga subacutipennis Duda 1924, p. 239¹⁾; Bezzi 1928, Dipt.

Fiji p. 156²⁾

Paroe, VIII., X.¹⁾ (DEI: 2 Typen + 2); Macuyama, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Pilam, VII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Fiji-Inseln.

Leucophenga subpollinosa de Meijere 1914, Tijds. Ent. 57, p. 263¹⁾;

Duda 1923, p. 27²⁾; Duda 1924, p. 187, Taf. 2, Fig. 23³⁾;

Duda 1926 a, p. 52⁴⁾

Chip Chip, II. 2); Tainan, II. 2); Anping, VI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai³⁾ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾; Sumatra⁴⁾

Leucophenga umbratula Duda 1924, p. 187¹⁾

Paroe, X. 1) (DEI: 1 Typus)

Leucophenga varinervis Duda 1923, p. 31¹⁾

Sokotsu, V. 1)

Paraleucophenga invicta Walker 1857, Proc. Linn. Soc. London, p. 130¹⁾; de Meijere 1924, Tijds. Ent. 57, p. 255²⁾; Duda 1924, p. 236, Taf. 2, Fig. 15³⁾ (*Trichiaspiphenga*)

Synonym: *Paraleucophenga trisetata* Hendel 1914, p. 114⁴⁾

Kankau (Koshun), V., IX. 2) (DEI: 2 Typen von *trisetata*); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. 3) (DEI: 19)

Sonstige Verbreitung: Borneo¹⁾; Java²⁾

Paramycodrosophila pictula de Meijere 1911, Tijds. Ent. 54, p. 412¹⁾; Duda 1924, p. 191, 241²⁾; Duda 1926 a, p. 58³⁾

Paroe 2)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾, Sumatra³⁾

Scaptodrosophila divergens Duda 1924, p. 240¹⁾

Toyenmongai, V. 1)

Paradrosophila marginata Duda 1923, p. 46¹⁾; Duda 1924, p. 244²⁾; Takao, XI. 1) 2); Paroe 2) (DEI: 1 Typus + 2)

Paradrosophila novoguineensis Duda 1923, p. 46¹⁾; Duda 1926 a, p. 81²⁾; Duda 1929, Treubia 7, p. 419³⁾

Takao 1)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea¹⁾; Buru³⁾; Sumatra²⁾

Paradrosophila oralis Duda 1923, p. 44¹⁾

Koshun, X. 1); Chip Chip, III. 1); Sokotsu, V. 1)

Paradrosophila scutellimargo Duda 1923, p. 43¹⁾; Duda 1924, p. 243, Taf. 5, Fig. 69²⁾

Kosempo, V. 1) 2) (DEI: 1); Sokotsu¹⁾; Taihorin¹⁾; Toa Tsui-Kutsu, V. 2) (DEI: 3 Typen + 1); Tainan, II. (DEI: 1)

Paradrosophila simplex de Meijere 1914, p. 266¹⁾; Duda 1923, p. 45²⁾; Duda 1924, p. 244, Taf. 5, Fig. 6³⁾

Chip Chip, I. 2); Paroe, X. 3)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾; Singapore²⁾

Paradrosophila subacuticornis Duda 1924, p. 244¹⁾

Hokuto, XII. 1) (DEI: 1 Typus).

Drosophila ananassae Doleschall 1858, Tijds. Fled. Ind. 17, p. 128; Duda 1923, p. 53¹⁾; Duda 1924, p. 247²⁾; Duda 1926, Suppl. Ent. 14, p. 98³⁾; Sturtevant 1927, p. 371⁴⁾; Bezzi 1928, Dipt. Fiji, p. 158⁵⁾; Kikkawa & Peng 1938, p. 526, Taf. 31, e 6).

Takao ^{1) 6)}; Kankau, VII. 1) (DEI: 1); Taihoku ^{2) 6)} (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. 2) (DEI: 1); Sintiku ⁶⁾; Tainan ⁶⁾; Palao ⁶⁾; Paroe, VIII. (DEI: 13)

Sonstige Verbreitung: Orientalisches und papuanisches Gebiet, Japan ⁶⁾

Drosophila (Spinulophila) annulipes Duda 1923, p. 58 ¹⁾; Duda 1924, p. 209, 250, Taf. 7, Fig. 94 ²⁾; Duda 1926, Suppl. Ent. 14, p. 84 ³⁾ Taihoku ^{1) 2)} (DEI: 2 Typen); Chip Chip ¹⁾; Toa Tsui Kutsu ²⁾ (DEI: 5 Typen); Macuyama, V.—VI. 2) (DEI: 3 Typen + 1)
Sonstige Verbreitung: Sumatra ³⁾

Drosophila bicolor de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 399 ¹⁾; Duda 1923, p. 55 ²⁾
Koshun, X. 2); Takao, III. 2)
Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Drosophila bipectinata Duda 1923, p. 52—53 ¹⁾; Duda 1924, p. 214 ²⁾; Kikkawa & Peng 1938, p. 527, Fig. 9—10 ³⁾
Taihoku ³⁾; Sintiku ³⁾; Takao ³⁾; Paroe, VIII. (DEI: 6)
Sonstige Verbreitung: Japan ³⁾

Drosophila busckii Coquillett 1901, Ent. News, 12, p. 18; Duda 1924, p. 251, Taf. 7, Fig. 95 ¹⁾
Daitotai ¹⁾ (DEI: 1); (Suisharyo ¹⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: „Kosmopolit“

Drosophila (Hirtodrosophila) carinata Duda 1923, p. 41 ¹⁾
Synonym: *Dasydrosophila latifrons* Duda 1926, Suppl. Ent. 14, p. 66 : „nomen novum pro *carinata* Duda + *astioidea* Duda!
Kosempo, III. 1); Fuhosho, VII. 1)
Sonstige Verbreitung: ungeklärt

Drosophila clunierus Duda 1923, p. 51 ¹⁾
Taihorin, VII. 1)

Drosophila compressifrons Duda 1923, p. 56 ¹⁾
Chip Chip ¹⁾; Taihorin ¹⁾; Mt. Hoozan ¹⁾

Drosophila (Microdrosophila) congesta Zetterstedt 1847, Dipt. Scand. 6, p. 2558; Duda 1924, p. 242, Taf. 4, Fig. 51 ¹⁾
Taihoku ¹⁾ (DEI: 4)
Sonstige Verbreitung: Europa, Java, Neuguinea

Drosophila curvica pillata Duda 1923, p. 49 ¹⁾. Fig. 13
Kosempo, VI., XI. ¹⁾ (DEI: 23); Tainan, II. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Sumatra

Drosophila decipiens Duda 1923, p. 55 ¹⁾
Kosempo ¹⁾; Taihorin ¹⁾

Drosophila dorsata Duda 1923, p. 56¹⁾; Duda 1924, p. 248, Taf. 6, Fig. 91²⁾. Fig. 14

Takao, V. 1¹⁾; Sokutsu, V. 1¹⁾; Paroe²⁾ (DEI: 2 Typen + 1); Taihoku²⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau, IX. (DEI: 4); Kosempo, V. (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Mittel-Annam 1)

Drosophila fasciata Meigen 1830, Syst. Besch. zweifl. Insekten 6, p. 84; Duda 1923, p. 52¹⁾; Duda 1924, p. 246, Taf. 6, Fig. 82²⁾; Kikkawa & Peng 1938, p. 534, Fig. 20—22³⁾

Taihoku³⁾; Sintiku³⁾; Takao³⁾; Toa Tsui Kutsu, V. 2²⁾ (DEI: 6); Akau, XII. 2²⁾ (DEI: 3); Alikang, X. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Palaearktis

Drosophila hoozani Duda 1923, p. 54¹⁾

Mt. Hoozan 1)

Drosophila hydei Sturtevant 1921, The N. Amer. Spec. *Drosophila*. p. 101¹⁾; Sturtevant 1927, p. 372²⁾

Taihoku, III. 2)

Sonstige Verbreitung: Sydney, N.-Amerika

Drosophila (Spinulophila) immigrans Sturtevant 1921, The N.-Amer. Spec. *Drosophila*, p. 83, Fig. 1, Taf. 3 1¹⁾; Sturtevant 1927, Philipp. Journ. Sci. 32, p. 367²⁾; Kikkawa & Peng 1938, p. 524, Fig. 5—6³⁾
Sturtevant 1927, stellt „*tripunctata* of authors, not of Loew“ als Synonym zu *immigrans* und vermutet, daß *hypocausta* der älteste Name für diese Art sei. Nach den Typen von *hypocausta* Osten-Sacken im DEI trifft das nicht zu, denn diese haben schmale Backen und gehören demnach in die Verwandtschaft von *nasuta* Lamb. Auffällig bei allen 5 Typen sind die dunklen Pleuren! Sturtevant trennt die formosanischen Tiere von *immigrans* als „var. *formosana* var. nov.“ ab. Dieser Name fällt mit *formosana* Duda nomen novum pro „*tripunctata* auct.“ zusammen.

ssp. *formosana* Duda 1926 b, p. 250, Fig. 4, 5⁴⁾

Synonym: *formosana* Sturtevant 1927, p. 368⁵⁾

„*tripunctata* Becker“ Duda 1924, p. 246, Taf. 5, Fig. 71⁶⁾

Macnyama⁶⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu⁶⁾ (DEI: 1); Taihoku, III. 5⁵⁾; Polisha, XII. (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 2)

Verbreitung der Nominatform: N.-Amerika, Paläarkt, Orientalis, Costa Rica, Australien, Hawaii

Drosophila (Spinulophila) Komaii Kikkawa & Peng 1938, p. 525, Taf. 32 1)

Taihoku 1¹⁾; Sintiku 1)

Sonstige Verbreitung: Japan 1)

Drosophila lineata de Meijere 1911, Tijds. Ent. 54, p. 420—421¹⁾;

Duda 1924, p. 221, Fig. 93 1)

Synonym (nach Duda): *multistriata* Duda 1923, p. 57³⁾

Chip Chip, I., II.³⁾; Hoozan (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Drosophila lividinervis Duda 1923, p. 54¹⁾

Synonym: *lividipennis* Duda 1924, p. 216²⁾

Fuhosho VII.¹⁾

Drosophila (Hirtodrosophila) longecrinita Duda 1923, p. 42¹⁾; Duda 1924, p. 242, Taf. 4, Fig. 55²⁾; Sturtevant 1927, p. 367³⁾

Paroe²⁾ (DEI: 1 „Typus“); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 „Typus“); Kosempo¹⁾; Fuhosho¹⁾; Tainan, X. (DEI: 2); Banshoryo (Shisha), V.—VII. (DEI: 29)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea¹⁾; Philippinen³⁾

var. *dentata* Duda 1923, p. 42¹⁾

Fuhosho VII.¹⁾

Drosophila longifrons Duda 1923, p. 48¹⁾

Chip Chip, III.¹⁾

Drosophila montium de Meijere 1916, Tijd. Ent. 59, p. 205¹⁾; Duda 1923, p. 53²⁾; Duda 1924, p. 247³⁾; Kikkawa & Peng 1938, p. 530, Fig. 14⁴⁾. Fig. 15

Sintiku⁴⁾; Taihoku, XI.³⁾⁴⁾ (DEI: 8); Paroe, VIII., X.³⁾ (DEI: 15); Daitotei V.—VI. (DEI: 1); Macuyama V.—VI.³⁾ (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Tainan, X.²⁾ (DEI: 2); Taihorin²⁾; Chip Chip²⁾; Mt. Hoozan²⁾; Polisha²⁾

Sonstige Verbreitung: Tokuyama, Kyusyu; Ryu-Kyu⁴⁾; Java¹⁾

var. *atropyga* Duda 1924, p. 215¹⁾

Java¹⁾; Formosa¹⁾; Annam¹⁾

var. *xanthopyga* Duda 1924, p. 215¹⁾

dieselben Fundorte¹⁾

Drosophila (Spinulophila) nasuta Lamb 1914, Trans. Linn. Soc. Zool. 16, p. 346¹⁾; Sturtevant 1927, p. 369²⁾

Synonym (nach Sturtevant):

Spinulophila albomicans Duda 1923, p. 47³⁾; Duda 1924, p. 245, Taf. 5, Fig. 70⁴⁾; Duda 1926a, p. 89⁵⁾

Koshun³⁾⁴⁾; Chip Chip³⁾⁴⁾; Taihorin³⁾⁴⁾; Polisha, XII.³⁾⁴⁾ (DEI: 5); Paroe, VIII., X.⁴⁾ (DEI: 8 Typen + 9); Kankau, IX. (DEI: 34); Tainan, X. (DEI: 8)

Sonstige Verbreitung: Seychellen¹⁾; Neuguinea⁵⁾

Drosophila obscurata de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 410¹⁾; Duda 1924, p. 251²⁾ Fig. 16

Macuyama, V.—VI.²⁾ (DEI: 38)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Drosophila paravibrissina Duda 1924, p. 248 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Drosophila repleta Wollaston 1858, Ann. Mag. Nat. Hist. 41, p. 117;

Duda 1923, p. 57; Duda 1924, p. 250 ¹⁾; Duda 1926a, p. 106 ²⁾;

Kikkawa & Peng 1938, p. 545, Fig. 29 ³⁾

Taihoku, X. ¹⁾ (DEI: 10); Tainan, II. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI:

6); Anping, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: „Kosmopolit“ ²⁾

Drosophila signata Duda 1923, p. 48 ¹⁾

Chip Chip, III ¹⁾

Drosophila silvata de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 206 ¹⁾; Duda 1924,

p. 247 ²⁾; Duda 1926a, p. 104 ³⁾

Paroe ²⁾ (DEI: 6); Chip Chip ²⁾; Sokutsu ²⁾; Polisha ²⁾; Macuyama,

V.—VI. (DEI: 1); Taihoku, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra

Drosophila singularis Duda 1923, p. 56 ¹⁾; Duda 1924, p. 249 ²⁾

Chip Chip, I., II. ¹⁾ ²⁾; Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾ (DEI: 1 Typus)

Drosophila takahashii Sturtevant 1927, p. 371 ¹⁾; Kikkawa & Peng

1938, p. 534, Taf. 31, Fig. 19 ²⁾

Taihoku, III. ¹⁾ ²⁾

Sonstige Verbreitung: Port Arthur ²⁾

Drosophila (Hirtodrosophila) trapezina Duda 1923, p. 41 ¹⁾

Kosempo ¹⁾; Polisha ¹⁾; Chip Chip ¹⁾

Drosophila tristipennis Duda 1923, p. 53 ¹⁾; Duda 1924, p. 247, Taf.

6, Fig. 84—85 ²⁾

Chip Chip, I. ¹⁾ ²⁾; Taihoku, XI., XII. ²⁾ (DEI: 5 Typen + 3)

Tainan, X. (DEI: 1); Hoozan (DEI: 16)

Drosophila trivittata Strobl 1893, Wien. Ent. Zeitg. 12, p. 281; Duda

1923, p. 49 ¹⁾

Kosempo ¹⁾; Fuhosho ¹⁾; Polisha ¹⁾; Mt. Hoozan ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Europa

Drosophila unipectinata Duda 1924, p. 246, Taf. 6, Fig. 83 ¹⁾ Fig. 17

Hokuto, VII. ¹⁾ (DEI: 5 Typen + 4); Taihoku, V. ¹⁾ (DEI: 4

Typen); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1 „Typus“)

Drosophila xanthogaster Duda 1924, p. 248 ¹⁾, Fig. 18

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 4 Typen + 3); „Formosa“ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Liodrosophila nitida Duda 1922, p. 157 ¹⁾; Duda 1923, p. 38; Duda

1924, p. 241 ²⁾, Taf. 4, Fig. 47; Duda 1926a, p. 53 ³⁾

Nach Duda, 1926, handelt es sich hierbei um 1 oder um 3 selbstständige Arten, für die Duda die Namen *nitida*, *marginifrons*, *dimidiata* vorschlägt. Siehe Dudas Beschreibung.

Polisha ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Taihorin ¹⁾; Hokuto, XII. ¹⁾ ²⁾

Sonstige Verbreitung: Annam ²⁾, Sumatra ²⁾

Dettopsomyia formosae Duda 1924, p. 194 ¹⁾ (*Styloptera*); Duda 1926a, p. 61 „Formosa“ ¹⁾ (Im DEI: 1 ♀, det. Duda von Macuyama, V.—VI., offenbar Typus)

Zaprionus albicornis Enderlein 1922, p. 295 ¹⁾

Toyenmongai bei Tainan ¹⁾

Spuriostyloptera multipunctata Duda 1923, p. 38 ¹⁾

Chip Chip I. ¹⁾

Hypselothyrea breviscutellata Duda, 1928, p. 82 ¹⁾

Formosa ¹⁾

Hypselothyrea guttata Duda, 1926a, p. 56, Fig. 2 ¹⁾

Chip Chip II. ¹⁾; Kosempo ¹⁾; Polisha ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Sumatra ¹⁾

Thaumastophila hyalipennis Hendel, 1914, p. 113 ¹⁾

Pilam ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Chipun ¹⁾

Chalcidomyia cyanescens Becker, 1916, p. 440 ¹⁾

Kankau IV. ¹⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun) (DEI: 2)

Chalcidomyia polita de Meijere, 1910, Tijd. Ent. 53, p. 156 ¹⁾; Becker, 1911, p. 47 ²⁾ (*Hemisphaeroscma*); Hendel, 1913, p. 35 ³⁾; Becker, 1924, p. 119 ⁴⁾

Macuyama V.—VI. ⁴⁾ (DEI: 10); Kosempo V., VI., XI. ³⁾ ⁴⁾ (DEI: 2)

Familie: *Sphaeroceridae*

Subfamilie *Sphaerocerinae*

Borborus n. sp.

Kankau (Koshun) VIII, (DEI: 1)

Subfamilie: *Leptocerinae*

Leptocera (Poecilosomella) amputata Duda, 1925a, p. 97 ¹⁾

Chip Chip I. ¹⁾; Polisha XII. ¹⁾

Leptocera (Opacifrons) coxata Stenhammar 1855, Coprom. Scand. p. 396; Duda 1925a, p. 70 ¹⁾

Taihorin, VII. ¹⁾; Taihoku, XI. ¹⁾ (DEI: 2); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: O.-Afrika, Europa

Leptocera (Leptocera) curvinervis Stenhammar 1855, Coprom. Scand. p. 406; Duda 1925a, p. 50 ¹⁾

„Formosa“ ¹⁾; Taihoku, XI. (DEI: 5); Chipun, VII. (DEI: 16); Pilam, VII. (DEI: 8); Kankau, VII. (DEI: 1); Macuyama, IV. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa, Afrika, Oriental. Region, Neuguinea

- Leptocera (Opacifrons) dupliciseta* Duda 1925a, p. 68¹⁾
 Taihorin, VII.¹⁾; Takao, XII.¹⁾
- Leptocera (Rachispoda) filiforceps* Duda 1925a, p. 40¹⁾
 Tainan, II.¹⁾; Kankau (Koshun) IX. (DEI: 5)
- Leptocera (Trachyopella) formosae* Duda 1925a, p. 200¹⁾
 Takao¹⁾
- Leptocera (Poecilomella) furcata* Duda 1925a, p. 91¹⁾
 Chip Chip III.¹⁾; „Formosa“¹⁾
- Leptocera (Limosina) heteroneura* Haliday 1836, Ent. Mag. 3, p. 331;
 Duda 1925a, p. 189¹⁾ (*Scotophilella*)
 Takao¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Europa, Afrika
- Leptocera (Coprophila) hirtula* Rondani 1880, Bull. Soc. Ent. Ital. 12,
 p. 38; Duda 1925a, p. 206¹⁾
 „Formosa“¹⁾; Anping, V. (DEI: 11); Taihoku, XI. (DEI: 5);
 Paroe, VIII. (DEI: 3)
 Sonstige Verbreitung: Anscheinend fast kosmopolitisch.
- Leptocera (Poecilomella) longinervis* Duda 1925a, p. 103¹⁾
 Kosempo, III.¹⁾; Taihoku, IV.¹⁾; Daitotei, V.—VI (DEI: 1)
- Leptocera (Poecilomella) multipunctata* Duda 1925a, p. 101¹⁾
 Kankau¹⁾; Kankau (Koshun) VII. (DEI: 19); Paroe, X. (DEI: 1)
- Leptocera (Leptocera) nigrolimbata* Duda 1925a, p. 60¹⁾
 Taihorin¹⁾; Chip Chip III.¹⁾; Hokuto, XII.¹⁾
- Leptocera (Poecilomella) nigrotibiata* Duda 1925a, p. 98¹⁾
 Im DEI 1 Exemplar mit normal gefärbter Vordertibia (d. h. gelber
 Ring vorhanden), doch hat es die typische Beborstung der Mittel-
 tibia von *nigrotibiata*.
 Takao¹⁾; Macuyama V.—VI. (DEI: 1 und das eben erwähnte Exemplar)
- Leptocera (Leptocera) parafulva* Duda 1925a, p. 54¹⁾
 Taihoku¹⁾; Hokuto, XII.¹⁾
- Leptocera (Leptocera) paranigrolimbata* Duda 1925a, p. 61¹⁾
 Polisha, XII.¹⁾; Taihorin, VII.¹⁾; Taihoku-Distr., Macuyama, V.—VI.,
 XII.¹⁾ (DEI: 1)
- Leptocera (Rachispoda) pseudooctisetosa* Duda 1925a, p. 27¹⁾
 Tainan, I., II., V., X.¹⁾ (DEI: 194); Anping, V.¹⁾ (DEI: 1)
- Leptocera (Poecilomella) punctipennis* Wiedemann 1824, Anal. Ent.,
 p. 59; Enderlein 1911, p. 138¹⁾; Duda 1925a, p. 95²⁾
 „Insel Lambeh“²⁾; Kosempo²⁾; Takao²⁾; Koshun²⁾; Taihoku, XI.²⁾
 (DEI: 25); Kankau, IX.²⁾ (DEI: 20); Chip Chip²⁾; Macuyama
 V.—VI. (DEI: 2); Chosokei (DEI: 1); Daitotei, V.—VI. (DEI: 3);
 Paroe, VIII., X. (DEI: 4); Kankau, IX. (DEI: 20)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Neuguinea.

Leptocera (Limosina) rufa Duda 1925a, p. 172 ¹⁾ (*Scotophilella*)
Takao, III ¹⁾; Tainan, V. (DEI: 2)

Leptocera (Limosina) brevicostata rufifrons Duda 1925a, p. 188 ¹⁾
Takao ¹⁾

Leptocera (Rachispoda) sauteri Duda 1925a, p. 26 ¹⁾

Tainan, II., V. (DEI: 37); Taihoku, XI. (DEI: 2); Kankau, IX.
(DEI: 1); Pilam, VI. (DEI: 1)

Leptocera (Rachispoda) subtipennis Brunetti 1913, Rec. Ind. Mus. 8,
p. 174 ¹⁾; Duda 1925a, p. 37 ²⁾ (*Collinella*)

Tainan, II, V., X. ²⁾ (DEI: 8); Taihoku, XI. (DEI: 2); Pilam, VIII.
DEI: 1; Anping, V. (DEI: 1); Kankau, IX. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: O.-Afrika, Java, Annam

Leptocera (Coprophila) vagans Haliday 1833, Ent. Mag. 1, p. 178:
Duda 1925a, p. 205 ²⁾

Takao, II. ²⁾; Anping, V. (DEI: 3); Taihoku, XI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: „Kosmopolit“

Leptocera (Poecilomella) varians Duda 1925a, p. 99 ¹⁾

Chip Chip, III ¹⁾; Koshun, X. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Singapore ¹⁾

Leptocera (Poecilomella) spec.

Mit nur 1 Stachel am unteren Ende des schwarzen Ringes der t_2 ,
vielleicht nur Variante von *punctipennis* Wied.

Kankau, IX. (DEI: 1)

Leptocera (Limosina) spec. 1 DEI: Tainan, V.: 1

spec. 2 DEI: Kankau, IX.: 1

spec. 3 DEI: Paroe, VIII.: 1

Familie Tethinidae

Pseudorhinoessa spinipes Malloch, 1914, p. 307 ¹⁾

Takao, IV. ¹⁾

Dasyrhinoessa fulva Hendel 1913, p. 110 ¹⁾ (*Rhinoessa*); Malloch 1914,
p. 308 ²⁾; Hendel 1934, p. 51

Tainan, II ¹⁾; Anping, V., VI., VII. ¹⁾ (DEI: 5 Typen + 2); Takao,
III., IV. ²⁾

Rhinoessa ochracea Hendel 1913, p. 109 ¹⁾; Malloch 1914, p. 308 ²⁾

Anping, V. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 3 Typen + 2); Takao, I., III., IV., V. ²⁾

Rhinoessa orientalis Hendel 1934, p. 47 ¹⁾

Anping ¹⁾; Alikang (DEI: 2)

Rhinoessa sexseriata Hendel 1913, p. 110 ¹⁾; Malloch 1914, p. 309 ²⁾

Anping, VI., VII. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 1 Typus); Takao, III., IV. ²⁾

Familie *Canaceidae*

Procanace grisescens Hendel 1913, p. 93 ¹⁾

Anping, IX. ¹⁾ (DEI: 18); Tainan, X. (DEI: 56 „Typen“ + 96)

Canace (Chaetocanace) biseta Hendel 1913, p. 95 ¹⁾; Hendel 1914, p. 98 ²⁾

Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 4 Typen + 18); Anping, IX. (DEI: 3)

Canace (Xanthocanace) magna Hendel 1913, p. 95 ¹⁾; Hendel 1914, p. 98

Anping, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Canace (Xanthocanace) orientalis Hendel 1913, p. 94 ¹⁾; Hendel 1914, p. 98 ²⁾

Anping, V. ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 2); Alikang, X. (DEI: 7)

Familie *Ephydriidae*Subfamilie *Gymnopininae*

Gymnopa dentifemur Cresson 1925, p. 233 ¹⁾

Synonym: „*Gymnopa subsultans* Fabr.“ Becker 1924, p. 92 ²⁾

Mt. Hoozan, V. ¹⁾; Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 2); Taihoku, XI. ²⁾ (DEI:

12); Chosokei ²⁾ (DEI: 1); Toyen-Distr., Sanshikyaku (DEI: 5);

Daitotei, V.—VI. (DEI: 2)

Gymnopa grandis Cresson 1925, p. 232 ¹⁾

Takao, VI. ¹⁾

Hecamede persimilis Hendel 1913, p. 99 ¹⁾; Cresson 1925, p. 229 ²⁾

Anping, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tainan, II., X. ¹⁾ (DEI: 2 Typen

+ 11); Tayao, IV.—V. ²⁾

Tetramerogaster fumipennis Hendel 1914, p. 111 ¹⁾

Anping, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Kanshizei, IV. (DEI: 1)

Trimerogaster cincta Hendel 1914, p. 111 ¹⁾; Cresson 1925, p. 241 ²⁾

Anping, VI. ¹⁾ (DEI: 9 Typen)

Athyroglossa freta Cresson 1925, p. 238 ¹⁾

Kankau, IV. ¹⁾; Tainan, V. (DEI: 1).

Placopsidella signatella Enderlein 1912, p. 164 ¹⁾ (*Oscinomima*); Kertész

1912, p. 548 ²⁾

Takao, X. ¹⁾ ²⁾

Nannodastia horni Hendel 1930, p. 68, Fig. auf Seite 69 ¹⁾

Anping, IV. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Subfamilie *Psilopininae*

Discomyza maculipennis Wiedemann 1824, Anal. Ent., p. 57; Cresson

1925, p. 242 ¹⁾

Anping, VI., X. ¹⁾ (DEI: 1); Tainan, II. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Cuba, Guam, Philippinen, Indochina

Clanoneurum cimiciforme Haliday 1855, Nat. Hist. Rev. 2, Proceed.,

p. 124; Cresson 1925, p. 243 ¹⁾

- Synonym (nach Cresson): *Clanoneurum orientale* Hendel 1913, p. 97, Fig. 5—6²⁾
 Anping, V. 2) (DEI: 2 Typen von *orientale*)
 Sonstige Verbreitung: U. S. A. 1); Aegypten 1); Triest 1); Europa.
- Psilopa flavimana* Hendel 1913, p. 97¹⁾; Cresson 1925, p. 246²⁾
 Tainan, X. 1) (DEI: 1 Typus)
 Sonstige Verbreitung: Indien 2); Indochina 2)
- Psilopa longicornis* de Meijere 1916, Tijds. Ent. 59, p. 266¹⁾; Becker 1924, p. 91²⁾
 Maruyama, IV. (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Java 1)
- Psilopa mentita* Cresson 1925, p. 245¹⁾
 Polisha, XII. (DEI: 37, det. Cresson); Tainan, II. (DEI: 7, det. Cresson).
 Sonstige Verbreitung: Mittel-Annam 1)
- Psilopa rufipes* Hendel 1913, p. 97¹⁾; Cresson 1925, p. 244²⁾
 Synonym (sec. typ.): *Psilopa bella* Becker 1924, p. 92³⁾
 Tainan, II., IV.—X. 1) 2) (DEI: 5 Typen von *rufipes* + 23); Takao, III. 2); Paroe, VIII. (DEI: 1); Taihoku, XI. 3) (DEI: 10 Typen von *bella* + 3); Hokuto, XII. (DEI: 1 „Typus“ von *bella*); Taihoku-Distr., Macuyama, XII., 500 F. (DEI: 3 „Typen“ von *bella*)
- Psilopa singaporensis* Kertész 1901, Term. Füzetek 24, p. 81¹⁾; Hendel 1913, p. 97²⁾; Cresson 1925, p. 245³⁾; Becker 1924, p. 91⁴⁾
 Tainan, II., X. 2) (DEI: 4); Macuyama, IV. 4) (DEI: 2); Paroe, VIII. (DEI: 1); Taihoku, XI. (DEI: 3); Taihoku-Distr., Maruyama XII., 500 F. (DEI: 3)
 Sonstige Verbreitung: Philippinen 3); Neu-Guinea 3); Singapore 1)
- Clasiopella dimidiata* Cresson 1922, Ent. News 33, p. 137¹⁾ (*Psilopa*); Cresson 1925, p. 248²⁾
 Tainan 2)
 Sonstige Verbreitung: N.-Amerika 1)
- Clasiopella uncinata* Hendel 1914, p. 110¹⁾; Cresson 1925, p. 248²⁾
 Synonym (sec. typ.): *Psilopa gilvipes* Becker 1924, p. 91³⁾
 Anping, V., X. 1) 2) 3) (DEI: 3 Typen von *uncinata*, 1 Typus von *gilvipes*)
- Leptopsilopa pollinosa* Kertész 1901, Term. Fuzet. 24, p. 81; Hendel 1913, p. 97¹⁾; Cresson 1925, p. 251²⁾
 Paroe, VIII 2) (DEI: 3); Pilan, VIII 3); Polisha, XII. (DEI: 3).
 Sonstige Verbreitung: Ceylon, Indien, N.-Guinea, Queensland, Samoa.

Subfamilie *Notiphilinae*

Cyphops fasciatus Jaennicke 1867, Abh. Senckenb. Nat. Ges. 6, p. 368,

Taf. 43, Fig. 14; Hendel 1913, p. 98¹⁾; Cresson 1929, p. 181²⁾
Kankau, IX.¹⁾ (DEI: 37); Koshun, VIII.²⁾

Sonstige Verbreitung: Siam, Java, Bismarck-Archipel

Paralimna albonotata Loew 1862, Öfvers. Vet. Akad. Förh., p. 13;
Becker 1924, p. 89¹⁾

Taihoku¹⁾; Taihoku-Distr., Okaseki, VI.¹⁾ (DEI: 2); Taihoku-Distr.,
Macuyama 500 F., V.—VI., XI.¹⁾ (DEI: 9); Kankau (Koshun), II.,
IV., IX.¹⁾ (DEI: 64); Tainan X. (DEI: 12); Toa Tsui Kutsu, V.
(DEI: 1). Nach Cresson wahrscheinlich zu *hirticornis*.

Sonstige Verbreitung: Südafrika

Paralimna cinerella Hendel 1914, p. 107¹⁾; Cresson 1929, p. 189²⁾

Synonym: „*Paralimna arabica* Becker 1922“, Becker 1924, p. 90³⁾

Tainan, IV., V., X.¹⁾ 2) (DEI: 8 Typen + 94); Anping, IX.²⁾; Pilam,
VIII.²⁾; Taihorin VII.²⁾; Kankau (Koshun),³⁾ (DEI: 2); Kanshizei,
IV. (DEI: 52)

Sonstige Verbreitung: Ceylon²⁾; Madras²⁾

Paralimna hirticornis de Meijere 1913, Bijdr. Dierk. 19, p. 65; Hendel
1914, p. 104¹⁾; Cresson 1929, p. 191²⁾

Kankau, IX.¹⁾ (DEI: 7); Kagi, VIII.²⁾; Tainan, II., X.²⁾ (DEI:
158); Takao, III., V.²⁾ (DEI: 7); Chipun, VII. (DEI: 1); Anping,
IX. (DEI: 5); Kanshizei, IV. (DEI: 20); Pilam, VII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Philippinen; Saok, nahe Waigiu

Paralimna javana van der Wulp 1892, Tijd. Ent. 34, p. 215

Synonym: *biseta* Hendel 1914, p. 105²⁾

Die Typen von *biseta* stimmen mit den von Cresson als *javana* be-
zeichneten Tieren überein

Tainan, II. V., XI. (DEI: 31, det. Cresson + 250 + 5 Typen
von „*biseta*“); Kanshizei, IV. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java

Paralimna major de Meijere 1911, Tijd. Ent. 54, p. 393

Tainan, I., II. (DEI: 63, det. Cresson)

Sonstige Verbreitung: Java

Paralimna minor Hendel 1914, p. 108¹⁾; Cresson 1929, p. 190

Nach Cresson wohl nur kleinere Variante von *cinerella*

Tainan, V.¹⁾ (DEI: 8 Typen + 3); Kankau, IX. (DEI: 1)

Paralimna sinensis Schiner 1862, Reise Freg. Novara, Zool. 2, Dipt.,
p. 241; Hendel 1914, p. 106¹⁾; Cresson 1929, p. 189²⁾

Kankau VII., IX.¹⁾ (DEI: 46); Polisha, XII. (DEI: 1); Kosempo,
V. (DEI: 4); Pilam, VII. (DEI: 5); Kanshizei, V. (DEI: 3); Koshun,
X. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Hongkong, Celebes, S.-Indien²⁾

Phaiosterna aequalis Cresson 1929, p. 193¹⁾

Tainan, X.¹⁾ (DEI: 61); Polisha, XII. (DEI: 5); Anping, IX. (DEI: 2); Kankau, IX. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen¹⁾; Annam¹⁾

Phaiosterna spec.

Anping, IX. (DEI: 1)

Notiphilacantha dorsopunctata Wiedemann 1830, Auss. Zweifl. Ins. 2, p. 591; Hendel 1914, p. 103¹⁾

Tainan, II., V.¹⁾ (DEI: 44); Takao, V. (DEI: 5); Chip Chip, II. (DEI: 1); Kanshizei, IV. (DEI: 11); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1).

Von diesen Fundorten im DEI weitere 665.

Sonstige Verbreitung: Java, Sumatra.

Notiphila maculifrons Hendel 1914, p. 102¹⁾

Tainan, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Notiphila similis de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 162¹⁾; Hendel 1914, p. 101²⁾

Synonym: „*Notiphila setigera* Becker 1923“, Becker 1924, p. 89³⁾

Tainan, II., V.²⁾ (DEI: 120); Daitotei, V.—VI.³⁾ (DEI: 2); Kanshizei, IV. (DEI: 10); Anping, V. (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Notiphila latigenis Hendel 1914, p. 102¹⁾

Anping, V.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Kanshizei, II. (DEI: 1); Tainan, II. (DEI: 8)

Notiphila phaea Hendel 1914, p. 101¹⁾

Tainan, II., V.¹⁾ (DEI: 3 Typen + 273); Kanshizei, IV. (DEI: 10)

Typopsilopa chinensis Wiedemann 1830, Auss. Zweifl. Ins. 2, p. 592; Cresson 1929, p. 194¹⁾

Synonym: *Psilopa sorella* Becker 1924, p. 91²⁾

Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII.²⁾ (DEI: 2 Typen von *sorella*); Taihoku, XI. (DEI: 3 „Typen“ von *sorella*); Hokuto, XII. (DEI: 2 „Typen“ von *sorella* + 1); Tainan V. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: China

Hydrellia incerta Becker 1924, p. 91¹⁾ (*Psilopa*)

Anping, V.¹⁾; Paroe, X. (DEI: 1 „Typus“)

Hydrellia luteipes Cresson 1932, p. 13¹⁾

Anping, V.¹⁾

Hydrellia modesta Loew 1860, Neue Beiträge 7, p. 23; Becker 1924, p. 93¹⁾

Daitotei, V.—VI.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa, Aegypten

Hydrellia spec.

Tainan, II. (DEI: 1, det. Cresson)

Subfamilie *Napaeinae**Napaea formosana* Cresson 1937, p. 206 ¹⁾Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)*Napaea inornata* Becker 1924, p. 92 ¹⁾Daitotei, V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)*Hyadina sauteri* Cresson 1934, p. 206 ¹⁾Tainan, II., V. ¹⁾ (DEI: 4 Typen + 7); Paroe, VIII. (DEI: 1)Sonstige Verbreitung: Philippinen ¹⁾*Brachydeutera longipes* Hendel 1913, p. 99 ¹⁾Synonym: „*Brachydeutera argentata* Walk.“ Becker 1924, p. 92 ²⁾Die von Becker als *argentata* bezeichneten Tiere gehören zur gleichen Art wie *longipes* Hendel.Kankau, IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 5 Typen + 22); Taihoku ²⁾; DaitoteiV.—VI. ²⁾ (DEI: 10); Anping, IX. (DEI: 6 „Typen“ + 25);

Paroe, VIII. (DEI: 1 „Typus“); Kanschizei, IV. (DEI: 28); Tainan,

II. (DEI: 41)

Subfamilie *Ephydrinae**Scatella bullacosta* Cresson 1934, p. 219 ¹⁾Tainan, II., X. ¹⁾ (DEI: 168); Anping, IX. ¹⁾ (DEI: 43); Kankau,

IX. (DEI: 1); Taihoku, XI. (DEI: 2)

Scatella stagnalis Fallén 1914, K. Vet. Ak. Handl. 1813 (2), p. 248

Tainan, XI. (DEI: 2, det. Cresson)

Sonstige Verbreitung: Europa

Ephydra laeta Hendel 1913, p. 99 ¹⁾„Formosa“ ¹⁾; Tainan, II. (DEI: 8 Typen + 54); Kanschizei, IV.

(DEI: 1); Kankau (Koshun), IX. (DEI: 1); Paroe, VIII. (DEI: 1)

Psilephydra cyanoprosopa Hendel 1914, p. 100, Fig. 2, 3 ¹⁾Hoozan, I. ¹⁾ (DEI: 4 Typen)*Ochthera circularis* Cresson 1926, p. 254 ¹⁾; Cresson 1932, p. 32 ²⁾Takao, VII. ¹⁾; Tainan, II. (DEI: 10); Kankau, V., VI. (DEI: 11);

Paroe, VIII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Philippinen ²⁾; Java ²⁾; Ceylon ²⁾; Amboina ²⁾*Ochthera pilimana* Becker 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 181; Cres-son 1932, p. 28 ²⁾Synonym: *canescens* Cresson 1931, p. 168 ³⁾Polisha, III. ³⁾; Anping, IV., V. ³⁾ (DEI: 2); Tainan, II., X. (DEI:

32); Kanschizei, IV. (DEI: 1); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Port Said, Sokotra, Mehadia (Ungarn) ²⁾*Ochthera sauteri* Cresson 1932, p. 32 ¹⁾Kankau (Koshun), VII., IV., IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus, + 4); Pilam,

VII. (DEI: 2 „Typen“); Kosempo, V. (DEI: 14); „Formosa“ (DEI: 3)

Ditrichophora spec.

Tainan, V. (DEI: 1, det. Cresson)

Rhynchopsilopa magnicornis Hendel 1913, p. 96, Fig. 3, 4¹⁾; Cresson 1925, p. 251²⁾

Kankau, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Paroe, VIII.¹⁾ (DEI: 1 Typus + 4); Polisha, XII. (DEI: 2); Taihoku-Distr., Okaseki, VI. (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 6); Macuyama, IV. (DEI: 2)

Ceropsilopa decussata Cresson 1925, p. 251¹⁾

Tainan, II., IV.¹⁾ (DEI: 3); Anping, V. (DEI: 2)

Discocerina albitarsis Wulp 1884, Sumatra Exped. 56; Becker 1924, p. 93¹⁾

Taihoku-Distr., Okaseki, VI.¹⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 1)

Discocerina infantina Becker 1924, p. 93¹⁾

Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Discocerina pernigra Becker 1924, p. 93¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Polytrichophora canora Cresson 1929, p. 165¹⁾

Tainan, II., V., X.¹⁾ (DEI: 33); Taihoku, XI. (DEI: 2); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 3)

Hecamedoides caprina Cresson 1929, p. 168¹⁾

Takao, VII., XI.¹⁾; Tainan, II., V., X.¹⁾ (DEI: 23)

Hecamedoides invida Cresson 1929, Trans. Amer. Ent. Soc. 55, p. 169¹⁾

Tainan, V. (DEI: 12, det. Cresson)

Sonstige Verbreitung: Neu-Guinea (Astrolabe-Bai)¹⁾

Atissa pygmaea Haliday 1833, Ent. Mag. 1, p. 174; Cresson 1929, p. 176¹⁾

Tainan, X.¹⁾

Sonstige Verbreitung: Fiume, Jugoslawien, Spanien, Cairo

Trypetomima formosina Becker 1924, p. 90¹⁾ (*Actocetor*); Cresson 1929 p. 172

Anping, X.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Allotrichoma livens Cresson 1929, p. 174¹⁾

Pilam, VIII. (DEI: 1, det. Cresson); Taihoku, XI. (DEI: 2, det. Cresson); Tainan, II. (DEI: 21). Nach Cresson ist es fraglich, ob diese Exemplare hierher oder zu einer neuen, nahestehenden Art gehören

Sonstige Verbreitung: Bombay¹⁾

Familie *Chloropidae*Subfamilie *Chloropinae*

Cordylosoma tuberiferum Becker 1912, p. 254¹⁾ (*Assuania*); Becker 1924, p. 119²⁾

Maruyama IV.²⁾ (DEI: 1)

Loxotaenia gracilis de Meijere 1908, Tijd. Ent. 51, p. 170¹⁾; Becker 1911, p. 84, Taf. 1, Fig. 18.²⁾; Becker 1924, p. 118³⁾; Duda 1930, p. 297⁴⁾

Hokuto, XII.³⁾ (DEI: 3); Taihoku, XI.³⁾⁴⁾ (DEI: 5); Chip Chip, I.²⁾; Tainan, II. (DEI: 5); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Macuyama, IV., XII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java

Eurina orientalis Becker 1911, p. 44¹⁾

Chip Chip, I.¹⁾; Hoozan, I. (DEI: 1, det. Hendel); Kosempo, V. (DEI: 1, det. Hendel)

Pseudeurina maculata de Meijere 1904, Bijdragen tot de Dierkunde 18, p. 112²⁾, Hendel 1913, p. 35²⁾

Tainan, II.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾

Formosina gigas Becker 1911, p. 79, Taf. 1, Fig. 1¹⁾; Becker 1924, p. 118²⁾

Takao¹⁾; Fuhosho¹⁾; Chosokei²⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 19, det. Duda); Kankau, IV. (DEI: 1, det. Duda); „Formosa“ (DEI: 1, det. Duda)

Formosina lucens de Meijere 1908, Tijd. Ent. 51, p. 169¹⁾; Duda 1930, p. 297²⁾

Synonym (nach Duda): *adolēscens* Becker 1916, p. 441³⁾

Chikutoki, V.²⁾ (DEI: 1); Taihorin, VII.³⁾; Sokotsu, V.³⁾; „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java¹⁾, Sumatra, Philippinen, NO.-Szechuan, Rodriguez

Formosina ochracea Becker 1911, p. 81¹⁾

Fuhosho, III.¹⁾

Formosina tumida Becker 1916, p. 441¹⁾

Taihorin, VII.¹⁾

Assuania nigroscutellata Becker 1911, p. 81¹⁾

Tainan, II.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Ectecephala frontata Becker 1911, p. 68, Taf. 1, Fig. 17¹⁾ (*Chlorops*); Duda 1930, p. 297²⁾

Yentempo¹⁾; Taihoku, XI.²⁾ (DEI: 1)

- Thaumatomyia notata* Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 144; Becker 1911, p. 73 ¹⁾
Chip Chip, II. 1)
Sonstige Verbreitung: Europa, Asien.
- Anthracophaga albovariegata* Thomson 1868, Eugen. Resa, p. 606 ¹⁾;
Becker 1911, p. 77 ²⁾
Chip Chip ²⁾
Sonstige Verbreitung: Malacca
- Anthracophaga sauteri* Becker 1911, p. 52 ¹⁾ (*Metopostigma*); Duda 1930, p. 296 ²⁾
Synonym: *Chlorops finitima* Becker 1924, p. 118 ³⁾
Taihoku, XI. ³⁾ (DEI: 3); Anping, V., X. ³⁾ (DEI: 3); Tainan, I., II. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 2 Typen + 20)
- Phyladelphus infuscatus* Becker 1916, p. 442 ¹⁾
Tainan, IV. ¹⁾
- Eutropha oldenbergi* Duda 1934, p. 58 ¹⁾
Anping, V. ¹⁾ (DEI: 3 Typen)
- Steleocerus ensifer* Thomson 1869, Eugenies Resa, p. 605; Becker 1911, p. 45 ¹⁾; Becker 1924, p. 119 ²⁾; Duda 1930, p. 296 ³⁾
Takao ¹⁾; Tainan ³⁾ (DEI: 1); Taihoku, XI. ²⁾ (DEI: 10); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., V.—VI., XII. (DEI: 6)
Sonstige Verbreitung: China
- Steleocerus formosus* Becker 1911, p. 46 ¹⁾
Chip Chip, II. ¹⁾
- Steleocerus obscurellus* Becker 1911, Ann. Mus. Nat. Hung. 9, p. 45 ¹⁾;
Duda 1930, p. 296 ²⁾
Puroe, VIII. ²⁾ (DEI: 4)
Sonstige Verbreitung:
- Steleocerus pallidior* Becker 1924, p. 119 ¹⁾
Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Steleocerus tenellus* Becker 1910, Ann. Mus. Nat. Hung. 8, p. 401 ¹⁾;
Becker 1911, p. 47 ²⁾
Tainan, II. ²⁾
Sonstige Verbreitung: O.-Afrika ¹⁾
- Chlorops albipilosa* Becker 1908, Mitt. zool. Museum Berlin 4, p. 147 ¹⁾
Becker 1911, p. 64 ²⁾
Takao ²⁾
Sonstige Verbreitung: Kanarische Inseln ¹⁾
- Chlorops canalicutata* Becker 1911, p. 71 ¹⁾
Tainan, II., X. ¹⁾
- Chlorops contribulus* Loew 1860, Oefvers. Vet. Akad. Förh., p. 269;
Becker 1924, p. 118 ¹⁾

- Hokuto XII. 1) (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: S.-Afrika
- Chlorops farinosa* Becker 1911, p. 65 1)
 Takao 1)
- Chlorops flavofrontata* Becker 1911, p. 64 1)
 Takao 1)
- Chlorops grisescens* Becker 1916, p. 439 1)
 Tainan 1); Anping 1)
- Chlorops lenis* Becker 1924, p. 117 1)
 Taihoku 1) (DEI: 2 Typen)
- Chlorops longicollis* Becker 1924, p. 118 1)
 Maruyama, IV. 1) (DEI: 1 Typus)
- Chlorops rubricollis* Becker 1911, p. 68 1)
 Kosempo, III. 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Duda)
- Chlorops stigmatella* Becker 1911, p. 59, Taf. 1, Fig. 3, 4 1)
 Kagi, VIII. 1); Tainan, II. (DEI: 1 „var. 2, Typus“)
 var. *nigricornis* Duda 1930, p. 297 1)
 Hokuto, XII. 1) (DEI: 1 Typus)
- Pachylophus rufescens* de Meijere 1904, Bijdr. Dierk. 18, p. 113 1);
 Becker 1911, p. 41 2)
 Tainan, X. 2)
 Sonstige Verbreitung: Java 1), Ceylon
- Euryparia rara* Becker 1911, p. 85, Taf. 1, Fig. 8 1)
 Tainan, II. 1)
- Chloropsina flavovaria* Becker 1916, p. 440 1)
 Kankau, IV. 1)

Subfamilie *Oscinellinae*

- Hippelates citreifrons* Becker 1911, p. 108 1); Duda 1930, p. 279 2)
 Tainan 1); Anping, V., X. 2) (DEI: 2)
- Hippelates minor* de Meijere 1908, Tijd. Ent. 51, p. 168 1); Becker
 1911, p. 105 2); Becker 1924, p. 121 3); Duda 1930, p. 279 4)
 Chip Chip, II. 2) 4) (DEI: 1); Paroe, VIII. 3) 4) (DEI: 3, von Becker
 als *planiscutellatus* bezeichnet); Kankau, IX. 4) (DEI: 1); Tainan,
 II., IX. 4) (DEI: 2); Pilam, VII. (DEI: 10); Chipun, VII. (DEI: 6);
 Anping, VI. (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Java 1)
- Hippelates nigricornis* Thomson 1869, Eugenes Resa, p. 607; Becker
 1911, p. 103 1)
 Formosa 1); Anping, V. (DEI: 2, det. Hendel)
 Sonstige Verbreitung: „Insulae Rossii“

var. *bilineata* de Meijere 1904, Bijdr. Dierk, p. 113¹⁾; Becker 1924, p. 121²⁾; Duda 1930, p. 279³⁾

Hokuto, XII. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII. (DEI: 2); Daitotei, V.—VI. (DEI: 8); Anping, X. (DEI: 26); Taihoku, XI.²⁾ (DEI: 31); Alikang (DEI: 1); Paroe, VIII. (DEI: 2); Tainan, V. (DEI: 1); Takao, III. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Australien, Fiji-Inseln

var. *flavus* Thomson 1869, Eugenes Resa, p. 607¹⁾; Duda 1930, p. 279²⁾

Paroe, VIII.²⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Keeling-Ins.

Hippelates setarius Becker 1911, p. 107¹⁾

Koshun, VIII.¹⁾

Anatrichus erinaceus Loew 1860, Oefvers. Vet.-Ak. Förh., p. 271; Becker 1911, p. 116¹⁾; Becker 1924, p. 124²⁾; Duda 1930, p. 280³⁾

Taihoku²⁾³⁾ (DEI: 6); Tainan, II., III., V.³⁾ (DEI: 23); Takao, VI.¹⁾ (DEI: 4); Chip Chip, II. (DEI: 1); Anping, VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: ganz Afrika, oriental. Region, Aegypten

Disciphus flavitarsis Duda 1930, p. 284¹⁾

Chip Chip, II.¹⁾; Maruyama¹⁾

Disciphus peregrinus Becker 1911, p. 98, Taf. 1, Fig. 12, 13¹⁾; Becker 1924, p. 123²⁾

Chip Chip, II.¹⁾; Taihoku-Distr., Maruyama, IV., XII.²⁾ (DEI: 3)

Aprometopsis orientalis Becker 1924, p. 124¹⁾

Maruyama, IV.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sepsidoscinis maculipennis Hendel 1914, p. 248, Fig. 1¹⁾

Takao, IV., 300 m¹⁾; Maruyama, IV., V.—VI. (DEI: 6, det. Duda);

Taihoku-Distr., Gai-So-Kei, V. (DEI: 1, det. Duda)

„*Dactylothyrea femorata* Hendel“ (in litt.?)

Anping, V. (DEI: 1); Kosempo, X. (DEI: 1)

Dactylothyrea spinipes Becker 1916, p. 443¹⁾; Becker 1924, p. 124²⁾

Taihoku¹⁾²⁾ (DEI: 2); Sokotsu, IV.¹⁾; Maruyama, IV. (DEI: 2);

Anping, V. (DEI: 1)

Siphunculina costalis Duda 1930, p. 282¹⁾

Taihoku, XI.¹⁾ (DEI: 3 Typen)

Siphunculina signata Wollaston 1858, Ann. Nat. Hist., p. 117; Becker 1911, p. 141¹⁾; Duda 1930, p. 282²⁾

Takao¹⁾; Alikang X.²⁾ (DEI: 2); Paroe, VIII.²⁾ (DEI: 1); Anping, V. (DEI: 6); Tainan, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Madeira, Arabien, Cuba, Fiji-Inseln

Dicraeus flavipes Duda 1930, p. 295 ¹⁾

Tainan, IV. ¹⁾

Dicraeus orientalis Becker 1911, p. 143 ¹⁾; Duda 1930, p. 295 ²⁾

Chip Chip, I. ^{1) 2)} (DEI: 2 Typen); Tainan, X. ²⁾ (DEI: 6); Kosempo V. ²⁾ (DEI: 1)

Conioscinella cavernae de Meijere 1913, Tijds. Ent. 56, p. 306 ¹⁾; Becker 1924, p. 122 ²⁾; Duda 1930, p. 288 ³⁾

Hokuto, XII. ^{2) 3)} (DEI: 3); Taihoku ²⁾

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾

Conioscinella formosa Becker 1911, p. 154 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 288 ²⁾

Synonym (nach Duda): *Oscinella pumila* Becker 1924, p. 121 ³⁾ Takao ¹⁾; Hokuto, XII. ^{2) 3)} (DEI: 4 Typen von *pumila* + 2); Chipun, VII. (DEI: 1)

Conioscinella griseostriata Duda 1930, p. 289 ¹⁾

Paroe, VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Conioscinella inaequalis Becker 1911, p. 164 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 290 ²⁾

Tainan, II. ¹⁾; Hokuto, XII. ²⁾ (DEI: 1, det. Duda); Taihoku, XI. ²⁾ (DEI: 1, det. Duda); Paroe, VIII. (DEI: 1, det. Duda)

Conioscinella minima de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 176 ¹⁾;

Becker 1911, p. 141 ²⁾ (*Microneurum*); Duda 1930, p. 290 ³⁾

Maruyama, V.—VI. ²⁾; Takao ³⁾

Sonstige Verbreitung: Java

Conioscinella minima Becker 1911, p. 66 ¹⁾ (*Chlorops*)

Takao, 300 m ¹⁾; Maruyama VI. (DEI: 1, det. Duda)

Conioscinella nigrohalterata Duda 1930, p. 291 ¹⁾

Synonym (nach Duda): *Oscinella nigrifrons* Becker 1924, p. 123 ²⁾, nec Becker 1911

Chosokei ^{1) 2)} (DEI: 1); Maruyama, IV. ^{1) 2)} (DEI: 1); Paroe, VIII. ¹⁾ (DEI: 15 Typen); Tainan, II., X. (DEI: 2)

Conioscinella opacifrons Duda 1930, p. 291 ¹⁾

Paroe, VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Conioscinella pallidinervis Becker 1911, p. 160 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 292 ²⁾

Tainan, II. ^{1) 2)} (DEI: 1)

Conioscinella poecilogaster Becker 1911, p. 161 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 292 ²⁾

Synonym (nach Duda): *Oscinella perspicenda* Becker 1924, p. 123 ³⁾

Tainan, II., IV. ^{1) 2)}; Taihoku ³⁾ (DEI: 1 Typus von *perspicenda*)

Conioscinella pumilio Becker 1916, p. 442 ¹⁾ (*Oscinella*)

Tainan, V. ¹⁾

- Conioscinella sauteri* Duda 1930, p. 292 ¹⁾
Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Conioscinella semimaculata* Becker 1911, p. 164 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 293 ²⁾
Tainan ¹⁾; Paroe, VIII. ²⁾ (DEI: 6); Chipun VII. (DEI: 1, det. Hendel)
- Conioscinella similans* Becker 1911, p. 160 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 293 ²⁾
Synonym (nach Duda): *Oscinella dispar* Becker 1924, p. 121 ³⁾
Tainan, II., X. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 2); Taihoku ³⁾ (DEI: 1 Typus von *dispar*)
Hokuto, XII. ³⁾ (DEI: 1 Typus von *dispar*)
- Conioscinella similifrons* Becker 1911, p. 152 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 294 ²⁾
Synonym (nach Duda): „*Oscinella frit* var. *pusilla*“ Becker 1911, p. 162 ³⁾
Tainan, X. ¹⁾ ³⁾; Taihoku, XI., XII. ²⁾ (DEI: 1)
- Conioscinella subnitens* Becker 1924, p. 122 ¹⁾ (*Oscinella*); Duda 1930, p. 294 ²⁾
Paroe VIII. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Daitotei, V. (DEI: 1 „Typus“)
- Conioscinella tenuiseta* Becker 1911, p. 126 ¹⁾ (*Gaurax*); Duda 1930, p. 288 ²⁾
Takao 300 m ¹⁾; Kankan (Koshun), IX. ²⁾ (DEI: 1)
- Oscinella glabrina* Becker 1924, p. 122 ¹⁾
Dudas Angabe, daß diese Art Synonym sei zu *Dicraeus orientalis* Becker, trifft sicher nicht zu
Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Oscinella griseicollis* Becker 1911, p. 158 ¹⁾
Takao ¹⁾
- Oscinella incerta* Becker 1912, Ann. Mus. Nat. Hung. 10, p. 116 ¹⁾; Becker 1924, p. 123 ²⁾
Hokuto, XII. ²⁾ (DEI: 2)
Sonstige Verbreitung: Nord-Amerika ¹⁾
- Oscinella intrita* Becker 1911, p. 160 ¹⁾
Chip Chip, II. ¹⁾
- Oscinella luteipes* Becker 1912, Ann. Mus. Nat. Hung. 10, p. 210 ¹⁾; Becker 1924, p. 122 ²⁾
Paroe VIII. ²⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Peru ¹⁾
- Oscinella siphonelloides* Becker 1911, p. 149 ¹⁾
Takao ¹⁾
- Oscinella ventralis* Becker 1916, p. 442 ¹⁾
Tainan, IV. ¹⁾

Gaurax aequalis Becker 1911, p. 128 ¹⁾

Polisha, XII. ¹⁾; Kosempo, VI. ¹⁾

Gaurax atrifrons Becker 1911, p. 126 ¹⁾

Kosempo, VI. ¹⁾

Gaurax nervosus Becker 1911, p. 127 ¹⁾

Chip Chip, I. ¹⁾

Gaurax oculatus Becker 1911, p. 127 ¹⁾

Chip Chip, II. ¹⁾; „Formosa“ (DEI: 1, det. Duda)

Gaurax piceus Becker 1911, p. 126 ¹⁾

Chip Chip, II. ¹⁾

Merosciniis dimidiata Becker 1911, p. 91 ¹⁾; Becker 1924, p. 124 ²⁾; Duda 1930, p. 285 ³⁾

Yentempo ¹⁾; Hokuto, XII. ²⁾ (DEI: 4); Tainan, II., III., IV. ³⁾ (DEI: 3); Paroe, VIII. ³⁾ (DEI: 8); Anping, V. (DEI: 1); Maruyama, IV. (DEI: 1)

Merosciniis elegantula Becker 1911, p. 89 ¹⁾; Becker 1924, p. 123 ²⁾; Duda 1930, p. 285 ³⁾

Kosempo ¹⁾; Chip Chip ¹⁾; Koshun, III. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Hokuto, IV. ²⁾; Kankau, IV., IX. ²⁾ ³⁾ (DEI: 26); Tainan, X. ³⁾ (DEI: 7)

Merosciniis finitima Becker 1911, p. 92 ¹⁾; Duda 1930, p. 285 ²⁾

Kosempo, XI. ¹⁾; Tainan, II., IV., V. ¹⁾ ²⁾; Paroe, VIII. ²⁾; Chipun, VII. ²⁾ (DEI: 2); Pilam, VII. (DEI: 5, det. Duda)

Merosciniis nitidifrons Becker 1911, p. 93 ¹⁾

Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Pilam, VII. (DEI: 1, det. Hendel); Anping, VI. (DEI: 2, det. Hendel)

Merosciniis recta Becker 1911, p. 91 ¹⁾; Duda 1930, p. 286 ²⁾

Chip Chip, I. ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Tainan, X. ²⁾ (DEI: 23)

Merosciniis sauteri Duda 1930, p. 286 ¹⁾

Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku, XI. ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Daitotei ¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 1 „Typus“); Kankau (Koshun) (DEI: 1)

Merosciniis scutellata de Meijere 1908, Tijds. Ent. 51, p. 172 ¹⁾; Becker 1911, p. 90 ²⁾; Becker 1924, p. 123 ³⁾; Duda 1930, p. 287 ⁴⁾

Maruyama, IV., V—VI., XII. ³⁾ (DEI: 11); Taihoku, XI. ³⁾ ⁴⁾ (DEI: 1); Chosokei ³⁾ (DEI: 1); Chip Chip, III. ⁴⁾ (DEI: 1); Daitotei, V.—VI. ⁴⁾ (DEI: 2); Kankau, IX. ⁴⁾ (DEI: 1); Paroe, VIII. ⁴⁾ (DEI: 3); Tainan, V. ⁴⁾ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. ⁴⁾ (DEI: 5); Chipun, VII., (DEI: 1); Pilam, VII. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 11); „Formosa“ (DEI: 1).

Sonstige Verbreitung: Java ¹⁾; Sumatra.

Elachiptera brevipennis Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 159

Chosokei (DEI: 1, det. Becker)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa.

Elachiptera divisa Becker 1911, p. 138 ¹⁾ (*Gampsocera*); Duda 1930, p. 279 ²⁾

Synonym (nach Duda): *Melanochaeta albo-pilosa* Becker 1924, p. 120 ³⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾ (DEI: 1 als „Typus“ von *albopilosa* + 2);

Maruyama ³⁾; „Formosa“ (DEI: 1).

Elachiptera insignis Thomson 1869, Eugenes Resa, p. 605 ¹⁾; Becker 1924, p. 120 ²⁾

Taihoku ²⁾; Maruyama ²⁾

Sonstige Verbreitung: China.

Elachiptera maculipennis Becker 1911, p. 132, Taf. 2, Fig. 3 ¹⁾ (*Gampsocera*); Becker 1924, p. 121 ²⁾; Duda 1930, p. 279 ³⁾

Takao ¹⁾; Paroe, VIII. ²⁾ (DEI: 3); Maruyama ³⁾

Elachiptera mutata Becker 1911, p. 134, Taf. 2, Fig. 12 ¹⁾ (*Gampsocera*); Duda 1930, p. 279 ²⁾

Maruyama ¹⁾; Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1); Tainan, V. (DEI: 1); Takao ²⁾; Koshun ²⁾.

Elachiptera nigroscutellata Becker 1911, p. 99 ¹⁾; Duda 1930, p. 280 ²⁾

Synonym (nach Duda 1930):

Elachiptera punctulata Becker 1911, p. 99 ³⁾

Taihoku, XI. ¹⁾ (DEI: 22); Chip Chip II. ²⁾; Daitotei, V.—VI. ²⁾ (DEI: 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F. XII. (DEI: 2).

Elachiptera umbrosa Becker 1924, p. 120 ¹⁾

Taihoku ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII., (DEI: 1 Typus)

Gampsocera binotata Becker 1911, p. 135, Taf. 2, Fig. 5 ¹⁾

Chip Chip II. ¹⁾

Gampsocera curvinervis Becker 1911, p. 135, Taf. 2, Fig. 7 ¹⁾

Chip Chip, I. ¹⁾

Gampsocera lanceolata Becker 1911, p. 136, Taf. 2, Fig. 8, 13 ¹⁾

Chip Chip, I. ¹⁾

Gampsocera latipennis Becker 1911, p. 136, Taf. 2, Fig. 10 ¹⁾

Chip Chip, I. ¹⁾; Paroe, VIII. (DEI: 1, det. Hendel)

Lioscinella aequisepta Duda 1930, p. 296 ¹⁾

Tainan, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Lioscinella fallax Duda (in litt.?)

nom. nov. pro *Oscinella particeps* Becker 1924, p. 123 ¹⁾, nec Becker 1912

Taihoku ¹⁾ (DEI: 1)

Tricimba fascipes Becker 1911, p. 142 ¹⁾ (*Notonaulax*); Duda 1930, p. 287 ²⁾

- Chip Chip, I. 1); Tainan, XI. 2) (DEI: 2)
- Tricimba marina* Becker 1911, p. 143 ¹⁾ (*Notonaulax*); Duda 1930, p. 288 ²⁾ (*murina*)
Tainan, II. 1) ²⁾ (DEI: 1)
- Goniopsita formosana* Duda 1930, p. 283 ¹⁾, nom. nov. pro *obliquus* Becker
Synonym (nach Duda): *Scoliophthalmus obliquus* Becker 1911, p. 114 ²⁾,
nec Becker 1903
Takao, 300 m ²⁾: Tainan, V. 1) (DEI: 1 Typus)
- Goniopsita pallidinervis* Becker 1916, p. 444 ¹⁾ (*Scoliophthalmus*); Duda 1930, p. 284 ²⁾
Taihorin, VII. 1)
var. *angustifrons* Duda 1930, p. 284 ¹⁾
Synonym: *Scoliophthalmus* sp.? Becker 1924, p. 124 ²⁾
Maruyama, IV. 1) ²⁾ (DEI: 2 Typen)
- Goniopsita sorella* Becker 1911, p. 161 ¹⁾ (*Lacometopa*); Duda 1930, p. 283 ²⁾
Synonym (nach Duda): *Oscinella lacteipennis* Becker 1916, p. 443 ³⁾
Tainan, II. 1) ²⁾; Anping, IV. 3)
- Siphonella ruficornis* Macquart 1835, Suites à Buffon, 2, p. 585; Becker 1910, Arch. Zool. 1, p. 138; Becker 1924, p. 121 ¹⁾
Hokuto, XII. 1) (DEI: 2); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., XII, V.—VI. (DEI: 2)
- Scoliophthalmus albipennis* Becker 1911, p. 114 ¹⁾
Tainan, II. 1)
- Scoliophthalmus parallelus* Hendel (in litt.?)
Tainan, V. (DEI: 1)

Familie Agromyzidae

- Cerodonta denticornis* Panzer 1806, Fauna Germ. CIV, tab. 22; Hendel 1932, in Lindner, Flieg. pal. Reg. 59, p. 269 ¹⁾
Synonym (nach Hendel): *acuticornis* Meigen 1826, Syst. Besch. 6, p. 175; Malloch 1914, p. 312 ²⁾
Takao, III. 2); Tainan, II. 2)
Sonstige Verbreitung ¹⁾: Holarktis, Porto Rico
- Phytomyza affinis* Fallén 1823, Dipt. Suec. Phytomyz. p. 3; Malloch 1914, p. 335 ¹⁾; Hendel 1934, in Lindner, Flieg. pal. Reg. 59, p. 334 ²⁾
Taihoku, IV. 1)
Sonstige Verbreitung ¹⁾: Paläarktis, N. S. Wales
- Phytomyza atricornis* Meigen 1838, Syst. Besch. 7, p. 404; Fig. 34
Synonym (nach Hendel): *subaffinis* Malloch 1914, p. 335 ¹⁾
Chip Chip II 1); Taihoku, IV. 1) (DEI: 1 ♂); Tainan, II. 1) (DEI:

1 ♂, 5 ♀); Kosempo, VI. (DEI: 1 ♂); Daitotei, V.—VI. (DEI: 8 ♂, 10 ♀).

Sonstige Verbreitung: Paläarktis.

Pseudonapomyza spicata Malloch 1914, p. 334¹⁾ (*Phytomyza*)

Hendel (1932, in Lindner, Flieg. pal. Reg. 59, p. 302—303) setzt *spicata* Malloch als fragliches Synonym zu *P. atra* Meigen, der einzigen weiteren bekannten Art des Genus. Nach dem mir vorliegenden Exemplare trifft diese Synonymie nicht zu.

Tainan, V.¹⁾; Takao, IV.¹⁾; Chipun, VII. (DEI: 1 ♀); Taihoku (DEI: 3 ♀).

Phytagromyza atrata Malloch 1914, p. 333¹⁾ (*Napomyza*); Fig. 19

Takao, X.¹⁾; Tainan, V.¹⁾ (DEI: 1 ♀); Paroe, nördl. Paiwan-Distr., VIII. (DEI: 2 ♀).

Phytoliriomyza formosensis Malloch 1914, p. 315¹⁾ (*Agromyza*)

Taihoku¹⁾; Daitotei, V., VII. (DEI: 2 ♂)

Liriomyza pusilla Malloch (nec Meigen!) 1914, p. 312, 314¹⁾ (*Agromyza*)

Die unten aufgeführten Tiere des DEI führen in Mallochs Tabelle auf „*Agromyza pusilla* Meig.“. Sie stimmen äußerlich mit dieser Art auch gut überein, so daß ich annehmen muß, daß es sich bei diesen Tieren wirklich um die von Malloch als *pusilla* bezeichnete Art handelt. Der ♂ Kopulationsapparat (vgl. Fig. 21—22) ist aber ganz verschieden von dem der genannten paläarktischen Art. Wahrscheinlich handelt es sich bei den formosanischen Tieren also um eine neue Art. Sollten zu dieser auch die von Bezzi (1928, Dipt. Fiji, p. 167) von den Fiji-Inseln unter dem Namen *pusilla* gemeldeten Tiere gehören?

Takao¹⁾; Tainan, II., III., V.¹⁾ (DEI: 1 ♂, 2 ♀); Taihoku¹⁾ (DEI: 1 ♀)

Liriomyza? subpusilla Malloch 1914, p. 314, Taf. 9, Fig. 5, 6¹⁾ (*Agromyza*)

Tainan¹⁾

Liriomyza spec.

Die Art führt in Mallochs Tabelle auf *subpusilla* Malloch. Jedoch ist unter anderem der Kopf ganz schwarz, am Thorax ist nur das Scutellum (außer einem Fleck an der Basis), 2 seitlich davorliegende Flecke des Mesonotum, und je 1 Seitenstrieme vom Humerus nach der Flügelwurzel gelb usw.

Paroe, VIII. (DEI: 1 ♀)

Dizygomyza aliena Malloch 1914, p. 328¹⁾ (*Agromyza*)

Sokotsu, V.¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 1 ♀); Paroe, II. (DEI: 1 ♀)

Dizygomyza? brunnifrons Malloch 1914, p. 317¹⁾ (*Agromyza*)

Im DEI 1 ♀ einer anscheinend nahestehenden Art aus Toa Tsui Kutsu, V., das in Mallochs Tabelle auf *brunnifrons* führt, sich aber durch Fehlen der gelben Lunula, völlig dunkle Fühler usw. von deren Beschreibung unterscheidet

Kosempo, XI. ¹⁾

Dizygomyza flavofemorata Malloch 1914, p. 315, Taf. 1, Fig. 7 und Taf. 10, Fig. 15 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 23

Polisha ¹⁾; Taihoku (DEI: 1 ♀); Paroe, VIII., X. (DEI: 2 ♂).

Dizygomyza? frontella Malloch 1914, p. 316, Taf. 9, Fig. 8 und Taf. 9, Fig. 4 ¹⁾ (*Agromyza*)

Pilam, VIII. ¹⁾

Dizygomyza nigricea Malloch 1914, p. 317 ¹⁾ (*Agromyza*)

Takao, V. ¹⁾; Tainan, II (DEI: 1 ♀)

Dizygomyza spec.

Paroe, X. (DEI: 1 ♀).

Melanagromyza atomella Malloch 1914, p. 331 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 24

Pilam, VII., VIII. ¹⁾ (DEI: 1 ♂); Tainan, X. ¹⁾ (DEI: 1 ♂); Takao ¹⁾; Anping ¹⁾; Maruyama, IV. (DEI: 1 ♂); Paroe, VIII. (DEI: 2 ♂); Chipun, VIII. (DEI: 1 ♂); Taihoku-Distr., V. (DEI: 1 ♀)

Melanagromyza koshunensis Malloch 1914, p. 321 ¹⁾ (*Agromyza*)

Koshun, X. ¹⁾; Paroe, VIII. (DEI: 1 ♂)

Melanagromyza lasiops Malloch 1914, p. 324, Taf. 10, Fig. 11 ¹⁾ (*Agromyza*)

Kosempo, VI. ¹⁾; Kankau, IX. (DEI: 1 ♀)

Melanagromyza nigrisquama Malloch 1914, p. 332 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 25

Tainan, IV., V. ¹⁾ (DEI: 8 ♂, 3 ♀); Takao ¹⁾; Chip Chip ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 ♂, 1 ♀); Hokuto, XII. (DEI: 1 ♀); Paroe, VIII. (DEI: 1 ♂)

Melanagromyza obtusa Malloch 1914, p. 323 ¹⁾ (*Agromyza*); Ahmad

1938, Ind. Journ. Agric. Sci. 8, p. 63—76, Taf. 5 (bunt) ²⁾; Fig. 26 Sokotsu, V. ¹⁾; Takao, III., IV., XI. ¹⁾; Yentempo, V. ¹⁾; Tainan ¹⁾ Sonstige Verbreitung: Indien ²⁾ (an *Cajanus cajan*, „the tur-pod Fly“)

Melanagromyza piliseta Malloch 1914, p. 326 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 27

Takao, X. ¹⁾; Tainan, IV., V. ¹⁾ (DEI: 1 ♂, det. Hendel); Paroe, X. (DEI: 2 ♂); Kankau, VII. (DEI: 1 ♂); Kosempo ¹⁾; ♀ der *piliseta*-Gruppe im DEI: 49

Melanagromyza producta Malloch 1914, p. 325 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 28

♀ nicht von *piliseta* zu trennen, siehe dort

Pilam, VII., VIII. ¹⁾ (DEI: 1 ♂); Tainan, II., X. ¹⁾; Paroe, VIII. (DEI: 1 ♂); Chipun, VII. (DEI: 1 ♂); Taihoku, XI. (DEI: 1 ♂)

Melanagromyza prolifica Malloch 1914, p. 326 ¹⁾; Fig. 29

♀ nicht sicher von *piliseta* zu trennen; siehe dort

Chip Chip, II. ¹⁾; Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 22 ♂); Takao ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 ♂); Taihoku-Distr., XI. (DEI: 3); Paroe, VIII., X. (DEI: 3 ♂)

Melanagromyza? sauteri Malloch 1914, p. 330 ¹⁾ (*Agromyza*)

Chip Chip ¹⁾

Melanagromyza setigera Malloch 1914, p. 328 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 30
Tainan, IV., V. ¹⁾ (DEI: 1 ♂, 2 ♀); Takao, 300 m, IV. ¹⁾; Koshun,
IX. ¹⁾; Kankau, VIII. ¹⁾ (DEI: 1 ♂)

Melanagromyza subfusca Malloch 1914, p. 330 ¹⁾ (*Agromyza*)

Pilam, VIII. ¹⁾

Melanagromyza variihalterata Malloch 1914, p. 329 ¹⁾ (*Agromyza*); Fig. 31
Koshun, III. ¹⁾; Paroe, VIII. (DEI: 1 ♂)

Melanagromyza spec. 1, DEI: 1 ♂, führt bei Malloch auf *piliseta*,
prolifica, Taihoku-Distr., Maruyama XII.

spec. 2, DEI: 1 ♂ (Fig. 32), führt bei Malloch auf *nigrisquama*,
Toa Tsui Kutsu, V.

spec. 3, DEI: 1 ♂ (Fig. 33), führt bei Malloch auf *pili-*
seta, prolifica, Tainan, II.

spec. 4, DEI: 1 ♂, führt bei Malloch auf *subfusca*,
Maruyama, IV.

spec. 5, DEI: 1 ♂, führt bei Malloch auf *atomella*,
nigrisquama, Tainan, V.

spec. 6, DEI: 1 ♂, führt bei Malloch auf *atomella, ni-*
grisquama, Toa Tsui Kutsu, V.

spec. 7, DEI: 5 ♂ (Fig. 35), führt bei Malloch auf
atomella, nigrisquama, Daitotei, V.—VI.; Chipun,
VII.; Taihoku; Paroe, VIII.

spec. 8, DEI: 1 ♀, führt bei Malloch auf *atomella, ni-*
grisquama, Tainan, X.

spec. 9, DEI: 1 ♀, führt bei Malloch auf *atomella, ni-*
grisquama, Toa Tsui Kutsu, XI.

spec. 10, DEI: 1 ♀, führt bei Malloch auf *atomella, ni-*
grisquama, Paroe, VIII

spec. 11, DEI: 1 ♀, führt bei Malloch auf *atomella, ni-*
grisquama, Paroe, X.

Die ♀ der spec. 8—11 gehören vielleicht teilweise zu den ♂-
spec. 5—7

Ophiomyia? anguliceps Malloch 1914, p. 327 ¹⁾ (*Agromyza*)

Tainan, II. ¹⁾

Agromyza atrata Malloch 1914, p. 313, Taf. 10, Fig. 12 ¹⁾ (Die Art
heißt nur in der Tabelle *atrata*, in der Beschreibung nennt sie
Malloch *nigrita*)

Pilam, VIII. ¹⁾; Takao, IV., V. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 ♂);
Kosempo, V. (DEI: 1 ♀); Chipun, VII. (DEI: 1 ♀); Kankau, IX.
(DEI: 1 ♀)

Agromyza flavisquama Malloch 1914, p. 318, Taf. 10, Fig. 14¹⁾
Chip Chip, III. 1)

Agromyza latipennis Malloch 1914, p. 321, Taf. 10, Fig. 13¹⁾
Takao, 300 m, III. 1)

Agromyza albidipennis **nomen novum** pro

Agromyza niveipennis Malloch 1914, p. 319¹⁾ nec Zetterstedt 1848
Takao, V. 1); Tainan, II. (DEI: 1 ♂)

Agromyza obesa Malloch 1914, p. 322¹⁾
Sokotsu, V. 1)

Agromyza plebeia Malloch 1914, p. 320¹⁾
Takao, V. 1); Kosempo, V. (DEI: 1 ♀, det. Hendel)

Agromyza spec. nahe *plebeia*
Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1 ♀)

Familie *Milichiidae*

Subfamilie *Milichiinae*

Milichia argyrata Hendel 1913, p. 107¹⁾
Kankau (Koshun)¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Milichia pubescens Becker 1907, Ann. Mus. Nat. Hung. 5, p. 519¹⁾;
Hendel 1913, p. 106²⁾;
Anping, V. 2) (DEI: 2); Paroe, VIII. 2) (DEI: 4); Pilam, VII.,
VIII. 2) (DEI: 2); Taihoku, XI. (DEI: 7); Daitotei, V.—VI. (DEI:
6); Tainan, V. (DEI: 2); Kanshizei, V. (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Kanar. Inseln, Aegypten

Milichiella bakeri Aldrich 1931, Proc. Hawaii. Ent. Soc. (1929/30) 7,
p. 398¹⁾; Hennig 1939, p. 85²⁾
„Formosa“ (DEI: 6)
Sonstige Verbreitung: Philippinen¹⁾

Milichiella lacteipennis Loew 1865, Berlin. Ent. Zeit. 9, p. 185; Hendel
1913, p. 107¹⁾; Malloch 1914, p. 312²⁾
Tainan, V. 1) 2) (DEI: 6); Anping, V. 1) (DEI: 24); Chipun, Puyuma-
Distr., VI., VII. 1) (DEI: 2); Daitotei, V.—VI. (DEI: 2); Taihoku,
XI. (DEI: 10); Maruyama, IV. (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Kosmopolit

Milichiella spinthera Hendel 1913, p. 107¹⁾
Pilam, VI. 1) (DEI: 1 Typus); „Formosa“ (DEI: 2)

Subfamilie *Phyllomyzinae* (*Madizinae*)

Aldrichiomyza elephas Hendel 1913, p. 108¹⁾ (*Aldrichiella*); Hendel
1914, p. 73²⁾; Hennig 1939, p. 87³⁾
Anping, VI. 1); Taihorin, VII. 1) (DEI: 1 Typus); Maruyama, IV.

(DEI: 14); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1); Tainan, XII. (DEI: 1); Taihoku (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Tsingtau (DEI)

Madiza lacteipennis Hendel 1913, p. 108¹⁾; Malloch 1914, p. 309²⁾ (*Mallochiella*)

Anping¹⁾ (DEI: 2 Typen + 1); Tainan¹⁾; Pilam, VIII. 2)

Neophyllomyza approximata Malloch 1913, Proc. U. S. Nat. Mus. 46, p. 138¹⁾ (*Phyllomyza*); Malloch 1914, p. 310²⁾

Pilam, VIII. 2); Hokuto, XII. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Paroe, VIII. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Maruyama, XII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Nordamerika¹⁾

Neophyllomyza dilatata Malloch 1914, p. 311¹⁾ (*Phyllomyza*)

Toyenmongai¹⁾

Neophyllomyza epitacta Hendel 1914, p. 97¹⁾ (*Phyllomyza*)

Chipun, VII. 1) (DEI: 1 Typus); Paroe, VIII. 1); Taihoku-Distr., Maruyama, 500 F., VI., XI. (DEI: 3)

Neophyllomyza luteipalpis Malloch 1914, p. 310¹⁾ (*Phyllomyza*)

Takao, 300 m, III., IV. 1)

Neophyllomyza nudipalpis Malloch 1914, p. 311¹⁾ (*Phyllomyza*)

Takao, 300 m, IV. 1)

Leptometopa latipes Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 177; Hendel 1913, p. 108¹⁾ (*Desmometopa*)

Anping, V. 1) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis, N.-Amerika

Desmometopa palpalis de Meijere, subspec. Hennig 1939, p. 88, Fig. 8 1)

Anping, V. 1) (DEI: 2); Hokuto, XII. 1) (DEI: 2)

Verbreitung der Nominatform: Java

Desmometopa tarsalis Loew 1865, Berl. Ent. Zeit. 9, p. 184; Hendel 1913, p. 108¹⁾; Malloch 1914, p. 309²⁾

Nach Hennig (1939, Arb. morph. taxon. Ent. 6, p. 87) sind die formosanischen Tiere wohl besser als *singaporensis* Kertész zu bezeichnen.

Anping, IV., V. 1) 2) (DEI: 5); Takao, VI. 2); Pilam (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: S.-Europa, Afrika, Oriental. Region, Fiji-Ins.

Desmometopa tristicula Hendel 1914, p. 96¹⁾

Anping, V. 1) (DEI: 1 Typus + 1); Pilam, VII. (DEI: 6); Hokuto, XII. (DEI: 4); Chipun, VII. (DEI: 2)

Pupipara

Familie *Hippoboscidae*

Lipoptena cervi Linné 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 611

Chip Chip, III. (DEI: 1, det. Schuurmans-Stekhoven)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis

Hippobosca capensis van Olfers 1815, Dissertat. p. 101; Schuurmans-Stekhoven 1929, p. 501¹⁾

Kankau (Koshun)¹⁾ (DEI: 36)

Sonstige Verbreitung: China¹⁾, Tonkin¹⁾, Europa

Familie Nycteribiidae

Penicillidia dufouri tainani Karaman 1939b, p. 133¹⁾

Syn.: „*Penicillidia dufouri* Westw.“ Scott 1913, p. 95²⁾

Anping, IX.²⁾ (DEI: 9); Tainan, X.^{1) 2)} (DEI: 11 Typen + 13)

Sonstige Verbreitung: Europa, N.-Afrika

Penicillidia jenynsi Westwood 1835, Trans. Zool. Soc. London 1, p. 291; Scott 1913, p. 95¹⁾; Schuurmans-Stekhoven 1929, p. 499²⁾; Karaman 1939a, p. 41³⁾

Tainan, X.^{1) 3)} (DEI: 331)

Sonstige Verbreitung²⁾: China, Sumatra, Java, Indien, Ceylon. Ausbreitungsweg²⁾!

Nycteribia (Listropodia) allotopa Speiser 1901, Arch. Nat. 67. 1, p. 37; Scott 1913, p. 97¹⁾; Schuurmans-Stekhoven 1929, p. 500²⁾; Karaman 1939a, p. 38³⁾ (*allotropia*)

Synonym (nach Scott 1913): *Nycteribia insolita* Scott 1908, Trans. Ent. Soc. London, p. 364, Taf. 18, Fig. 9—13

Tainan, X.³⁾ (DEI: 499); Taihorin, VI. (DEI: 11)

Sonstige Verbreitung²⁾: Brit. Indien, Ceylon, China, Philippinen, Java. Ausbreitungsweg²⁾!

Nycteribia (Listropodia) formosana Karaman 1939a, p. 35, Fig. 4¹⁾

Synonym (nach Karaman): „*Nycteribia pedicularia* Latr.“ Scott 1913, p. 100²⁾

Tainan, X.^{1) 2)} (DEI: 16 Typen + 33; Anping, IX.¹⁾ (DEI: 15)

Nycteribia (Listropodia) parvula Speiser 1901, Arch. Nat. 67. 1, p. 38; Scott 1913, p. 98¹⁾; Karaman 1939a, p. 37, Fig. 5²⁾

Synonym (nach Scott 1913): *Nycteribia sauteri* Scott 1908, Trans. Ent. Soc. London, p. 366, Taf. 18, Fig. 14—18

Tainan, X.^{1) 2)} (DEI: 238); Taihorin, VI.¹⁾ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Sumatra, Ceylon

Superfamilie Calyptratae

Familie Cordyluridae

Parallelomma longicornis Hendel 1913, p. 77¹⁾

Hoozan, II.¹⁾ (DEI: 4 Typen); „Formosa“ (DEI: 1)

? *Scatomyza litorea* Fallén 1819, Dipt. Suec. Scatomyz. p. 4

Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1 ♀)

Sonstige Verbreitung: Europa, Grönland

Familie Rhiniidae

Metallea notata van der Wulp 1880, Tijd. Ent. 23, p. 175

DEI (det. Baranoff): Taihorinsho, VIII. (1); „Formosa“ (34)

Sonstige Verbreitung: Java

Rhynchomyia setipyga Villeneuve 1929, p. 62¹⁾

Koshun, XI.¹⁾ (Dieses Tier ist im DEI nicht vorhanden, dagegen sind 2 von Fuhosho III und 1 von Suihenkyaku VIII. als Typen bezeichnet, 1 der Tiere von Fuhosho von Villeneuve eigenhändig)

DEI (det. Townsend): Pilam, VII. (DEI: 1); Chipun, VII. (DEI: 2); Hokuto, XII. (DEI: 2); Kankau, VII. (DEI: 5)

Thelychaeta electa Villeneuve 1927, p. 391¹⁾

Kosempo, VII.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tappani, XI. (DEI: 1 Typus); Taihorinsho, IX.¹⁾

Thelychaeta munda Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 398

DEI (det. Baranoff): Banshoryo (Shisha) VI. (1); Sokutsu, IX. (1); Kankau (Koshun) VIII. (1)

Sonstige Verbreitung: Java

Thelychaeta tibialis Villeneuve 1927, p. 218¹⁾

Tappani, XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Thelychaeta viridaurea Wiedemann 1824, Anal. Ent., p. 43

DEI (det. Baranoff): Kankau (Koshun) VI. (DEI: 3); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Java

Strongyloneura formosae Villeneuve 1927, p. 391¹⁾

Nach Senior-White (Brief vom 9. XI. 38 an das DEI) nicht deutbar, da ♀.

Kanshizei, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Chloroidia flavifrons Townsend 1917, Rec. Ind. Mus. 13, p. 196

DEI (det. Townsend): Kankau (Koshun), VII., IX. (3); Kanshizei, V. (3); Fuhosho, III. (1); Hoozan, I. (1); „Formosa“ (11)

Sonstige Verbreitung: Burma

Bengalia escheri Bezzi 1913, Ent. Mitt. 2, p. 76¹⁾

DEI (det. Baranoff): Toa Tsui Kutsu, V. (2); Kosempo, XI. (5); Tappani, XI. (1); Taihorinsho, XI. (2); Tainan¹⁾ (4); „Formosa“ (8)

Bengalia fuscipennis (Macquart) Brauer & Bergenstamm 1889, Denkschr. Ak. Wien 56, p. 158; Bezzi 1913, p. 75¹⁾

DEI (det. Villeneuve): Taihorinsho, XI. (5); Tappani, XI. (2); Kosempo, VII. (1); Fuhosho, VII. (1); Tainan¹⁾

Sonstige Verbreitung: Amboina

Bengalia latro de Meijere 1910, Tijds. Ent. 53, p. 328; Bezzi 1913, p. 78¹⁾

DEI (det. Villeneuve u. Townsend): Sokutsu, VI. (2); Fuhosho, VII. (3); Kanshirei, VIII. (1); Kosempo, VII, XI. (3); Kankau (Koshun) VII. (13); Taihorinsho, XI. (2); Tappani, XI. (2); Chip Chip, I. (1); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (1); Tainan¹⁾

Sonstige Verbreitung: Java

Bengalia pallens Robineau-Desvoidy 1830, Essai sur les Myodaires, p. 426

DEI (det. Townsend): Kankau (Koshun), VII. (13); Tainan, V. (1)

Sonstige Verbreitung: Bengalen

Bengalia varicolor Fabricius 1805, Syst. Antl. p. 296

DEI (det. Villeneuve u. Baranoff): Kankau (Koshun), VII. (4); Anping, V. (1); Sokutsu, VI. (1); Tainan (1); „Formosa“ (5)

Sonstige Verbreitung: Indien

Anisomyia lateralis Macquart 1843, Mém. Soc. R. Sci. Lille 1842, p. 277

DEI (det. Townsend u. Villeneuve): Kankau (Koshun), VII. (12); Gebiet des Shishastammes, V.—VI. (4); Kosempo, V., VI., XI. (4); Koshun, IX. (1); Banshoryo (Shisha), VI. (1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Paradichosia crinitarsis Villeneuve 1927, p. 219¹⁾

Koshun, VII. (1) (DEI: 1 Typus); Kankau (Koshun), XI. (DEI: 1); Paroe, X. (DEI: 1)

Paradichosia nigricans Villeneuve 1927, p. 387¹⁾

Chip Chip, III., V. (1) (DEI: 1 Typus)

Gymnadichosia pusilla Villeneuve 1927, p. 388¹⁾

Tainan, II. (1) (DEI: 1 Typus)

Tricycleopsis paradoxa Villeneuve 1927, p. 388¹⁾

Koshun, X. (1) (DEI: 1 Typus)

Somalia toxopei Senior-White 1926, Rec. Ind. Mus. 28, p. 135 (*Paratrichoclea*)

DEI (det. Baranoff): Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Buru

Caiusa testacea Senior-White 1923, Spolia Zeylan. 12, p. 310, Taf. 11¹⁾

Synonym (nach Senior-White in litt.): *Caiusa dubiosa* Villeneuve 1927, p. 392²⁾

Koshun, VII. (2) (DEI: 1 Typus von *dubiosa*)

Sonstige Verbreitung: Brit. Indien; Parasit von Froschlaich

Phumosa abdominalis Robineau-Desvoidy 1830, Essai sur les Myodaires, p. 427

Kankau, IX. (DEI: 1, det. Townsend)

Sonstige Verbreitung: Timor . . .

Alikangia pulchella Villeneuve 1927, p. 390 1)

Alikang, VI. 1) (DEI: 1 Typus); Toyenmongai 1

Alikangiella flava Villeneuve 1927, p. 391 1)

Chip Chip I. 1) (DEI: 1 Typus)

Rhinia majuscula Villeneuve 1932, p. 245 1)

Kosempo, V. 1)

Rhinia testacea var. *apicalis* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. II, p. 354

Tainan, II. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: N.-Afrika, Sudan, Sokotra

Stomatorrhina lunata Fabricius 1805, Syst. Antl., p. 292

Hoozan, II., VIII. (DEI: 3, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Mittelmeergebiete, Mitteleuropa

Stomatorrhina muscina Rondani 1875, Ann. Mus. Genova 7, p. 429

DEI (det. Villeneuve): Kosempo, V., XI. (DEI: 5); Chip Chip, I., III. (DEI: 13); Koshun, VIII. (DEI: 2); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 6)

Sonstige Verbreitung: Borneo, Philippinen . . .

Stomatorrhina unicolor Macquart 1851, Dipt. exot. Suppl. 4, p. 240

„Formosa“ (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Java

Stomatorrhina veterana Villeneuve 1927, p. 395 1)

Chip Chip, I.—III. 1) (DEI: 15 Typen); Koshun, IX. (DEI: 1 „Typus“)

Idiella euidielloides Senior-White 1922, Mem. Dept. Agric. India 7, p. 166

DEI (det. Baranoff): Chip Chip I (1); Kankau, VI. (1); Tainan, IV. (2); „Formosa“ (77)

Sonstige Verbreitung: Indien

Idiella floccosa Villeneuve 1927, p. 394 1)

Takao 1); Kosempo 1); Polisha 1); Kanshizei, V. 1) (DEI: 1 Typus);

Suihenkyaku, VIII. (DEI: 1 Typus); Tainan, II. 1) (DEI: 3 Typen);

Chip Chip 1)

Idiella mandarina Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 350

DEI (det. Townsend u. Baranoff): Kankau, IX. (1); Pilam, VII.

(4); Chosokei (9); Hokuto, XII. (1); Tainan, II. (2); Anping, V.

(2); Suihenkyaku, VIII. (1); Paroe, VIII. (1); „Formosa“ (7)

Sonstige Verbreitung: China, Java, Sumatra . . .

Idiella pleuro-foveolata Villeneuve 1927, p. 394 1)

Kanshizei, V. 1) (DEI: 1 Typus); Koshun, IX. (DEI: 1 Typus);

Chip Chip, I—V. 1) (DEI: 23)

Euidiella discolor Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 320

DEI (det. Townsend u. Baranoff): Hokuto, XII. (1); Taihoku (1);

Pilam, VII. (2); Kankau (Koshun), VI.—VIII. (13); Tainan, IV.—V.

(9); Chip Chip I. (2); Macuyama, V.—VI. (6); Suihenkyaku, III (1); „Formosa“ (33)

Sonstige Verbreitung: Tsingtau (DEI), Oriental. Region

Pollenia luteola Villeneuve 1927, p. 393¹⁾

Kosempo, III.—V., XI.¹⁾ (DEI: 1); Taihorinsho¹⁾ (DEI: 1)

Familie Calliphoridae

Stilbomyia latigena Enderlein 1936, p. 438¹⁾

Es scheint mir sehr fraglich, ob Enderlein mit der Unterscheidung der Formen *latigena*, *sauteri*, *viridis* recht hat, da sichere Unterschiede nicht festzustellen sind. Wahrscheinlich ist, daß die formosanischen Tiere alle einer Art angehören, die vielleicht als *fuscipennis* Walker zu bezeichnen wäre.

Toyenmongai, V.¹⁾; Takao, IX.¹⁾; Kanshizei, V.¹⁾ (DEI: 3 Typen); Kankau, XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Koshun, V.¹⁾ (DEI: 4 Typen); Yamo-no-Taiko, IX.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Tainan, IV.¹⁾ (DEI: 5 Typen); Paroe, IX. (DEI: 1 „Typus“); Suisharyo, X. (DEI: 1 „Typus“); Chipun, VII. (DEI: 1 „Typus“).

Im DEI von folgenden Fundorten noch Exemplare dieser Gruppe: Kankau, VIII., IX., XI. (5); Tainan, IV. (1); Paroe, X. (1); „Formosa“ (2); Koshun, V., VII., VIII. (19); Sokutsu, IX. (3); Fuhosho, VII.¹⁾; Yamo no Taiko, IX. (3); Kanshirei, V. (11); Kosempo, IV. (4); Suisharyo, X. (2); Chipun, VII. (1)

Stilbomyia sauteri Enderlein 1936, p. 439¹⁾

Kosempo, I., IV.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toyenmongai, V.¹⁾; Kankau (Koshun), VIII., XI.¹⁾ (DEI: 3 Typen); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 Typus); Tainan, IV. (DEI: 2 „Typen“); Paroe, XI. (DEI: 1 „Typus“); „Formosa“ (DEI: 3 „Typen“) Siehe auch *latigena* var. *viridis* Enderlein 1936, p. 439¹⁾

Kankau (Koshun), VIII., V.¹⁾ (DEI: 3 Typen); Suisharyo, X.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Paroe¹⁾ (DEI: 1 Typus); Polisha, XII. (DEI: 1 „Typus“)

Lucilia cuprina Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 654.

Synonym (nach Aubertin): *argyrocephala* Macquart

Takao, V. (DEI: 1, det. Villeneuve: *argyrocephala*)

Sonstige Verbreitung: Nahezu kosmopolitisch, außer Paläarktis

Lucilia papuensis Macquart 1842, Mém. Soc. Roy. Sci. Agric. Arts Lille p. 298

DEI (det. Baranoff, als *inducta*): Tainan, IV. (3); „Formosa“ (3). Chip Chip, III. (1, det. Malloch als *metilia* Walker); Kankau (Koshun) VII. (DEI: 1, det. Baranoff: *Hemipyrellia cyaneomarginata* Macquart)

Sonstige Verbreitung: Oriental. und Notogae. Region

Lucilia (Agoracites) porphyryna Walker 1857, Journ. Proc. Linn. Soc. 1, p. 24.

Chip Chip, I. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Japan

Lucilia (Phaenicia) sericata Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 53

Kankau, VI. (DEI: 1, det. Baranoff); Anping, V. (DEI: 1, det. Baranoff); Tainan, II. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit.

Chrysomyia dux Eschscholtz 1822, Entomogr. 1, p. 120

DEI (det. Villeneuve): Chip Chip, III. (DEI: 4); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 2), Kanshirei, V. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Chrysomyia megacephala Fabricius 1805, Syst. Antl., p. 289

DEI (det. Villeneuve): Macuyama, V.—VI. (1); Tainan, II., IV., V. (4); Anping, V. (1); Chip Chip, III. (1); „Formosa“ (3)

Sonstige Verbreitung: Tsingtau, Pingchiang (China), Java, Guinea...

Catapicephala dasyophthalma Villeneuve 1927, p. 222 1)

Kosempo, III. 1)

Catapicephala ruficornis Villeneuve 1927, p. 222 1)

Anping, VI. 1) (DEI: 1); Kosempo, VII. (DEI: 1); Fuhosho, IV.: Kanshirei, V.; Sokutsu, IX. (DEI: 2); Paroe, IX. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 5)

Catapicephala splendens Macquart 1851, Dipt. exot. Suppl. 4, p. 237

DEI (det. Baranoff): Sokutsu, VI. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Java

Familie *Sarcophagidae*

Goniophyto formosensis Townsend 1927, p. 281 1); Souza Lopes 1938, Occas. Pap. Bishop Mus. 14, p. 194

Anping, V. 1) (DEI: 1 Typus); Taihoku (DEI: 1 „Typus“)

Goniophyto tibialis Baranoff (in litt.)

Anping, V. (DEI: 4, det. Baranoff)

Goniophyto unguicularis Baranoff (in litt.)

Taihoku, XI. (DEI: 3, det. Baranoff)

Blaesoxipha formosana Baranoff 1931, p. 110, Fig. 1 1)

Sokutsu, IX. 1) (DEI: 1 Typus)

Thelodiscoprosopa formosana Townsend 1932, p. 445 1)

Kankau (Koshun), VII. 1) (DEI: 1 Typus)

Amobia auriceps Baranov 1935, p. 558 1) (*Pachyophthalmus*)

Shinkwa, VIII. 1)

Sonstige Verbreitung: Ceylon 1); Malaya 1)

Eumiltogramma angustifrons Townsend 1932, p. 444 ¹⁾

Tainan, V., IV. ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 1); Macuyama, V.—VI ¹⁾ (DEI: 1); Takao, V. ¹⁾ (DEI: 1)

Synorbitomyia linearis Villeneuve 1929, p. 61 ¹⁾ (*Hoplocephala*)

Tainan, II., IV., V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus + 2); Tappani, XI. ¹⁾; Kankau, V., VI., VII. (DEI: 7)

Pterella fasciata Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 227

Koshun, VII., VIII. (DEI: 2, det. Villeneuve); Taihorin, XI. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Europa.

Arrenopus aberrans Townsend (? in litt.)

DEI (det. Townsend): Tainan, V. (1); Kankau, IX. (1)

Metopia instruens Walker 1860, Proc. Linn. Soc. London 4, p. 129

DEI (det. Townsend): Kankau (Koshun), VI., XI. (DEI: 7); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Celebes

Metopia leucocephala Rossi 1790, Fauna etrusca 2, p. 306

DEI (det. Baranoff u. Villeneuve): Tainan, IV., V. (3); Kanshirei IV. (1)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Chaetanicia sauteri Townsend 1932, p. 446 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu ¹⁾; Kankau (Koshun), VII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Macronychia griseola Fallén 1820, Dipt. suec., Musc., p. 10

Tainan, V. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Asceloctella formosana Enderlein 1928, p. 50 ¹⁾

Takao, VII. ¹⁾

Sarcophaga albiceps Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 22; Böttcher 1912, p. 164 ¹⁾

Formosa ¹⁾. DEI: Kankau, VII., IX. (16); Tainan, II. (3); Kanshirei (1); Taihorinsho, XI. (1); Anping, V. (5); Yamo no Taiko, IX. (1); Hoozan, VIII. (1); Pilam, VIII. (1); Sokutsu, IX. (1); Suihenkyaku, VIII. (2); Toa Tsui Kutsu, V. (2); „Formosa“ (6)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Sarcophaga antilope Böttcher 1913, p. 380, Fig. 3 ¹⁾

Tainan ¹⁾; Kankau (Koshun), V. (DEI: 2); Sokutsu, VI., IX. (DEI: 4); „Formosa“ (DEI: 2)

Sarcophaga (Braunsiella) basiseta Baranoff 1931, p. 111, Fig. 2 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sarcophaga calicifera Böttcher 1912, p. 169 ¹⁾; Böttcher 1913, p. 379 ²⁾

Takao ²⁾; Tainan, II. (DEI: 5 Typen)

Sonstige Verbreitung: Ceylon ²⁾

Sarcophaga (Liopygia) caudagalli Böttcher 1912, p. 167¹⁾; Böttcher 1913, p. 379²⁾

Formosa¹⁾; Tainan, II. (6 Typen + 7); Taihoku (DEI: 1); Takao²⁾

Sarcophaga dux Thomson 1868, Dipt. Eugen. Resa, p. 540

Synonym (nach Senior-White 1924, Rec. Ind. Mus. 26, p. 248): *Sarcophaga tuberosa* Pandellé, Böttcher 1912, p. 164¹⁾

Formosa¹⁾; Kankau (Koshun), V., VI., VII. (DEI: 6); Tainan, V. (DEI: 1); Anping, V. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: nahezu kosmopolitisch

Sarcophaga (Thyrsoenema) formosana Senior-White 1924, Rec. Ind. Mus. 26, p. 243, nom. nov. pro *longicornis* Böttcher¹⁾; Baranoff 1934, p. 49²⁾

Synonym: *Sarcophaga longicornis* Böttcher 1912, p. 166³⁾, nec Macquart. Formosa¹⁾; Taihorinsho, XI. (DEI: 1 Typus); Tainan, II. (DEI: 1 Typus); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Kuala Lumpur²⁾; Wirt: *Attacus cyntia* Drury²⁾

Sarcophaga fuscicauda Böttcher 1912, p. 168¹⁾; Böttcher 1913, p. 379²⁾ Formosa¹⁾; Tainan, II., V. (DEI: 2 Typen + 3); Takao²⁾; Kyukokudo²⁾; Kosempo²⁾; Anping, V. (DEI: 7); Kankau (Koshun), VI., VIII. (DEI: 2); Pilam, VII. (DEI: 1); Daitotei, VI. (DEI: 18); Chosokei (DEI: 5); Macuyama, V.—VI. (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Singapore²⁾

Sarcophaga herveana Böttcher (in litt.)

Kankau (Koshun), V., VIII., IX. (DEI: 7); „Formosa“ (DEI: 1)

Sarcophaga josephi Böttcher 1912, p. 168¹⁾; Böttcher 1913, p. 379²⁾ Formosa¹⁾; Tainan, II. (DEI: 1 Typus); Takao²⁾

Sarcophaga (Liopygia) kankauensis Baranoff 1931, p. 113¹⁾

Kankau (Koshun), XI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sarcophaga krameri Böttcher 1912, p. 165¹⁾; Böttcher 1913, p. 378²⁾ Formosa¹⁾; Takao²⁾; Kyukokudo²⁾; Kosempo, IX.²⁾ (DEI: 1 Typus); Tainan, II.²⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Pilam²⁾; Fuhosho, IX.²⁾ (DEI: 1 Typus); Toyenmongai²⁾; Sokutsu, VI. (DEI: 1); Tappani, XI. (DEI: 1); Anping, V. (DEI: 1); Kanshizei, V. (DEI: 1); Kankau (Koshun), VI., VIII., IX. (DEI: 68 „Paratypen“)

Sonstige Verbreitung: Singapore²⁾; Ceylon²⁾

Sarcophaga melanura Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 23; Böttcher 1912, p. 164¹⁾

Formosa¹⁾; DEI (det. Böttcher u. Enderlein): Tainan, II., V. (12); Anping, V. (5); Suisharyo, X. (1); Kankau (Koshun), VII. (2)

Sonstige Verbreitung: Europa, Japan

- Sarcophaga hirtipes orchidea* Böttcher 1913, p. 375, Fig. 1¹⁾
 Kyukokudo 1); Takao 1); Yentempo 1); Kankau (Koshun), VII, VIII, IX. (DEI: 8)
 Sonstige Verbreitung: Calcutta 1); Colombo 1); Neuguinea 1)
- Sarcophaga orientaloidea* Senior-White 1924, Rec. Ind. Mus. 26, p. 244, Taf. 15, Fig. 31¹⁾
 Kankau (Koshun), VIII. (DEI: 9, det. Baranoff); Taihoku-Distr., Maruyama, XI. (DEI: 1, det. Baranoff)
 Sonstige Verbreitung: Indien; Ceylon
- Sarcophaga ostindicae* Senior-White 1924, Rec. Ind. Mus. 26, p. 233, Taf. 9, Fig. 7¹⁾
 DEI (det. Baranoff): Kankau (Koshun), VI, VIII, IX. (DEI: 4); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Tainan, IV. (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: „Ostindien“
- Sarcophaga phoenicopferus* Böttcher 1913, p. 376, Fig. 2¹⁾
 Kankau, IV., VI., IX¹⁾ (DEI: 6)
- Sarcophagaprehendens* Böttcher (in litt.)
 Kankau (Koshun), V., VI. (DEI: 4)
- Sarcophaga problematica* Baranoff (in litt.)
 Kankau, IX. (DEI: 1)
- Sarcophaga (Prosballia) prospaliina* Baranoff 1931, p. 112, Fig. 3¹⁾
 Toa Tsui Kutsu, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Sarcophaga ruficornis* Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 314; Böttcher 1913, p. 378²⁾
 Formosa²⁾
 Sonstige Verbreitung: Indien
- Sarcophaga sacki* Böttcher (in litt.)
 Kankau (Koshun), V., VI. (DEI: 4)
- Sarcophaga serriforceps* Böttcher (in litt.)
 Sokutsu, IX. (DEI: 1)
- Sarcophaga tristylata* Böttcher 1912, p. 167¹⁾; Böttcher 1913, p. 379²⁾
 Fuhosho, VII.²⁾; Formosa¹⁾; Taihorinsho, XI. (DEI: 1 Typus); Kankau (Koshun), (DEI: 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)

Familie *Melanophoridae*

- Acampomintho lobata* Villeneuve 1927, p. 223¹⁾
 Synonym: *Wagneriopsis formosensis* Townsend 1927, p. 282²⁾
 Tainan, II.¹⁾ (DEI: 37 Typen + 10); Hokuto, XII.²⁾; Anping, X., V.²⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Kankau, VII. (DEI: 2); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai, V. (DEI: 1)
- Morinia melanoptera* Fallén 1810, Vet. Acad. Handl. 31, p. 253 (*Anthracomysia*)

Chip Chip, III. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa

Tainanina grisella Villeneuve 1926, p. 272 1)

Tainan, I., II., III. 1) (DEI: 55); Kanshirei, IV. (DEI: 4); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 2); Chip Chip, II. (DEI: 2); Pilam, VII., VI. (DEI: 2); Anping, V. (DEI: 1); Chipun, VII. (DEI: 1)

Familie Phasiidae

Gymnosoma brevicorne Villeneuve 1929, p. 67 1)

Chip Chip, I. 1) (DEI: 1 Typus); Fuhosho, VII. 1) (DEI: 1 Typus)

Gymnosoma indica Walker 1852, Dipt. Saund. 4, p. 257

„Formosa“ (DEI: 4, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Indien

Gymnosoma rotundatum Linné 1758, Syst. Nat. 10, p. 595

DEI (det. Villeneuve): Takao, V. (1); Fuhosho, III. (1)

Sonstige Verbreitung: Paläarktis

Perigymnosoma globulum Villeneuve 1929, p. 68 1)

Chip Chip, I 1) (DEI: 1 Typus)

Akosempomyia caudata Villeneuve 1932, p. 244 1)

Toyenmongai 1)

Kosempomyia sauteri Baranoff (in litt.)

Kosempo, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2)

Kosempomyia tibialis Villeneuve 1932, p. 243 1)

Kosempo, III.—IV. 1)

Bogusia latifascia Villeneuve 1932, p. 244 1)

Kosempo, VI.—VII. DEI: 1, det. Baranoff, aus „Formosa“

Comptosia phoenix Villeneuve 1915, p. 91, Fig. 1 1)

Sokotsu, V. 1); Kosempo, IX. 1)

Comptosia rufula Villeneuve 1915, p. 91 1)

Tainan, III. 1); Kosempo, IX. ? 1)

Ochrophasia atripennis Townsend 1927, Philipp. Journ. Sci. 34, p. 374

„Formosa“ (DEI: 1 det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Mindanao

Austrophasiopsis formosensis Townsend 1932, p. 449 1)

Kosempo, V. 1) (DEI: 5 Typen + 2)

Austrophasiopsis rufiventris Baranoff 1934, p. 165 1) (*Kosempomyiella*)

Kosempo 1) (DEI: 4 Typen)

Phasia dubiosa Baranoff (in litt.) (*Allophora*)

„Formosa“ (DEI: 1)

Stylogynomyia cylindrica Townsend 1927, p. 280 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 Typus)

- Evibrissa obscuripennis* Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 219
Gebiet des Shishastammes V.—VI. (DEI: 1, det. Townsend)
Sonstige Verbreitung: Europa . . .
- Phania vittata* Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 219
Tappani, IX. (DEI: 1, det. Villeneuve); Gebiet des Shishastammes,
V.—VI. (DEI: 1, det. Townsend)
Sonstige Verbreitung: Europa . . .
- Weberia rubiginans* Villeneuve 1932, p. 270¹⁾
Kosempo¹⁾
- Zambesopsis claripalpis* Villeneuve 1926, p. 272¹⁾ (*Zambesa*)
Koshun, III.¹⁾
- Zambesa formosensis* Townsend 1927, p. 286¹⁾
Kankau, VI.—VII.¹⁾ (DEI: 4 Typen + 4)
- Orectocera beelzebul* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 301
Taihorinsho, IX. (DEI: 4, det. Villeneuve)
Sonstige Verbreitung: Java . . .
- Catapariprosopa curvicauda* Townsend 1927, p. 285¹⁾
Kankau, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Vespoicyptera petiolata* Townsend 1927, p. 279¹⁾
Sokutsu, IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Eocyptera orientalis* Townsend 1927, p. 284¹⁾
Sokutsu¹⁾ (DEI: 1 Typus + 1); Toa Tsui Kutsu, V., IX.¹⁾ (DEI:
1 Typus + 2)
- Palpocyptera formosensis* Townsend (? in litt.)
Kankau, IX. (DEI: 1)
- Palpocyptera palpata* Townsend (? in litt.)
Kankau (Koshun), III., IV. (DEI: 3)
- Palpocyptera spec.*
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Kankau (Koshun), IV. (DEI: 1)
- Eupalpocyptera angusticauda* Townsend 1927, p. 286¹⁾
Sokutsu, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Ecatocyptera evibrissata* Townsend 1927, p. 286¹⁾
Kankau, VI.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Lophosiodes scutellatus* Townsend 1927, p. 285¹⁾
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1 Typus)
- Perilophosia ocypterina* Villeneuve 1927, p. 221¹⁾
Taihorin¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Perilophosia diversipes* Villeneuve 1926, p. 275¹⁾
Daitorinsho, VII.¹⁾
- Xenolophosia perpendicularis* Villeneuve 1927, p. 220¹⁾
Taihorinsho, IX.¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Xenolophosia hamulata* Villeneuve 1926, p. 274¹⁾

Synonym (nach Townsend, Ann. Mag. N. H. (10) 8, p. 391): *Formolophosia hemydoides* Townsend 1927, p. 280 2)

Nach Malloch (Ann. Mag. N. H. [10] 7, p. 318 ist *Xenolophosia hamulata* Villeneuve Synonym zu *Duvaucelia bicincta* Rob.-Desv. (*Duvaucelia* R.-D. nach Townsend = *Curtocera* R.-D.)

Toa Tsui Kutsu, V. 2) (DEI: 2 Typen von *hemydoides* + 7); Taihorin, VII. 1); Tainan, IV. (DEI: 9); „Formosa“ (DEI: 5)

Calypteromyia barbata Villeneuve 1915, p. 92, Fig. 2 1)

Kosempo, V. 1); DEI (det. Townsend u. Baranoff): Kankau, IX. (DEI: 8); Macnyama, V.—VI. (DEI: 1)

Hyalomyodes orientalis Baranoff (in litt.)

Tainan, IV. (DEI: 1)

Paradionaea orientalis Baranoff (in litt.)

Kankau, IX. (DEI: 1)

Familie Dexiidae

Actinochaetopteryx actifera Townsend 1927, p. 278 1)

Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1 Typus + 3); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Tainan, IV. (DEI: 12)

Thelaira nigripes Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 319

Taihorinsho, XI. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Paläarktische, Orientalische, Notogäische Region

Thelaira sumatrana Townsend 1927, Suppl. ent. 16, p. 58

DEI (det. Townsend): Sokutsu, IX. (2); Toa Tsui Kutsu, V. (1); Tainan, IV. (8)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Metopomintho sauteri Townsend 1927, p. 284 1)

Hoozan, I. 1) (DEI: 1 Typus); Tainan, IV. (DEI: 1)

Macquartia oculata Baranoff (in litt.)

„Formosa“ (DEI: 8)

Urodexia siamensis Townsend 1919, Proc. U. S. Nat. Mus. 56, p. 563

DEI (det. Townsend): Kankau (Koshun), VI., VII. (3); Toa Tsui Kutsu, V. (1)

Sonstige Verbreitung: Siam

Eophyllophila filipes Townsend 1927, p. 283 1)

Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1 Typus + 5); Kosempo, V.—VI. (DEI: 1); Tainan, IV. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 7); „Formosa“ (DEI: 5)

Arrhinodexia atrata Townsend 1927, p. 283 1)

Tappani, IV. 1); Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1 Typus); außerdem im DEI 1 von Townsend selbst als Typus bezeichnetes Exemplar aus Chip Chip III.

Succingulum transvittatum Pandellé 1896, Rev. Ent. 15, p. 148

Synonym (nach Townsend in litt.): *Gymnamedoria medinoides* Townsend 1927, p. 283¹⁾

Sokutsu, IX. 2) (DEI: 2 Typen); Taihoku-Distr., Okaseki, V. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Trichoformosomyia sauteri Baranov 1934, p. 164¹⁾

Formosa¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Oxydexiops uramyoides Townsend 1927, Philipp. Journ. Sci. 34, p. 375

„Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Philippinen

Medinodexia formosana Baranoff (in litt.)

Tainan, IV. (DEI: 1)

Prodegeeria javana Brauer & Bergenstamm 1894, Denkschr. Ak. Wiss. Wien, math.-nat. 61, p. 617

DEI (det. Townsend): Kankau, V.—X. (20); Paroe (1); Toa Tsui Kutsu, V. (2); Koshun, IX. (1)

nach Townsend 1926, Phil. Journ. Sci. 29, p. 531 Syn. zu *Urodexia penicillum* Osten-Sacken

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Prodegeeria tricineta Villeneuve 1929, p. 67¹⁾ (*Hemidegeeria*)

Kanshizei, VII. 1) (DEI: 1 Typus)

Prodegeeria bicincta Villeneuve 1929, p. 67¹⁾ (*Hemidegeeria*)

Fuhosho, VII. 1) (DEI: 1 Typus)

Dolichopodominto dolichopiformis Townsend 1927, p. 278¹⁾

Kosempo¹⁾; Kankau, V.—VII. 1) (DEI: 3 Typen + 1); Tainan, IV. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sumpigaster formosensis Baranoff (in litt.)

„Formosa“ (DEI: 3)

Halidayopsis formosensis Townsend 1927, p. 282¹⁾

Kankau, IX. 1) (DEI: 1 Typus + 10, wahrscheinlich weitere Typen)

Chaetomyiobia javana Brauer & Bergenstamm 1894, Denkschr. Akad. Wiss. Wien 61, p. 617

DEI (det. Townsend): Hoozan, II. (1); Toa Tsui Kutsu, V. (4); Sokutsu, VI. (1)

Sonstige Verbreitung: Java

Chaetomyiobia sumatrensis Townsend 1926, Suppl. Ent. 14, p. 36.

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2, det. Baranoff); Tainan, IV. (DEI: 6, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Leskia deaurata Baranoff (in litt.)

Sokutsu, VI. (DEI: 1)

Dexiomimops ruficeps Baranoff 1935, p. 557 1)

Formosa 1)

Sonstige Verbreitung: Japan 1)

Familie Oestridae

Xanthoestrus fastuosus Villeneuve 1914, p. 440, Fig. 2 1)

Fuhosho, VII. 1); Toyenmongai 1)

Homotrixa brevifacies Villeneuve 1914, p. 440, Fig. 1 1)

Lake Candidius, X. 1)

Familie Prosenidae

Blepharopoda eutachinoides Baranoff 1932, p. 92, Fig. 8 1)

Sokutsu, IX. 1) (DEI: 1 Typus)

Asbellopsis luzonensis Townsend 1927, Philipp. Journ. Sci. 34, p. 379

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Townsend)

Sonstige Verbreitung: Philippinen.

Phasiodesia formosana Townsend 1927, p. 284 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 Typus)

Prosenia flavipennis Wiedemann, Zool. Mag. 3, p. 20

Hokuto, XII. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Java

Prosenia parva Malloch 1930, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 55, p. 115

(*Callirthoe*)

„Formosa“ (DEI: 5, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Australien.

Prosenia sibirita Fabricius 1775, Syst. Ent., p. 798

Tappani, XI. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Calotheresia formosensis Townsend 1927, p. 284 1)

Kankau (Koshun) I., VI, VII., IX, XI. 1) (DEI: 3 Typen + 26);

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 8 Typen + 5); Hoozan 1); Paroe 1);

Suisharyo, X. 1) (DEI: 1 Typus + 1); Sokutsu 1); Kosempo, X.

(DEI: 1); Taihorinsho, IX. (DEI: 7); Tainan (DEI: 1)

Gymnodexia orientalis Baranoff (in litt.)

„Formosa“ (DEI: 3)

Philippodexia longipes Townsend 1926, Philipp. Journ. Sci. 29, p. 534

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Townsend)

Sonstige Verbreitung: Philippinen

Familie Tachinidae

Bombyliomyia apicalis Matsumura 1918, p. 389, Taf. 22, Fig. 17

Formosa

Echinomyia rubrapex Villeneuve 1932, p. 268 1)

Toyenmongai 1)

Platycheira cyanicolor Villeneuve 1932, p. 268 1)

Toyenmongai 1)

Voria edentata Baranoff 1932, p. 83, Fig. 1 1)

Kankau, VI. 1) (DEI: 1 Typus + 1); „Formosa“ (DEI: 2)

Voria ruralis Fallén 1810, Vet. Acad. Handl. 31, p. 265

Tappani, IX. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Leiosia flavisquama van der Wulp 1893, Tijd. Ent. 36, p. 186

„Formosa“ (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Java

Trischidocera sauteri Villeneuve 1915, p. 94, Fig. 3 1)

Mt. Hoozan, V. 1)

Acuphocera varia Fabricius 1794, Ent. Syst. 4, p. 327

DEI (det. Townsend): Chipun, VII. (1); Kosempo, II., IV., V. (1);

Kanshizei, VIII. (2); „Formosa“ (1)

Sonstige Verbreitung: Indien . . .

Linnaemyia formosensis Villeneuve 1932, p. 269 1)

Kosempo 1)

Hemilinnomyia decorata Villeneuve 1932, p. 269 1)

Koshun 1)

Janthinomyia Felderi Brauer & Bergenstamm 1893, Denkschr. Ak. Wiss.

Wien, math.-nat. 60, p. 140

„Formosa“ (DEI: 3, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Eugynnochaetopsis lateralis Townsend 1927, p. 287 1)

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 Typus)

Anaeudora aureocephala Townsend 1932, p. 468 1)

3 zu dieser Art gehörige Tiere des DEI aus „Formosa“ sind von Baranoff als „*Sumatrotachina lampros* v. d. W.“ bezeichnet worden!

Sokutsu 1) (DEI: 1 Typus); Taihorinsho 1) (DEI: 1 Typus)

Homoeonychia lithosiophaga Rondani 1859, Dipt. Ital. Prodrom. 3, p. 66

Tappani, XI. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Servilliodes rufoanalis Macquart 1850, Dipt. exot. Suppl. 4, p. 169

DEI: Kosempo, VI. (1), Toa Tsui Kutsu, V. (12); Tainan, IV. (2);

Gebiet des Shishastammes V.—VI. (2); Tappani, XI. (1); „Formosa“ (1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Nemoraea tropidobothra Brauer & Bergenstamm 1893, Denkschr. Akad.

Wiss. Wien 58, p. 361

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2, det. Townsend)

Sonstige Verbreitung: Java

Familie Exoristidae

Thelairosoma secundum Villeneuve 1929, p. 66 ¹⁾

Fuhosho, VI.—VII. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Vibrissina turrita Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 401

Chip Chip I (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa

Meigenia majuscula Rondani 1859, Dipt. Ital. Prodr. 3, p. 112

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 5, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Meigenia setosa Baranoff (in litt.)

Hoozan, II. (DEI: 1, det. Baranoff)

Mollia malayana Townsend 1926, Suppl. Ent. 14, p. 32

(*Molliopsis* nach Townsend, Journ. N. Y. Ent. Soc. 40, p. 470)

Kankau, VII. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Tricholyga sorbillans Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 311

Kankau, IX. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Teneriffa . . .

Palpexorista orientalis Townsend (? in litt.)

Sokutsu, IX. (DEI: 12, det. Townsend); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1, det. Townsend)

Eutachina basalis Baranoff 1932, p. 86, Fig. 3 ¹⁾

Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Eutachina hyalipennis Baranoff 1932, p. 88, Fig. 5 ¹⁾

Synonym (nach Mesnil, in litt., Brief vom 26. IV. 39): *E. fuscipennis*

Baranoff 1932, p. 90, Fig. 6 ²⁾

Kankau, VIII., IX. ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Chipun, VII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kankau, IV., VIII. ²⁾ (DEI: 4 Typen)

Eutachina quadriseta Baranoff 1932, p. 91, Fig. 7 ¹⁾

Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Eutachina rusticella Baranov 1936, p. 108 ¹⁾

Takao, XI. ¹⁾

Phorocerosoma anomala Baranoff 1936, p. 99

DEI: „Formosa“ (1); Toa Tsui Kutsu, V. (5); Kankau (Koshun), VI., XI. (8)

Sonstige Verbreitung: Salomonen

Exorista apicalis Baranoff (in litt.)

DEI: Kankau, VII., VIII., IX. (16); Sokutsu, IX. (4)

- Exorista confinis* Fallén 1820, Dipt. Suec. Musc., p. 32; Baranoff 1931, p. 120, Abb. 1¹⁾
Formosa 1); Tainan, II. (DEI: 1, det. Villeneuve)
Sonstige Verbreitung¹⁾: Europa, Afrika, Nordamerika
- Exorista distincta* Baranoff 1931, p. 120, Abb. 2¹⁾
Kankau, VII.—IX. 1) (DEI: 3 Typen)
- Exorista fallax* Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 321
Synonym (nach Mesnil, in litt., Brief vom 9. III. 39): *Eutachina c-viloides* Baranoff 1932, p. 84, Fig. 2¹⁾
Kankau, VII.—VIII. 1) (DEI: 2 Typen)
Sonstige Verbreitung: Europa . . .
- Exorista japonica* Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 73
Synonym (nach Mesnil, in litt., Brief vom 9. III. 39): *Eutachina tenuiforceps* Baranoff 1932, p. 87, Fig. 4¹⁾
Kankau, VII. 1) (DEI: 4 Typen)
Sonstige Verbreitung: Paläarkt. und oriental. Region
- Exorista impexa* Villeneuve 1914, Ann. S.-Afr. Mus. 15, p. 494 (*Tricholyga*); Baranoff 1931, p. 122, Abb. 3²⁾
Tainan, II., V. 2) (DEI: 3)
Sonstige Verbreitung: Afrika
- Exorista maculiventris* Baranoff (in litt.)
Kankau (Koshun) VIII. (DEI: 2)
- Exorista picta* Baranoff 1935, p. 553¹⁾
Formosa 1); Tainan, V. (DEI: 3 Typen); Kankau, VIII., IX. (DEI: 10 Typen); Shinkwa 1)
- Exorista polycalens* Villeneuve 1929, p. 66 1); Baranoff 1931, p. 123 2)
Chip Chip, III. 1) (DEI: 1 Typus); Hoozan, II. 2)
- Exorista pulchra* Baranoff (in litt.)
Sokutsu, X. (DEI: 1)
- Exorista simulator* Baranoff (in litt.)
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2)
- Exorista vicinalis* Baranoff 1931, p. 123 1)
Kankau (Koshun), VII. 1)
- Exorista winthemoides* Baranoff (in litt.)
„Formosa“ (DEI: 1)
- Phorinia flavipalpis* Baranoff (in litt.)
Kankau, VIII., IX. (5)
- Actia aegyptia* Villeneuve 1912, Bull. Mus. Hist. Nat. No. 5
Tainan, II., III. (DEI: 7, det. Villeneuve)
Sonstige Verbreitung: Aegypten
- Actia maculipennis* Malloch 1930, Journ. Fed. Malay. States Mus. 16, p. 141 .

Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Malaya

Actia nudibasis Stein 1924, Arch. Naturg. 90 A 6, p. 129

Chip Chip, III. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Mitteleuropa

Actia siphonosa Malloch 1930, Journ. Fed. Malay States Mus. 16, p. 136

Taihoku-Distr., Jushifu, VI. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: „Malaya“

Actia tibialis Robineau-Desvoidy 1851, Ann. Soc. Ent. France (2) 9 p. 185

DEI (det. Baranoff u. Villeneuve): Chip Chip, III. (1); Taihoku, XI. (1); Kankau (Koshun), VIII., IX. (19); Tainan, IV. (1); „Formosa“ (2)

Sonstige Verbreitung: Paläarkt. und oriental. Region

Bactromyia compsiluroides Baranoff (in litt.)

Kankau (Koshun), VII., VIII., IX. (DEI: 5)

Microphytomomyia minuta Townsend 1927, p. 287¹⁾

Hokuto, XII.¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Siphona abbreviata Villeneuve (? in litt.) (*Bucentes*)

DEI (det. Villeneuve) Chip Chip, II. (1); Tainan, II. (4)

Siphona cristata Fabricius 1805, Syst. Antl., p. 281

Tainan, II. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Siphona maculata Staeger apud Zetterstedt 1849, Dipt. Scand. 8, p. 3212

Chip Chip, II. (DEI: 2, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa

Siphona taiwanica Baranoff (in litt.) (*Crocota*)

DEI (det. Baranoff): Macuyama, IV., V.—VI. (3); Toa Tsui Kutsu, V. (1)

Prosopodopsis fasciata Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 337

Anping, V. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Macao . . .

Dolichocolon quadrisetosum Baranov 1935, p. 555¹⁾

Formosa¹⁾; Kankau, VII., VIII. (DEI: 3 Typen); Shinkwa, IV.¹⁾

Gomia cinerascens Rondani 1859, Dipt. Ital. Prodr. 3, p. 34

DEI (det. Baranoff): „Formosa“ (1); Anping, V. (1); Tainan, V. (1)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Stylurodora stylata Townsend 1932, p. 476¹⁾

Kankau, VIII.—IX.¹⁾ (DEI: 11 Typen + 9)

Masicera oculata Baranov 1935, p. 554¹⁾

Formosa¹⁾; Kankau (Koshun), VII. (DEI: 1 Typus); Shinkwa VII.¹⁾

Sonstige Verbreitung ¹⁾: Java (Wirt: *Baoris bada* Moore); Südindien (Wirt: *Plusia* sp.)

Erycia palpata Baranoff 1936, p. 113 ¹⁾

Formosa ¹⁾

Platerycia compressa Baranov 1936, p. 111 ¹⁾

Formosa ¹⁾; Tainan, V. (DEI: 1 Typus); Hoozan, II. (DEI: 1 Typus); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 1 Typus)

Prosopaea sturmioides Baranoff (in litt.)

„Formosa“ (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Sokutsu, VI. (DEI: 1)

Bessa remota Aldrich 1925, Proc. Ent. Soc. Wash. 27, p. 13 (*Ptichomyia*)

Kankau (Koshun), VIII., IX. (DEI: 5, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Malay. Staaten

Phrynactia petiolata Townsend 1926, Suppl. Ent. 14, p. 34

Pilam, VIII. (DEI: 1, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Byomyiodes cyaneus Matsumura 1918, p. 387 ¹⁾, Stellung?

Formosa ¹⁾

Phoriniophylax femorata Baranoff (in litt.)

Tainan, IV. (DEI: 2, det. Baranoff)

Argyrophylax nigrotibialis Baranoff 1935, p. 552 ¹⁾

Formosa ¹⁾; Kankau, IX. (DEI: 1 Typus)

Sonstige Verbreitung: Malaya, Zentral-Japan, China

Argyrophylax rufitibialis Baranoff (in litt.)

Hoozan, II. (DEI: 1)

Thelycarcelia thrix Townsend 1932, p. 475 ¹⁾

Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Sokutsu ¹⁾

Formosodorcia convergens Wiedemann 1824, Anal. Ent., p. 43

Synonym (nach Villeneuve 1933, Rev. Zool. bot. afr. 23, p. 280)

Formosodorcia dilabida Villeneuve 1916, Ann. S.-Afr. Mus. 15, p. 479;

Townsend 1932, p. 475 ²⁾

DEI (det. Villeneuve und Townsend): Kankau (Koshun), VII., VIII., IX., XI., VI. (29); Tainan, II., V. (6); Hokuto, XII. (1); Pilam, VII. (1); Sokutsu, IX. (1)

Sonstige Verbreitung: Indien . . .

Carcelia frontalis Baranoff 1931, p. 43 ¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Carcelia laxifrons Villeneuve 1912, Feuille jeun. Nat. 5, p. 90; Baranoff 1931, p. 40 ²⁾

Kankau, VIII.—IX. ²⁾; Toa Tsui Kutsu, V. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Europa

Carcelia pilosella Baranoff 1931, p. 37 ¹⁾

Kankau, VI., VII., IX. ¹⁾ (2 Typen)

Carcelia rasella Baranoff 1931, p. 44 ¹⁾; Baranoff 1934, p. 403 ²⁾

Formosa ¹⁾ ²⁾ (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Europa ¹⁾ ²⁾

Carcelia rutilloides Baranoff 1931, p. 29 ¹⁾

Chosokei ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Carcelia setosella Baranoff 1931, p. 44 ¹⁾

Sokutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Carcelia sexta Baranoff 1931, p. 34 ¹⁾

Taihorinsho, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Eucarcelia excisa Fallén 1820, Dipt. Suec. Musc., p. 32; Baranoff 1931, p. 29 ¹⁾ (*Carcelia*); Baranoff 1934, p. 393 ²⁾

Hoozan ¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung ²⁾: Europa, Indien, Ceylon, Siam, Java

Eucarcelia grossa Baranoff 1934, p. 393, Abb. 2 f

Formosa ¹⁾

Eucarcelia kockiana Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 65; Baranov 1934, p. 396 ¹⁾

Synonym (nach Baranov): *Carcelia prima* A Baranoff 1931, p. 31 ²⁾

Sokutsu, IX. ²⁾ (DEI: 8 Typen + 7); Kankau, IV.—IX. ²⁾ (DEI: 14 Typen + 16); Taihorinsho, IX. ²⁾ (DEI: 1 Typus)

Sonstige Verbreitung ¹⁾: ganze orientalische Region, Tsingtau, Shantung

Wirt: Eupterote; Hyblaea puera; Sphingide; Diacrisia obliqua;

Chloridea; Macroglossum; Bombotelia jacosatrix; Euproctis minor.

Eucarcelia prima Baranoff 1931, p. 31 ¹⁾ (*Carcelia prima* B); Baranoff 1934, p. 397

Kankau, VI.—IX. ¹⁾ (DEI: 7 Typen)

Eucarcelia quarta Baranoff 1931, p. 33 ¹⁾ (*Carcelia*)

Gebiet des Shishastammes, V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Eucarcelia quinta A Baranoff 1931, p. 33 ¹⁾ (*Carcelia*)

quinta B Baranoff, l. c.

Kankau, VI., XI. ¹⁾ (DEI: A: 2 Typen; B: 1 Typus)

Eucarcelia rufa Baranoff 1931, p. 33 ¹⁾ (*Carcelia*)

Kankau, V.—VI. ¹⁾ (DEI: 4 Typen); Macuyama, V.—VI. ¹⁾ (DEI: 1)

Eucarcelia secunda Baranoff 1931, p. 31 ¹⁾ (*Carcelia*)

Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Eucarcelia sumatrana Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 66; Baranoff 1934, p. 395, Abb. 2 e ¹⁾

Toa Tsui-Kutsu ¹⁾; Hoozan ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Ceylon ¹⁾; Sumatra ¹⁾

- Eocarcelia aurata* Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 65; Baranov 1934, p. 399
 Synonym (nach Baranoff 1934): *Carcelia distincta* Baranoff 1931, p. 32 ¹⁾
 Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
 Sonstige Verbreitung: Sumatra
- Eocarcelia ceylanica* Townsend 1919, Proc. U. S. Nat. Mus. 56, p. 583; Baranov 1934, p. 399 ¹⁾
 Synonym (nach Baranov 1934): *Carcelia tertia* Baranoff 1931, p. 32 ²⁾
 Taihorinsho, IX. ²⁾ (DEI: 1 Typus)
 Sonstige Verbreitung ¹⁾: Ceylon; Mindanao
- Catacarcelia rondaniella* Baranov 1934, p. 392, Abb. 1c ¹⁾
 Kankau ¹⁾; Takao ¹⁾
- Carceliopsis sumatrensis* Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 66; Baranov 1934, p. 406 ¹⁾
 Synonym (nach Baranov 1934): *Carcelia rasoides* Baranoff 1931, p. 42 ²⁾
 Kankau, VI., IX. ²⁾ (DEI: 4 Typen); „Formosa“ (DEI: 5)
 Sonstige Verbreitung: Sumatra, Ceylon, Kuala Lumpur
 Wirte: *Stauropus alternatus*; *Dasychira horsfieldii*
- Carceliella octava* A Baranoff 1931, p. 36 ¹⁾ (*Carcelia*)
octava B Baranoff, l. c. p. 35
 Kankau, III., IV., VIII.—IX. ¹⁾ (DEI: A: 12 Typen + 3; B: 1 Typus)
- Parexorista latistylata* Baranov 1934, p. 405 ¹⁾
 Formosa ¹⁾
- Asiocarcelia caudata* Baranoff 1931, p. 41, Fig. 5 ¹⁾ (nicht wie im Druck angegeben Fig. 6) (*Carcelia*); Baranoff 1934, p. 407 ²⁾
 Kankau, VIII.—IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
 Sonstige Verbreitung: Ceylon ²⁾
- Microcarcelia septima* Baranoff 1931, p. 35 ¹⁾ (*Carcelia*)
 Kankau, VIII. ¹⁾ (DEI: 3 Typen); „Formosa“ (DEI: 1)
- Zygocarcelia cruciata* Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 64; Baranov 1934, p. 405 ¹⁾
 Formosa ¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Sumatra ¹⁾
- Myxocarcelia aberrans* Baranoff 1931, p. 27 ¹⁾ (*Carcelia*)
 Kankau, VIII. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Myxocarcelia hirsuta* Baranoff 1931, p. 38 ¹⁾ (*Carcelia*)
 Kankau, VII., VIII. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)
- Isocarceliopsis hemimacquartoides* Baranoff 1934, p. 406 ¹⁾
 Tainan, IV. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Takao, XII. ¹⁾; Toa Tsui Kutsu, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Chosokei (DEI: 1)

- Sturmia atropivora* Robineau-Desvoidy 1830, Essai Myodaires, p. 171;
Baranoff 1932, p. 76 ¹⁾
Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 27); Anping, V. ¹⁾ (DEI: 3); Kankau, VI.,
VIII. ¹⁾ (DEI: 8)
Sonstige Verbreitung: Europa . . .
- Sturmia bella* Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 317; Baranoff 1932, p. 77 ¹⁾
Kankau, VI., IX. ¹⁾ (DEI: 29); Sokutsu, VI. ¹⁾ (DEI: 17); Taiho-
rinsho, IX. ¹⁾ (DEI: 1); Paroe, X. ¹⁾ (DEI: 1); Tappani, XI. (DEI:
1); Geb. des Shishastammes, V.—VI. (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Europa . . .
- Sturmia bisetosa* Baranoff 1932, p. 75 ¹⁾
Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Sturmia inconspicua* Meigen 1830, Syst. Besch. 6, p. 369
Koshun, VIII. (DEI: 1, det. Villeneuve)
Sonstige Verbreitung: Europa . . .
- Sturmia inconspicuella* Baranoff 1932, p. 79 ¹⁾
Kankau, IV., VII., VIII. ¹⁾ (DEI: 49 Typen); Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI:
2 Typen)
- Sturmia inconspicuoides* Baranoff 1932, p. 80 ¹⁾
Kankau, VIII., IX. ¹⁾ (DEI: 6 Typen); Sokutsu, IX. ¹⁾ (4 Typen)
- Sturmia latiforceps* Baranoff 1932, p. 78 ¹⁾
Kankau, V., VII., VIII., IX. ¹⁾ (DEI: 9 Typen); Sokutsu, IX. ¹⁾
(DEI: 1 Typus)
- Sturmia latistylata* Baranoff 1932, p. 79 ¹⁾
Kanshizei, V. ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Kankau, IV., VII., VIII., IX. ¹⁾
(DEI: 6 Typen); Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Sturmia macrophallus* Baranoff 1932, p. 76 ¹⁾
Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 2 Typen + 2); Tainan, V. ¹⁾ (DEI: 1 Ty-
pus); Pilam, VII. (DEI: 1)
- Sturmia oculata* Baranoff 1932, p. 80 ¹⁾
Tainan, V. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)
- Sturmia (Weingärtneriella) paradoxalis* Baranoff 1931, p. 124 ¹⁾; Bara-
noff 1932, p. 80 ²⁾
Sokutsu, IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 1 Typus)
- Sturmia picta* Baranoff 1932, p. 77 ¹⁾
Kankau, V., VI., VIII., IX. ¹⁾ (DEI: 16 Typen)
- Sturmia sericariae* Cornalia 1870, Bull. Soc. Ent. ital. 2, p. 217
DEI (det. Baranoff): Tainan, IV. (7); Sokutsu, IX. (1); „Formosa“ (1)
Sonstige Verbreitung: Paläarktische, orientalische, notogäische Region
- Sturmia trisetosa* Baranoff 1932, p. 78 ¹⁾
Kankau, VII.—IX. ¹⁾ (DEI: 8 Typen); Taihorinsho, IX. ¹⁾ (DEI:
1 Typus); Sokutsu, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sturmia trisetosoides Baranoff 1932, p. 78 ¹⁾

Tainan, IV. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Sturmia unisetosa Baranoff 1932, p. 75 ¹⁾

Kankau (Koshun), VIII., IX. ¹⁾ (DEI: 2 Typen)

Sturmia vicinella Baranoff 1932, p. 79 ¹⁾

Tainan, IV. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sturmia ♀ der *scutellata*-Gruppe Baranoff 1932, p. 81 ¹⁾

Kankau (Koshun), V. ¹⁾

Macrozenillia Townsendi Baranoff 1935, p. 553 ¹⁾

Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Sonstige Verbreitung: Japan, (Hokkaido) ¹⁾

Rhinomyodes emporomyioides Townsend 1932, p. 471 ¹⁾

Kankau, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Alsomyia anomala Villeneuve 1929, p. 65 ¹⁾

Tainan, II. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Nemorilla floralis Fallén 1820, Dipt. Suec. Musc. p. 36

DEI: (det. Villeneuve u. Baranoff): Tainan, II., V. (3); Chip Chip, II. (1); Sokutsu, IX. (6); Anping, V. (2); Kankau (Koshun), VIII., VII. (5)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Neopales javana Macquart 1850, Dipt. exot. Suppl. 4, p. 197

Tainan, IV. (DEI: 5, det. Baranoff)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Neopales pavida Meigen 1824, Syst. Besch. 4, p. 398

Chip Chip, I. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Winthemia albiceps Malloch 1930, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 55, p. 349 ¹⁾; Baranoff 1932, p. 47 ²⁾

Kankau, VII.—IX. ²⁾ (DEI: 8); Macuyama, V.—VI. ²⁾ (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: Australien

Winthemia diversa Malloch 1930, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 55, p. 348 ¹⁾; Baranoff 1932, p. 47 ²⁾

Sokutsu, IX. ²⁾ (DEI: 2); Kankau, VIII. ²⁾ (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. ²⁾ (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Australien

Winthemia diversoides Baranoff 1932, p. 47 ¹⁾

Sokutsu, IX. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Winthemia Mallochi Baranoff 1932, p. 46 ¹⁾

Kankau, VI. ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Winthemia trichopareia Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Zool. II, Dipt. p. 327 ¹⁾; Malloch 1930, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 55, p. 349 ²⁾; Baranoff 1932, p. 47 ³⁾

Sokutsu, IX. 3) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Queensland 2); ohne Fundort 1)

Winthemia xanthogaster Rondani 1859, Dipt. Ital. Prodr. 3, p. 107

Tappani, XI. (DEI: 1, det. Villeneuve)

Sonstige Verbreitung: Europa . . .

Sturmiodoria albifacies Townsend (Schreibfehler für *St. facialis* Townsend 1927, Philipp. Journ. Sci. 34, p. 392 — Philippinen?)

Kankau, IX. (DEI: 19, det. Townsend)

Podomyia setosa Doleschall 1858, Nat. Tijd. Ned. Ind. 17, p. 102

DEI (det. Villeneuve): Kanshirei, V. (1); Fuhosho, VII. (1); Kankau (Koshun), V. (4); Hoozan, II. (1); Tainan, IV. (1); „Formosa“ (1)

Sonstige Verbreitung: Amboina . . .

Eoparachaeta formosensis Townsend (in litt.)

Sollte das *Ugimyia sericariae* sein?

DEI (det. Townsend): Kankau (Koshun), VIII. (2); Chipun, VII. (1);

Toa Tsui-Kutsu, V. (4); Kosempo, V. (1); Hoozan, II. (1)

Eoparachaeta orientalis Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 70

Für diese Art gilt dasselbe wie für die vorstehende

Sokutsu, IX. (DEI: 1, det. Townsend); Macnyama, V.—VI. (DEI: 1, det. Townsend)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Eoparachaeta sturmiodoides Townsend 1927, Suppl. Ent. 16, p. 71

Tappani, IX. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Familie Anthomyiidae

Subfamilie Anthomyiinae

Pegomyia angustiventris Stein 1918, p. 159 1)

Tainan, III. 1)

Pegomyia dorsalis Stein 1915, p. 48 1); Stein 1918, p. 159 2)

Hoozan, II. 1) (DEI: 1 Typus); Tapani, II. 2); Chip Chip, II. (DEI: 1, det. Karl)

Pegomyia ovata Stein 1915, p. 47 1); Stein 1918, p. 159 2)

Hoozan, II., V. 1) 2) (DEI: 2 Typen); Chip Chip, I. 2) (DEI: 5)

Pegomyia quadricittata Karl 1935, p. 44 1)

Tainan, IV. 1); „Formosa“ (DEI: 2 „Typen“)

Hylemyia platura Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 171

Synonym: *Chortophila cilicrura* Rondani, Stein 1918, p. 160 1)

Kankau, IV. 1)

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit.

Hylemyia (Paregle) cinerella Fallén 1825, Mon. Muse. Suec., p. 77;

Stein 1915, p. 49 1) (*Chortophila*); Stein 1918, p. 160 2)

Chip Chip, I., II.¹⁾ (DEI: 37); Tainan, II., III.^{1) 2)} (DEI: 2);
Lambek, I.¹⁾; Hoozan, V.²⁾; Taihorin, VII.²⁾; Kankau, IV.²⁾;
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Daitotei, V.—VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Holarktis

Hylemyia femoralis Stein 1915, p. 47¹⁾; Stein 1918, p. 160²⁾

Chip Chip, I., II., III.^{1) 2)}; Tappani, III., IV.^{1) 2)}; Kosempo, III.^{1) 2)}

Hydrophoria aberrans Stein 1918, p. 159¹⁾

Taihorin, VII.¹⁾

Emmesomyia socia Fallén 1825, Mon. Musc. Suec., p. 82, Stein 1915,
p. 49¹⁾; Stein 1918, p. 159²⁾; Karl 1935, p. 44³⁾

Kosempo, II., III.^{1) 2)}; Chip Chip I.—III.^{1) 2) 3)} (DEI: 9); Hoozan,
II.¹⁾ (DEI: 16); Tainan, IV.³⁾ (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 2);
Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: Europa, Asien

Calythea limnophorina Stein 1915, p. 29¹⁾ (*Fallacia*); Stein 1918, p.
159²⁾; Karl 1935, p. 47³⁾

Chip Chip, I.—III.¹⁾ (DEI: 12 Typen + 3); Hoozan, I.¹⁾ (DEI:
15 Typen + 3); Kosempo, III.—IV.^{1) 2)}; Taihorin, VII.²⁾; Tainan,
IV.³⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun), VIII.³⁾ (DEI: 1)

Anthomyia amoena Macquart 1851, Dipt. exot., Suppl. 4, p. 271; Stein,
1915, p. 49¹⁾

Chip Chip, III.¹⁾ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Maskarenen, Madagaskar

Anthomyia illocata Walker 1856, Proc. Linn. Soc. Lond. 1, p. 129;
Stein 1915, p. 49¹⁾; Stein 1918, p. 158²⁾; Karl 1935, p. 47³⁾
Tainan, II., III., IV.^{1) 2) 3)} (DEI: 9); Kanshirei, IV.¹⁾ (DEI: 1);
Fuhosho, VII.¹⁾; Pilam VII.¹⁾ (DEI: 1); Paroe, IX.¹⁾ (DEI: 1);
Takao, IV., V., XI., XII.^{1) 2)}; Lambek, II.^{1) 2)}; Kankau (Koshun),
I., IV., VII.^{1) 2) 3)}; Hoozan, VIII.²⁾; Tapani, III.²⁾; Sokotsu, V.²⁾;
Anping²⁾; Taihoku, XI. (DEI: 2); Hokuto, XII. (DEI: 1); Toa
Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Borneo, Ceylon, Siam, China, Philippinen

Anthomyia maculigena Stein 1913, Ann. Mus. Nat. Hung. 11, p. 563¹⁾;
Stein 1915, p. 49²⁾

Chip Chip, III.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Afrika

Anthomyia plumiseta Stein 1918, p. 158¹⁾

Hoozan, VIII.¹⁾; Tapani, III.¹⁾; Tainan (DEI: 1, det. Karl)

Subfamilie *Fanniinae*

Fannia carbonaria Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 154; Stein 1915,
p. 28²⁾

Chip Chip, III 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa

Fannia interrupta Malloch 1914, p. 153 1)

Takao, IV. 1)

Fannia leucosticta Meigen 1826, Syst. Besch. 7, p. 328; Stein 1915, p. 28 1); Stein 1918, p. 154 2)

Tainan, III., II. 1) (DEI: 4); Pilam, VIII. 1) (DEI: 1); Takao, III., IV., VI., XI. 1)

Sonstige Verbreitung: Holarktis, Aethiop. Reg.

Fannia minutipalpis Stein 1895, Berl. Ent. Zeit. 40, p. 106; Stein 1918, p. 154 2)

Tapani, III. 2)

Sonstige Verbreitung: Europa, N.-Amerika.

Fannia prisca Stein 1918, p. 154 1); Karl 1935, p. 39 2)

Takao, IV. 1); Kankau 1); Tainan, IV. 1) 2); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1, det. Karl); „Formosa“ (DEI: 8)

Fannia spec. Stein 1915, p. 28 1)

Chip Chip, III. 1) (DEI: 1)

Euryomma peregrinum Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 187; Stein 1915, p. 28 1) (*Fannia*); Stein 1918, p. 154 2)

Anping, V. 1) (DEI: 1); Takao, III. 1) 2)

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit.

Subfamilie *Lispinae*

Lispa assimilis Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 444; Stein 1915, p. 44 1); Stein 1918, p. 157 2); Karl 1935, p. 43 3)

Anping, IX 1) (DEI: 104); Polisha, XII. 1) 2) (DEI: 117); Tainan, II., IV., XI. 1) 2) 3) (DEI: 172); Hokuto, XII. (DEI: 1); Kyokokudo, I. 1) 2); Lambek 1) 2); Takao, VI., XI., XII. 1) 2); Taihoku (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: „Asien“

Lispa bivittata Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 262 1); Stein 1915, p. 44 2); Stein 1918, p. 157 3)

Synonym: *Lispa nigrifacies* Becker 1914, p. 83 4)

Kankau, IX, VIII 2) 4) (DEI: 1 Typus von *nigrifacies*); Koreto, IX. 1) 2); Takao, XII. 1) 2); Tainan, IV. 2)

Sonstige Verbreitung: Java

Lispa flavicornis Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 260 1); Stein 1915, p. 44 2); Stein 1918, p. 157 3); Karl 1935, p. 43 4)

Synonym: *Lispa vidua* Becker 1914, p. 85 5)

Anping, V., IX., IV. 2) 3) 5) 4) (DEI: 1 Typus von *vidua* + 3); Tainan, II., XI. 2) 5) (DEI: 5); Takao, V., VI., X. 2) 3); Chip Chip, III. (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Java

Lispa Kowarzi Becker 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 116¹⁾; Becker 1914, p. 81²⁾; Stein 1915, p. 43³⁾; Stein 1918, p. 157⁴⁾; Karl 1935, p. 44⁵⁾

Tainan, II., IV., V. XI. 2—5) (DEI: 237); Anping, IX. 3) (DEI: 4); Kanshirei, IV. 3) (DEI: 2); Kagi, VIII. 3) 4); Takao, XI., XII., VIII., X. 3) 4)

Sonstige Verbreitung: Afrika

Lispa leucospila Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 441; Becker 1914, p. 86¹⁾; Stein 1915, p. 44²⁾; Stein 1918, p. 157³⁾; Karl 1935, p. 44⁴⁾

Pilam, VII., VIII. 1) 3) 4); Kankau, VII., IX. 1) (DEI: 2); Sokotsu, VII.—IX. 1); Taihoku, XII. (DEI: 4); Takao, V., XI. 2) 3); Anping IX., XI. 2) 3) 4) (DEI: 9); Chip Chip, III. 2) (DEI: 1); Kagi, VIII. 2) 3); Lambeh, I. 2) 3); Polisha, XII. 2); Tainan, X. 2) 3) (DEI: 4); Tapani, III. 3); Taihorin, VII. 3); Maruyama, XI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Afrika, Asien

Lispa nuba Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 444; Becker 1914, p. 85¹⁾

Tainan, II. 1) (DEI: 14); Kankau, VII., IX. 1) (DEI: 2); Polisha, XII. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Afrika

Lispa orientalis Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 444; Stein 1915, p. 44¹⁾; Stein 1918, p. 157²⁾; Karl 1935, p. 44³⁾

Synonym: *Lispa opaca* Becker 1914, p. 82⁴⁾

Kosempo, IV., V. 1) 3) (DEI: 2 „Typen“ von *opaca* + 16); Anping, IX. 1) 4) (DEI: 2 Typen von *opaca* + 15); Takao, V. 1) (DEI: 1); Chip Chip, I., III. 1) (DEI: 5); Tainan, II., IV., X., XI. 1) 2) 3) 4) (DEI: 6 Typen von *opaca* + 138); Koshun, II., V., IX. 1) 2) 3) (DEI: 1); Polisha, III. 1) 2); Tappani, III. 2); Kankau 2); Pilam, VIII. 2); Sokutsu, IX. 4) (DEI: 12 Typen von *opaca* + 5); Chosokei (DEI: 1); Taihoku-Distr., Gai-So-Kai V. (DEI: 1); Taihoku, I., XI. 3) (DEI: 5); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 1); Yamo-no-Taiko, IX. (DEI: 6)

Sonstige Verbreitung: Indien, China

Lispa patellitarsis Becker 1914, p. 87, Fig. 1); Stein 1915, p. 43²⁾; Stein 1918, p. 157³⁾; Karl 1935, p. 44⁴⁾

Anping, IV., V., VI., IX. 1) 2) 3) 4) (DEI: 1 Typus + 3)

Lispa pumila Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 439; Stein 1915, p. 44¹⁾; Stein 1918, p. 157²⁾; Karl 1935, p. 44³⁾

Synonym: *Lispa ignobilis* Stein 1910, Ann. Mus. Nat. Hung. 8, p. 562⁴⁾; *Lispa proletaria* Becker 1914, p. 80⁵⁾

Tainan, II., XI. 1) 2) 3) 5) (DEI: 273 Typen von *proletaria* + 633); Anping, IX. 1) (DEI: 11); Chip Chip, III. 1) (DEI: 1); Takao, VII., XI., XII. 1) 2); Lambek, I., II. 1) 2); Kosempo 1) 2); Akau 1) 2)

Sonstige Verbreitung: Indien, Australien

Lispa pygmaea Fallén 1825, Mon. Musc. Suec. p. 94; Stein 1915, p. 44 1)

Tainan, II., III. 1) (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Europa, Afrika, Asien, Honolulu

Lispa sericipalpis Stein 1904, Tijd. Ent. 47, p. 110 1); Stein 1918, p. 157 2)

Hoozan, V. 2); Tapani, III. 2); Taihoku 2); Tainan, IV. 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Ceylon

Lispa tetrastigma Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt. p. 297; Stein

1918, p. 157 1); Karl 1935, p. 43 2)

Synonym (nach Stein 1918): *Lispa determinata* Becker 1914, p. 86 3); Stein 1915, p. 43 4)

Anping, IX., VI. 1) 3) 4) (DEI: 3 Typen + 12); Tainan, II., XI. 1) 3) 4) 2) (DEI: 15 Typen von *determinata* + 36); Takao, VI., VII. 1) 4)

Sonstige Verbreitung: Australien

Lispa vittipennis Thomson 1868, Eugenes Resa, Dipt., p. 561 1); Stein 1918, p. 157 2)

Kankau 2); Tainan, IV. 2)

Sonstige Verbreitung: China

Chaetolispa geniseta Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 256 1); Becker 1914, p. 82 2) (*Lispa*); Stein 1915, p. 44 3); Stein 1918, p. 157 4); Karl 1935, p. 43 5)

Anping, IX. 3) 4) (DEI: 9); Tainan, II., XI. 3) 5) 2) (DEI: 79); Lambek, I., III. 3) 4); Kosempo, II., III. 3) 4); Takao, XI., XII. 4); Chip Chip, II. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Ceylon

Xenolispa binotata Becker 1914, p. 81 1) (*Lispa*); Stein 1915, p. 43 2); Stein 1918, p. 157 3); Karl 1935, p. 43 4)

Tainan, V., II. 1) 4) (DEI: 2 Typen + 3); Kankau, VIII., IX. 1) 3) (DEI: 3 Typen + 17); Koshun, V., IX., X., XII., III. 1—3) (DEI: 5 Typen + 25); Koseto, IX. 2); Kosempo, V. 1) 3) 4) (DEI: 3 Typen + 3); Pilam, VII. 1) (DEI: 2 Typen); Takao, VI. 3); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1)

Subfamilie *Coenosini*

Pygophora confusa Stein 1915, p. 54 1); Stein 1918, p. 164 2); Karl 1935, p. 48 3)

Tainan, II., IV. 1) 3) (DEI: 2 Typen), Yentempo, V. 1) 2); „Formosa“ (DEI: 1)

- Pygophora lobata* Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 271¹⁾; Stein 1915, p. 55²⁾; Stein 1918, p. 164³⁾; Karl 1935, p. 48⁴⁾
Koshun, I., IX. 2)³⁾ (DEI: 5); Tainan, II. 2) (DEI: 3); Kanshirei, IV. 2)⁴⁾ (DEI: 2); Alikang, VI. 2) (DEI: 1); Chipun, VII. 2) (DEI: 1); Kankau, VIII, IX., XI. 2)³⁾ 4) (DEI: 11); Paroe, IX. 2) (DEI: 2); Takao, III., V., X.—XII. 2)³⁾; Lambek, II. 2)³⁾; Kosempo, III. 2)³⁾
Sonstige Verbreitung: Neuguinea, Seychellen, Christmas
- Pygophora maculipennis* Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 271¹⁾; Stein 1915, p. 55²⁾; Stein 1918, p. 164³⁾
Koshun, I., IX. 2)³⁾ (DEI: 1); Paroe, IX. 2) (DEI: 1); Kankau, VII., VIII. 2)³⁾ (DEI: 1); Takao, III., XI., XII. 2)³⁾; Tapani, III. 3)
Sonstige Verbreitung: Krakatau
- Pygophora torrida* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 437
Synonym *Coenosia macularis* Wiedemann 1830, l. c., p. 438; Stein 1915, p. 53¹⁾; Stein 1918, p. 162²⁾
Suihenkyaku, VIII. 1) (DEI: 1); Tainan, II. 1) (DEI: 9); Koshun, I. 1) (DEI: 2); Chip Chip, II. 1) (DEI: 4); Alikang, VI. 1); Hoozan, II. 1) (DEI: 1); Kankau, IX. 1) (DEI: 3); Takao, VI. 1); Kosempo, I. 1) 2); Taihorin, VII. 2); Takao, VI., VIII., XII. 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1); Taihoku, XI. (DEI: 3); Hokuto, XII. (DEI: 2); Dai-totei, V.—VI. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: China, Sumatra
- Orchisia costata* Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 266; Stein 1915, p. 43¹⁾; Stein 1918, p. 164
Tainan, II. 1) (DEI: 2); Taihoku-Distr., Maruyama, XII. (DEI: 3)
Sonstige Verbreitung: Europa, China, Afrika, Madagaskar
- Coenosia atrimaculata* Stein 1915, p. 50¹⁾; Stein 1918, p. 160²⁾
Tappani, IV. 1) (DEI: 1 Typus); Hoozan, I., VIII. 1) 2) (DEI: 1 Typus); Koshun, X. 1) 2); Chip Chip, I., III. 1) 2); Taihorin, VII. 2); Hokuto, XII. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)
- Coenosia attenuata* Stein 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 121¹⁾; Stein 1915, p. 54²⁾; Stein 1918, p. 160³⁾
Tainan, II., IV. 2)³⁾ (DEI: 104); Anping, V. 2) (DEI: 1); Chipun, VII. 2) (DEI: 5); Pilam, VII. 2) (DEI: 19); Takao, III. 2)³⁾
Sonstige Verbreitung: Afrika, Kanarische Inseln, Syrien
- Coenosia cingulata* Stein 1918, p. 160¹⁾
Kosempo, VI. 1); Chip Chip, I. 1); Tapani, III. 1); Taihorin, VII. 1)
- Coenosia humilis* Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 220
Tainan, II. (DEI: 2 det. Karl)
Sonstige Verbreitung: Europa, Afrika
- Coenosia lepidofera* Stein 1915, p. 50¹⁾
Paroe, IX. 1) (DEI: 4 Typen)

Coenosia longicornis Stein 1918, p. 161¹⁾

Tapani, III. 1)

Coenosia nigribasis Stein 1915, p. 51¹⁾

Kosempo, V. 1) (DEI: 1 Typus)

Coenosia pallens Stein 1915, p. 52¹⁾; Stein 1918, p. 162²⁾

Tapani, III. 2) (DEI: 2); Taihorin, VII. 2); Kosempo, V. 1) 2) (DEI: 1 Typus); Sokutsu, VI. 1) (DEI: 1 Typus); Takao, III., IV., XI., XII. 1) 2); Lambek, II. 1) 2); Hoozan, VIII. 2); Taihorinsho, VII. 1)

Coenosia pumilio Stein 1900, Term. Füzetek 23, p. 151¹⁾; Stein 1918, p. 162²⁾

Takao, V., XII. 2); Anping, VI. 2)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea

Coenosia radiata Stein 1918, p. 162¹⁾; Karl 1935, p. 49²⁾

Sokotsu, V. 1); Tainan, IV. 2); „Formosa“ (DEI: 1, det. Karl)

Coenosia strigipes Stein 1918, p. 163¹⁾

Synonym (nach Stein): „*Coenosia cingulipes* Zett.“ Stein 1915, p. 54²⁾

Takao, V. 1) 2); Koshun, III. 1) 2); Tainan, II., X. 1) 2) (DEI: 4); Chip Chip, III. 1) 2); Taihoku, IV. 1); Kankau, IV., VII. 1) 2); Pilam 2) (DEI: 1); Anping, V. 2) (DEI: 1)

Coenosia trigonalis Stein 1918, p. 163¹⁾

Taihoku, IV. 1)

Atherigona bella Frey 1917, Ofv. Finsk. Vet. Förh. 59, p. 17, 22 [*Coenosia*]

Taihoku (DEI: 1 det. Karl)

Sonstige Verbreitung: Ceylon

Atherigona biseta Karl 1939, p. 279¹⁾

Toa Tsui Kutsu, V. 1) (DEI: 1 det. Karl)

Atherigona bituberculata Malloch 1925, Mem. Dept. Agr. Ind. 8, p. 119¹⁾;

Karl 1935, p. 47²⁾

Chipun, VII. 2) (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1); Taihoku (DEI: 1); Maruyama, XI. (DEI: 2); Okaseki, VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien

Atherigona crassiseta Stein 1915, p. 41¹⁾ (*Acritochaeta*); Stein 1918, p. 158²⁾; Karl 1935, p. 47³⁾

Chip Chip, I. 1) (DEI: 1 Typus); Hoozan, VIII. 2); Tainan, IV. 3) (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 8)

Atherigona dorsovittata Malloch 1928, Ent. Mitt. Vol. 17, p. 300

Kankau, III. (DEI: 1 det. Karl); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1 det. Karl)

Sonstige Verbreitung: Sumatra

Atherigona erichloae Malloch 1925, Mem. Dept. Agric. India 8, p. 117

Taihoku (DEI: 1 det. Karl)

Sonstige Verbreitung: Indien

Atherigona excisa Thomson 1868, Eugen. Resa, Dipt., p. 560; Stein 1915, p. 42¹⁾ (*Acritochaeta*); Stein 1918, p. 158²⁾; Karl 1935, p. 47³⁾

Takao, III., XI.^{1) 2)}; Koshun, III., XI.^{1) 2)}; Anping, V.^{1) 2)}; Tainan, II., IV., V.^{1) 2) 3)} (DEI: 5); Pilam, VII.¹⁾ (DEI: 1); Chipun, VII.¹⁾ (DEI: 1); Kankau, VIII.¹⁾ (DEI: 1); Paroe, IX.¹⁾ (DEI: 1); Chip Chip, II. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Seychellen, Java, Neu-Guinea, Ins. Ross., Hawaii, Aegypten, Kanar. Inseln

Atherigona exigua Stein 1900, Term. Füzetek, 23, p. 157¹⁾; Stein 1915, p. 41²⁾; Stein 1918, p. 158³⁾

Tainan, II., IV.^{2) 3)} (DEI: 33); Chipun, VII.²⁾ (DEI: 35); Pilam, VII.²⁾ (DEI: 27); Yentempo, V.^{2) 3)}; Takao, X.^{2) 3)}; Paroe (DEI: 1); Lambek, I.^{2) 3)}; Kosempo, II., III.^{2) 3)}; Chip Chip, III.^{2) 3)}; Kankau, IX. (DEI: 4)

Sonstige Verbreitung: Indien

Atherigona laeta Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 440; Stein 1913, Ann. Mus. Nat. Hung. 11, p. 536¹⁾; Stein 1915, p. 41²⁾; Stein 1918, p. 158³⁾

Tainan, II., VI., XI.²⁾ (DEI: 90); Polisha, II., XII.^{2) 3)} (DEI: 13); Takao, V., VIII., X.^{2) 3)}; Chip Chip, II.³⁾; Pilam, VIII.³⁾; Taihoku, IV.³⁾ (DEI: 1); Anping, V. (DEI: 12)

Sonstige Verbreitung: Afrika, Aegypten, Seychellen, Indien

Atherigona maculigera Stein 1910, Ann. Mus. Nat. Hung. 8, p. 560¹⁾; Stein 1915, p. 40²⁾; Stein 1918, p. 158³⁾; Karl 1935, p. 47⁴⁾ Chip Chip, I., II.^{2) 3)} (DEI: 7); Kankau, IV.³⁾; Tainan, IV.⁴⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Australien

Atherigona nigripes Stein 1900, Term. Füzetek 23, p. 155¹⁾; Stein 1918, p. 158²⁾

Tapani, III.²⁾

Sonstige Verbreitung: Afrika, Neuguinea¹⁾

Atherigona punctata Karl 1940, p. 147¹⁾

Tainan¹⁾ (DEI: 5 Typen); Taihoku¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Atherigona quadripunctata Rossi 1794, Mant. Ins. 2, p. 71

Synonym: *varia* Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 187; Stein 1915, p. 41¹⁾; Stein 1918, p. 158²⁾

Tainan, II.^{1) 2)} (DEI: 3); Chip Chip, III.^{1) 2)} (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa, Afrika, Vorder-Asien

*Lispocephala erythrocer*a Robineau-Desvoidy 1830, Essai sur les Myod., p. 534; ? Stein 1918, p. 157¹⁾

Kankau ¹⁾; Taihoku, IV. ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Holarktis

Lispocephala flavibasis Stein 1915, p. 46 ¹⁾

Tainan, II. ¹⁾; Chip Chip, III. ¹⁾; Hokuto, XII. (DEI: 2 „Typen“);

Taihoku, XI. (DEI: 1); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)

Lispocephala miki Strobl 1893, Wien. Ent. Zeit. 12, p. 107 ¹⁾; Karl 1935, p. 47 ²⁾

Tainan, IV. ²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa

Pectiniseta prominens Stein 1910, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. 71, p. 152 ¹⁾; Malloch 1928, p. 315 ²⁾

Formosa ²⁾

Sonstige Verbreitung: Sokotra, Hinterindien

Subfamilie *Phaoniinae*

Limnophora albitarsis Stein 1915, p. 34 ¹⁾; Stein 1918, p. 155 ²⁾

Takao, III. ¹⁾ ²⁾; Tainan, IV., V. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 1 Typus)

Limnophora ascendens Stein 1915, p. 32 ¹⁾; Stein 1918, p. 155 ²⁾; Karl 1935, p. 42 ³⁾

Chip Chip, I., III. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 3 Typen); Kanshirei, V. ¹⁾ (DEI: 1);

Kankau, V., VI. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 3 Typen); Yentempo, V. ¹⁾ ²⁾; Koshun

III. ¹⁾ ²⁾; Taihorin, VII. ²⁾; Tainan, IV., V. ²⁾ ³⁾ (DEI: 2); Taihoku-

Distr., Okaseki, IV., VI. ³⁾ (DEI: 5); Hokuto, XII. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 16, det. Karl)

Limnophora Beckeri Stein 1908, Mitt. zool. Mus. Berlin 4, p. 104 ¹⁾; Stein 1918, p. 155 ²⁾

Taihorin, VII. ²⁾; Taihoku, IV. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Kanar. Inseln

Limnophora breviventris Stein 1915, p. 33 ¹⁾; Karl 1935, p. 43 ²⁾

Chip Chip, III. ¹⁾ (DEI: 1 Typus); Tainan, IV. ²⁾; „Formosa“ (DEI: 1)

Limnophora conica Stein 1915, p. 30 ¹⁾; Stein 1918, p. 155 ²⁾; Karl 1935, p. 43 ³⁾

Chip Chip, III. ¹⁾ (DEI: 3 Typen); Tappani, III., IV. ¹⁾ ²⁾ (DEI:

1); Hoozan, I. ¹⁾ (DEI: 2 Typen); Taihorin, VII. ²⁾; Tainan, IV. ³⁾

(DEI: 5)

Limnophora distincta Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 251 ¹⁾; Stein 1915, p. 37 ²⁾; Stein 1918, p. 155 ³⁾; Karl 1935, p. 43 ⁴⁾

Chipun, VII. ²⁾ ⁴⁾ (DEI: 2); Tainan, V., VII. ²⁾ ³⁾ (DEI: 1); Kan-

kau, V., VIII. ²⁾ ³⁾ (DEI: 1); Yentempo, IV., V. ²⁾ ³⁾; Takao, XII. ²⁾ ³⁾;

Akau, XII. ²⁾ ³⁾; „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java

Limnophora exsurda Pandellé 1899, Rev. Ent. 18, p. 126

Kosempo, V. (DEI: 1, det. Stein)

Sonstige Verbreitung: Europa

Limnophora fallax Stein 1920, Tijds. Ent. 62, Suppl., p. 72¹⁾; Karl 1935, p. 43²⁾

Synonym: „*Limnophora maculosa* Meigen“ Stein 1915, p. 37³⁾; Stein 1918, p. 155⁴⁾

Hoozan, II.³⁾ (DEI: 1); Kosempo, II., V.³⁾⁴⁾ (DEI: 1); Sokutsu, IX.³⁾ (DEI: 1); Tainan, IV., V.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mittel- und Nordeuropa

Limnophora flavifrons Stein 1915, p. 35¹⁾; Stein 1918, p. 155²⁾

Anping, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Takao, VI.¹⁾²⁾

Limnophora insignis Stein 1900, Ann. Mus. Genova 20, p. 390¹⁾; Stein 1918, p. 155²⁾; Karl 1935, p. 43³⁾

Chip Chip, I.²⁾; Taihorinsbo, VII.²⁾; Tainan, IV.³⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Neuguinea

Limnophora obsignata Rondani 1866, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 5, p. 117; Stein 1915, p. 36¹⁾

Chip Chip, I.¹⁾; Anping, V.¹⁾; Takao, VI., IX., XII.¹⁾ (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Mediterrane Region

Limnophora plumiseta Stein 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 109¹⁾; Stein 1915, p. 36²⁾; Stein 1918, p. 155³⁾

Tainan, II.²⁾³⁾ (DEI: 4); Hoozan, II.²⁾; Kankau, VI.²⁾; Pilam, VII.²⁾; (DEI: 1); Sokutsu, IX., V.²⁾³⁾; (DEI: 1); Takao, I., IV., V., XI., XII.²⁾³⁾; Koshun, X.²⁾³⁾; Taihoku, XI. (DEI: 1); Taihoku-Distr., Okaseki, VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Aegypten, Abessinien.

Limnophora spoliata Stein 1915, p. 31¹⁾; Stein 1918, p. 155²⁾; Karl 1935, p. 43³⁾

Tappani, IV.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Hoozan, I.¹⁾ (DEI: 5 Typen); Kosempo, V.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Chip Chip, III., XI.¹⁾²⁾ (DEI: 1 Typus); Taihorin, VII.²⁾; Tainan, IV.³⁾; „Formosa“ (DEI: 6)

Limnophora subtilis Stein 1909, Tijds. Ent. 12, p. 249¹⁾

Pilam, VII. (DEI: 1, det. Stein)

Sonstige Verbreitung: Java, S.-Afrika

Limnophora suturalis Stein 1918, p. 155¹⁾

Takao, IV., VI., XI., XII.¹⁾ (DEI: 2); Anping, V. (DEI: 7, det. Stein)

Limnophora tonitruui Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 429; Stein 1915, p. 36¹⁾; Stein 1918, p. 155²⁾; Karl 1935, p. 43³⁾

Tainan, II.¹⁾³⁾ (DEI: 2); Anping, V.¹⁾ (DEI: 1); Takao, IV., V., VII.¹⁾²⁾; Lambek, I.¹⁾²⁾; Kosempo, III.¹⁾²⁾; Kankau, IV.²⁾

Sonstige Verbreitung: Afrika, Mauritius

- Limnophora tonsa* Stein, Tijds. Ent. 52, p. 245¹⁾; Stein 1915, p. 36²⁾; Stein 1918, p. 156³⁾; Karl 1935, p. 43⁴⁾
 Kosempo, II., III. 2)³⁾ (DEI: 2); Chip Chip, I. 2) (DEI: 1); Hoozan, II. 2) (DEI: 1); Tapani, III. 3); Taihorin, VII. 3); Tainan, IV. 4) (DEI: 32)
 Sonstige Verbreitung: Java
- Limnophora veniseta* Stein 1920, Tijds. Ent. 62, Suppl., p. 56¹⁾
 Taihoku-Distr., Okaseki, VII. 1) (DEI: 3)
 Sonstige Verbreitung: Java
- Anaclysta flexa* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 434; Stein 1918, p. 156¹⁾
 Takao, IV. 1)
 Sonstige Verbreitung: Tranquebar
- Hebecnema fumosa* Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 109; Stein 1915, p. 26¹⁾
 Chip Chip, II. 1) (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1, det. Malloch)
 Sonstige Verbreitung: Europa, N.-Amerika
- Hebecnema umbratica* Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 88; Stein 1918, p. 151¹⁾
 Chip Chip, I. 1); Tapani, III. 1); Kankau 1); Taihorin, IV. 1)
 Sonstige Verbreitung: Europa, N.-Amerika
- Mydaea antennata* Stein 1918, p. 151¹⁾
 Tapani, VI. 1)
- Mydaea arminervis* Stein 1900, Term. Füzetek 23, p. 138¹⁾; Stein 1915, p. 23²⁾; Stein 1918, p. 152³⁾
 Kosempo, I., III. 2)³⁾; Takao, V. 2)³⁾; Koroton, IX. 3); Hoozan, VIII., II. 2)³⁾ (DEI: 1); Tapani, III. 3); Chip Chip, II., III., V. 2) (DEI: 1)
 Sonstige Verbreitung: Neu-Guinea
- Mydaea duplicata* Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 92; Stein 1915, p. 26¹⁾
 Tainan, VII. 1)
 Sonstige Verbreitung: Holarktis
- Mydaea longicornis* Stein 1915, p. 15¹⁾; Malloch 1928, Ann. Mag. N. H. (10) 2, p. 312²⁾ (*Pendleburya*); Stein 1918, p. 153³⁾
 Chip Chip, I. 1)³⁾ (DEI: 1 Typus)
- Mydaea pectinipes* Stein 1909, Tijds. Ent. 52, p. 23¹⁾; Stein 1915, p. 23²⁾; Stein 1918, p. 153³⁾
 Koshun, X. 2); Tapani, III. 3)
 Sonstige Verbreitung: Ceylon, Java, Hinterindien
- Mydaea uliginosa* Fallén 1825, Mon. Musc. Suec., p. 81; Stein 1915, p. 26¹⁾; Stein 1918, p. 154²⁾

Anping, V. 1) 2); Yentempo, V. 1) 2); Takao, IV. 1) 2)

Sonstige Verbreitung: Holarktis

Eumydaea argentata Walker 1856, Proc. Linn. Soc. London 1, p. 27; Stein 1915, p. 25 1) (*Mydaea*); Stein 1918, p. 152 2); Karl 1935, p. 41 3)

Tainan, IV. 3) (DEI: 2); Kosempo, II. 1) 2); Koshun, III., X. 1) 2) (DEI: 1); Chip Chip, I, III. 1) (DEI: 6); Fuhosho, III. 1) (DEI: 1); Hoozan, II. 1) 2) (DEI: 1); Kankau, VII. 1); Polisha, III. 1) 2); Tapani 2)

Sonstige Verbreitung: Java, Celebes

Eumydaea attenta Stein 1918, Ann. Mus. Nat. Hung. 16, p. 167 1); Karl 1935, p. 41 2)

Tainan, IV. 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Kalkutta 1)

Helina coronata Stein 1915, p. 19 1); Stein 1918, p. 152 2); Karl 1935, p. 41 3)

Chip Chip, I., II., III. 1) 2) (DEI: 7 Typen); Fuhosho, III. 1) (DEI: 1 Typus); Hoozan, II. 1) (DEI: 1 Typus + 3); Kosempo, II.—III. 1) 2); Tapani, III. 2); Taihorin, V., VII. 2); Tainan 3) (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Helina nemorum Stein 1915, p. 19 1) (*Mydaea*); Stein 1918, p. 153 2) Hoozan, II., V. 1) 2) (DEI: 3 Typen)

Helina nervosa Stein 1909, Tijds. Ent. 52, p. 240 1); Stein 1915, p. 16 2); Stein 1918, p. 153 3)

Chip Chip, I. 2) (DEI: 1); Tainan, III. 3); Chipun, VII. 2) (DEI: 1); Kankau 2); Pilam, VII. 2) (DEI: 1); Kosempo, I. 2) 3); Takao, XII. 3)

Sonstige Verbreitung: Java

Helina propinqua Stein 1900, Ann. Mus. Genova 20, p. 386 1); Stein 1915, p. 26 2) (*Mydaea*); Stein 1918, p. 153 3)

Koshun, IX., X. 2) 3) (DEI: 3); Chip Chip, I. 2) (DEI: 1); Tainan, V. 2) 3); Kankau, VII., IX. 2) 3) (DEI: 1); Takao, XI., XII. 2) 3); Yentempo 2) 3); Tapani, III. 3); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Molukken

Dichaetomyia alterna Stein 1915, p. 18 1); Stein 1918, p. 151 2) (*Mydaea*) Kosempo, VI. 1) 2); Koshun 2); Chip Chip, II. 1) (DEI: 1 Typus).

Dichaetomyia apicalis Stein 1904, Tijds. Ent. 47, p. 103 1); Stein 1915, p. 22 2); Stein 1918, p. 152 3); Karl 1935, p. 41 4)

Kosempo, III., VI. 2) 3) 4); Koshun, IX., X. 2) (DEI: 10); Polisha, I., III., XII. 2) 3) (DEI: 1); Chip Chip, II., III. 2) (DEI: 2); Kanshirei, IV. 2) (DEI: 1); Hoozan, V., VIII. 2) 3) (DEI: 1); Sokutsu, VI. 2); Tapani, III. 3); Tainan, IV. 4) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Java, Afrika

- Dichaetomyia crassicauda* Stein 1900, Term. Füz. 23, p. 135¹⁾; Karl 1935, p. 41²⁾
Kanshizei, IV.²⁾ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Neu-Guinea
- Dichaetomyia femorata* Stein 1915, p. 21¹⁾ (*Mydaea*); Karl 1935, p. 41²⁾
Hoozan, II.¹⁾ (DEI: 1 Typus); „Formosa“²⁾ (DEI: 1)
- Dichaetomyia flavipalpis* Stein 1915, p. 17¹⁾ (*Mydaea*); Stein 1918, p. 152²⁾; Karl 1935, p. 41³⁾
Koshun, X.¹⁾ (DEI: 2 Typen + 1); Polisha, II., XII.^{1) 2) 3)} (DEI: 2 Typen + 6); Chip Chip, I.—III.^{1) 2)} (DEI: 1 Typus + 3); Hoozan, II., V.^{1) 2)} (DEI: 7 Typen + 1); Pilam, II.¹⁾; Kosempo, III., XI., XII., I.—III.^{1) 2)} (DEI: 1); Tappani, III.²⁾; Kankau, IV.²⁾; Tainan, IV.³⁾ (DEI: 4); „Formosa“ (DEI: 1)
- Dichaetomyia laeviventris* Stein 1915, p. 16¹⁾ (*Mydaea*); Karl 1935, p. 41²⁾
Akan, XI., XII.¹⁾ (DEI: 1 Typus); Kosempo, I.¹⁾; Koshun, X.¹⁾ (DEI: 6 Typen + 2); Polisha, XII.¹⁾ (DEI: 1); Chip Chip, I., II.¹⁾ (DEI: 4 Typen + 17); Hoozan, II.¹⁾ (DEI: 7 Typen + 2); Kankau, V.¹⁾; Tainan, IV.²⁾ (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1); Takao, V. (DEI: 1 „Typus“); Chosokei (DEI: 13); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1); Nördl. Taiwan-Distr., Shinsinei, 4000 ft., XII. (DEI: 1)
- Dichaetomyia pallicornis* Stein 1915, p. 14¹⁾ (*Mydaea*); Stein 1918, p. 153²⁾; Karl 1935, p. 42³⁾
Kosempo, XI., III., IV.^{1) 2)}; Koshun, III., X.^{1) 3)} (DEI: 2); Fuhosho, VII.^{1) 2)} (DEI: 2 Typen); Sokutsu, VI.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Tainan, IV.³⁾ (DEI: 1)
- Dichaetomyia pallitarsis* Stein 1909, Tijd. Ent. 52, p. 236¹⁾; Stein 1918, p. 153²⁾ (*Mydaea*)
Tapani²⁾; Kanshizei, IV. (DEI: 1, det. Malloch)
Sonstige Verbreitung: Java, Hinterindien
- Dichaetomyia quadrata* Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 428; Stein 1918, p. 153¹⁾ (*Mydaea*); Karl 1935, p. 42²⁾
Takao, V., VI.^{2) 3)} (DEI: 1); Yentempo, V.¹⁾; Koshun, VIII.¹⁾; Chip Chip, I.¹⁾; Taihorin, VII.¹⁾; Kankau, VII., VIII.¹⁾ (DEI: 12); Tainan²⁾; Chosokei (DEI: 2, det. Malloch); „Formosa“ (DEI: 1)
Sonstige Verbreitung: Java, Afrika
- Dichaetomyia lineata* Stein 1904, Tijd. Ent. 47, p. 102¹⁾; Stein 1915, p. 22²⁾ (*Mydaea*)
Nach Stein 1918, Ann. Mus. Nat. Hung. 16, p. 154 höchstwahrscheinlich Synonym zu *quadrata* (vorstehende Art)
Takao, VI.²⁾; Yentempo, V.²⁾; Chip Chip, VIII.²⁾ (DEI: 2);

Koshun, VIII. 2) (DEI: 5); Kanshirei, IV. 2) (DEI: 1); Kankau, VII. 2) (DEI: 13)

Sonstige Verbreitung: Java

Dichaetomyia rufescens Stein 1900, Term. Füzetek 23, p. 134 1); Karl 1935, p. 42 2)

Formosa 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Neu-Guinea

Xenosia flavibasis Malloch 1925, p. 510 1)

Chosokei 1) (DEI: 2 Typen); Toa Tsui Kutsu 1) (DEI: 1 Typus)

Xenosia lauta Stein 1918, p. 152 1) (*Mydaea*); Karl 1935, p. 42 2) (*Dichaetomyia*)

Takao, XI., XII. 1) 2); Koshun, III. 1) (DEI: 2); Tapani, III. 1); „Formosa“ 2) (DEI: 1); Chosokei (DEI: 3, det. Malloch)

Sonstige Verbreitung: Hongkong 1)

Xenosia pudica Stein 1915, p. 21 1) (*Mydaea*); Stein 1918, p. 153 2) Tainan, V. 1) 2); Sokutsu, IX. 1) (DEI: 3 Typen); Akau, XII. 1) 2); Koshun, III. 1) (DEI: 1 Typus); Kankau, V., XI. 2) (DEI: 1); Kosempo, IV. 2); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 1)

Xenosia sparsiseta Stein 1915, p. 20 1); Stein 1918, p. 154 2)

Chip Chip, III. 1) (DEI: 2 Typen); Kosempo, III. 1) 2); Koshun, X. 1) 2)

Xenosia unguolata Stein 1909, Tijds. Ent. 52, p. 233 1) (*Mydaea*); Stein 1915, p. 24 2); Stein 1918, p. 154 3); Malloch 1922, Ann. Mag. N. H. (9) 10, p. 574 4); Karl 1935, p. 42 5)

Kankau (Koshun), VII., VIII., III., V., IX., X. 2) 3) 5) (DEI: 9); Tainan, IV., V., VI. 2) 3) 5) (DEI: 3); Takao, XII. 3); Kyukokudo 3); Kosempo, I. 3); Lambek, II. 3); Pilam, II. 3); Hoozan, VIII. 3); Anping, V. 3)

Sonstige Verbreitung: Java, Indien, Ceylon 4)

Hydrotaea affinis Karl 1935, p. 38 1)

Tainan, IV. 1) (DEI: 5 Typen)

Hydrotaea occulta Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 133, 90 (*Anthomyia*)

Kankau (Koshun), VI. (DEI: 1, det. Karl)

Sonstige Verbreitung: Holarktis

Hydrotaea spec. Stein 1915, p. 27 1)

Hoozan, II. 1)

Parahydrotaea jacobsoni Stein 1919, Arch. Nat. 83 A. 1, p. 129 1)

Taihoku-Distr., Okaseki, VI. (DEI: 1, var. 1)

Sonstige Verbreitung: Java

Ophyra chalcogaster Wiedemann 1830, Auss. zweif. Ins. 2, p. 427; Stein 1915, p. 26 1); Stein 1918, p. 154 2)

Kanshirei, IV. 1) (DEI: 8); Tainan, III., V. 1) (DEI: 38); Anping,

V. 1); Kankau, VII. 1); Paroe, IX. 1); Yentempo, V. 1); Kagi, VIII. 1); Koshun, III. 1) (DEI: 1); Takao, VI. 1); Kosempo, VII. 1); Chip Chip, III. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 9); Hokuto, XII. (DEI: 1); Taihoku, XI. (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 7)

Sonstige Verbreitung: Palaeotrop. Regionen

Ophyra nigra Wiedemann 1830, Ans. zweifl. Ins. 2, p. 432

DEI (det. Malloch): Tainan, II. (1); Macuyama, V.—VI. (2); Kankau (Koshun), IV., IX. (14)

Sonstige Verbreitung: China

Ophyra simplex Stein 1915, p. 27 1); Stein 1918, p. 154 2)

Chip Chip, I. 1) (DEI: 3 Typen); Hoozan, II. 1) (DEI: 1 Typus); Kosempo, III., V. 1) 2)

Ophyra spinigera Stein 1910, Ann. Mus. Nat. Hung. 8, p. 555 1); Stein 1918, p. 154 2)

Takao, XI. 2)

Sonstige Verbreitung: Indien

Phaonia fuscata Fallén 1825, Mon. Musc. Suec., p. 85; Stein 1918, p. 151 1); Karl 1935, p. 37 2)

Kosempo, III. 1); Formosa 2) (DEI: 1); Tainan (DEI: 1); Toa Tsu, Kutsu, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Europa

Phaonia mystica Meigen 1826, Syst. Besch. 5, p. 126; Stein 1918, p. 151 1)

Kosempo, III. 1); Chip Chip, II. 1)

Sonstige Verbreitung: Mittel-Europa

Phaonia palpata Stein 1897, Ent. Nachr. 23, p. 322 1); Stein 1915, p. 14 2)

Chip Chip, I. 2) (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mittel-Europa

Muscina stabulans Fallén 1823, Mon. Musc. Suec., p. 52; Karl 1935, p. 37 1) Formosa 1)

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit

Subfamilie *Eginiinae*

Eginiella brunnescens Malloch 1925, Ann. Mag. N. H. (9) 16 p. 93 1); Karl 1935, p. 40 2)

Tainan, IV. 2) (DEI: 5)

Sonstige Verbreitung: China

Subfamilie *Muscinae*

Passeromyia heterochaeta Villeneuve 1915, Bull. Soc. Ent. France 84, p. 225 (*Muscina*)

„Formosa“ n. Séguy, Gen. Ins. 205, p. 383

Sonstige Verbreitung: Afrika, Orient. Region

Graphomyia maculata Scopoli 1763, Ent. Carn. Vind., p. 326, Karl 1935, p. 37¹⁾

Formosa¹⁾ (DEI: 1)

Graphomyia rufitibia Stein 1918, p. 147¹⁾; Karl 1935, p. 37²⁾

Kosempo¹⁾; Kankau (Koshun), VII., IX.^{1) 2)} (DEI: 3); Polisha, III.¹⁾; Takao, IV.¹⁾; Kanshirei, IV.¹⁾ (DEI: 2); Tainan, II., V.²⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Tsingtau

Morellia hortensia Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 413; Stein 1918, p. 148¹⁾; Karl 1935, p. 36²⁾

Takao¹⁾; Yentempo, V.¹⁾; Akan, XII.¹⁾; Kankau (Koshun), VII., VIII., IX.^{1) 2)} (DEI: 4); Polisha, III.¹⁾; Anping, IV.¹⁾; Tainan, V.^{1) 2)} (DEI: 2); Chipun, VII.²⁾ (DEI: 1); Chip Chip, III. (DEI: 2); Kanshirei, V. (DEI: 1); Macuyama, VI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Aethiop. u. Oriental. Reg.

Morellia sordidisquama Stein 1918, p. 164¹⁾; Karl 1935, p. 36²⁾

Hoozan²⁾ (DEI: 13); Tainan, IV.²⁾ (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Indien

Pyrellia flavipes Enderlein 1934, p. 422¹⁾

Toyenmongai bei Tainan¹⁾

Pyrellia nigerrima Enderlein 1934, p. 422¹⁾

Toyenmongai bei Tainan¹⁾

Rypellia fulvipes Malloch 1932, p. 307¹⁾; Karl 1935, p. 36²⁾

Chip Chip, III.¹⁾ (DEI: 2 Typen); Hoozan, II.²⁾ (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 1)

Orthellia argentigena Enderlein 1934, p. 419¹⁾ (*Neomyia*)

Takao, IV.¹⁾

Orthellia caerulea Wiedemann 1819, Zool. Mag. 1, p. 23; Stein 1918, p. 149¹⁾; Karl 1935, p. 34²⁾ (*Cryptolucilia*)

Synonym: *Orthellia coeruleifrons* Macquart, Karl 1935, partim., p. 34³⁾

Takao, V.¹⁾ (DEI: 1); Kosempo, II.¹⁾; Polisha, III., XII.¹⁾ (DEI: 1); Kankau, VII.²⁾ (DEI: 1); Yamono Taiko²⁾ (DEI: 5); Hokuto, XII.³⁾ (DEI: 1); Sokutsu, VI.³⁾ (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 6)

Sonstige Verbreitung: Orient. Reg.

Orthellia chalybea Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 402; Stein 1918, p. 149¹⁾; Karl 1935, p. 34²⁾ (*Pyrellia*)

Kosempo, II.—IV.¹⁾; Yamo-no-Taiko^{1) 2)} (DEI: 20); Polisha, XII.¹⁾; Tainan¹⁾; Chip Chip, II.¹⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Orthellia faceta Enderlein 1934, p. 420¹⁾ (*Neomyia*)

Kosempo, II., III.¹⁾

Orthellia sauteri Enderlein 1934, p. 421 ¹⁾ (*Agalmia*)

Toyenmongai bei Tainan ¹⁾

Orthellia sumatrana Enderlein 1934, p. 419 ¹⁾; Enderlein 1936, p. 238 ²⁾
Takao, VII. ²⁾

Sonstige Verbreitung: Sumatra ¹⁾

Euphoria claripennis Malloch 1923, Ann. Mag. N. H. (9) 12, p. 515 ¹⁾;
Karl 1935, p. 34 ²⁾ (*Orthellia*)

Hoozan ²⁾ (DEI: 6); Chip Chip, I., III. ²⁾ (DEI: 48); Yamo-no-Taiko,
IX. ²⁾ (DEI: 3); „Formosa“ (DEI: 51); Fuhosho (DEI: 1); Kosempo
(DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien

Euphoria indica Robineau-Desvoidy 1830, Essai sur les Myodaires, p. 453

Synonym: *Orthellia obscuripes* Stein 1918, p. 149 ¹⁾ (*Cryptolucilia*);

Karl 1935, p. 35 ²⁾

Takao ¹⁾; Yentempo, V. ¹⁾; Tainan, II., V. ²⁾ (DEI: 3); „Formosa“
(DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Indien, Malay. Archipel

Euphoria lauta Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 410; Stein
1918, p. 149 ¹⁾

Takao, III., V. ¹⁾ (DEI: 1); Yentempo, V. ¹⁾; Tainan, III. ¹⁾; Polisha,
XII. (DEI: 3, det. Malloch)

Sonstige Verbreitung: Java

Euphoria viridifrons Macquart 1843, Dipt. exot. 2, 3, p. 295

Synonym: *Orthellia siamensis* Malloch 1923, Ann. Mag. N. H. (9) 12,
p. 509 ¹⁾; Karl 1935, p. 34 ²⁾

Formosa ²⁾ (DEI: 5); Taihorinsho, XI. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Mauritius, Siam, Indien, Java

Musca convexifrons Thomson 1868, Eug. Resa, Dipt., p. 547; Stein
1918, p. 148 ¹⁾; Karl 1935, p. 33 ²⁾ (*Eumusca*)

Takao, V.—XII. ¹⁾; Yentempo, V. ¹⁾; Akau, XII. ¹⁾; Kosempo,
III. ¹⁾; Taihorinsho, VIII. ¹⁾; Tainan, IV. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 3); Kankau,
VII.—IX. ¹⁾ ²⁾ (DEI: 15); Sokutsu, IX. ²⁾ (DEI: 5); „Formosa“
(DEI: 16)

Sonstige Verbreitung: Oriental. u. Notogäische Region

Musca domestica Linné 1761, Fauna suec. 11, p. 453; Stein 1918, p.
148 ¹⁾; Karl 1935, p. 32 ²⁾

„Formosa“ ²⁾ ³⁾ (DEI: 30); Chip Chip, (DEI: 2); Tainan, II. (DEI:
25); Kanshirei, IV. (DEI: 1); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit.

Musca fasciata Stein 1910, Proc Linn. Soc. London 14, p. 149 ¹⁾; Stein
1918, p. 148 ²⁾; Karl 1935, p. 34 ³⁾

Takao, I., VI. ²⁾; Pilam, VII. ³⁾ (DEI: 2); Anping, V. (DEI: 1);

Chipun, VII. (DEI: 3); Tainan, II., V. (DEI: 2); Kankau (Koshun), VI. 3) (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Afrika

Musca formosana Malloch 1925, p. 375 1)

Taihoku-Distr., Okaseki 1); Kankau (Koshun) 1); Chosokei 1)

Sonstige Verbreitung: China (Szechuan) 1)

Musca lusoria Wiedemann (I) 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 411

Sokutsu, IX. (DEI: 1, det. Karl)

Sonstige Verbreitung: Afrika

Musca pattoni Austen 1910, Ann. Mag. N. H. (8) 5, p. 115 1)

DEI (det. Villeneuve): Kanshirei, V. (2); Tainan, II. (1); Suihenkyakn, VIII. (1)

Sonstige Verbreitung: Indien

Musca sorbens Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 418

Synonym: *Musca humilis* Wiedemann, Stein 1918, p. 148 1); Karl 1935, p. 34 2)

Takao, III. 1); Anping, IV. 1); Kankau, IX. 1) 2) (DEI: 1); Pilam, VIII. 1); Chip Chip, I. (DEI: 2)

Sonstige Verbreitung: Ägypten, O.-Afrika, China, Misol, O.-Indien, französ. Ozeanien

Musca ventrosa Wiedemann 1830, Auss. zweifl. Ins. 2, p. 656; Stein 1918, p. 149 1); Karl 1935, p. 34 2)

Yentempo, V. 1); Korotou, IX. 1); Takao, V. XI. 1) (DEI: 1); Lambek, I. 1); Kosempo, III. 1); Taihorinsho, VIII. 1); Tainan, V. 1) 2) (DEI: 1); Kankau, V., VII.—IX. 1) 2) (DEI: 6); Anping, V. 2) (DEI: 1); Chipun, VII. 2); Hoozan 2) (DEI: 1); Chip Chip, III. (DEI: 1); Hokuto, XII. (DEI: 1); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1); Suihenkyaku, VIII. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: China, Indien, Malay. Archipel, Afrika

Musca vetustissima Walker 1849, List. Dipt. Brit. Mus. 4, p. 902; Karl 1935, p. 34 1)

Anping, V. 1) (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1); Taihoku (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Indien, China, Manila

Ptilolepis inferior Stein 1909, Tijds. Ent. 52, p. 213 1); Stein 1918, p. 149 2) (*Musca*); Karl 1935, p. 32 3)

Anping, IV. 2); Kankau, VIII.—IX. 3) (DEI: 6)

Sonstige Verbreitung: Indien, Annam, Java, Sumatra, Philippinen

Phlaematomyia conducens Walker 1859, Proc. Linn. Soc. London, 4, p. 138; Karl 1935, p. 33 1) (*Byomyia*)

Tainan, II., III., V. 1) (DEI: 41); Chipun, VII. 1); (DEI: 5); Kankau, VI.—VII. 1) (DEI: 11); Anping, V. 1) (DEI: 2); Paroe 1) (DEI: 1); Polisha, XII. (DEI: 1); Pilam, VI. (DEI: 1); Macuyama,

V.—VI. (DEI: 7); Toa Tsui Kutsu, V. (DEI: 2); Chip Chip, III., II. (DEI: 13); Takao, V. (DEI: 2); „Formosa“ (DEI: 6); Taihoku (DEI: 4); Chosokei (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Celebes, Palästina

Philaematomyia crassirostris Stein 1903, Mitt. zool. Mus. Berlin 2, p. 99¹⁾ (*Musca*); Stein 1918, p. 148²⁾; Karl 1935, p. 32³⁾

Tainan, V.²⁾³⁾ (DEI: 1); Pilam, VII.³⁾ (DEI: 1); „Formosa“ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Aethiop. und Oriental. Region

Subfamilie *Stomoxydinae*

Stomoxys calcitrans Linné 1758, Syst. Nat. 10, p. 604; Stein 1918, p. 150¹⁾; Karl 1935, p. 30²⁾

Takao, I.—V.¹⁾ (DEI: 1); Yentempo, V.¹⁾; Formosa²⁾ (DEI: 11); Taihoku, XI. (DEI: 10); Toyenmongai (DEI: 1); Kanshirei, IX. (DEI: 3); Kankau (Koshun), VII. (DEI: 17); Tainan, II., V. (DEI: 13); Macuyama, V.—VI. (DEI: 1); Chosokei (DEI: 1); Sokutsu, IX. (DEI: 1); Chip Chip, I., III. (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Kosmopolit.

Stomoxys dubitalis Malloch 1932, Ann. Mag. N. H. (10) 9, p. 426; Zumpt 1940, p. 133¹⁾

Tainan, II.¹⁾ (DEI: 4); Kankau (Koshun) VII.¹⁾ (DEI: 3); Anping, V. (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, China

Somoxys indica Picard 1908, Bull. Soc. Ent. France 20, p. 21¹⁾; Karl 1935, p. 29²⁾

Synonym (nach Karl): „*brunnipes* Grünb.“ Stein 1918, p. 150³⁾

(nach Zumpt 1940): *latipennis* Karl 1935, p. 30⁴⁾

Kosempo, III.³⁾; Hoozan⁴⁾ (DEI: 1 Typus von *latipennis*); Hokuto, XII. (DEI: 1, det. Zumpt); Chipun, VII.²⁾ (DEI: 1); Kankau (Koshun), IV., VII., IX.²⁾ (DEI: 5); Sokutsu, VI.²⁾ (DEI: 3)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Stomoxys triangularis Brunetti 1910, Rec. Ind. Mus. 4, p. 77¹⁾; Karl 1935, p. 29²⁾

Tainan, II., V.²⁾ (DEI: 4); Kankau (Koshun), VII., IX.²⁾ (DEI: 4); Anping, V.²⁾ (DEI: 1)

Sonstige Verbreitung: Süd-Indien

Haematobia (Bdellolarynx) sanguinolentus Austen 1909, Ann. Mag. N. H. (8) 3, p. 290¹⁾; Karl 1935, p. 31²⁾

Synonym (nach Karl): *Haematobia nudinervis* Stein 1918, p. 150³⁾

Kosempo³⁾; Polisha, III.³⁾; Taihorin, V.³⁾; Kankau, VIII., IX.²⁾³⁾ (DEI: 6); Sokutsu, IX.²⁾ (DEI: 28); Tainan (DEI: 3, det. Zumpt); „Formosa“ (DEI: 4, det. Zumpt)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region

Haematobia (Bdellolarynx) rufipes Stein 1918, p. 151¹⁾; Karl 1935, p. 31²⁾

Polisha, III. 1); Tainan, IV 2) (DEI: 2); Kankau 2)

Nachträge.

(Im folgenden sind außer einer übersehenen Art einige Nachträge aus der während des Druckes erschienenen Literatur gegeben).

Es ist einzufügen:

Seite 31 zwischen Zeile 2 und 3: *Schizobremia formosana* Felt 1926, p. 183¹⁾; Barnes 1932, p. 478²⁾

Formosa 1)

Wirt: *Pseudococcus filamentosus* Cockerell und *P. breviceps* Cockerell 2)

„ 31 zwischen Zeile 17 und 18: *Bibio aequalis* Brunetti 1912, Rec. Ind. Mus. 7, p. 296; Ouchi 1940, p. 296¹⁾

Mt. Ari 1)

Sonstige Verbreitung: Schanghai (China) 1)

Bibio flavissimus Brunetti; Ouchi 1940, p. 295¹⁾

Tatsutaka 1)

Sonstige Verbreitung: Indien 1)

„ 31 zwischen Zeile 33 und 34: *Plecia fulvicollis* Fabricius 1805, Syst. Antl., p. 53; Ouchi 1940, p. 291¹⁾

Südformosa 1)

Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Neu-Guinea, Australien, China, Japan 1)

„ 36 zwischen Zeile 33 und 34: *Cricotopus taiwanus* Tokunaga 1940, p. 285¹⁾

Sizyukei 1)

„ 36 auf Zeile 37: *Trichocladius nitens* Kieffer = *Cricotopus nitens* nach Tokunaga 1940, p. 284¹⁾

Taihoku, VIII. 1)

„ 37 zwischen Zeile 4 und 5: *Spaniotoma (Limnophyes) fuscipygma* Tokunaga 1940, p. 287¹⁾

Sizyukei, XII. 1)

Spaniotoma (Orthocladius) multiannulata Tokunaga 1940, p. 287¹⁾

Sizyukei 1)

Spaniotoma (Smittia) tipuliformis Tokunaga 1940, p. 288¹⁾

Arisan, XII. 1)

- Seite 37 zwischen Zeile 32 und 33: *Pentaneura circumdata* Tokunaga 1940, p. 283 ¹⁾
Sizyukei, XII. ¹⁾
- „ 38 zwischen Zeile 5 und 6: *Pentaneura pleuralis* Tokunaga 1940, p. 284 ¹⁾
Sizyukei, XII. ¹⁾
- „ 38 auf Zeile 10: *Lundstroemia formosana* Kieffer = *Tanytarsus* (*Tanytarsus*) f. nach Tokunaga 1940, p. 303 ¹⁾
Taihoku, VIII., IX. ¹⁾
- „ 39 zwischen Zeile 26 und 27: *Prochironomus bifascipennis* Tokunaga 1940, p. 302 ¹⁾
Sizyukei, XII. ¹⁾
- „ 39 zwischen Zeile 28 und 29: *Prochironomus nigerarticulatus* Tokunaga 1940, p. 302 ¹⁾
Taihoku, XII. ¹⁾
- „ 40 auf Zeile 18: *Cryptochironomus sauteri* Kieffer; Tokunaga 1940, p. 301 ¹⁾; Taihoku, VIII., IX. ¹⁾
- „ 40 auf Zeile 35: *Tendipes circumdatus* Kieffer; Tokunaga 1940, p. 292 ¹⁾; Taihoku, VIII., IX. ¹⁾
- „ 41 auf Zeile 6: *Tendipes dystenus* Kieffer; Tokunaga 1940, p. 293 ¹⁾
Taihoku, VIII., IX. ¹⁾
- „ 41 auf Zeile 27: *Tendipes prasinellus* Kieffer; Tokunaga 1940, p. 292 ¹⁾
Taihoku, VIII., IX. ¹⁾
- „ 42 auf Zeile 18: *Culicoides kagiensis* Tokunaga; Tokunaga 1940b, p. 145 ¹⁾; Doba ¹⁾
- „ 43 vor Zeile 1: *Culicoides raripalpis* Smith var. no. 1, Tokunaga 1940b, p. 147 ¹⁾; Doba ¹⁾
- „ 43 auf Zeile 9: *Forcipomyia arcigera* Kieffer; Tokunaga 1940b, p. 76 ¹⁾; Taihoku ¹⁾; Kagi ¹⁾; Sizyukei ¹⁾
- „ 43 auf Zeile 18: *Forcipomyia formosana* Kieffer; Tokunaga 1940b, p. 83 ¹⁾; Taihoku, VIII., XII. ¹⁾
- „ 43 auf Zeile 20: *Forcipomyia fuscimana* Kieffer; Tokunaga 1940b, p. 82 ¹⁾; Taihoku ¹⁾; Kagi ¹⁾
- „ 43 zwischen Zeile 21 und 22: *Forcipomyia hirtipes* de Meijere; Tokunaga 1940b, p. 65 ¹⁾
Taihoku, IX. ¹⁾
- Sonstige Verbreitung: Niederl. Indien
- „ 43 zwischen Zeile 24 und 25: *Forcipomyia longitarsis* Tokunaga 1940b, p. 92 ¹⁾; Taihoku, VIII. ¹⁾
- „ 43 auf Zeile 25: *Forcipomyia miricornis* Kieffer; Tokunaga 1940 p. 77 ¹⁾; Taihoku, VIII. ¹⁾

- Seite 43 auf Zeile 27: *Forcipomyia sauteri* Kieffer; Tokunaga 1940 b, p. 83 1); Doba 1), Taihoku 1)
- „ 43 zwischen Zeile 28 u. 29: *Forcipomyia takahashii* Tokunaga 1940 b, p. 88 1); Doba IX. 1)
- „ 43 zwischen Zeile 28 u. 29: *Lasiohelea japonica* Tokunaga 1937, Tenthredo 1, p. 267; 1940, Tokunaga, p. 104 1); Taihoku, XII. 1)
Sonstige Verbreitung: Japan
- „ 43 nach Zeile 42: *Atrichopogon flavidus* Kieffer 1921, Philipp. Journ. Sci., 18, p. 562; Tokunaga 1940 b, p. 111 1)
Taihoku, XII. 1)
Sonstige Verbreitung: Philippinen
- „ 44 Zeile 1: *Atrichopogon formosanus* Kieffer; Tokunaga 1940 b, p. 110 1)
Taihoku, XII. 1)
- „ 44 Zeile 5: *Atrichopogon (Kempia) insularis* Kieffer; Tokunaga 1940 b, p. 113 1)
Taihoku, XII. 1)
- „ 44 zwischen Zeile 6 u. 7: *Atrichopogon (Kempia) kagiensis* Tokunaga 1940, p. 270 1)
Kagi, XII. 1)
- „ 44 auf Zeile 7: *Atrichopogon minimus* Kieffer: Tokunaga 1940, p. 263 1)
Kagi, XII. 1), Sizyukei, XII. 1)
- „ 44 zwischen Zeile 8 u. 9: *Atrichopogon (Kempia) monticolus* Tokunaga 1940, p. 271 1)
Arisan, XII. 1)
- „ 44 Zeile 17: *Atrichopogon (Kempia) rufescens* Kieffer; Tokunaga 1940 b, p. 115 1)
Taihoku, XII. 1)
- „ 44 Zeile 21 u. 22: *Stilobezzia notata* de Meijere; Tokunaga 1940, p. 280 1)
Kagi, XII. 1)
Sonstige Verbreitung: Niederl. Indien, Japan
- „ 44 Zeile 30 u. 34: *Dasyhelea curtiradialis* Tokunaga 1940 b, p. 130 1)
Sizyukei 1)
Sonstige Verbreitung: Japan 1)
Dasyhelea formosana Kieffer 1921 b, p. 157 1); Tokunaga 1940 b, p. 136 1)
Daitotei 1) (DEI: 1 Typus); Taihoku, XII. 2)
Dasyhelea fulvicauda Macfie; Tounaga 1940 b, p. 131 1), Taihoku, XII. 1)

Dasyhelea parvifulva Tokunaga 1940 b, p. 139 ¹⁾

Taihoku, XII. ¹⁾

Dasyhelea parvinigra Tokunaga 1940 b, p. 127 nomen novum
pro *formosana* Kieffer 1921 a, nec 1921 b

Synonym: *Dasyhelea formosana* Kieffer 1921 a, p. 565 ¹⁾

Hokuto ¹⁾ (DEI: 1 Typus)

Dasyhelea taiwana Tokunaga 1940 b, p. 119 ¹⁾

Taihoku, XII. ¹⁾

Seite 44 auf Zeile 34: *Lepidohelea formosae* Kieffer = *Forcipomyia* nach
Tokunaga 1940 b, p. 73 ¹⁾

Taihoku ¹⁾, Hokuto ¹⁾, Kagi ¹⁾

„ 45 auf Zeile 35: *Bezzia murina* Kieffer; Tokunaga 1940 b, p. 163 ¹⁾
Taihoku, XII. ¹⁾

„ 45 hinter Zeile 40: *Isohelea flaviventris* Kieffer; Tokunaga 1940,
p. 260 ¹⁾

Sizyukei, XII. ¹⁾

„ 53 auf Zeile 20: *Negritomyia fulvicollis* Kertész einfügen: Ouchi
1940, p. 272 ²⁾

Hori ²⁾

Sonstige Verbreitung: Prov. Fukien (O.-China) ²⁾

„ 54 nach Zeile 4: *Eulalia garatus* Walker 1849, List Dipt. Brit.
Mus. 3, p. 532; Ouchi 1940, p. 276 ¹⁾

Rato ¹⁾

Sonstige Verbreitung: China, Japan

Eulalia (Hoplodonta) rubrithorax Maquart 1838, Dipt. exot. 1,
p. 158, Ouchi 1940, p. 276 ¹⁾

Kagi ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Japan, Indien, Siam

„ 54 zwischen Zeile 33 u. 34: *Evaza discolor* de Meijere 1916,
Tijd. Ent. 56, Suppl., p. 15; Ouchi 1940, p. 266 ¹⁾

Kuraru, s. Formosa ¹⁾

Sonstige Verbreitung: Sumatra, Simalus, O.-China, Japan

„ 55 auf Zeile 5: *Culcua simulans* Walker; Ouchi 1940, p. 266 ³⁾
Miyama near Heito, s-Formosa ³⁾

„ 55 auf Zeile 24: Bei *Craspedometopon frontale* Kertész ist einzu-
fügen:

Sonstige Verbreitung: Ost-China, Japan

„ 55 zwischen Zeile 23 u. 24: *Pseudowallacea tsudai* Ouchi 1940,
p. 267 ¹⁾

Kuraru, S.-Formosa ¹⁾


Sonstige Verbreitung: Riukiu-Inseln, Schanghai ¹⁾

- Seite 56 auf Zeile 5: *Ptecticus aurifer* Walker; Ouchi 1940, p. 282¹⁾, Kural, S.-Formosa¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Oriental. Region, Japan, Wladiwostok, China
- „ 56 zwischen Zeile 12 u. 13: *Ptecticus australis* Schiner 1868, Reise Freg. Novara, Dipt., p. 538; Ouchi 1940, p. 280¹⁾ Miyama¹⁾, Rimogan¹⁾
 Sonstige Verbreitung: China, Nikobaren, Indien, Siam
- „ 56 zwischen Zeile 19 u. 20: *Ptecticus tenebrifer* Walker 1849, List, Dipt. Mus. 2, p. 517; Ouchi 1940, p. 281¹⁾ Formosa¹⁾
 Sonstige Verbreitung: Japan, China, Korea, Wladiwostok
- „ 56 auf Zeile 39: *Microchrysa flaviventris* Wiedeman: Japan
- „ 91 auf Zeile 11: *Claraeola adventitia* Kertész; Aczél 1940, p. 154.
- „ 92 auf Zeile 5: *Eudorylas gigas* Kertész; Aczél 1940, p. 158.
- „ 92 auf Zeile 32: *Dorylas pulvillatus* Kertész; Aczél 1940, p. 161.

Weiterhin wurde übersehen:


Familie Asteidae

- Asteia curvinervis* Duda, Deutsche Ent. Zeitschr., 1927, p. 145¹⁾
 Chip Chip, I.¹⁾
- Asteia megalophthalma* Duda, l. c., p. 142¹⁾
 Yentempo, V.¹⁾
- Asteia nigrithorax* Duda, l. c., p. 139¹⁾
 Chip Chip, I.¹⁾
- Asteia sexsetosa* Duda, l. c., p. 128¹⁾
 var. *albifacies* Duda, l. c., p. 133¹⁾
 var. *nigripes* Duda, l. c., p. 134¹⁾
 var. *nigrohalterata* Duda, l. c., p. 133¹⁾
 Toyenmongai¹⁾
-




Teile des Hypopygiums von

Fig. 1—2 *Cephenius barbiellini* Bezzi, Fig. 3—4 *Cephenius formosanus* Enderlein,
 Fig. 5—7 *Cephenius excisus* Enderlein (Fig. 7: innerer Kopulationsapparat),
 Fig. 8 *Velocia formosana* Paramonow, Fig. 9 *Velocia orientalis* Paramonow,
 Fig. 10 *Velocia similis* Coquillett, Fig. 11 *Hercostomus congruens* Becker.




Teile des Hypopygiums von

Fig. 12 *Hercostomus aerosus* Fallén (Europa, zum Vergleich mit Fig. 11),
 Fig. 13 *Drosophila curvicaillata* Duda, Fig. 14 *Drosophila dorsata* Duda,
 Fig. 15 *Drosophila montium* de Meijere, Fig. 16 *Drosophila obscurata* de Meijere,
 Fig. 17 *Drosophila unipectinata* Duda, Fig. 18 *Drosophila xanthogaster* Duda
 (in Teilfigur 18 a ist der Dörnchenkamm des Hypopygiums stärker vergrößert
 dargestellt), Fig. 19 *Phytomyza atrata* Malloch.



Hypopygium von

Fig. 20 *Phytoliriomyza formosensis* Malloch, Fig. 21 *Liriomyza pusilla* Malloch nec Meigen, Fig. 22 *Liriomyza pusilla* Meigen (Europa, zum Vergleich mit Fig. 21), Fig. 23 *Dizygomyza flavofemorata* Malloch, Fig. 24 *Melanagromyza atomella* Malloch, Fig. 25 *Melanagromyza nigrisquama* Malloch, Fig. 26 *Melanagromyza obtusa* Malloch. Teilfiguren 21 a und 22 a: Samenspritze.



Hypopygium von

Fig. 27 *Melanagromyza piliseta* Malloch, Fig. 28 *Melanagromyza producta* Malloch, Fig. 29 *Melanagromyza prolifica* Malloch, Fig. 30 *Melanagromyza setigera* Malloch, Fig. 31. *Melanagromyza variihalterata* Malloch, Fig. 32. *Melanagromyza* spec. 2, Fig. 33 *Melanagromyza* spec. 3, Fig. 34 *Phytagromyza atricornis* Meigen (*subaffinis* Malloch), Fig. 35 *Melanagromyza* spec. 7.

Literaturverzeichnis.

- Aczél, M., Vorarbeiten zu einer Monographie der Dorylaiden. Dorylaiden-Studien V. Zool. Anz., **132**, 149—169, 1940.
- Aldrich, J. M., Five new parasitic Flies reared from Beetles in China and India. Proc. U. S. Nat. Mus., **74**, 8, 1—7, 1928.
- Alexander, Ch. P., New or little known crane-flies from Formosa. Ann. Ent. Soc. Amer., **13**, 249—270, 1920.
- New Species of Japanese Crane-Flies II. Insector Insc. Menstr. Washington, **9**, 179—186, 1921.
- Four undescribed species of Limnobia from the oriental Region. I. c. **10**, 75—80, 1922.
- Undescribed Crane Flies from Formosa and Luzon. Philipp. Journ. Sci., **22**, 467—481, 1923.
- Undescribed species of Japanese Crane-flies III. Ann. Ent. Soc. Amer., **16**, 57—76, 1923.
- — IV. I. c., **17**, 59—74, 1924.
- New or little known Tipulidae from Eastern Asia. I. Philipp. Journ. Sci., **31**, p. 363—381, 1926.
- — III. I. c., **36**, 455—483, 1928.
- — IV. I. c. **40**, 317—348, 1929.
- — V. I. c. **40**, 519—546, 1929.
- New or little known Tipulidae XLI—XLIII, Australasian. Species. Ann. Mag. Nat. Hist., London (10) **3**, 468—489, 1929.
- New or little known Tipulidae from the Philippines VI. Philipp. Journ. Sci., **42**, 59—82, 1930.
- New or little known Tipulidae from Eastern Asia VII. I. c. **42**, 507—535, 1930.
- — VIII. I. c., **43**, 507—536, 1930.
- Records and descriptions of Trichoceridae from the Japanese Empire. Konowia, **9**, 103—108, 1930.
- New or little known Tipulidae from Eastern Asia IX. Philipp. Journ. Sci., **44**, 339—368, 1931.
- — XVIII. I. c., **53**, 267—300, 1934.
- — XXI. I. c., **55**, 19—60, 1934.
- — XXII. I. c., **55**, 133—164, 1934.
- — XXIII. I. c., **56**, 339—372, 1935.
- — XXIV. I. c., **56**, 525—562, 1935.
- — XXV. I. c., **57**, 81—148, 1935.
- — XXVI. I. c. **57**, 195—225, 1935.
- — XXVII. I. c., **58**, 213—252, 1935.
- — XXIX. I. c., **59**, 225—257, 1936.
- — XXX. I. c. **60**, 165—204, 1936.
- — XXXVI, I. c., **66**, 93—134, 1938.

- Baranoff, N.¹⁾, Studien an pathogenen und parasitischen Insekten III Beitrag zur Kenntnis der Raupenfliegengattung *Carcelia* R. D. Arb. paras. Abt. Inst. Hyg. Schule Volksges. Zagreb, **3**, 3—45, 1931.
- Über Raupenfliegen, welche durch die Farbe des Abdomens *Exorista confinis* Fall. ähnlich sind. Wien. Ent. Zeit., **48**, 117—124, 1931.
- Neue orientalische Sarcophaginae. Konowia, **10**, 110—115, 1931.
- Zur Kenntnis der orientalischen *Winthemia*-Arten. Ent. Nachr. Bl., **6**, 45—47, 1932.
- Neue orientalische Tachinidae. Enc. Ent. Bd. II, Dipt., **6**, 83—93, 1932.
- Zur Kenntnis der formosanischen Sturmien. Neue Beitr. syst. Insektenkunde, **5**, 70—82, 1932.
- Neue Gattungen und Arten der orientalischen Raupenfliegen. Enc. Ent. B II, Dipt., **7**, 160—165, 1934.
- Mitteilungen über gezüchtete orientalische Larvaevoriden. Ent. Nachr.-Bl. Troppau, **8**, 41—49, 1934.
- Übersicht der orientalischen Gattungen und Arten des *Carcelia*-Komplexes. Trans. Roy. Ent. Soc. London, **82**, 387—408, 1934.
- Neue paläarktische und orientalische Raupenfliegen. Veterinarskog Arhiva, **5**, 550—560, 1935.
- Weitere Beiträge zur Kenntnis der parasitären Raupenfliegen von den Salomonen und Neubritannien. Ann. Mag. N. H. (10) **17**, 97—113, 1936.
- Barnes, H. F., Notes on Cecidomyiidae. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **9**, 475—484, 1932.
- Becker, Th., Chloropidae. Eine monographische Studie, III. Teil. Die indo-australische Region. Ann. Mus. Nat. Hung., **9**, 35—170, 1911.
- — Nachtrag zum III. Teil. I. c., 252—255, 1912.
- H. Sauters Formosa-Ausbeute: Lsipen und Phoriden. Suppl. Ent., **3** 80—90, 1914.
- Neue Chloropiden aus dem Ungarischen National-Museum. Ann. Mus. Nat. Hung., **14**, 423—453, 1916.
- Dipterologische Studien, Dolichopodidae der indo-australischen Region. Capita Zoologica, **1**, 1—247, 1922.
- Dolichopodidae von Formosa. Zool. Med., **8**, 120—131, 1924.
- H. Sauters Formosa-Ausbeute: Pipunculidae (Dorylaidae; Diptera). Ent. Mitt., **13**, 14—18, 1924.
- — Ephydridae. I. c., **13**, 89—93, 1924.
- — Chloropidae. I. c., **13**, 117—124, 1924.
- — Asilidae III. I. c., **14**, 62—85, 123—139, 240—250, 1925.
- Bequaert, J. C., Oriental Nemestrinidae. Psyche, **42**, 123—141, 1935.
- Bezzi, M., Leptidae et Empididae in insula Formosa a clar. H. Sauter collectae. Ann. Mus. Nat. Hung., **5**, 564—568, 1907.
- Secondo Contributo alla Conoscenza del Genere *Asarcina*. Ann. Mus. Nat. Hung., **6**, 495—504, 1908.
- Rhagionidae et Empididae ex insula Formosa a clar. H. Sauter missae. I. c., **10**, 442—495, 1912.
- Einige Bemerkungen über die Dipterengattungen *Auchmeromyia* und *Bengalia*. Ent. Mitt., **2**, p. 70—78, 1913.
- H. Sauters Formosa-Ausbeute: Rhagionidae et Empididae. Suppl. Ent., **3**, 65—78, 1914.

¹⁾ Einige Arbeiten unter dem Namen Baranov.

- Bezzi, M., Studies in Philippine Diptera II. Philipp. Journ. Sci., **D 12**, 107—159, 1917.
- Böttcher, G., H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Genus Sarcophaga. Ent. Mitt., **1**, 163—170, 1912.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Einige neue Sarcophaga-Arten. Ann. Mus. Nat. Hung., **11**, 374—381, 1913.
- Zum Charakter der Dipterenfauna von Formosa. Ent. Mitt., **2**, 99—100, 1913.
- Brues, Ch. P., The Phoridae of Formosa. Ann. Mus. Nat. Hung., **9**, 530—559, 1911.
- Additions to the Phoridae of Formosa. Psyche, **31**, 206—223, 1924.
- Brunetti, E., Revision of the oriental Leptidae. Rec. Ind. Mus., **2**, 417—436, 1909.
- Diptera Nematocera (excluding Chironomidae and Culicidae). Faune Brit. Ind., London, 1—574, 1912.
- Second Revision of the oriental Stratiomyidae. Rec. Ind. Mus., **25**, 45—180, 1923.
- Cresson, E. T., Studies in the Dipterous Family Ephydriidae, excluding the North and South American Faunas. Trans. Amer. Ent. Soc., **51**, 227—258, 1925.
- — II., l. c., **55**, 165—195, 1929.
- — III., l. c., **56**, 93—131, 1930.
- — IV., l. c., **58**, 1—34, 1932.
- Descriptions of new genera and species of Diptera (Ephydriidae and Micropezidae). Trans. Amer. Ent. Soc., **52**, 249—274, 1926.
- Descriptions of New Genera and Species of the Dipterous Family Ephydriidae. Paper X. Ent. News, **42**, 168—170, 1931.
- — Paper XI. Trans. Amer. Ent. Soc., **60**, 199—222, 1934.
- Descriptions of Two New Species of Indo-Australian Ephydriidae. Arb. morph. taxon. Ent., **4**, 205—207, 1937.
- Curran, C. H., New Syrphidae and Tachinidae. Ann. Ent. Soc. Amer., **22**, 489—510, 1929.
- Czerny, L., Monographie der Helomyziden. Abh. Zool. bot. Ges. Wien, **15**, 1—166, 1924.
- Tyliden und Neriiden des Zoologischen Museums in Hamburg. Stett. Ent. Zeit., **93**, 267—302, 1932.
- Duda, O., Liodrosophila und Sphaerogastrella, zwei neue zu den Drosophiliden und nicht zu den Camilliden gehörige Dipteren-Gattungen aus Südostasien. Archiv Naturgesch., **88 A 4**, 150—160, 1922.
- Die orientalischen und australischen Drosophiliden-Arten des ungarischen National-Museums zu Budapest. Ann. Mus. Nat. Hung., **20**, p. 24—59, 1923.
- Die Drosophiliden des Deutschen Entomologischen Instituts der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (früh. Deutsches Entomolog. Museum) aus H. Sauter's Ausbeute. Archiv. Naturgesch., **90 A 3**, 235—259, 1924.
- Beitrag zur Systematik der Drosophiliden unter besonderer Berücksichtigung der paläarktischen und orientalischen Arten. Archiv Naturgesch., **90 A 3**, 172—234, 1924.
- Die außereuropäischen Arten der Gattung Leptocera Olivier-Limosina Macquart, l. c., **90 A 11**, 1—208, 1925a.

- Duda, O., Monographie der Sepsiden. Ann. Naturhist. Mus. Wien, **39**, 1—153, 1925b und **40**, 1—110, 1926.
- Fauna sumatrensis 26. Drosophilidae. Suppl. Ent., **14**, 42—116, 1926a.
- Die orientalischen und australischen Drosophiliden-Arten des ungarischen National-Museums zu Budapest. I. Nachtrag. Ann. Mus. Nat. Hung. **23**, 241—250, 1926b.
- Beitrag zur Kenntnis der außereuropäischen Scatopsiden. Konowia, **7**, 259—297, 1928.
- Beitrag zur Kenntnis der südostasiatischen Drosophiliden-Gattung *Hypselothyrea* de Meijere. Ann. Mus. Nat. Hung., **25**, 79—90, 1928.
- Neue und bekannte orientalische Chloropiden des Deutschen Entomologischen Instituts in Berlin-Dahlem. Stett. Ent. Zeit., **91**, 278—304, 1930.
- Weitere neue und wenig bekannte orientalische und australische Chloropiden des Deutschen Entomologischen Instituts in Berlin-Dahlem. Arb. morph. taxon. Ent., **1**, 39—60, 1934.
- Edwards, F. W., A Revision of the Tipulid Genus *Styringomyia* Lw. London Trans. entom. Soc., 206—227, 1914.
- New and little known Tipulidae, chiefly from Formosa. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) **18**, 245—269, 1916.
- The old-world species of *Eriocera* in the British Museum collection, l. c., (9) **8**, 67—99, 1921.
- New and little known Tipulidae chiefly from Formosa. Part II. l. c., (9) **8**, 99—115, 1921.
- H. Sauters Formosa Collection: Culicidae, l. c., 629—632, 1921.
- On some Malayan and other species of *Culicoides*, with a note on the genus *Lasiohelea*. Bull. Ent. Res., **13**, 161—167, 1922.
- Four new Diptera in the collection of the Berlin Zoological Museum. Stylops, London, **3**, 185—187, 1934.
- Enderlein, G., Neue Gattungen und Arten außereuropäischer Fliegen. Stett. Ent. Zeit., **72**, 135—209, 1911.
- Trypetiden-Studien. Zool. Jahrb., Syst. **31**, 407—460, 1911.
- Studien über die Tipuliden, Limoniiden, Cyndrotomiden und Ptychopteren, l. c., **32**, 1—88, 1912.
- Zur Kenntnis außereuropäischer Dolichopodiden. Zool. Jahrb., Suppl. **15**, 367—408, 1912.
- Über eine mimetische Ephydriden-Gattung. Stett. Ent. Zeit., **73**, 163—165, 1912.
- Dipterologische Studien. Zur Kenntnis der Familie Xylophagidae. Neue Beiträge zur Kenntnis der Richardiinen. Zool. Anz., **42**, 533—555, 1913.
- Dipterologische Studien, IX., l. c., **43**, 577—615, 1914.
- Einige neue Sepsiden. Wien. Ent. Zeit., **38**, 60—61, 1920.
- Über die phyletisch älteren Stratiomyiiden-subfamilien. Mitt. Zool. Mus. Berlin, **10**, 153—214, 1921.
- Dipterologische Studien, XVII. Zool. Anz., **52**, 219—232, 1921.
- Klassifikation der Micropeziden. Arch. Nat., **88 A 5**, 140—229, 1922.
- Einige neue Drosophiliden. Deutsche Ent. Zeit., **1922**, 295—296, 1922.
- Beiträge zur Kenntnis der Platystominien. Mitt. Zool. Mus. Berlin, **11**, 99—153, 1924.
- Zur Kenntnis der Bombyliiden-Subfamilie Systropodinae. Wien. Ent. Zeit. **43**, 69—92, 1926.

- Enderlein, G., Klassifikation der Sarcophagiden. Arch. Klass. phylogen. Ent., 1, 1—54, 1928.
- Dipterologica I. Sitz.-Ber. Ges. Naturforsch. Berlin (1933), 416—429, 1934.
- — III. l. c. (1935), 235—246, 1936.
- Klassifikation der Rutilimen. Veröffentl. Dtsch. Kolonial-Übersee-Mus., 1, 397—446, 1936.
- Simuliologica I. Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, (1936), 113—130, 1936.
- Felt, E. P., A New Formosan Gall-Midge. Ent. Mo. Mag., 62, 183—184, 1926.
- Gall Midges or Gall Gnats of the Orient. Lingna Sci. Journ., 7, 413—474, 1929.
- Frey, R., Philippinische Dipteren II. Fam. Dolichopodidae. Not. Ent., 4, 115—123, 1924; 5, 15—26, 1925.
- Beiträge zur Kenntnis der exotischen Dolichopodiden. l. c., 8, 17—23, 1928.
- Hybotinen von Formosa und den Philippinen. l. c., 18, 52—62, 1938.
- Gressitt, J. L., Notes on collecting in Formosa. Ent. World, Tokyo, 4, 711—727, 1936.
- Hendel, F., Revision der Chrysomya Arten. Zoolog. Anz., 34, 612—622, 1909.
- Über die Sepedon-Arten der äthiopischen und indo-malayischen Region. Ann. Mus. Nat. Hung., 9, 266—277, 1911.
- Neue Muscidae acalyptratae. Wien. Ent. Zeit., 31, 1—20, 1912.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Genus Dacus, Fabricius (1805), Suppl. Ent., 1, 13—24, 1912.
- — Acalyptrate Musciden. Ent. Mitt., 2, 33—43, 1913.
- — II. Suppl. Ent., 2, 77—112, 1913.
- Die Arten der Platystomini. Abh. Zool.-bot. Ges. 8, 1—409, 1914.
- Eine neue Gattung der Oscinellinae. Ann. Mus. Nat. Hung., 12, 247—248, 1914.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Acalyptrata Musciden III. Suppl. Ent., 3, 90—117, 1914.
- — Tephritinae. Ann. Mus. Nat. Hung., 13, 424—467, 1915.
- Eine neue interessante Ephydriden-Gattung. Konowia, 9, 66—70, 1930.
- Übersicht über die Gattungen der Pyrgotiden, nebst Beschreibung neuer Gattungen u. Arten. Enc. Ent. B II Dipt., 7, 141—156, 1934.
- Revision der Tethiniden. Tijd. Ent., 77, 37—54, 1934.
- Hennig, W., Revision der Tyliden II. Konowia, 14, 68—92, 192—216, 289—310, 1935 und l. c., 15, 129—144, 201—239, 1936.
- Beiträge zur Systematik und Tiergeographie der Pyrgotiden. Arb. morphol. taxon. Ent., 4, 243—256, 1936.
- Übersicht über die Arten der Neriiden und über die Zoogeographie dieser Acalyptraten-Gruppe. Stett. Ent. Zeit., 98, 240—280, 1937.
- Tyliden aus Japan. Insecta Matsumurana, 13, 1—14, 1938.
- Beiträge zur Kenntnis des Kopulationsapparates und der Systematik der Acalyptraten I. Chamaemyiidae und Odiniidae. Arb. morphol. taxon. Ent., 5, 201—213, 1938.
- — II. Tethinidae, Milichiidae, Anthomyzidae und Opomyzidae. l. c., 6, 81—94, 1939.
- Beiträge zur Kenntnis der Clusiiden und ihres Kopulationsapparates. Enc. Ent. B II, Dipt., 9, 121—138, 1938.
- Außereuropäische Psiliden und Platystomiden im Deutschen Entomologischen Institut. Arb. morphol. taxon. Ent., 7, 304—318, 1940.

- Hering, M., Neue Arten und Gattungen. *Siruna seva*, 1, 1—16, 1940.
- Hermann, F., H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Asilidae II. (Leptogastrinae et Asilinae). *Arch. Nat.*, **82 A 5**, 1—35, 1916.
- — Mydidae et Asilidae (Dasypogoninae, Laphrinae et Leptogastrinae. *Ent. Mitt.*, **3**, 33—44, 83—95, 102—112, 129—136, 1914.
- Hull, F. M., New Species of Exotic Syrphid Flies. *Psyche*, **44**, 12—32, 1927.
- James, M. T., New Formosan Stratiomyidae in the Collection of the Deutsches Entomologisches Institut. *Arb. morphol. taxon. Ent.*, **6**, 31—37, 1939.
- Karaman, Z., II. Beitrag zur Kenntnis der Nycteribien. *Ann. Mus. Serb. merid.*, **1**, 31—44, 1939 a.
- III. Beitrag zur Kenntnis der Nycteribien. *Bull. Soc. Sci. Skoplje (Sci. Nat.)*, **20**, 131—134, 1939 b.
- Karl, O., Außereuropäische Musciden (Anthomyiiden aus dem Deutschen Entomologischen Institut). *Arb. morphol. taxon. Ent.*, **2**, 29—49, 1935.
- Zwei neue Musciden (Anthomyiiden) aus der Mandschurei. *l. c.*, **6**, 279—280, 1939.
- Eine neue Muscide (Anthomyiide) aus Formosa. *l. c.*, **7**, 147, 1940.
- Kertész, K., Die Pipunculus-Arten Süd-Asiens und Neu-Guineas. *Ann. Mus. Nat. Hung.*, **1**, 465—471, 1903.
- Die Dipterengattung *Evaza* Walk. *l. c.*, **4**, 276—292, 1906.
- Vier neue Pipunculus-Arten. *l. c.*, **5**, 579—583, 1907.
- Vorarbeiten zu einer Monographie der Notacanthen XII—XXII. *l. c.*, **7**, 368—397, 1909.
- Noch einiges über die Dipterengattung *Loxoneura*. *l. c.*, **7**, 337—339, 1909.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. *Dorylidae*. *l. c.*, **10**, 285—299, 1912.
- Über einige Muscidae Acalypteratae. *l. c.*, **10**, 541—548, 1912.
- — *Lauxaniinae*. *l. c.*, **11**, 88—102, 1913.
- — *Syrphidae*. *l. c.*, **11**, 273—285, 1913.
- Three new species of the genus *Cerioides* from the oriental region. *l. c.*, **11**, 404—408, 1913.
- *Myrmecosepsis*. A new Genus of Diptera with very reduces wings. *l. c.*, **12**, 244—246, 1914.
- Vorarbeiten zu einer Monographie der Notacanthen XXIII—XXXV. *l. c.*, **12**, 449—557, 1914.
- Some remarks on *Cadrema lonchopteroides* Walk. with description of a new *Musidora* from the oriental region. *l. c.*, **12**, 674—675, 1914.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. *Syrphidae* II. *l. c.*, **12**, 73—87, 1914.
- Contributions to the Knowledge of the *Dorylidae*. *l. c.*, **13**, 386—392, 1915.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. *Lauxaniinae* II. *l. c.*, **13**, 491—534, 1915.
- Vorarbeiten zu einer Monographie der Notacanthen XXXIX—L. *l. c.*, **20**, 85—129, 1923.
- Kieffer, J. J., H. Sauter's Formosa-Ausbeute. *Tendipedidae*. *Suppl. Ent.*, **1**, 27—43, 1912.
- Description de deux remarquables *Cécidomyies* de Formose. *Marcellia*, **12**, 42—44, 1913.
- *Tendipedides* (Chironomides) de Formose. *Ann. Mus. Nat. Hung.*, **14**, 81—121, 1916.
- Chironomides d'Afrique et d'Asie conservés aux Muséum national Hongrois de Budapest. *l. c.*, **16**, 31—136, 1918.

- Kieffer, J. J., Chironomides des Philippines et de Formose. *Philipp. Journ. Sci.*, **18**, 557—593, 1921.
- Etude sur les Chironomides de Formose. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, **68**, 149—163, 1921 und **69**, 27—41, 1922.
- Kikkawa, H. & Peng, F. T., *Drosophila* Species of Japan and Adjacent Localities. *Japan. Journ. Zool.*, **7**, 507—552, 1938.
- Kitakami, S., The Blepharoceridae of Japan. *Mem. Coll. Sci. Kyoto*, (B) **6**, 53—108, 1931.
- Supplementary notes on the Blepharoceridae of Japan. *Mem. Coll. Sci. Kyoto*, (B) **12**, 115—136, 1937.
- Koidzumi, M., Taiwansan anopheleska ni Asuite. (On the Formosan Anopheles). *Dobuts. Zasshi.*, **29**, 134—142, 1917.
- The Anophelines of Formosa. I. c., **37**, 314—377, 1925 und *Contr. Dept. Hyg. Gov. Res. Inst. Formosa Taihoku*, **76**, 1—68, 1927 und *Riv. Malarial.*, **9**, 232—235, 1930.
- Studies on Mosquitoes in Formosa. *Rept. Sci. Inst. (Taihoku)*, **8**, 158 pp., 1926.
- On the distribution of Anopheles in Formosa. *Dobuts. Zasshi.*, **40**, 219—228 und (Abstr.) in *Japan. Journ. Zool.*, **2**, 105, 1929.
- Kröber, O., H. Sauter's Formosa-Ausbeute: Thereviden, Omphraliden. *Suppl. Ent.* **1**, 24—26, 1912.
- Monographie der paläarktischen und afrikanischen Thereviden. *Deutsche Ent. Zeitschr.* **1912**, 1—32, 109—140, 251—266, 395—410, 493—508, 673—704, 1912; **1913**, 17—32, 147—162, 255—270, 1913.
- Die paläarktischen Arten der Gattung *Physocephala* Schin. *Arch. Naturgesch.*, **80 A 10** (1914), 43—77, 1915.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Thereviden II., *Conopiden. Ent. Mitt.*, **2**, 276—282, 1913.
- Die indo-australischen und südamerikanischen *Physocephala*-Arten. *Archiv Naturgesch.*, **81 A 4**, 117—145, 1916.
- Die paläarktischen Arten der Gattung *Conops* L. I. c., **81 A 11** (1915), 35—60, 1916.
- Die Gattung *Oecemyia* Rob.-Desv., I. c., **81 A 7** (1915), 93—107, 1916.
- Beiträge zur Kenntnis paläarktischer Tabaniden (Teil I: *Surcoufia*, *Hep- tatoma*, *Silvius* und *Chrysozona*). I. c., **88 A 8**, 114—164, 1922.
- Die Conopiden der Philippinen. *Philipp. Journ. Sci.*, **34**, 331—346, 1927.
- Thereviden von den Philippinen aus Japan und Formosa. I. c. **38**, 325—334, 1929.
- Indo-australische Chrysopini. *Zool. Jahrb. Syst.*, **56**, 463—528, 1929.
- Die Dipteren-Ausbeute der Sunda-Expedition Rensch II. Therevidae und Conopidae. *Zool. Anz.*, **89**, 65—73, 1930.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Omphraliden. *Stett. Ent. Zeit.*, **98**, 211—231, 1937.
- Lengersdorf, F. H., Sauter's Formosa-Ausbeute: Sciaridae. *Suppl. Ent.*, **16**, 104—108, 1927.
- Lichtwardt, B., Beitrag zur Kenntnis der Nemestriniden III. Über indische und indoaustralische Arten. *D. E. Z.*, **1909**, 643—651, 1909.
- Die Dipterengattung *Nycterimyia* Lichtw. *Ent. Mitt.*, **1**, 26—28, 1914.
- Die Nemestriniden des Ungarischen Nationalmuseums in Budapest. *Ann. Mus. Nat. Hungar.*, **17**, 274—278, 1919.

- Malloch, J. R., Formosan Agromyzidae. Ann. Mus. Nat. Hung., **12**, 306—336, 1914.
- A new *Fannia* from Formosa. l. c., **12**, 153—154, 1914.
- Exotic Muscaridae XVII. Ann. Mag. N. H., (9) **16**, 361—377, 1925.
- Some far Eastern Muscidae. Philipp. Journ. Sci., **26**, 507—510, 1925.
- H. Sauters Formosa-Collection: Sapromyzidae. Ent. Mitt., **16**, 159—172, 1927.
- Exotic Muscaridae XXII. Ann. Mag. N. H., (10) **2**, 301—319, 1928.
- Notes on some oriental Sapromyzid flies, with particular reference to the Philippine Species. Proc. U. S. Nat. Mus., **74**, 6, 1—97, 1929.
- Notes on exotic Diptera (1). Stylops, **1**, 112—120, 1932.
- Exotic Muscaridae XXXVII. Ann. Mag. N. H., (10) **10**, 297—330, 1932.
- Matsumura, S., Schädliche und nützliche Insekten vom Zuckerrohr Formosas 1910a (zitiert bei Shiraki 1930, p. 345).
- Derselbe Titel. Zeitschr. wiss. Insbiol., **6**, 101—104, 1910b.
- Beschreibungen von am Zuckerrohr Formosas schädlichen oder nützlichen Insekten. Mem. Soc. Ent. Belg. **18**, 129—150, 1911.
- Thousand Insects of Japan. Addidamenta 2 (Erscheinungsjahr?; zwischen 1915 und 1918).
- & Adachi, J., Synopsis of the Economic Syrphidae of Japan. Ent. Mag. Kyoto, **2**, 1—29 (1916), 133—152, **3**, 3—41, 128—141 (1917).
- Meijere, J. C. H. de, H. Sauters Formosa-Ausbeute. Sepsinae. Ann. Mus. Nat. Hung., **11**, 114—124, 1913.
- Munro, H. K., Observations and Comments on the Trypetidae of Formosa. Arb. phys. angew. Ent., **2**, 195—203, 253—271, 1935.
- Okada, J., Beitrag zur Kenntnis der Ceroptatinen-Fauna Japans. Insecta Matsumurana, **13**, 17—32, 1938.
- Die Bibioniden Japans. Journ. Fac. Agric., **42**, 189—227, 1938.
- Die von Herrn K. Takeuchi aus Japan gesammelten Nematoceren. Tenthredo, **2**, 33—43, 1938.
- Die Phryneiden und Pachyneuriden Japans. Journ. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ., **42**, 221—238, 1938.
- Oldenberg, L., H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Familie: Clythiidae (= Platypezidae). Ann. Mus. Nat. Hung., **11**, 339—343, 1913.
- — II. Suppl. Ent., **3**, 78—80, 1914.
- Eine *Agathomyia* aus Formosa. Arch. Nat., **82 A 5**, 119—120, 1917.
- Ouchi, Y., Diptera Sinica. Cyrtidae. J. Shanghai Sci. Inst. (Sect. 3), **4**, 33—36, 1938.
- Painter, R. H., The Bombyliidae of China and near-by Regions. Lingnan Sc. Journ., **11**, 341—374, 1932.
- Paramonow, S. J., Zur Kenntnis der Gattung *Hemipenthes* Loew. Enc. Ent. B II., Dipt., **3**, 150—190, 1927.
- Beiträge zur Monographie der Bombyliidengattungen *Amictus*, *Lyophlaeba* etc. Mem. Class. Sci. Nat. Techn. Acad. Sci. Ukraine, **9** (Trav. Mus. Zool., **11**), 1—218, 1931.
- Parent, O., Etude sur les Diptères Dolichopodides Exotiques conservés au Zoologisches Staatsinstitut und Zoologisches Museum de Hambourg. Mitt. Zool. Staatsinst. Zool. Mus. Hamburg, **43**, 155—198, 1928.
- Sur quelques Diptères Dolichopodides, la plupart appartenant à la collection L. Oldenberg. Notes et descriptions. Stett. Ent. Zeit., **93**, 220—241, 1932.

- Ricardo, G., A Revision of the species of *Tabanus* from the oriental region including notes on species from surrounding countries. *Rec. Ind. Mus.*, **4**, 111—255, 1911.
- *Tabanidae* from Formosa. *Ann. Mus. Nat. Hung.*, **11**, 168—173, 1913.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute: *Tabanidae*. *Suppl. Ent.*, **3**, 62—65, 1914.
- Riedel, M. P., H. Sauter's Formosa-Ausbeute, *Nematocera polyneura*. *Suppl. Ent.*, **1**, 26—27, 1912.
- — — *Ent. Mitt. Berlin*, **2**, 272—276, 1913.
- — — (Dipt.) III. *Arch. Nat.*, **82 A 5**, 109—116, 1916.
- — — *Liriopidae* (Ptychopteridae) und *Nematocera polyneura*. *Ann. Mus. Nat. Hung.*, **16**, 315—320, 1918.
- Sack, P., H. Sauter's Formosa-Ausbeute: *Syrphiden* I. *Ent. Mitt.*, **2**, 1—10, 1913.
- — II. *Arch. Nat.*, **87 A 11**, 258—276, 1922.
- — III. *Stett. Ent. Zeit.*, **88**, 305—320, 1927.
- Schmitz, H., H. Sauter's Formosa-Ausbeute: *Phoriden*. *Ent. Mitt.*, **15**, 46—57, 1926.
- Revision der *Phoriden*. Berlin & Bonn 1929.
- Über *Pseudotermitoxenia Shiraki* (Übersetzung des Gattungs- und Art-Schlüssels) und *Tymnoptera vitripennis* Mg. *Natuurhist. Maandbl.*, **22**, 9, 1933.
- *Megaselia* (s. str.) *laticosta* n. sp. *Arb. morph. taxon. Ent.*, **5**, 292—293, 1938.
- Drei neue aus toten Schnecken gezüchtete japanische *Phoriden*. *Natuurhist. Maandbl.*, **27**, 81, 1938.
- Schuermans-Stekhoven, J. H., The Bloodsucking Arthropods of the Dutch East Indian Archipelago VII. The *Tabanidae* of the Dutch East Indian Archipelago. *Treubia*, **6**, Suppl., 552 pp., 1926.
- Our present Knowledge about the Pupipara and *Tabanidae* of China. *Ling-nang Sci. Journ.*, **7**, 497—510, 1929.
- Scott, H., On certain *Nycteribiidae* with descriptions of two new species of Formosa. *Trans. Ent. Soc. London*, **1908**, p. 359.
- H. Sauter's Formosa-Ausbeute. *Nycteribiidae*. *Arch. Nat.*, **79 A 8**, 92—103, 1913.
- Senior-White, R., A Revision of the Subfamily *Sarcophaginae* in the oriental region. *Rec. Ind. Mus.*, **26**, 193—283, 1924.
- Shiraki, T., Investigation on general injurious insects. *Taiwan-Sotokufu-Noji-Shikenjo-Tokubetsu-Hokoku*, **8**, 286—297, 1913.
- An investigation on general injurious insects. *Extra Rept. Dept. Agr., Gov. Res. Inst. Formosa*, **8**, 1913.
- Paddy Borer, *Schoenobius incertellus* Wlk. *Taihoku* 1917.
- Blood-micking insects of Formosa. Part 1, *Tabanidae*. *Taihoku Agric. Exp. Stat.* 442 pp., 11 pls., 1918.
- Some insects living in termites' nests. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, **15**, 208—210, 1925.
- Die *Syrphiden* des japanischen Kaiserreichs, mit Berücksichtigung benachbarter Gebiete. *Mem. Fac. Sci. Agric. Taihoku Imp. Univ.*, **1**, 446 pp., 1930.
- Some *Diptera* in the Japanese Empire, with Descriptions of New Species. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, **22**, 259—280, 1932.
- — (2) *Cyrtidae*, l. c., **22**, 331—336, 1932.

- Shiraki, T., A systematic Study of Trypetidae in the Japanese Empire. Mem. Fac. Sci. Agric. Taihoku Imp. Univ., 8, 509 pp., 1933.
- Simuliidae of the Japanese Empire. I. c., 16, 1—90, 1935.
- Speiser, P., Zur Kenntnis außereuropäischer Dipteren. Wiesbaden, Jahrb. Ver. Naturk., 64, 237—261, 1911.
- Stein, P., H. Sauters Formosa-Ausbeute. Anthomyidae. Suppl. Ent., 4, 13—56, 1915.
- Zur weiteren Kenntnis außereuropäischer Anthomyiden. Ann. Mus. Nat. Hung., 16, 147—244, 1918.
- Sturtevant, A. H., Philippine and other oriental Drosophilidae. Philippine Journ. Sci., 32, 361—374, 1927.
- Szilady, Z., On some Tabanidae collected by Mr. Sauter on Formosa. Ann. Mus. Nat. Hung., 19, 125—128, 1922.
- Zwei neue orientalsiatische Rhagio-Arten. Konowia, 13, 8—9, 1934.
- Tokunaga, M., Japanese Cricotopus and Corynoneura Species. Tenthredo, 1, 9—52, 1936.
- — Sand Flies (Ceratopogonidae) from Japan. I. c., 1, 233—338, 1937.
- — Chironomidae from Japan IX. Tanypodinae und Diamesinae. Philipp. Journ. Sci., 62, 21—65, 1937.
- — XII. New or little-known Ceratopogonidae and Chironomidae. I. c., 72, 255—311, 1940.
- — Japanese Biting Midges of Bezzia and Palpomyia. Tenthredo, 2, 273—313, 1939.
- — Biting Midges from Japan and neighbouring countries, including Micronesian Islands, Manchuria, North China and Mongolia. I. c., 3, 58—165, 1940b.
- Townsend, C. H. T., New muscoid flies in the collection of the Deutsches Entomologisches Institut in Berlin. Ent. Mitt., 16, 277—287, 1927.
- New Genera and Species of old world oestro-muscoid flies. Journ. New York Ent. Soc., 40, 439—479, 1932.
- Tsuzuki, J., Malaria und ihr Vermittler in Japan. Arch. Schiffs- und Tropenhyg., 6, 285—295, 1902.
- Über die Anopheles-Arten in Japan und einige Beiträge zur Kenntnis des Entwicklungsgangs der Anopheles-Larven. Zool. Jahrb., 25, Abt. Syst., 525—556, 1907.
- Villeneuve, J., Sur quatre forms nouvelles se rapportant aux „Oestridae dubiosae B. B.“ Ann. Mus. Nat. Hung., 12, 435—442, 1914.
- Nouveaux Myodaires supérieurs de Formose. I. c., 13, 90—94, 1915.
- Descriptions de Myodaires supérieurs nouveaux. Bull. & Ann. Soc. Ent. Belg., 60, 269—275, 1926.
- Myodaires supérieurs nouveaux de l'île de Formose. Rev. Zool. Afr., 15, 387—397, 1927.
- Tachinides nouveaux de Formose et du Congo. I. c., 15, 217—224, 1927.
- Myodaires supérieurs nouveaux. Bull. & Ann. Soc. Ent. Belg., 69, 61—68, 1929.
- Descriptions de Myodaires supérieurs (Larvaevoridae) nouveaux de Formose. Bull. Soc. Ent. France, 37, 268—271, 1932.
- Descriptions de nouveaux Myodaires supérieurs paléarctiques (B. Espèces de l'île de Formose, p. 242—245). Bull. & Ann. Soc. Ent. Belg., 71, 241—245, 1932.

- Yamada, S., Anopheles Mosquito. A new Species found in Hokkaido, Japan. Taiwan Iga Kukai Zasshi (Jl. Formosa Med. Soc.), **186**, 528, 1918.
- Descriptions of ten new species found in Japan, with notes on the relation between some of these Mosquitoes and the larva of *Filaria bancrofti* Cobbold. Annot. Zool. Jap., **10**, 45—84, 1921.
- Zumpt, F., Über einige afrikanische und orientalische Stomoxys-Arten. Z. angew. Ent., **27**, 126—141, 1940.
-