Der Winter in der Schmetterlingswelt.

Von H. Lauckner.

Wirkt die starre Macht des Winters lähmend auf die Natur überhaupt ein, so liegt die raue Hand des gestrengen Herrn erst recht schwer auf denjenigen ihrer Kinder, deren eigentliches Lebensselement Sonnenlicht und Sonnenwärme sind: den Insekten.

Für die meisten Schmetterlinge freilich ist mit Erreichung ihres Lebenszweckes, der Fortpflanzung der Art, bei Eintritt des Winters auch zugleich das Lebensende gekommen, und es gehört schon zu den selteneren Ausnahmen, wenn Falter beim Herannahen des Winters, wie weiland Dornröschen, in einen tiefen Schlaf fallen, um dann unter dem belebenden Hauche des Frühlings von neuem ein lustiges und lustiges Vagabundendasein zu führen. Solche Winterschläfer unter den Schmetterlingen sind in erster Linie die jedem Kinde geläufigen Vertreter der Tagfaltergattung *Vanessa*, deren dornigen Raupen mit nur wenigen Ausnahmen die unscheinbare Kessel als Futter dient, ebenso der wohlbekannte Citronenvogel (*Rhodocera rhamnii*), der seinen Namen freilich nur im männlichen Geschlechte rechtfertigt, mit diesem aber ebenso wie mit dem schwefelgelben Weibchen, wenn auch vereinzelter, überwintert.

Unter den Eulen verträumen im Falterzustande namentlich solche aus den Gattungen *Orrhodia*, *Xylina* und *Calocampa* in irgendwelchem schützenden Verstecke, zwischen dürrer Laube oder in Rindenrissen, den Winter und naschen, von der Märzsonne aus ihrer Erstarrung erlöst, an den sich erschließenden Weidenkästchen oder lassen sich an ausgehangenen Rüderschmüren ertappen. Einzelnen Faltern bietet sich auch in wenig beleuchteten Winkeln

unserer Wohnungen ein willkommenes Plätzchen für die Winterruhe. Dies gilt von den Banessen, wie von der Gule *libatrix* und der kleinen Noctue *Hypena rostralis*. Werden dann bei einem solchen Winterschläfer durch die wunderthätige Wärme die Lebensgeister wieder wach, und flattert oder taumelt er vielmehr noch halb schlaftrunken umher, dann wird er als Bote eines bald erscheinenden Lenzes angestaunt, und sogar Zeitungen nehmen von solchem falschen Frühlingsapostel Notiz. Und doch würde ein Blick auf den schäbigen Gesellen mit seinen abgetragenen, halbzerfetzten Flügeln uns belehren, daß er einen Teil seiner Erlebnisse bereits hinter sich hat. Wer Lust dazu hätte, könnte wohl jeden Wintermonat einen solchen Schläfer aus einer dunkeln Dachkammer in der warmen Stube aufleben und umherflattern sehen, unbeschadet des draußen tobenden Winterungestümes. Greift man übrigens gar zu gewaltsam in solche Winterruhe ein, daß man diese Schläfer mehrmals in der Wärme erwachen und nachher wieder erstarren läßt, so schlafen sie schließlich ein, um nie wieder, auch in der wärmenden Frühlingssonne nicht, zu erwachen.

Es liegt die Frage nahe, was wohl die Veranlassung sein mag, daß diese überwinterten Falterarten so aller Schmetterlingsgewohnheit zuwider nochmals nach Verlauf des Winters ein neues Leben beginnen, während doch sonst das Falterdasein bloß nach Wochen, wenn nicht gar nur nach Tagen zählt. Sicherlich ist es die Erhaltung des eigenen Geschlechtes, wenigstens will man in verschiedenen Fällen beobachtet haben, daß sich erst im Frühjahr die Geschlechter finden und somit erst zu dieser Zeit das Leben der überwinterten Falter seinen Höhepunkt erreicht. Auch wenn weiter, wie von *Plusia gamma* und *Agrotis ypsilon*, einzelne Falter überwintern, so sind auch hier kaum andere als Geschlechtsverhältnisse maßgebend. Die einzelnen sind eben nichts Anderes, als Nachzügler in der Ausübung ihres Geschlechtstriebes.

Eine ungewöhnliche Erscheinung bringt der Spätherbst dem Schmetterlingsammler. Dann lassen sich im Oktober und November, auch wenn schon einzelne Nachtfroste erscheinen, von *Hibernia aurantiaria* und *defoliaria* an den Straßenlaternen

die gelbflügeligen Männchen sehen, ihren Weibchen aber bleiben solche Laternenbesuche versagt, weil die von der erstgenannten Art nur Flügelstummel von $\frac{1}{4}$ Körperlänge tragen, die der letzteren jedoch ganz ungeflügelt sind und deshalb weit eher Anspruch auf Ähnlichkeit mit einer schlanken, hochbeinigen Baumwanze haben, als mit der eines Falterweibchens. Schwer verständlich ist es, daß diese Falter mit ihrem keineswegs robusten Körperbau nicht auch an der allgemeinen Erstarrung teilnehmen. Noch wunderbarer erscheint uns dies allerdings bei dem Frostspanner (*Cheimatobia brumata*), der bis weit in den Dezember hinein sich sehen läßt, und dessen „bessere Hälfte“ mit ihren Flügelstummeln der vernachlässigtere Teil ist. Die einzeln abgesetzten Eierchen geben dann erst nach ihrer Überwinterung die Käupchen, welche bei all ihrer Kleinheit den Obstbaumknospen so verhängnisvoll werden.

Wieviele der Schmetterlingsarten im Eistadium den Winter verbringen, läßt sich bei der Schwierigkeit der Beobachtung auch nicht einmal annähernd angeben. Der Kenner weiß schon aus der Form der Eier, von deren Mannigfaltigkeit eine Tafel in Hofmann's Raupenwerk eine wenn auch nicht erschöpfende, aber sehr fesselnde Darstellung giebt, und aus der Art, wie sie untergebracht sind, oft mit Sicherheit das betreffende Tier zu erkennen. Während das dickleibige, flügellose Weibchen von *Orgyia antiqua*, im Volksmunde wegen der sonderbaren büschelweisen Behaarung der Raupe Bürstenbinder genannt, seine Eier, allen Gefahren preisgegeben, auf der Oberseite seines Gespinnstes nebeneinander anklebt, der Weidenspinner (*Leucoma salicis*), dessen Flügel ein herrlicher, weißer Seidenglanz auszeichnet, seine Eierhäufchen an Pappel- und Weidenstämmen mit weißglänzendem Schleim überzieht, so daß die leichten Eilein nur schwer vom Sturm verweht werden können, kittet der Ringelspinner (*Bombyx neustria*) Ei an Ei zu einem Ringe um die Zweige der Futterpflanze, und nun haften sie so fest an einander, daß sich eher die Eierringe verschieben lassen, als daß sich die Eierchen aus ihrer Verbindung untereinander lösen.

Überwintern von der durch die wälderverwüstende Fressarbeit ihrer Raupe berühmte Nonne (*Psilura monacha*) die

Eierhäuschen als sogenannte Spiegel ohne besondere Schutzvorrichtungen an den Baumstämmen, so haben wir in der fürsorglichen Art, wie der Spinner *Ocneria dispar* seine Eier unterbringt, ein uns geradezu überraschendes Beispiel von Sorgfalt und Umsicht, wie es bei den Schuppenflüglern zu den Seltenheiten gehört. Das Weibchen, welches im Körperumfange das Männchen weit hinter sich läßt (daher der Artnamen *dispar*, d. i. ungleich), setzt seine Eier in Häuschen an Baumstämmen und Wänden ab, überzieht sie mit zähem Schleim und bedeckt sie mit den gelbbraunen, seidenweichen Härchen seines Aterpolsters. Als „großer Schwamm“ sind diese Eierhäuschen jedem Obstzüchter wohlbekannt, und den Thäter nennt er sehr bezeichnend Schwammspinner. Mit gleicher, mütterlicher Fürsorge bettet auch der Spinner *Porthesia chrysorrhoea* seine Brut auf der Unterseite der Blätter verschiedener Bäume in die aus seinem Hinterleibsende sich lösenden braunen Wollhärchen. Auch solch „kleiner Schwamm“ aber, wie der Obstbauer diese Eierhäuschen nennt, ist ihm mit Recht ein Dorn im Auge, denn der kleine wie der große „Schwamm“ liefern ihm lästige Fresser an seinen Obstbäumen. Sonderbarerweise hat aber hier diese schützende Wollhülle wenigstens als Winterschutz gar keinen Zweck, denn die noch vor Eintritt des Winters ausgeschlüpften Käupchen überwintern gar nicht unter der Schutzhülle, sondern überstehen in geschwisterlicher Vereinigung in einem Gespinnste, das sie sich aus skelettirten Blättern zusammengesponnen haben, den Winter.

Beide Arten des Eierschutzes, die des Ringelspinners und Schwammspinners, vereinigt *Bombyx catax* in sich, indem er die ringförmig um die Zweige befestigten Eier noch mit seiner bräunlichen Aterwolle überzieht. Von den in ganzen Schichten abgesetzten Eiern werden sicherlich nicht wenige von den scharfen Späheraugen der Meisen und Goldhähnchen aufgespürt. Größere Schwierigkeiten schon macht die Auffindung der einzeln überwinterten Eier, wie dies etwa bei der Eule mit dem erschrecklichen Artnamen *caeruleocephala*, die ihre grünen, oben gewölbten Eier einzeln an Laubhölzer, mit Vorliebe an Weißdorn, anklebt, der Fall ist.

Von den Eulen überwintert eine ganze Reihe in der Ei-

form; es mögen, mit Übergelung der zahlreichen einzelnen Arten, nur genannt sein: die Gattungen *Polia* und *Amphipyra*, *Orthosia* und *Xanthia* und die bekannten Ordensbänder. Jeder kundige Schmetterlingsfammer weiß, daß die sogenannten Käpchenraupen der Eulengattung *Xanthia* sich aus überwinterten Eiern entwickeln, der Laie freilich ahnt nicht, daß er mit dem im Frühjahr heimgeholtten blühenden Weidenkätzchen Duzende kleiner Käpchen mit eingetragen hat, aus denen sich der Hauptsache nach 3 Arten: *Xanthia flavago* und *fulvago* und *Orthosia circellaris* ergeben.

Besonders zahlreich sind diejenigen Schuppenflügler, die sich im Raupenzustande durch den Winter schlagen müssen. Freilich ist bei vielen nur die Thatsache, weniger die Art der Überwinterung bekannt. Auffallend ist dabei, daß gar viele Arten im zarten Raupenalter überwintern, ohne daß zum Schutze gegen die Unbilden der Witterung besondere Veranstaltungen ersichtlich wären. Im jugendlichen Zustande überwintern die häufigeren Arten der Spinnergattung *Lasiocampa* und verschiedene Spezies der mit charakteristischen, metallischen Abzeichen gezierten Eulengattung *Plusia*; ebenso überwintern ohne besondere Schutzvorrichtungen die affelförmigen Schildraupen der Bläulinge, die kleinköpfigen, gedrungenen Raupen der Hygänen, das Eulengeschlecht *Caradrina* und auf verschiedenen Altersstufen die artenreiche Gattung der Ackereulen (*Agrotis*).

Gar mannigfaltig sind die Vorkehrungen, um den vernichtenden Wirkungen des Winters zu begegnen. Jedes einzelne Tier hat darin seine eigentümliche Art. Während den jung überwinterten Bärenräupchen wenigstens ein schützendes Haarkleid verliehen ist, können die Jungräupchen der Spinnergattung *Hepialus* und der Grasswurzeleule (*Charaeas graminis*) in und zwischen Pflanzenwurzeln, die der Rohreulen (*Nonagria*) in hohlen Pflanzenstengeln, wo die Mutter mittels des Legestachels ihre Eier untergebracht hat, die Sesien- oder Glasflüglerraupen im Innern von Holzpflanzen getrost den Grimm des Winters über sich ergehen lassen. Bei der Eulengattung *Hadena*, von welcher eine Anzahl Arten als junge, andere als erwachsene Raupen überwintern, wird die Winterruhe teils im

filzigen Gewirr von Graßwurzeln, theils in Graßstengeln selbst, wie bei *strigilis* und *bicoloria*, abgehalten.

Bald erfolgt die Überwinterung einzeln, wie bei den kleinen Käupchen des Spinners *Porthesia similis*, die sich zwischen Baumrigen und hinter niedlichen, weißen Gespinnsten verbergen, bald in geselliger Vereinigung, wie bei dem Baumweißling (*Aporia crataegi*), dessen Jungräupchen in lockeren Gespinnsten zwischen dürren Blättern an den Zweigspitzen, sogenannten Raupennestern, und den jugendlichen Käupchen der rotgelb und schwarz gewürfelten und gescheckten *Melitaeen*, die auch gesellig in Fadengespinnten durchwintern, um sich wie jene erst im Frühlinge zu zerstreuen.

Vom Schillerfalter (*Apatura iris*), der uns mit seinem wunderbaren Farbenspiel ein Stück Tropenwelt vor Augen zaubert, machen sich die Jungräupchen mit den beiden charakteristischen Hörnchen am Kopfe durch Überspinnen der Zweigspitzen ihrer Futterpflanze, der Wollweide, eine Art Höhle zurecht, in welcher sie, dicht an den Zweig geschmiegt, den Winter überdauern, und einen ähnlichen Winteraufenthalt schaffen sich auch die Käupchen des Eisvogels (*Limenitis populi*), indem sie einzelne Blätter der Bitterpappel dicht zusammenziehen und durch Fäden an den Zweigen befestigen. Der unscheinbare kleine Spinner *Heterogenea limacodes* endlich überwintert mit seiner breiten, assel-förmigen Raupe in einem Tönnchen, welches an Eichblättern festgesponnen ist und mit diesen dann zu Boden fällt.

Absonderlich, wie ihre Entwicklung überhaupt, ist ganz besonders auch die Überwinterung der Psychiden oder Sackträger. Hier durchwintern die madenähnlichen Raupen in sackähnlichen Hüllen aus Laub-, Graß- oder Nadelresten, aber diese wunderlichen, zottigen Säcke, die man eher für Schlammklümpchen als für Tierwohnungen ansprechen möchte, sind nicht bloße Unterschlupfe für den Winter, ihre Bewohner wandern vielmehr damit, wie die Schnecke mit ihrem Häuschen, umher, ja die zeitlebens flügellos und madenähnlich bleibenden Psychenweibchen legen in ihrer Umhüllung ihre Eier ab und verenden in ihr, und so wird ihnen die eigene Wiege zum Sarge und wieder zur Wiege für den Nachwuchs.

Bei vielen der überwinternden Eulenraupen unterbricht übrigens der Winter nie ganz ihre Lebensthätigkeit, vielmehr scheint die ihnen eigene Freßlust sie nicht ganz zur Ruhe kommen zu lassen, denn bei frostfreiem Winterwetter lassen sie sich ihr in niederen Pflanzen bestehendes Futter wohlschmecken. An solchem darf es selbstverständlich auch der Raupenzüchter nicht fehlen lassen, wenn er diese seine Pfleglinge glücklich durch den Winter bringen will.

Dem aufmerksamen Raupenzüchter wird die räthselhafte Erscheinung nicht unbekannt sein, daß einzelne Raupen völlig erwachsen überwintern, ohne sich, wie es Raupenbrauch ist, bei der Vollwüchsigkeit zu verpuppen. So liegen die Ackereule *Agrotis exclamationis*, die Eule *Hadena adusta* und *Caradrina morpheus* während des langen Winters unverpuppt und unthätig in ihren aus Erdkrümchen zusammengeleimten Gehäusen, so bezieht die vollgenährte, dunkelhaarige und gelbgeringelte Raupe von *Bombyx rubi* unter Moos und Laub ein Winterlager, spart sich aber ihre Verpuppung für das Frühjahr auf, ja der bekannte Weidenbohrer (*Cossus cossus*) verläßt sogar sein als Winterlager benütztes Cocon, um sich im Frühlinge noch ein besonderes Puppengehäuse anzufertigen. Was veranlaßt nun wohl diese Tiere, die Arbeit der Verpuppung bis zum Frühjahre zu verschieben? Fühlen sie sich zu schwach dazu, die Einpuppung noch vor dem Winter zu besorgen? Auf diese Fragen kann leider eine bestimmte Antwort nicht gegeben werden. Möglich ist allerdings, daß diese Spätlinge sich erst durch die Winterruhe genügende Kräfte zu dem ohne Zweifel anstrengenden Geschäfte der Verpuppung sammeln müssen.

Im Stadium der Puppe endlich treten weitaus die meisten Schuppenflügler in den Winter ein. Da sind zunächst unsere an den Flügeln lange Sporen tragenden Ritter Schwalbenschwanz und Segelfalter zu nennen. In zweifacher Befestigung finden wir ihre „Gürtelpuppen“ an den Futterpflanzen, denn mit weiser Vorsicht haben sich die Raupen am hinteren und zugleich unteren Ende angesponnen, außerdem aber durch einen festen Fadengürtel um die Mitte des Leibes sich vor dem Herabfallen geschützt. Ganz dieselbe Schutzvorrichtung ist aber auch bei den

an Baumstämmen und Hausmauern überwinterten Puppen der Weißlinge und bei den so sonderbar kahnförmig gebogenen und vorn und hinten zugespitzten Puppen des schönen Aurorafalters (*Anthocharis cardamines*) zu beobachten.

Überdauern die meisten Sphingiden und zahlreiche Eulen, beispielsweise den Gattungen *Mamestra* und *Dianthoecia* zugehörnde Arten, als Puppen frei in der Erde liegend den Winter, so leimen sich wieder andere aus Erdkrümchen zierliche Gehäuse für ihre Puppen zusammen, z. B. die Eulengattungen *Taeniocampa* und *Cucullia*, und wer die aus abgenagten Holzsplitterchen und den langen Haaren des Raupenkleides kunstvoll gewebten Gespinste der Noctuen *Acronycta aceris* und *megacephala* am Grunde der Baumstämme findet, ist versucht, sie für Gebilde von Spinnern, den Meistern in der Herstellung von Puppenwohnungen, zu halten.

Die beiden Wickelspinner *Hylophila prasinana* und *Earias clorana* betten ihre Puppen in kahnförmige Gespinste und der Buchenspinner *Stauropus fagi* die seinigen in einen seidenähnlichen Cocon zwischen zusammengezogenen Blättern; zwischen solchen spinnen sich aber auch die Spinnergattungen *Drepana* und *Pygaera* ein, so daß das vom Herbststurm zu Boden geworfene Laub diesen wie vielen anderen Puppen gegen die Winterkälte wie gegen etwaige Nachstellungen den besten Schutz gewährt.

Wer hätte weiter nicht schon mit Bewunderung die kunstreichen, flaschenähnlichen Gespinste von *Saturnia pavonia*, die an ihrer Öffnung nach Art der Fischreusen, und zwar durch einen Haarfranz verschlossen sind, betrachtet? Oder welchem Schmetterlingsjämmler wären die schier unverwüstlichen, aus abgenagten Holzteilchen zusammengeleimten Puppengehäuse des Spinnergeschlechtes *Harpyia* unbekannt? Wie wenig aber auch das denkbar festeste Gespinst, das außerdem durch eingewebte Moose und Flechten sich geschickt zu verbergen weiß, gegen den Falkenblick und den eisenfesten Schnabel des Spechtes schützen, das hat schon mancher Sämmler zu seinem Leidwesen erfahren müssen, wenn er das Gespinst von *Hybocampa milhauseri* an Eichstämmen — erbrochen und ausgefressen fand.

Allen den Winter in Puppenform verbringenden Schuppenflüglern ist dieser keineswegs eine Zeit träger, starrer Ruhe, sondern es bereitet sich während desselben in der Puppe eines jener alltäglichen Wunder vor, an denen der gedanken- und gefühllose Mensch gleichgiltig vorübergeht: Die häßliche, gefräßige Raupe wandelt sich um in einen farbenprächtigen, leichtbeschwingten, Nektar schlürfenden Falter, der nach Winters Ende aus seinem Puppenfarge hervorgeht zu einem neuen Leben voll Duft und Sonnenschein. Damit aber ist der Schmetterling dem Christen zu einem lebendigen Symbol seiner eigenen Auferstehung geworden.

Die vorstehende Arbeit kann natürlich nicht Anspruch darauf erheben, die Schmetterlingswelt in ihrem Verhältnis zum Winter erschöpfend darzustellen, sondern sie will nur eine einfache Anregung sein, den mancherlei noch ungelösten Rätseln in der kleinen Lebewelt weiter nachzuspüren, und wahrlich, es wäre nicht die undankbarste Aufgabe der entomologischen Vereine, das vielfache Dunkel, namentlich in den biologischen Verhältnissen der Insekten, lichten zu helfen.

Ghemniz.

Dreiecks-Rätsel.

Von Dr. D. Krancher.

In die Felder nebenstehender Figuren sollen die Buchstaben:

A, A, A, E, H, H, J, J, O, O,
R, R, S, S, T,

so eingesetzt werden, daß die entsprechenden wagrechten und senkrechten Reihen gleichlautend bezeichnen:

1. Den Gattungsnamen reizender Tagsschmetterlinge.
2. Einen kleinen Tagfalter.
3. Die lateinische Bezeichnung eines heiligen Ortes.
4. Einen als Raupe wie als Schmetterling häufigen Tagfalter.
5. Einen einzelnen, oft als Ruhegebot verwendeten Buchstaben.

(Auflösung: Siehe letzte Seite des Textes.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [1895](#)

Autor(en)/Author(s): Lauckner A.

Artikel/Article: [Der Winter in der Schmetterlingswelt 156-164](#)