



## Diptera.

### Verzeichnis der im Jahre 1905 in der Umgebung von Brünn erbeuteten Dipteren (Brachycera).

Von Fachlehrer Karl Landrock, Brünn (Mähren).

Mein Sammelgebiet war Brünn, die Hauptstadt Mährens, mit seiner nähern und weitem Umgebung. — Während die nördlich und westlich von Brünn gelegenen Gegenden von schönen, bewaldeten Gebirgszügen bedeckt sind, hat der Süden und Osten mehr ebenen Charakter. Dort sind es die schattigen Waldwege, die von blühendem Gebüsch reich umstandenen Waldränder und die sonndurchglühten, blumenreichen Waldwiesen, hier die von zahlreichen Wassergräben durchzogenen oder doch sehr feuchten busch- und grasreichen Auen, die für den Dipteren Sammler ausgezeichnete Fangplätze bilden. Im Walde und auf den blumigen Wiesen gebrauchte ich fleißig das Fangnetz, während an den grasreichen Stellen der feuchten Auen mit bestem Erfolge der Kätscher verwendet wurde.

Den Fang betrieb ich zu jeder Tageszeit; sofern es mir nur mein Beruf erlaubte, war ich draußen, und niemals ging ich leer heimwärts. Besonders gute Ergebnisse erzielte ich immer nach vorausgegangenem Regen an sonnigen, warmen Tagen; doch auch kalte, regnerische Tage liefern eine sehr hübsche Ausbeute, nur muß man es dann verstehen, die erstarrten Tierchen aus ihren Verstecken hervorzuholen, was leicht und mühelos mit dem Kätscher am ersten besten Waldrande stets gelingen wird.

Nachstehend habe ich das Fangergebnis des Jahres 1905, systematisch geordnet, zusammengestellt und in Schlagwörtern den Fundort beigelegt; die Zahlen bedeuten den Monat des Fanges; s. bedeutet seltenes Vorkommen.

#### I. Stratiomyidae.

Nemotelus pantherinus L.	— Auf feuchten Wiesen. 6.—8.
„ nigrinus Fall.	— „ „ „ 7.

## Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren. 171

<i>Ephippium thoracicum</i> Panz.	— An Dolden, besond. <i>Heracleum</i> . 7. s.
<i>Oxycera trilineata</i> Fb.	— An Wassergräben. 6. s.
„ <i>analis</i> Mg.	— „ „ 6.—7.
<i>Stratiomys longicornis</i> Scop.	— An Wasserpflanzen ( <i>Roripa</i> ). 6., 7.
„ <i>chamaeleon</i> Dg.	— An Dolden ( <i>Pastinaca</i> ). 8.
<i>Odontomyia tigrina</i> Fb.	— Auf feuchten Wiesen. 5., 6.
„ <i>viridula</i> Fb.	— „ „ „ 5.—8.
„ <i>hydroleon</i> L.	— „ „ „ 7.—8.
<i>Sargus cuprarius</i> L.	— An Gras. 6.—8.
„ <i>nubeculosus</i> Zett.	— Dürre Abhänge. 7. s.
<i>Chrysomyia formosa</i> Scop.	— An Gras, Gesträuch. 5.—8.
<i>Beris fuscipes</i> Mg.	— An Gras. 5.—8.

**II. Coenomyidae.**

<i>Coenomyia ferruginea</i> Scop.	— In Holzschlägen. 6.
-----------------------------------	-----------------------

**III. Tabanidae.**

<i>Tabanus gigas</i> Herbst.	— In schattigen Waldalleen. 6.
„ <i>quatuornotatus</i> Mg.	— In Waldstraßen. 7.
„ <i>rusticus</i> L.	— An Dolden ( <i>Heracleum</i> ). 8.
„ <i>spodopterus</i> Mg.	— Auf Viehweiden. 7.—8.
„ <i>sudeticus</i> Zell.	— „ „ 7.—8.
„ <i>autumnalis</i> L.	— „ „ 6.—8.
„ <i>bromius</i> L.	— An Waldwegen. 7.—8.
<i>Haematopota pluvialis</i> L.	— „ „ 5.—8.
<i>Chrysops caecutiens</i> L.	— „ „ 5.—9.

**IV. Bombyliidae.**

<i>Anthrax maura</i> L.	— An sonnigen Waldwegen. 6.—7.
„ <i>morio</i> L.	— An sonnigen Waldwegen. 6.—8.
„ <i>paniscus</i> Ros.	— Auf dünnen, sonnigen Hängen. 7.
„ <i>flava</i> Mg.	— Auf sonnigen Wegen; auch auf Dolden. 7.—8.
<i>Argyromoeba sinuata</i> Fall.	— Auf sonnigen Wegen. 8. s.
<i>Bombylius ater</i> Scop.	— Auf sonnigen Waldwegen. 7.
„ <i>discolor</i> L.	— Auf <i>Pulmonaria</i> -Blüten, Frühling. 3.—5.
„ <i>venosus</i> Mik.	— Auf sandigen Abhängen. 5., 6., 7.

## 172 Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren.

*Bombylius cinarens* Mik. — Auf sandigen Abhängen.  
6., 7., 8.

**V. Empididae.**

*Pterospilus muscarius* Fb. — Auf feuchten Wiesen.  
7., 8.  
*Hybos femoratus* Müll. — An Gras. 6.  
*Mircophorus velutinus* Marg. — „ „ 6.  
*Rhamphomyia sulcata* Fall. — An Waldrändern. 4.—5.  
„ *anthracina* Mg. — „ „ 8.  
*Empis maculata* Fb. — Auf blühenden *Crataegus*-  
Sträuchern. 5.  
„ *livida* L. — An Wasserpflanzen. 5.—8.  
„ *florisomna* Loew. — Auf *Potentilla*-Blüten. 4.—5.  
„ *pennipes* L. — An Gras. 6.  
„ *stercorea* L. — Auf feuchten Wiesen. 6.  
*Pachymeria femorata* Fb. — „ „ „ 6.

**VI. Asilidae.**

*Leptogaster cylindricus* Deg. — Auf Wiesen. 7., 8.  
*Dioctria longicornis* Mg. — Auf Gesträuch. 7, s.  
„ *oelandica* L. — Auf Gesträuch. 6.—7.  
„ *hyalipennis* Fb. — Auf Gesträuch. 7.  
*Laphria flava* L. — In Holzschlägen. 8.  
„ *gilva* L. — An Kieferstämmen. 7.—8.  
„ *ignea* Mg. — „ „ 7.—8. s.  
„ *marginota* L. — In Holzschlägen. 7.  
*Andrenosoma atra* L. — An Holzplanken 8.  
*Asilus crabroniformis* L. — Auf Hutweiden, Straßen.  
6.—9.  
„ *germanicus* Fb. — In Holzschlägen. 7.  
„ *praemorsus* Loew. — An Baumstämmen. 8.  
„ *rufibarbis* Mg. — „ „ 8.  
„ *atricapillus* Fll. — „ „ 8.  
„ *chrysitis* Mg. — „ „ 8.  
„ *cyanurus* Loew. — „ „ 8.  
„ *cothurnatus* Mg. — An Gras. 7.—8.

**VII. Scenopinidae.**

*Scenopinus fenestralis* L. — An Fenstern. 7.—8.

**VIII. Therevidae.**

*Thereva praecox* Egg. — An Waldrändern. 6. s.

## Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren. 173

**IX. Leptidae.**

<i>Leptis maculata</i> Deg.	— Auf feuchten Wiesen. 7. s.
„ <i>vitripennis</i> Mg.	— „ „ „ 6.—8.
„ <i>tringaria</i> L.	— „ „ „ 6.—8.
<i>Chrysopila aurea</i> Mg.	— „ „ „ 8.
„ <i>atrata</i> Fb.	— „ „ „ 6., 7.
<i>Atherix ibis</i> Fb.	— An Waldrändern. 6. s.

**X. Dolichopidae.**

<i>Argyra argentata</i> Macq.	— An Wassergräben. 6., 7.
<i>Gymnopternus fumipennis</i> Stan.	— „ „ „ 7.
<i>Dolichopus aeneus</i> Deg.	— Auf feuchten Wiesen. 5.—8.
<i>Sybstroma nodicornis</i> Mg.	— An Wasserpflanzen. 5.—6.

**XI. Pipunculidae.**

<i>Pipunculus furcatus</i> Egg.	— An feuchten, schattigen Orten. 7.
„ <i>auctus</i> Fall.	— An feuchten, schattigen Orten. 7.
„ <i>elegans</i> Egg.	— An feuchten, schattigen Orten. 7.

**XII. Syrphidae.**

<i>Microdon devius</i> L.	— An Wassergräben. 5.—6.
<i>Chrysotoxum bicinctum</i> L.	— „ „ „ 6., 7., 8.
„ <i>festivum</i> L.	— Auf Dolden. 7., 8.
„ <i>vernale</i> Loew.	— „ „ „ 6., 7., 8.
„ <i>octomaculatum</i> Curt.	— „ „ (Pastinaca). 8.
„ <i>elegans</i> Loew.	— „ „ „ 7., 8.
<i>Paragus tibialis</i> Fall.	— „ „ „ 8.
„ <i>albifrons</i> Fall.	— „ „ „ 8.
„ <i>bicolor</i> Fb.	— „ „ „ 8.
<i>Pipizella virens</i> Fb.	— „ „ „ 7., 8.
„ <i>annulata</i> Macq.	— „ „ „ 7., 8.
<i>Pipiza festiva</i> Mg.	— „ „ „ 7.
„ <i>funebis</i> Mg.	— „ „ „ 7., 8.
<i>Chrysogaster viduata</i> L.	— An Wassergräben. 6.—8.
„ <i>aenea</i> Mg.	— „ „ „ 6.
„ <i>basalis</i> Loew.	— „ „ „ 7.
<i>Orthoneura brevicornis</i> Loew.	— An Wasserpflanzen ( <i>Ranunculus</i> ). 6., 7.
<i>Cheilisia oestracea</i> L.	— Auf Waldwiesen. 8.
„ <i>variabilis</i> Panz.	— An Dolden. 7., 8.
„ <i>antiqua</i> Mg.	— An <i>Ranunculus</i> -Blüten. 6., 7.

## 174 Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren.

<i>Cheilosia pubera</i> Zett.	— An Raununculus-Blüten. 6., 7.
„ <i>pulchripes</i> Loew.	— An Dolden. 7., 8.
„ <i>carbonaria</i> Egg.	— „ „ 7., 8.
„ <i>modesta</i> Egg.	— „ „ 7., 8.
<i>Melanostoma ambigua</i> Fall.	— „ „ 7., 8.
„ <i>mellina</i> L.	— „ „ 7., 8.
<i>Platycheirus peltatus</i> Mg.	— „ „ 7., 8.
<i>Syrphus pyrastris</i> L.	— „ „ 6., 7., 8.
„ <i>laternarius</i> Mill.	— „ „ (Heracleum). 8. s.
„ <i>lunulatus</i> Mg.	— „ „ 8.
„ <i>corollae</i> Fb.	— „ „ 7., 8., 9.
„ <i>luniger</i> Mg.	— „ „ 8.
„ <i>balteatus</i> Deg.	— „ „ 7., 8.
„ <i>nitidicollis</i> Mg.	— Auf Gebüsch. 5., 6.
„ <i>ribesii</i> L.	— Auf Dolden. 5.—9.
<i>Melithreptus strigatus</i> Straeg.	— „ „ 5.—9.
„ <i>scriptus</i> L.	— „ „ 6.
„ <i>dispar</i> Loew.	— „ „ 7. s.
<i>Xanthogramma citrofasciata</i> Dg.	— Auf Gebüschchen. 6.
„ <i>ornata</i> Mg.	— „ „ 5., 6., 7.
<i>Volucella bombylans</i> L.	— Auf Dolden (Daucus). 6., 7.
„ <i>pellucens</i> L.	— An blumigen Halden. 7., 8.
„ <i>inflata</i> Fb.	— Auf Dolden. 8. s.
„ <i>inanis</i> L.	— „ „ (Heracleum). 8.
<i>Eristalis sepulcralis</i> L.	— An Wassergräben. 5., 6., 7., 8.
„ <i>aenea</i> Scop.	— „ „ 3.—9.
„ <i>tenax</i> L.	— Auf Dolden — Fenster. 4.—10.
„ <i>arbustorum</i> L.	— Auf Dolden. 6., 7., 8.
„ <i>pratorum</i> Mg.	— „ „ 7., 8.
„ <i>pertinax</i> Scop.	— „ „ 8.
„ <i>nemorum</i> L.	— „ „ 8.
<i>Helophilus florens</i> L.	— „ „ 5.—9.
„ <i>nigrotarsatus</i> Schin.	— Auf Waldwiesen. 8.
„ <i>pendulus</i> L.	— An Wassergräben. 5.—6.
„ <i>trivittatus</i> Loew.	— Auf Cirsium-Blüten. 8.
„ <i>frutetorum</i> Fb.	— Auf Roripa-Blüten. 6.—7.
„ <i>transfugus</i> L.	— An Wassergräben. 6. s.
<i>Xylota segnis</i> L.	— Auf Cornus-Blüten. 6.—7.
„ <i>lenta</i> Mg.	— In Holzschlägen 6.
„ <i>femorata</i> L.	— „ „ 6.
<i>Syritta pipiens</i> L.	— Auf Blüten. 7.—9.
<i>Eumerus lunulatus</i> Mg.	— Auf Dolden. 7.—8.

## Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren. 175

- Chrysochlamis nigrifrons* Egg. — An ausfließenden Baum-  
säften. 8.  
*Spilomyia bombylans* Fb. — Auf Waldwegen. 5.—6.  
„ *vespiformis* L. — „ „ 7.

**XIII. Conopidae.**

- Conops flavipes* L. — Auf Dolden. 8.  
*Physocephala rufipes* Fb. — Auf Campanula-Blüten.  
6.—7.  
*Oecemyia atra* Fb. — Auf Cirsium-Blüten. 7., 8.  
*Sicus ferrugineus* L. — Auf Wiesen. 7.—8.  
*Myopa buccata* L. — An Gras. 5.—6.  
„ *testacea* L. — „ „ 6.  
„ *oculta* Mg. — Auf Blüten. 7.

**XIV. Muscidae.**

- Phasia analis* Fb. — Auf Dolden. 7., 8., 9.  
„ *crassipennis* Fb. — „ „ 7., 8., 9.  
*Alophora hemiptera* Mg. — Auf Achillea-Dolden. 8.  
„ *aurigera* Egg. — „ „ „ 8.  
„ *umbripennis* Mg. — „ „ „ 8.  
„ *atropurpurea* Mg. — „ „ „ 8.  
„ *semicinerea* Mg. — „ „ „ 8.  
*Xysta semicana* Egg. — „ „ „ 8.  
*Gymnosoma nitens* Mg. — Auf Dolden. 7.—9.  
„ *rotundata* L. — „ „ 7.—9.  
*Cistogaster globosa* Fb. — „ „ 7.—8.  
*Ocyptera pilipes* Loew. — Auf Eryngium-Blüten. 7.—8.  
„ *brassicaria* Fb. — „ „ „ 7.—9.  
„ *cylindrica* Fb. — „ „ „ 8.  
*Echinomyia ferox* Panz. — In Holzschlägen. 8.  
„ *tesselata* Fb. — Auf Dolden. 8.  
„ *grossa* L. — Auf Waldwiesen. 8.  
„ *fera* L. — Auf Dolden. 7.—9.  
„ *magnicornis* Zett. — Auf Blüten. 6., 7., 8., 9.  
*Micropalpus comptus* Fall. — Auf Heracleum-Dolden. 8.  
„ *pictus* Mg. — „ „ „ 8.  
*Demoticus plebejus* Fall. — „ „ „ 8.  
*Oliviera lateralis* Fb. — Auf Dolden. 8.  
*Zophomyia temula* Scop. — Auf Blüten. 6.—7.  
*Gonia fasciata* Mg. — An Wegen. 5.—6.  
„ *capitata* Deg. — „ „ 6.  
*Cnephalia bucephala* Mg. — Auf Dolden. 7.—8. s.  
*Nemoraea vivida* Zett. — „ „ 8.

## 176 Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren.

<i>Nemoraea radicum</i> Fb.	— Auf Dolden.	8.
<i>Exorista confinis</i> Fall.	— „ „	8.
„ <i>agnata</i> Rond.	— „ „	8.
<i>Tachina larvarum</i> L.	— „ „	8.
„ <i>vidua</i> Mg.	— „ „	8.
„ <i>erucarum</i> Rond.	— „ „	8.
„ <i>nigricans</i> Egg.	— „ „	8.
<i>Masicera rutila</i> Mg.	— „ „	8.
<i>Phorocera caesifrons</i> Macq.	— Auf dürrem Laube.	5.—8.
<i>Frontina laeta</i> Mg.	— Auf Dolden.	8.
<i>Rhinophora atramentaria</i> Mg.	— „ „	8.
„ <i>melania</i> Mg.	— „ „	8.
<i>Thelaira leucozona</i> Panz.	— „ „	6.—7.
<i>Dexia rustica</i> Fb.	— „ „	7.—8.
<i>Phorostoma subrotunda</i> Rob.	— „ „	8.
<i>Microphthalma europaea</i> Egg.	— „ „	8.
<i>Sarcophila meigenii</i> Mg.	— Auf <i>Heracleum</i> -Dolden.	7., 8.
<i>Sarcophaga pumila</i> Mg.	— Auf Dolden.	7.
„ <i>carnaria</i> L.	— „ „	5.—9.
„ <i>cruentata</i> Mg.	— „ „	7.
<i>Cynomyia mortuorum</i> L.	— „ „	7.—8.
<i>Onesia sepulcralis</i> Mg.	— An Holzplanken, auf Dol-	den. 3.—8.
„ <i>cognata</i> Mg.	— Auf Dolden.	7.
„ <i>gentilis</i> Mg.	— „ „	8.
<i>Stomoxys calcitrans</i> L.	— In Wohnungen u. Ställen.	7., 8., 9.
<i>Graphomyia maculata</i> Scop.	— Auf Dolden.	8.—9.
<i>Calliphora vomitoria</i> L.	— An Planken und an Fen-	stern. 5.—10.
„ <i>crythrocephala</i> Mg.	— An Planken.	5.—8.
„ <i>azurea</i> Fall.	— Auf Dolden.	7.
<i>Pollenia vespillo</i> Fb.	— An Mauern, Planken.	2.—10.
„ <i>rudis</i> Fb.	— „ „ „	2.—10.
<i>Dasyphora pratorum</i> Mg.	— „ „ „	3.
<i>Lucilia regina</i> Mg.	— Auf Holzstößen.	4.—8.
„ <i>nobilis</i> Mg.	— Auf Dolden.	7., 8.
„ <i>caesar</i> L.	— Auf Dolden, an Planken	und Fenstern. 5.—9.
„ <i>cornicina</i> Fb.	— Auf Dolden.	8.
„ <i>sylvarum</i> Mg.	— „ „	8.
<i>Pyrellia cadaverina</i> L.	— An Fenstern.	7.
<i>Musca domestica</i> L.	— In Wohnungen.	2.—11.
„ <i>corvina</i> Fb.	— „ „	7., 8.

## Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren. 177

<i>Musca vitripennis</i> Mg.	— Im Freien, setzen sich an die Kleider. 8.
<i>Cyrtoneura hortorum</i> Fall.	— Auf Dolden. 8.
„ <i>stabulans</i> Fall.	— An Mauern. 6.—8.
„ <i>pabulorum</i> Fall.	— „ „ 3.
„ <i>pascuorum</i> Mg.	— „ „ , auf Dolden. 8.
<i>Aricia obscurata</i> Mg.	— Auf Dolden. 8.
„ <i>eratica</i> Fll.	— An Fenstern. 7.
„ <i>vagans</i> Fall.	— Auf Dolden. 7.
„ <i>pallida</i> Fb.	— „ „ 6.—8.
„ <i>populi</i> Mg.	— „ „ 8.
<i>Spilogaster semicinerea</i> Wied.	— „ „ 7.
„ <i>quadrum</i> Fb.	— „ „ 7.
„ <i>urbana</i> Mg.	— „ „ 7.
<i>Hydrotea ciliata</i> Fb.	— Auf Gebüsch, ♂ schweben. 7., 8.
„ <i>dentipes</i> Fb.	— Auf Gebüsch. 6.—8.
„ <i>brevipennis</i> Loew.	— „ „ 8.
<i>Ophyra leucostoma</i> Wied.	— „ „ 7.—8.
<i>Drymeia hamata</i> Fall.	— Auf Dolden. 8.
<i>Limnophora pertusa</i> Mg.	— „ „ 8.
„ <i>tristis</i> Mg.	— „ „ 8.
<i>Anthomyia pluvialis</i> L.	— Auf Dolden. 6., 7., 8.
<i>Homalomyia canicularis</i> L.	— An Fenstern. 8.
„ <i>armata</i> Mg.	— Auf Gebüsch. 8.
<i>Cordylura pubera</i> L.	— Auf Schilf, an Teichufern. 7.
<i>Scatophaga analis</i> Mg.	— Auf Gebüsch. 7.
„ <i>lutaria</i> Fb.	— An Exkrementen. 7.
„ <i>stercoraria</i> L.	— „ „ 4. — 9.
„ <i>medardaria</i> Fb.	— „ „ 5.—8.
<i>Helomyza rufa</i> Fall.	— An Wassergräben. 6.—7.
„ <i>ustulata</i> Mg.	— „ „ 7.—8.
„ <i>praeusta</i> Mg.	— „ „ 8.
„ <i>pallida</i> Fall.	— „ „ 8.
<i>Leria serrata</i> L.	— An Fenstern. 2., 3.
„ <i>modesta</i> Mg.	— An Planken. 3.
<i>Heteromyza flavipes</i> Zett.	— An Gras. 8.
<i>Clusia flava</i> Mg.	— „ „ 8.
<i>Dryomyza anilis</i> Fall.	— An Wassergräben. 8.
<i>Phaeomyia nigripennis</i> Fb.	— An Gras. 8.
<i>Sciomyza cinerella</i> Fall.	— „ „ 8.
„ <i>dubia</i> Fall.	— „ „ 7.
<i>Tetanocera laevifrons</i> Loew.	— An Wassergräben. 7.
„ <i>sylvatica</i> Mg.	— „ „ 8.

## 178 Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren.

<i>Tetanocera robusta</i> Loew.	— An Wassergräben. 7.
„ <i>ferruginea</i> Fall.	— „ „ 6.—8.
„ <i>reticulata</i> Fb.	— „ „ 6.—8.
„ <i>punctulata</i> Scop.	— „ „ 8. s.
„ <i>coryleti</i> Scop.	— „ „ 7. s.
<i>Limnia unguicornis</i> Scop.	— „ „ 5., 6., 7., 8.
„ <i>obliterata</i> Fb.	— An Cirsium-Blüten. 7. s.
<i>Sepodon spinipes</i> Scop.	— An Wassergräben. 7.
<i>Otites lamed</i> Schrank.	— An blühenden Crataegus- Sträuchern. 5.
<i>Ortalis formosa</i> Panz.	— An blühenden Crataegus- Sträuchern. 5.
„ <i>centralis</i> H.	— An Gras. 7.
<i>Ceroxys hyalinata</i> Panz.	— An Schilf, an Teichufern. 7.
<i>Herina paludum</i> Fall.	— An Gras. 7.
„ <i>frondescentiae</i> L.	— „ „ 7.
<i>Platystoma seminationis</i> Fb.	— Auf Gesträuch. 5.—9.
<i>Ulidia erythrophthalma</i> Mg.	— An Gras. 7.
<i>Myodina vibrans</i> L.	— Auf Dolden. 7. s.
<i>Chloria demandata</i> Fb.	— An Planken. 7., 8.
<i>Lauxania aenea</i> Fall.	— An Gras. 5.—8.
<i>Sapromyza lupulina</i> Fb.	— An Gras. 8.
„ <i>rorida</i> Fall.	— „ „ 8.
„ <i>praeusta</i> Fall.	— „ „ 8.
„ <i>marginata</i> Mg.	— „ „ 8.
<i>Acidia heraclei</i> L.	— „ „ 6.
„ <i>cognata</i> Wied.	— Auf Distel-Köpfen. 7., 8.
<i>Trypeta falcata</i> Scop.	— Auf Tragopogon-Blüten. 7.
„ <i>onotrophes</i> Loew.	— „ „ „ 7.
„ <i>ruficauda</i> Fb.	— „ „ „ und Hier- acien-Blüten. 7., 8.
„ <i>acuticornis</i> Loew.	— Auf Cirsium lanceolatum. 7., 8.
<i>Urophora stylata</i> Fb.	— Auf Cirsium lanceolatum. 7., 8.
„ <i>quadrifasciata</i> Mg.	— An Gras. 8.
<i>Carpotricha pupillata</i> Fall.	— „ „ 8. s.
<i>Oxiphora miliaria</i> Schrank.	— Auf Cirsium-Blüten. 7., 8.
<i>Tephritis pantherina</i> Fall.	— Auf blumigen Wiesen. 8.
„ <i>flavipennis</i> Loew.	— „ „ „ 8.
„ <i>tesselata</i> Loew.	— „ „ „ 8.
„ <i>formosa</i> Germ.	— „ „ „ 8.
„ <i>leontodontis</i> Deg.	— „ „ „ 7.—8.
„ <i>ruralis</i> Loew.	— Auf trockenen Hügeln. 5.

## Verzeichnis der im Jahre 1905 erbeuteten Dipteren. 179

Sepsis annulipes Mg.	— An Gras. 6., 7., 8.
„ violacea Mg.	— „ „ 6.—8.
„ cynipsea L.	— „ „ 6.—8.
Calobata cibaria L.	— In Gärten, an Fenstern. 7.
Micropeza corrigiolata L.	— Auf Blüten, im Gebüsch. 6., 7., 8.
Psila fimetaria L.	— Auf feuchten Wiesen. 6., 7.
„ nigricornis Mg.	— „ „ „ 8.
Chlorops rufina Zett.	— An Gras (geschöpft). 8.
„ didyma Zett.	— „ „ „ 8.
„ laeta Mg.	— „ „ „ 8.
„ taeniopus Mg.	— „ „ „ 6.
„ cereris Fall.	— „ „ „ 7.
Notiphila cinerea Fall.	— „ „ „ 7.
Opomyza germinationis L.	— „ „ „ 8.
„ florum Fb.	— „ „ „ 8.
Geomyza combinata L.	— „ „ „ 8.
„ tripunctata Fall.	— „ „ „ 7.
Sphaerocera subsultans Fb.	— „ „ „ 5., 6.

## Die Kreuzspinne als Wetterprophet.

Durch Raupenfutter hatte ich eine Kreuzspinne mit ins Zimmer gebracht; diese war geflüchtet, bevor ich das Futter in den Raupenkasten eingestellt hatte. Direkt am meist offenen Fenster fand ich am nächsten Morgen ihr schönes, regelmäßig gewebtes Netz vor, so daß ich Gelegenheit hatte, sie einige Wochen bequem zu beobachten, bis sie beim Fensterputzen leider dem „schwächern“ Geschlechte weichen mußte! Bei Sonnenschein und hellem, freundlichem Wetter hielt sie sich stets in der Mitte ihres Nestes auf, hier geduldig auf Beute wartend. Zog sie sich jedoch in den sackartigen Winkel des Nestes in der Fensterrahmen-Ecke zurück, so war am nächsten Tage gewiß auf Wind und Regen zu rechnen. Gelegentlich suchte sie dann verletzte Stellen des Nestes zu reparieren, jedoch bald wieder in ihren Schmollwinkel zurückkehrend, wohin sie sogar ihre Beute mitnahm. Blieb sie aber während ihrer Arbeit im Netze sitzen, hier umfängliche Ausbesserungen vornehmend und neue Fäden einschaltend, so kehrte bald gutes Wetter wieder. Von besonderem Interesse war mir, daß der anfangs ganz kleine Spinnkörper in kaum zwei Tagen sich zu einem etwa haselnußgroßen Leibe aufblähte. Daran war wohl die gute Kost schuld, für die ich natürlich reichlich sorgte.

Dr. Krancher.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1907](#)

Autor(en)/Author(s): Landrock Karl

Artikel/Article: [Verzeichnis der im Jahre 1905 in der Umgehung von Brünn erbeuteten Dipteren \(Brachycera\) 170-179](#)

