<del>深层密密器系数数影器器器器器器器器器</del> 

## Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens.

Von Hugo Skala, Fulnek.

Als Grundlagen für dieselbe müssen angesehen werden:

1. Bezüglich der Großschmetterlinge der Catalogus insectorum faunae bohemicae, Prag 1897, von Dr. Ottokar Nickerl, ein bloßes Namensverzeichnis, und "Die Spanner

Böhmens", Prag 1907, von demselben Verfasser.

2. Bezüglich der Microlepidopteren liegen die ausgezeichneten und eingehenden Arbeiten Dr. Ottokar Nickerls vor,

und zwar:

Die Zünsler Böhmens, Prag 1906.

Die Wickler Böhmens, Prag 1906.
Die Motten Böhmens, Prag 1908.
Die Federmotten Böhmens, Prag 1910.
Es kann daher ohne Einschränkung behauptet werden, daß Dr. Ottokar Nickerl beziehungsweise sein Vater Franz Nickerl bezüglich dieses Kronlandes in lepidopterologischfaunistischer Beziehung das Hervorragendste geleistet haben.

Betreffs der gesamten Microlepidopteren und Geo-Betretts der gesamten Microlepidopteren und Geo-metriden genügen die derzeitigen Abhandlungen vollkommen; was die ersteren anbelangt, müßte sich eine neue Bearbeitung hauptsächlich auf ein Abschreiben beschränken, dagegen wäre eine Neubearbeitung der übrigen Familien der Macro-lepidopteren unter Beachtung der Synopsis Franz Nickerls sehr wünschenswert. Vielleicht bietet mein kleiner Beitrag Anregung hierzu.

Ich beabsichtige durch denselben auf Grund der mir vorliegenden Publikationen eine Ergänzung zu den obigen grundlegenden Publikationen zu geben. Es kommen haupt-

sächlich in Betracht:

Nickerl, Franz, Synopsis, 1850.

Kolenati, Fauna des Altvatergebirges. Brünn 1858.

Wocke, L., Fauna Schlesiens, Breslau 1872, 1874. Laube, Beiträge zur Lepidopterenfauna des böhmischen Erzgebirges (Noctuidae und Geometridae), Lotos 1897.

Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens.

Sterneck, Dr. Jakob von, Verzeichnis der Macrolepidopteren des Egerlandes, Prag 1909.Gillmer, M., Beitrag, entomol. Wochenblatt XXV.

Binder, Dr. Artur, bez. der Macrolep. von Gratzen, i. e. Z. 4.J. Verzeichnis der Tagfalter von Rumburg usw. 1911.

Wagner, Gustav, Verzeichnis der Großschmetterlinge des Buchauer Bezirks usw. 1911.

Ferner einige andere kurze Notizen.

Etwaige tschechische Publikationen liegen mir leider nicht vor, Hüttners Lepidopterenfauna von Karlsbad, 1900. ist so mangelhaft und unverläßlich, daß sie außer Betracht

bleiben mußte.

Von Abkürzungen bedeutet: E.Z. = entomol. Zeitschrift (Guben, Stuttgart). - V. R. = Verzeichnis von Rumburg. — W. e. V. = Jahresbericht des Wiener entomol. Vereines. — St. = Sterneck. — Gub. = internat. entomol. Zeitschrift, Guben. - Kol. = Kolenati, Fauna des Altvatergebirges. — z. b. G. = zoologisch botan. Gesellschaft in Wien.

In den grundlegenden Arbeiten nicht angeführte Arten sind mit \* bezeichnet.

Papilio podalirius L. ab. undecimlineatus Eim. Rumburg e. l. (V. R.).

- machaon L. ab. bimaculatus Eim. angeblich bei Rum-

burg (V. R.).

- machaon L. ab. nebeskyi Albert. Schemanowitz E. Z. X., S. 77.

Parnassius mnemosyne L. v. nubilosus Christ. Berge-Rebel 9. Aufl.

Pieris rapae L. Q ab. flavescens Röber, Gratzen.

- rapae L. ab. immaculata Ck. Eger (St.). - napi L. ab. radiata Röber bei Georgswalde.

Colias hyale L. ab. flava Husz. Saaz. E. Z. XXII., S. 214.
— hyale L. Zwitter, l. \( \rangle \), r. \( \rangle \), Rumburg, E. Z. XX., S. 130.

edusa F. (croceus) & ab. faillae Stef. Gratzen; nach der Beschreibung wohl nur ein Übergang.
 myrmidone Esp. ab. micans Röber. W. e. V. XXII.

— myrmidone Esp. ab. hartmanni Joukl. W. e. V. XXII. Vanessa jo L. ab. pavo Stichel, lt. Berge-Rebel 9. Aufl. Polygonia c-album L. ab. hutchinsoni Rbs. Kammer-

wald (St.).

- c-album L. ab. jota-album Nwh. und pusilla Stichel, dsgl. (St.).

- pales v. arsilache Esp., Soos, Kammerdorf, Glatzen (St.).

aglaja L. ab. emilia Quens., Gratzen (W. e. V. XXII.).
 adippe L. ab. suffusa Tutt, Synopsis S. 13.

— paphia L., Zwitter, l. ♀, r. ♂, Liebshausen, E. Z. XX., S. 182.

Satyrus semele L., Zwitter, l.  $\mathcal{Q}$ , r.  $\mathcal{J}$ , Synopsis. Callophrys rubi L. ab. caeca G., Eger (St.), bei Rumburg (V. R.), Gratzen W. e. V. XXII.

Chrysophanus phlaeas L. ab. intermedia Tutt, Gratzen.
— phlaeas L. ab. schmidtii Gerh. b. Rumburg (V. R.).

Lycaena icarus Rott. ab. caerulea Fuchs, bei Stein (St.), Schlechteberg (V. R.).

- arcas Rott. ab. minor Frey, Mariaschein. Gillmer, ent. Wochenbl. XXV. Die Form ist eigentlich alpin. Acherontia atropos L. ab. imperfecta Tutt, Synopsis S. 29.

Hyloicus pinastri L. ab. fasciata Lampa, bei Eger (St.).

— pinastri L. ab. brunnea Sterneck, bei Eger (St.), siehe

auch Synopsis.

Deilephila euphorbiae L. ab. helioscopiae Selys, Synopsis S. 28.

Mimas tiliae L. ab. obsoleta Clark. Synopsis S. 29.

\*Cerura bifida Hb., Gratzen; bei Eger (St.), bei Buchau (Wagner).

Lophopteryx camelina L. ab. giraffina Hb., Egertal (St.). Euproctis chrysorrhoea L. ab. punctigera Teich., Wildstein usw. (St.).

Lymantria monacha L. ab. nigra Frr., Prag (St.), b. Buchau

(Wagn.).

Malacosoma neustria ab. unicolor Aign., bei Eger (St.). Trichiura crataegi L. v. ariae Hb., Kamm des Riesengebirges

(Wocke). Aglia tau L. ab. hüttneri Stich., Karlsbad. E. Z. XXI. S. 99.

Acronycta auricoma F. ab. pepli Hb., Eichwald, Laube. - rumicis L. ab. salicis Curt. 1 St. bei Kammerdorf (St.).

\*Agrotis castanea Esp., Eichwald (Laube).

\*-- collina B., Riesengebirge (Kol.). - primulae Esp., bei Eger (St.).

\*— depuncta L., Eichwald (Laube).

- exclamationis ab. conjuncta Hirschke, z. b. G. 1910.

\*Sora rubricosa F. ab. rufa Hw., Gratzen.

\*Mamestra leineri Frr., Riesengebirge (Wocke 1 St.).

— dentina Esp. ab. hilaris Zett., 1 St. bei Eger (St.).

## Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens.

\*Luperina zollikoferi Frr., Chodau, E. Z. XVIII., S. 42.

\*— haworthi Curt., einmal Tuppelburg (Laube).

\*Hadena rubrirena Tr., Riesengebirge (Wocke). Daß die ab. hercyniae Stgr. bei Gratzen vorkommen soll, erscheint mir unwahrscheinlich.

- monoglypha ab. infuscata Buch., Wildstein (St.), Eich-

wald (Laube).

\*- sublustris Esp. bei Buchau (Wagn.).

\*Polia polymita L., Herscheditz (Wagn.).

Hydroecia petasitis Dbl., Gratzen, & 9./10.; Wagn. \*Nonagria sparganii Esp., Riesengebirge (Kol.); Wagn.

— typhae ab. fraterna bei Eger (St.).

\*Taeniocampa populi F., Riesengebirge (Kol.). - stabilis View. ab. grisea Spul., Gratzen.

— incerta Hufn. ab. fuscata Hw., Gratzen.

\*— opima Hb., bei Eger (St.); Riesengeb. (Kol.); Wagn.

— munda Esp. ab. immaculata Stgr., 1 & Gratzen. Panolis griseovariegata ab. grisea Tutt, bei Eger (St.). Orthosia pistacina F. ab. serina Esp., Eger (St.); Eichwald (Laube).

Xanthia fulvago L. ab. decolor Schultz, el. Liebenau

(W. e. V. XV.).

\*— ocellaris Bkh., bei Eger (St.). Orrhodia vaccinii L. ab. signata Klem., Gratzen.

— ligula Esp. ab. subspadicea Stgr., Gratzen. Scopelosoma satellitia L. ab. brunnea Lampa, b. Eger (St.); gewiß auch sonst.

Anarta cordigera ab. aethiops Hoffm., bei Eger (St.).

\*Telesilla amethystina Hb., 1 St. im Udritscher Walde (Wagn.). Plusia chrysitis L. ab. scintillans Schultz, Gub. 1. J., S. 32. Euclidia mi Cl. ab. explanata Rebel, bei Przibram, Gub. 2. J., S. 286.

Catocala fraxini L. ab. sternecki Hschke., 2 St. e l. Prag

(W. e. V. XXI.).

\*Toxocampa pastinum Tr., 1 St. bei Kreuzenstein (St.).

\*Zanclognatha tarsipennalis Tr., 1 St., Prag (St.).

Hypena rostralis ab. radiatalis Hb., Eichwald (Laube). \*Hypenodes costaestrigalis Stph., Udritscher Wald (Wagn.).

\*Acidalia ochrata Sc., Eichwald, 7, 8 häufig (Laube).
\*— contiguaria Hb., Eichwald 7, selten (Laube); Riesengeb. im 7 (Wocke).

— deversaria H.S. ab. laureata Fuchs, Berge-Rebel 9. Aufl. Rhodostrophia vibicaria Cl. ab. roseata Ersch., bei Wildstein (Ŝt.).

109

- vibicaria Cl. ab. strigata Stgr., bei Wildstein (St.). \*Ortholitha coarctata F., Thomasschlag, Pergles 2 St.

(Wagn.).

\*Anaitis paludata v. imbutata Hb., Glatzen bei Königswart (St.).

\*Larentia aptata Hb., Obitz im Böhmerwald (W. e. V. III.).

\*— unidentaria Hw., Eichwald (Laube).

- dilutata Bkh. ab. christyi Prout, Berge-Rebel 9. Aufl.

- dilutata Bkh. ab. obscurata Stgr., bei Eger (St.).

\*- procellata F., Gratzen, im August und Juni. \*Tephroclystia extremata F., Berge-Rebel 9. Aufl.

\*— millefoliata Roeßl., Miroditzer Berg (Wagn.).

\*- subnotata Hb., bei Eger (St.).

Abraxas marginata ab. pollutaria Hb., bei Buchau (Wagn.). Amphidasis betularia L. ab. doubledayaria Mill., Schönlinde. Gub. 4. J., S. 206.

Boarmia repandata ab. destrigaria Hw., Wildstein usw., sehr vereinzelt (St.).

\*Gnophos sordaria Thnbg. v. mendicaria H.S., Isergeb. bis Gesenke (Wocke).

\*- operaria Hb., Kamm des Riesengebirges von der kleinen Sturmhaube bis zur schwarzen Koppe, im Juni (Wocke). Ematurga atomaria L. ab. unicoloraria Stgr., Kammerdorf usw., auch \$\$ (St.).

Bupalus piniarius L. ab. & nigricarius Backh., b. Eger

2 St. (St.).

\*Perconia strigillaria Hb., Wildstein usw. ab 20./6. nicht häufig (St.).

Arctia casta Esp. ab. lutea Schultz. E. Z. XXII., S. 183. Callimorpha quadr. ab. nigricans Kempny, Synopsis S. 34. \*Pelosia muscerda Hfn., Riesengebirge (Kol.).

Zygaena purpuralis Br. ab. cingulata Burg., Liebenau. - purpuralis Br. ab. rubrianata Burg., Liebenau.

Von den im "Catalogus" angeführten Arten sind Lycaena jolas O., Mamestra treitschkei B. und Zygaena exculans Hochw., letztere mit ? bezeichnet, gewiß zu streichen, ebenso die von Dr. Binder zitierte Leucania congrua Hb.; letztere dürfte wohl eine obsoleta Hb. sein. Auch Sternecks Zygaena transalpina Esp. von Eger kann nur unrichtig determiniert sein, Wagners Lithosia unita Hb. ab. arideola Hering von Thomasschlag ist fraglich.

Für weitere bezughabende Daten, etwaige Überlassung

von Sonderabdrücken usw. bin ich jederzeit dankbar.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Jahrbuch (Hrsg. O. Krancher). Kalender für alle Insekten-Sammler

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 1913

Autor(en)/Author(s): Skala H.

Artikel/Article: Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens.

105-109