

Morgenrot am ersten Tag
Unwetter bringt und große Plag'.

Nebel im Januar
Bringen ein nasses Frühjahr.

Ist der Januar gelind,
Lenz und Sommer fruchtbar sind.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	M.	Neujahr	Neujahr	8 14	3 54	
2	D.	Abel, Seth	Makarius	8 13	3 55	
3	M.	Enoch, Daniel	Genoveva	8 13	3 56	
4	D.	Methusalem	Titus	8 13	3 57	
5	F.	Simeon	Telesphorus	8 13	3 58	
6	S.	Heil. 3 Könige	Heil. 3 Könige	8 12	4 0	
7	S.	1. n. Epiph.	1. n. Epiph.	8 12	4 1	
8	M.	Balthasar	Erhard	8 11	4 3	
9	D.	Kaspar	Julian	8 11	4 4	
10	M.	Pauli Eins.	Agathon	8 10	4 5	
11	D.	Erhard	Hyginus	8 10	4 7	
12	F.	Reinhold	Arcadius	8 9	4 8	
13	S.	Hilarius	Gottfried	8 8	4 10	
14	S.	2. n. Epiph.	2. n. Epiph.	8 7	4 11	
15	M.	Habakuk	Mauros	8 7	4 13	
16	D.	Marcellus	Marcellus	8 6	4 14	
17	M.	Antonius	Antonius	8 5	4 16	
18	D.	Priska	Petri Stuhlf.	8 4	4 18	
19	F.	Ferdinand	Canutus	8 3	4 19	
20	S.	Fabian, Sebastian	Fabian, Sebastian	8 2	4 21	
21	S.	3. n. Epiph.	3. n. Epiph.	8 0	4 23	
22	M.	Vincentius	Vincentius	7 59	4 25	
23	D.	Emerent.	Emerent.	7 58	4 27	
24	M.	Timotheus	Timotheus	7 57	4 29	
25	D.	Pauli Bek.	Pauli Bek.	7 55	4 30	
26	F.	Polykarp	Polykarp	7 54	4 32	
27	S.	Kais. Geb.	Kais. Geb.	7 53	4 34	
28	S.	4. n. Epiph.	4. n. Epiph.	7 51	4 36	
29	M.	Samuel	Franz v. Sales	7 49	4 37	
30	D.	Adelgunde	Martinus	7 48	4 39	
31	M.	Valerius	Petri Nolas.	7 47	4 41	

Monatliche Anweisungen für Sammler.

Lepidoptera.

Von Dr. O. Krancher, Leipzig.

Januar.

Viele Menschen meinen, daß in den ersten Monaten des Jahres nichts oder doch nur recht wenig in der Natur zu holen ist. Sie kennen den Winter nur als Schnee-, als Eismonat, hüllen sich in ihren Pelz oder hocken sich hinter den Ofen und warten nun mit bewundernswerter Geduld auf den Frühling, auf wärmere Tage.

Daß aber auch im Winter der Entomologe nicht untätig zu sein braucht, daß für ihn gerade jetzt so manches zu holen ist, dafür geben unter anderm auch einige Aufsätze im vorvorliegenden 26. Jahrgange unsers Entomologischen Jahrbuchs hinlänglich Beweis. Freilich Schmetterlinge mit dem Netze im Januar im Freien zu fangen, das wird wohl kaum gelingen, es müßte denn ganz zufällig einer der wenigen überwinternden Falter aus seinem Winterquartier aufgescheucht worden sein, so daß er den vielleicht schönen Sonnenschein zu unfreiwilligen Flugversuchen benutzt. Ein solcher einsamer Flieger aber mag sich in acht nehmen, nicht einem Tageszeitungs-Redakteur in die Hände zu fallen, es könnte ihm von diesem gar angedichtet werden, daß er durch sein Ausfliegen beabsichtige, einen zeitigen Frühling zu prophezeien.

Aber es läßt sich für den ernsten Lepidopterologen auch jetzt schon so manches erbeuten, besonders wenn er es versteht, den verschiedenen Entwicklungsstadien seiner Lieb-linge nachzugehen. Er muß diese in ihren Winterverstecken aufsuchen, muß unter der moosigen Decke des Waldbodens in unmittelbarer Nähe kräftiger Waldstämme der Puppen verschiedener Schwärmer habhaft zu werden suchen, vielleicht des Fichtenschwärmers (*Hyloicus pinastri* L.), des Abendpfaunauges (*Smerinthus ocellata* L.), des Pappel-

schwärmers (*Smerinthus populi* L.) und anderer mehr. Auch nach Eulen- und Spannerpuppen wird man an solchen Stellen nicht vergebens suchen. In Rindenrissen unserer Waldbäume erbeutet man gelegentlich Puppen von Spinnern, vom Gabelschwanz (*Dicranura vinula* L., *erminea* Esp.) u. a. Aber der Lohn selbst des angestrengtesten Suchens wird nur gering sein; spätere Monate bieten denselben und oft noch weit bessern und reichlichern Ersatz.

Gewiß läßt sich auch jetzt schon an sonnigen, schönen Tagen ködern, vielleicht daß man einige überwinternde Eulen fängt, z. B. *Agrotis ypsilon*, *Calocampa exoleta*, *Orrhodia vaccini*, *Scoliopterix libatrix* und andere; doch ist deren Gewand fadenscheinig und zerschlissen; für die Sammlung taugen solche Tiere nicht. Man überläßt sie besser der Natur, damit sie durch Eiablage die Art erhalten.

Aber unbedingt sorgen muß jetzt der Schmetterlings-sammler dafür, daß in der Sammlung alles in Ordnung gebracht wird, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Vielleicht gibt es noch Falter zu präparieren, zu spannen, in die Sammlung einzuordnen oder für Tauschzwecke übersichtlich zusammenzustecken. Minderwertige, beschädigte Tiere werden durch tadellose, farbenreine Exemplare ersetzt, während mit den ausrangierten Tieren so manchem „Anfänger im Sammeln“ eine große Freude bereitet werden kann. Das aber schafft Nachwuchs, schafft junge Entomologen.

Von besonderm Vorteile ist es, schon jetzt an die in kaltem Raume untergebrachten Puppen der vorjährigen Ausbeute zu denken. Man bringe dieselben vielleicht Mitte bis Ende Januar in die wärmere Stube, versäume aber nicht, das sie bedeckende Moos öfter mit Wasser zu besprengen, nicht die Puppen direkt, und bald wird sich in diesen Puppenkästen neues Leben zeigen. Die Falter entschlüpfen der Puppenhülle und können jetzt schon gespannt werden, so daß man mit der Präparation dieser erzüchteten Tiere bereits fertig ist, wenn die neue Sammelzeit beginnt. Dieses „Treiben der Puppen“ durch Feuchtigkeit und Wärme schafft freie Stunden für das Sammeln im neuen Jahre.

Daß jeder Sammler jetzt schon eifrigst daran geht, seine Sammelgerätschaften wieder in Ordnung zu bringen, ist wohl selbstverständlich; doch ist dafür auch im Februar noch Zeit, weshalb wir dort noch einmal ausführlicher darauf zurückkommen werden.

8 Monatliche Anweisungen für Sammler.

Aber versäumen darf er keineswegs, in den langen Winterabenden sein entomologisches Wissen zu vervollkommen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und niemand, selbst der „Klügste“, ist nicht so klug, daß er nicht noch etwas lernen könnte. Es ist darum für jeden strebsamen Lepidopterologen unbedingt geboten, sich die neuesten in sein Gebiet einschlagenden Werke zugänglich zu machen, auch Botanik zu studieren und die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften im Bereiche der Insektenwelt zu studieren. Er suche sich mit der Lebensgeschichte, mit der Entwicklung der Schmetterlinge bekannt und vertraut zu machen, um dann im kommenden Sommer selbst mit Bausteinen herbeizutragen zum Auf- und Ausbau der gesamten Insektenkunde, der Biologie der Insekten. Nur dadurch nützt er dem großen Ganzen, nützt er der Wissenschaft, nicht aber durch bloßes Zusammentragen der Tiere, durch sorgfältiges Zusammenstecken derselben in schöne, lange Reihen!


Der Entomologe, der Schmetterlingsfreund studiere aber nicht nur die neuesten Werke, er lese auch eifrigst die verschiedenen entomologischen Zeitschriften, weshalb wir ihn auf den Abschnitt unsers Jahrbuchs: „Literatur“ ausdrücklich aufmerksam machen.



Notizen für Januar.

Februar — Hornung — 28 Tage.

9



Taut es vor und auf Mattheis,
Dann sieht es schlecht aus mit dem Eis.

Wer seinen Pelz im Leihhaus hat,
Bekommt gar leicht den Winter satt

Sankt Dorothee
Gibt den meisten Schnee.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	D.	Brigitte	Ignatius	7 45	4 43	
2	F.	Mariä Reinigung	Mariä Lichtmeß	7 43	4 45	
3	S.	Blasius	Blasius	7 42	4 47	
4	S.	Septuagesima	Septuagesima	7 40	4 49	
5	M.	Agatha	Agatha	7 38	4 51	
6	D.	Dorothea	Dorothea	7 37	4 52	
7	M.	Richard	Romuald	7 35	4 54	
8	D.	Salomon	Joh. v. Matha	7 33	4 56	
9	F.	Apollonia	Apollonia	7 31	4 58	
10	S.	Renata	Scholastika	7 29	5 0	
11	S.	Sexagesima	Sexagesima	7 27	5 2	
12	M.	Severin	Eulalia	7 26	5 4	
13	D.	Benignus	Kath. v. R.	7 24	5 6	
14	M.	Valentinus	Valentin	7 22	5 8	
15	D.	Formosus	Faustinus	7 20	5 10	
16	F.	Juliana	Juliana	7 18	5 12	
17	S.	Konstantia	Donatus	7 16	5 14	
18	S.	Estomihi	Estomihi	7 14	5 16	
19	M.	Susanna	Konrad	7 12	5 17	
20	D.	Fastnacht	Fastnacht	7 10	5 19	
21	M.	Aschermittw.	Aschermittwoch	7 7	5 21	
22	D.	Petri Stuhl.	Petri Stuhl.	7 5	5 23	
23	F.	Reinhard	Milburjis	7 3	5 25	
24	S.	Matthias	Matthias	7 1	5 27	
25	S.	1. Invocavit	1. Invocavit	6 59	5 29	
26	M.	Nestor	Walburga	6 57	5 30	
27	D.	Hektor	Leander	6 55	5 32	
28	M.	Quatember †	Quatember †	6 52	5 34	

Februar.

Der Februar bringt in unserer Gegend meist heftiges Schneegestöber und empfindliche Kälte, so daß das Sammeln im Freien sich oft genug ganz von selbst verbietet. Und trotzdem ist doch schon hier und da vom Insektenleben etwas zu spüren, weshalb es sich an besonders schönen, sonnigen Tagen immerhin lohnt, die Ausflüge zu beginnen. Vor allem sind es jetzt die Frühjahrsspanner, die auf dem Plane erscheinen und deren Flugzeit eine ziemlich beschränkte ist, so *Hybernia leucophaearia* (Breitflügelspanner), *Phigalia pedaria* (Wollrückenspanner), *Biston hispidaria* (Spinnerspanner), *Anisopteryx aescularia* (Rundflügelspanner) und andere.

Scheint die Sonne etwas wärmer, so zeigen sich wohl auch schon die überwinterten Tagfalter, die sogenannten „Frühlingsverkünder“, nämlich *Vanessa io* (Tagpfauenauge), *V. urticae* (kleiner Fuchs), *V. antiopa* (Trauermantel), *V. polychloros* (großer Fuchs), *Polygonia c-aureum* (C-Vogel), *Gonepteryx rhamni* (Zitronenvogel) und andere. Sie hat die allbelebende Sonne aus ihrem schützenden Winterversteck hervorgelockt, allerdings oft genug zu ihrem Schaden, denn die rauhe Februarluft scheucht die kleinen Sommervögelchen bald genug wieder in ihre Verstecke zurück oder raubt ihnen gar ihr kleines Leben. Diese jetzt zu fangen in ihrem abgeflogenen Kleidchen, hieße der Natur die Eierlegenden Weibchen rauben.

Aber auf unserm Ausfluge haben wir vielleicht bemerkt, daß die Sonne da, wo sie ihre wärmenden Strahlen besonders nachdrücklich wirken lassen konnte, an Berglehnen, Wald-rändern, ruhigen Waldblößen usw., bereits eine ganz nette Vegetation hervorgezaubert hat; da treffen wir bereits Spitzchen und junge Pflänzchen der Brennessel, des Ampfers, der verschiedensten Gräser, des Mäusedarms und wie sie alle heißen mögen. Das gibt uns bequeme Gelegenheit, der im vergangenen Spätherbste eingetragenen Eulenträupchen zu gedenken und für deren erste Frühlingsnahrung Sorge zu tragen, jener kleinen Tierchen, die nach überstandener Winterruhe zum Teil jetzt schon ihre Verstecke verlassen, um die vorgelegten ersten Frühlingspflänzchen zu benagen.

Vielleicht versuchen wirs an solchen Stellen auch mit dem „Rau-pen kratzen“, und wenn unsere Erfolge auch nicht gerade glänzende sein werden, so ist es doch möglich, diese

oder jene, allerdings noch ziemlich kleine Eulenraupe aus den Gattungen *Agrotis*, *Mamestra*, *Leucania* usw. zu erbeuten. Freilich gehört Geduld und immer frisches Futter dazu, diese kleinen Kerlchen heranzupäppeln, aber um so größer ist die Freude, wenn später sich Falter entwickeln, die gerade noch in der Sammlung fehlten oder in recht minderwertigem Äußern darin zu finden waren. An Wegrändern, auf Waldblößen, an Bergabhängen wird man auch Räupchen von Spinnern, von Bären usw. finden können, so z. B. von *Arctia caja* (brauner Bär), *Arctia aulica* (olivbrauner Bär), *Diacrisia sanio* (Hainbär), *Phragmatobia fuliginosa* (Fleckbär) usw., ferner von *Macrothylacia rubi* (Vielfraß), *Cosmotriche potatoria* (Trinker, Graselefant) und andere. Doch raten wir für all diese Tiere ein Sammeln in späteren Monaten, wenn die Raupen größer geworden, die Weiterzucht nicht mehr so schwierig und die Futterbeschaffung eine bequemere ist.

Dagegen ist das Suchen nach Puppen jetzt, wo der Boden bereits lockerer geworden ist, unbedingt zu empfehlen.

Aber höchste Zeit wird es nun, die verschiedenen Sammelgerätschaften wieder zum Gebrauch fertig zu machen. Da sind es vor allem die Giftgläser, die mit neuem Tötungstoff, mit Zyankalium, versehen werden müssen, denn ihre Kraft ist erloschen, das Gift ist fast wirkungslos geworden. Darum neues Zyankalium ins Glas, eine Gipsschicht darauf, und es ist wieder zum Gebrauch fertig. Wer dies Gift aber nicht erlangen kann, nimmt Schwefeläther, Chloroform, Hirschhornsalz oder andere gebräuchliche Tötungsmittel.

Die Sammelschachteln und die Zuchtbehälter müssen sorgfältig gereinigt, die Blechschachteln gut mit Sand ausgescheuert oder mit Sandpapier ausgerieben werden; die Pappschachteln versorge man mit neuen Torfauslagen oder überklebe diese mit sauberem Papier.


Das rissig gewordene Netz wird sorgfältig ausgebessert oder erhält einen neuen Gazebeutel, die Zuchtkästen werden mit neuen Gazewänden, vielleicht auch mit frischer Erde oder neuem Moospolster versehen. Puppenhüllen, Raupenkot, Raupengespinnste werden entfernt, kurz es wird alles getan, um den neu zu sammelnden Tieren in des Sammlers Heim einen recht guten Empfang bereiten zu können. — Und sollte der Sammler in diesem Monate noch keine Sammelausflüge unternehmen wollen, so ist es doch nicht unange-

bracht, durch kleinere oder größere Spaziergänge die Gegend zu mustern, sich nach neuen Fang- und Sammelplätzen umzuschauen, nach Orten, die er noch nicht besuchte, und die sich vielleicht durch günstige Lage auszeichnen. Nach diesen richtet er dann zu gelegener Zeit seine Schritte, nach sonnigen Waldblößen mit Weidenbeständen, um Schmetterlinge zu leuchten, nach günstig gelegenen Busch- oder Waldrändern, um zur passenden Zeit zu ködern. Es schadet nichts, wenn man vorher überdenkt, was man nachher zu tun sich vorgenommen.

Nicht vergessen soll auch sein, den Sammler daran zu erinnern, einem entomologischen Vereine beizutreten. Durch den Austausch der Gedanken mit Gleichgesinnten, vorausgesetzt, daß man dort keine Geheimniskrämerei treibt, wird sein Wissen und Können am besten gefördert.



Notizen für Februar.



Säst du im März zu früh,
Ist's oft vergebne Müh'.

Märzenregen
Bringt wenig Sommerregen.

Märzenschnee
Tut Frucht und Weinstock weh.

Ist am Josephintag das Wetter schön,
So folgt ein gutes Jahr.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	D.	Albinus	Albinus	6 50	5 36	
2	F.	Luise	Simplizius	6 48	5 38	
3	S.	Kunigunde	Kunigunde	6 46	5 40	
4	S.	2. Reminiscere	2. R. miniscere	6 43	5 42	
5	M.	Friedrich	Friedrich	6 41	5 43	
6	D.	Eberhard	Fridolin	6 39	5 45	
7	M.	Felicitas	Th. v. Aqu.	6 36	5 47	
8	D.	Philemon	Joh. v. G.	6 34	5 49	
9	F.	Prudentius	Franziska	6 32	5 51	
10	S.	Henriette	40 Märtyrer	6 30	5 53	
11	S.	3. Okuli	3. Okuli	6 27	5 54	
12	M.	Gregor P.	Gregor	6 25	5 56	
13	D.	Ernst	Euphrasia	6 23	5 58	
14	M.	Mittfasten	Mittfasten	6 20	6 0	
15	D.	Isabella	Longinus	6 18	6 1	
16	F.	Cyriacus	Heribert	6 16	6 3	
17	S.	Gertrud	Gertrud	6 13	6 5	
18	S.	4. Lätare	4. Lätare	6 11	6 7	
19	M.	Joseph	Heil. Joseph	6 9	6 9	
20	D.	Hubert	Joachim	6 6	6 10	
21	M.	Benediktus	Benediktus	6 4	6 12	
22	D.	Kasimir	Benevent.	6 1	6 14	
23	F.	Eberhard	Viktorian	5 59	6 16	
24	S.	Gabriel	Gabriel	5 57	6 17	
25	S.	5. Judika	5. Judika	5 54	6 19	
26	M.	Emanuel	Ludw. H. C.	5 52	6 21	
27	D.	Rupert	Rupert	5 50	6 23	
28	M.	Gideon	Guntram	5 47	6 24	
29	D.	Eustasius	Eustasius	5 45	6 26	
30	F.	Guido	Quirinus	5 43	6 28	
31	S.	Philippine	Balbina	5 40	6 30	

März.

Die Natur beginnt sich jetzt mehr und mehr mit neuem Grün zu schmücken, die jungen Pflanzen sprossen jetzt aller Orten aus der Erde hervor, die Knospen der Bäume und Sträucher schwellen kräftiger an, um bald genug zu platzen und die Bäume mit einem dichten Blätterwerk zu bedecken. Da wird es auch im Insektenreiche lebendiger. Mit den Weidenkätzchen erscheinen auch unsere Falter und Eulen in größerer Zahl und geben sich hier ihr Stelldichein. Und indem sie sich durstig an dem süßen Saft der jungen Blüten laben, bieten sie dem Sammler eine höchst günstige Fanggelegenheit. In der Dämmerung eilt er dahin, mit Laterne, Giftglas und Sammelschachtel versehen, und mit Leichtigkeit kann er hier schöne, frische Frühjahrseulen in Menge einheimsen. Doch muß er sich wohl hüten, das Licht seiner Laterne zu grell, zu schnell auf die Weidenkätzchen zu richten, da sich die Tiere sonst erschreckt zur Erde, ins Gras fallen lassen und für den Sammler meist verloren sind, wenn er nicht etwa das Netz vorsorglich untergehalten hat. Hier findet er in erster Linie die ganze Schar der *Taenio-campen*, und zwar *gothica*, *pulverulenta*, *populeti*, *stabilis*, *gracilis*, *incerta*, *miniosa*, *munda* und *opima*, ferner *Pach-nobia rubricosa* und *leucographa*, dazu verschiedene andere Arten, die übrigens auch am Tage an Zäunen und Planken, zwischen Ritzen der Bäume und an anderen Orten in der Nähe von blühenden Weidensträuchern gefunden werden können. Verschiedene von ihnen sind es auch, die abends ans elektrische Licht gehen und besonders an die von diesem bestrahlten Glasscheiben sich ansetzen und mit dem Giftglase leicht zu erbeuten sind.

Aber auch andere Gruppen bringen bereits jetzt ihre Vertreter auf den Plan. So erscheint nicht selten der Spinner *Eriogaster lanestris* und die Eule *Polyploca flavicornis*. Von den sogenannten Tageulen trifft man in Birkenschonungen in der Sonne umherfliegend *Brephos parthenias*, während auf feuchten, von der Sonne beschienenen Waldwegen der Falter *Brephos nothum* hin und her fliegt und, da er sich kaum niederzulassen scheint, gar nicht so leicht zu fangen ist. — Die Spanner sind durch die Gattung *Biston* vertreten, von der man *pomonaria*, *hirtaria* und *strataria* gelegentlich an Baumstämmen antrifft, mit ausgebreiteten Flügeln, also leicht zu sehen. Auch der Birkenspanner

Amphidasis betularia mit seiner Abart *doubledayaria*, wird schon jetzt gefunden werden, vielleicht auch die schöne Eule *Brachionycha nubeculosa*.

Das Puppenkratzen kann noch fortgesetzt werden und ist jetzt weit bequemer auszuführen, da der Erdboden seine Starrheit so ziemlich verloren hat.

Mit besonderm Nachdruck aber möchte jetzt das Raupenkratzen und das Raupenleuchten aufgenommen werden. Ersteres ist recht vorteilhaft an Waldrändern, an Gräben und Böschungen und im Buschwalde, wo überall schon junge Pflänzchen sprießen, auszuführen dergestalt, daß man das dort umherliegende Laub mit einer kleinen harkenähnlichen Kratze zusammenrafft, in den ausgespannten Schirm wirft, darin gut ausschüttelt und wieder herauswirft. Dann wird sich manches Räupchen, auf dem Boden des Schirmes zusammengerollt, vorfinden, um vom Sammler freudestrahlend in die Sammelschachtel gebracht zu werden.

Das „Leuchten der Raupen“ führt man in der Weise aus, daß man, den Lebensgewohnheiten der Tiere folgend, diese bei Anbruch der Dunkelheit mit der Laterne an ihren Futterpflanzen absucht. Schon sind Primeln, Gras, Nesseln und andere niedere Pflanzen, die den Raupen reichlich Nahrung bieten, in Menge vorhanden; an jungen Blättern der Sträucher nagen diese bei Nacht herum, sich am Tage tief unten am Boden unter Laub und Moos versteckt haltend. — Doch mag auch hier ausdrücklich betont sein, daß beide Methoden, das Kratzen sowohl wie das Leuchten der Raupen, die besten Resultate erst im April zeitigen. Die Tiere besitzen dann ansehnliche Größe, sind also besser sichtbar, und sie sind auch sicherer und schneller zur Puppe zu bringen.

Besonderes Interesse bietet auch das Aufsuchen der Sesien-Raupen, jener im Pflanzeninnern, im Holze verborgen lebenden Schmetterlingslarven, die die zartesten aller Falter, die Glasflügler, ergeben. Ein Teil dieser Raupen ist jetzt bereits erwachsen, weshalb mit dem Eintragen derselben nicht mehr gezögert werden darf. Sie leben unter der Rinde, im Holze der Stümpfe von Weiden, Birken, Eichen, Pappeln, Erlen usw., in Johannisbeer- und Himbeerstämmchen und dergleichen mehr, meist dicht über der Erde minierend; doch ist ihr Aufenthaltsort leicht an den durch ein Auswurfsloch herausbeförderten Fraßspänen zu erkennen. Hat man den Wohnort dieser Raupen entdeckt, so trennt man mit einem kräftigen Messer oder einer kleinen Säge das ganze Fraßstück,

den Stumpf, los, nimmt ihn mit nach Hause und bringt ihn in den Zuchtkasten, vielleicht daß man ihn dort mit dem untern Ende in schwach angefeuchteten Sand steckt. Etwa gespaltene Stämmchen oder Äste bindet man mit Bindfaden wieder zusammen. Nach einiger Zeit werden dann die schönen Falter schlüpfen: *Trochilium apiformis* (Bienenschwärmer), *Sesia spheciformis*, *tipuliformis*, *vespiformis*, *myopaeformis*, *culiciformis*, *formicaeformis* und andere Sesien mehr.


Aber auch Bären-Raupen müssen jetzt gesammelt werden; für uns war früher der Frühjahrs-Bußtag immer der Sammeltag für Bären-Raupen. Sie finden sich gern in Hecken, Gräben, auf Waldblößen, an Wegen, und überwintern in einigen Arten in recht ansehnlicher Größe. Diese Raupen müssen direkt gesucht werden und sind morgens im Grase oder auf Blättern usw. sehr leicht zu sehen. So wird es jetzt höchste Zeit für das Eintragen des olivbraunen Bären *Arctia aulica*, auf sonnigen Waldblößen zu finden; bereits Ende des Monats, spätestens Anfang April, verpuppt sich die Raupe. *Arctia villica* und *caja* sind gleichfalls häufig zu erbeuten, *villica* schon ziemlich erwachsen. Auch *Diacrisia sanio* ist bereits so ziemlich spinnreif. Von den Schön-Bären ist *Callimorpha dominula* an sonnigen Stellen auf Himbeerblättchen jetzt schon zu finden.

Es gibt somit für den Schmetterlingssammler bereits reiche Arbeit; bei allem aber vergesse er nicht, genau Buch zu führen, genau Fundort und Tag zu vermerken, soll sein Sammeln auch gewissen wissenschaftlichen Wert besitzen.



Notizen für März.

1



Bringt der April viel Regen, * So deutet es auf Segen.

Je früher im April der Schlehdorn blüht,
Desto früher der Schnitter zur Ernte zieht.

Sind die Reben um Georgi noch blind,
So erfreut sich Mann und Kind.

Gras, was im April wächst, * Steht im Mai fest.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	S.	6. Palmarum	6. Palmarum	5 38	6 31	
2	M.	Theodosia	Fr. v. Paul	5 36	6 33	
3	D.	Christian	Richard	5 33	6 35	
4	M.	Ambrosius	Isidorus	5 31	6 37	
5	D.	Gründonnerstag	Gründonnerstag	5 29	6 38	
6	F.	Karfreitag	Karfreitag	5 26	6 40	
7	S.	Cölestin	Hermann	5 24	6 42	
8	S.	Osterfest	Ostersonntag	5 22	6 43	
9	M.	Ostermontag	Ostermontag	5 19	6 45	
10	D.	Ezechiël	Ezechiël	5 17	6 47	
11	M.	Hermann	Leo d. Gr.	5 15	6 49	
12	D.	Julius	Julius	5 13	6 50	
13	F.	Justinus	Hermannsgild	5 10	6 52	
14	S.	Tiburtius	Tiburtius	5 8	6 54	
15	S.	1. Quasimod.	1. Quasimod.	5 6	6 56	
16	M.	Carisius	Lambert	5 4	6 57	
17	D.	Rudolf	Rudolf	5 1	6 59	
18	M.	Florentin	Amidäus, B.	4 59	7 1	
19	D.	Werner	Werner	4 57	7 3	
20	F.	Sulpitius	Victor	4 55	7 4	
21	S.	Adolf	Anselm	4 53	7 6	
22	S.	2. Mis. Dom.	2. Mis. Dom.	4 51	7 8	
23	M.	Georg	Adalbert	4 48	7 9	
24	D.	Albert	Fidelis	4 46	7 11	
25	M.	Markus Evang.	Markus Evang.	4 44	7 13	
26	D.	Raimarus	Kletus	4 42	7 15	
27	F.	Anastasius	Anastasius	4 40	7 16	
28	S.	Therese	Vitalis	4 38	7 18	
29	S.	3. Jubilate	3. Jubilate	4 36	7 20	
30	M.	Josua	Kath. v. S.	4 34	7 22	

April.

Mit Recht wird der April wetterwendisch und launenhaft genannt; im Handumdrehen kann er sein Gesicht ändern, mit unglaublicher Schnelligkeit vermag er das beste, sonnigste Frühlingswetter in kaltes, rauhes, stürmisches, regenreiches umzuwandeln. Doch ist er für den Lepidopterologen ein keineswegs ungünstiger Monat; trotz seiner Aprillaunen gesellen sich zu den bereits vorhandenen Tieren eine ziemliche Anzahl neuer Gefährten.

Von **Tageschmetterlingen** begrüßen wir vor allem unsere Weißlinge, die wieder in langsamem Fluge dahinschweben, und zwar *Pieris rapae* und *napi*, zu denen sich gegen Ende des Monats auch der Senfweißling, *Leptidia sinapis*, und Aurorafalter, *Euchloë cardamines*, gesellen. Von Bläulingen läßt sich bereits *Lycaena argiolus*, seltener auch *cyllarus*, sehen, und auch die kleine *Araschnia levana* kann bereits beobachtet werden. Die Perlmutterfalter sind durch *Argynnis lathonia*, vielleicht auch *selene* und *euphrosine*, vertreten, wie auch *Pararge megera* und v. *egrides*, die Abart von *aegeria*, ihr lustiges Spiel treiben. Auch Hesperiden dürften gelegentlich angetroffen werden; es seien als ihre evtl. frühesten Vertreter *Carcharodus alceae* und *Thanaos tages* genannt.

Die **Schwärmer** haben wohl keinen Vertreter in den April zu schicken, dagegen sind die **Spinner** recht gut vertreten. Vor allem ist es *Endromis versicolora*, dessen ♂ gern im Sonnenschein fliegt, ebenso *Saturnia pavonia* und *Agia tau*. Die kleinen Sichelflügler *Drepana falcataria* und *curvatula*, der Gabelschwanz, *Dicranura vinula*, der Buchenspinner, *Stauropus fagi*, und ein ganzes Heer der Notodonten, wie *Notodonta ziczac*, *trepida*, *torva* und *chaonia*, dazu *Odontesia carmelita* und *Lophopteryx camolina*, und endlich *Polyplocia flavicornis* und *ridens*, sie alle stellen sich bereits Ende dieses Monats ein oder wählen sich die ersten Tage des Mai als frühesten Erscheinungstermin. — Den **Eulen** des März haben sich einige weitere zugesellt. Außer den bereits gemeldeten *Taeniocampa*- und *Pachnobia*-Arten finden wir vielleicht noch *Panolis griseovariegata* und *Heliaca tenebrata*, die wohl allesamt durch Ableuchten der Weidenkätzchen oder durch Absuchen der Stämme usw. zu erlangen sind. — Von **Spannern** ist die Zahl der Ankömmlinge gegen früher eine bedeutend größere. Vor allem sind es *Selenia bilunaria*, *lunaria* und *tetralunaria*, *Larentia ferrugata*,

suffumata, riguata und polygrammata und Tephroclystia irriguata, insigniata, albipunctata, lariciata, abbreviata, lanceata und pumilata, welche das Hauptkontingent stellen. Gegen Ende des Monats aber gesellen sich noch eine ziemliche Zahl anderer Arten und Gattungen zu, deren Namen in späteren Monaten zu finden sind. —

Das Einsammeln von **Raupen** erfordert im April viel Umsicht und Zeit. Wir folgen bei ihrer Aufzählung wiederum der Systematik der Lepidopteren. Von **Tageschmetterlingen** seien zunächst der Baumweißling *Aporia crataegi*, auf Pflaume (*Prunus*), Weißdorn (*Crataegus*) u. dgl. erwähnt. Auf Sauerampfer (*Rumex*) finden wir das kleine, grüne, mit roter Rückenlinie versehene Räumchen von *Chrysophanus phlacas*, ebenso verschiedene *Lycaena*-Raupen auf Klee, Ginster und anderen Pflanzen. Von *Melitaea*-Arten treffen wir die Raupe von *M. maturna* vor allem auf jungen Eschen (*Fraxinus excelsior*), von *M. aurinia* an Wegerich (*Plantago*), Teufelsabbiss (*Succisa pratensis*), Ehrenpreis (*Veronica*) usw., von *M. cinxia* an Wegerich und Mauseöhrchen (*Hieraceum*) und von *M. didyma* an Wegerich, Ehrenpreis, Leinkraut (*Linaria*) usw. Auch *Argynnis*-Raupen erscheinen an Veilchen- (*Viola*-) Arten, dazu die Raupen der Gattungen *Erebia*, *Satyrus*, *Epinephele* und *Coenonympha*, die allesamt durch „Schöpfen“ oder direktes „Absuchen“ erlangt werden können. — Von **Schwärmern** kann das Suchen der Raupen der Sesien durch Aussägen der Stümpfe noch fortgesetzt werden, wie auch *Zygaena*-Raupen auf Wiesen und Feldern teilweise schon anzutreffen sind.

Die **Spinner** bieten eine ziemliche Anzahl schöner Vertreter, vor allem die Bären (*Arctiidae*), von denen bereits im März verschiedene genannt wurden. Jetzt kommen hinzu *Callimorpha quadripunctaria*, *Pericallia matronula* und *Rhyparia purpurata*. Auch die *Psychidae*-Raupen dürfen nicht unbeachtet bleiben, sie ergeben wundervoll zarte Tierchen. Die Raupen von *Orgyia gonostigma*, *Dasychira selcinitica* und *fascelina*, *Arctornis l-nigrum* und *Macrothylacia rubi* können jetzt durch Abklopfen der Büsche, durch Schöpfen oder direktes Absuchen niederer Pflanzen erbeutet werden. In bezug auf **Eulen**-Raupen wird weiter geleuchtet und weiter gekratzt; die Ausbeute wird sicher voll befriedigen. An Waldrändern, Gräben, Böschungen, Eisenbahndämmen, an niederen Pflanzen oder nicht zu hohen Sträuchern trifft man zahlreiche Vertreter der Gattungen *Agrotis*, *Leucania*,


Plusia, Mamestra, Caradrina, Hadenä und andere mehr. Die meisten derselben sind ziemlich erwachsen, so daß ihre Zucht Schwierigkeiten nicht mehr bereitet. Ihre Schmetterlinge schlüpfen noch in diesem Jahre aus.

Und auch die **Spanner** bieten Gelegenheit zu einer größern Ausbeute an Raupen. Da sind es vor allem folgende, die mit ziemlicher Gewißheit gefunden werden: *Pseudoterpna pruinata*, *Thalera fimbrialis*, *Acidalia*-Arten, *Ellopiä prosapiaria*, *Ourapteryx sambucaria*, *Boarmia bistortata*, *repandata* und *roboraria*, *Thamnonoma wauaria*, *Perconia strigillaria*, *Lythria purpuraria*, *Ortholitha plumbaria*, *limitata*, *moeniata* und *bipunctaria*, *Anaitis plagiata*, *Lygris populata* und verschiedene *Larentia*- und *Tephroclystia*-Arten.

Wir erschen, der April behandelt uns keineswegs stiefmütterlich. Bringt er einigermaßen leidliches Wetter, so muß die Ausbeute eine recht bedeutende sein.



Notizen für April.



Kühle und Abendtau im Mai
Bringen Wein und vieles Heu.

Der Mai kühl, der Brachmond naß,
Die füllen Scheunen und Faß.

Viel Gewitter im Mai,
Singt der Bauer Juchhei.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	D.	Philipp, Jakob	Philipp, Jakob	4 32	7 23	
2	M.	Sigismund	Athanasius	4 30	7 25	
3	D.	† Erfindung	† Erfindung	4 28	7 27	
4	F.	Florian	Monika	4 26	7 28	
5	S.	Gotthard	Pius V.	4 24	7 30	
6	S.	4. Kantate	4. Kantate	4 22	7 32	
7	M.	Gottfried ☉	Stanislaus	4 21	7 33	
8	D.	Stanislaus	Mich. Ersch.	4 19	7 35	
9	M.	Hiob	Greg. Naz.	4 17	7 37	
10	D.	Gordian	Antonius	4 15	7 38	
11	F.	Mamertus	Mamertus	4 13	7 40	
12	S.	Pankratius	Pankratius	4 12	7 41	
13	S.	5. Rogate	5. Rogate	4 10	7 43	
14	M.	Christian ☾	Bonifazius	4 9	7 45	
15	D.	Sophia	Sophia	4 7	7 46	
16	M.	Honoratus	Joh. v. Nep.	4 5	7 48	
17	D.	Chr. Himmelfahrt	Chr. Himmelfahrt	4 4	7 49	
18	F.	Liborius	Venantius	4 3	7 51	
19	S.	Sara	Petr. Cölestin	4 1	7 52	
20	S.	6. Exaudi	6. Exaudi	4 0	7 54	
21	M.	Prudens ☉	Konstantin	3 58	7 55	
22	D.	Helena	Julia	3 57	7 57	
23	M.	Desiderius	Desiderius	3 56	7 58	
24	D.	Esther	Johanna	3 54	7 59	
25	F.	Urban	Urban	3 53	8 1	
26	S.	Eduard †	Philipp Neri	3 52	8 2	
27	S.	Pfingstsonntag	Pfingstsonntag	3 51	8 4	
28	M.	Pfingstmontag	Pfingstmontag	3 50	8 5	
29	D.	Maximilian ☾	Maximus	3 49	8 6	
30	M.	Quatember †	Quatember †	3 48	8 7	
31	D.	Petronilla	Petronilla	3 47	8 9	

Mai.

Der Mai bringt den großen Vortrab des gesamten Insektenheeres, das sich jetzt in der Natur fröhlich tummeln kann, denn auch die Pflanzenwelt prangt bereits im schönsten Schmucke.

In tadellos frischen Exemplaren erscheinen jetzt die prächtigen **Tagschmetterlinge** aus der Gattung der Ritter: Der Schwalbenschwanz (*Papilio machaon*) und der Segelfalter (*P. podalirius*). Den im April genannten Weißlingen gesellt sich der Kohlweißling (*Pieris brassicae*) zu, während von den *Colias*-Arten vor allem *C. hyale* und gelegentlich die schöne, orangegelbe *C. edusa* auf Feldern anzutreffen sind. Die Zipfelfalter sind durch *Callophrys rubi* und *Thecla pruni* vertreten, und auch *Chrysophanus hippothoe*, *dorilis*, *phlaeas* und *amphidamas* können hier und da erbeutet werden. Zu den früher genannten Bläulingen gesellen sich noch *Lycaena polysperchon*, *baton*, *orion*, *bellargus*, *sebrus* und *minima*. Ebenso fliegt an lichten Waldplätzen *Nemeobius lucina*, während der kleine Fuchs (*Vanessa urticae*) und das Tagpfauenauge (*Vanessa io*) sich allenthalben tummeln. An weiteren Vertretern der Gattungen *Melitaea* (*phoebe*, *trivia*), *Argynnis* (*dia*), *Pararge* (*aegeria*), *Erebia* (*medusa*), *Coenonympha* (*dorus*, *pamphilus*) und *Hesperia* (*alveus*, *orbifer*) und anderen ist jetzt gleichfalls kein Mangel.

Bald stellen sich auch die ersten **Schwärmer** ein, von denen vor allem *Hyloicus pinastri*, dann vereinzelt *Sphinx ligustri*, ferner *Dilina tiliae*, *Smerinthus ocellata*, *Sm. populi*, *Deilephila euphorbiae* und *Pterogon proserpina* zu erwähnen sind. Doch muß an dieser Stelle ausdrücklich betont werden, daß all diese Schwärmer und ebenso alle anderen Lepidopteren an eine ganz bestimmte, vielleicht auf Tag und Stunde genau anzugebende Erscheinungszeit durchaus nicht gebunden sind, so daß sie recht wohl auch erst im nächsten Monate auftreten können. Von den Tagschwärmern treffen wir *Macroglossa stellatarum*, *Hemaris scabiosae* und *fuciformis* an, wie auch verschiedene *Sesien*, z. B. *Sesia spheciiformis*, *conopiformis*, *myopaeiformis*, *culiciformis* und *empiiformis* jetzt frühestens ausschlüpfen dürften.

Die **Spinner**, die schon der April in ziemlicher Zahl erzeugte, erhalten jetzt weitem Zuzug. So erscheinen die schöne, kleine, grüne *Earias clorana*, in Buchenwäldern *Hylophila prasinana*, vielleicht auch schon *Nola confusalis*

und centonalis; dazu kommt in lichten Laubwäldern *Gnophria rubricollis*, auf Wiesen *Hipocrita jacobaeae* und *Arctia aulica*, ferner Vertreter der Gattungen *Ocnogyna*, *Spilosoma*, z. B. *mendica*, *Phragmatobia fuliginosa* und *Hepialus*. In Laubwäldern trifft man *Dasychira pudibunda*, auf Wiesen vielleicht schon *Macrothylacia rubi*, und in Laubhölzern gelegentlich die Glucken *Epicnaptera tremulifolia* und *ilicifolia*. Den Sichelflüglern des vorigen Monats gesellen sich *Drepana lacertinaria*, *harpagula*, *binaria* und *cultraria* zu, wie auch *Cilix glaucata* bereits an Büschen anzutreffen ist. Von den Gabelschwänzen ist *Dicranura erminea* sicher bereits zu finden, wie auch im südlichen Deutschland *Exaereta ulmi* schon fliegt. Ein Glücklicher erbeutet wohl auch eine *Hoplitis milhauseri*. Die Zahl der Notodonten-Arten ist bedeutend gestiegen; außer den April-Tieren sind zu nennen: *Pheosia tremula*, *dictaeoides*, *Notodonta tritophus*, *dromedarius*, *Drymonia querna*, *trimacula* und *Leucodonta bicoloria*, eine treffliche Auswahl reizender Falter. Auch *Pterostoma palpina*, *Gluphisia crenata*, *Phalera bucephala*, *Pygaera curtula*, *anachoreta* und *pigra* und *Cymatophora octogesima*, *or* und *duplaris* können günstigenfalls bereits angetroffen werden.

In sich immer mehrender Zahl erscheinen die **Eulen**, deren einzelne Namen hier anzuführen diese Mitteilungen zu umfangreich gestalten würde. Sie gehören vornehmlich den Gattungen *Acronicta*, *Agrotis*, *Mamestra*, *Dianthoeicia*, *Plusia*, *Chariclea*, *Acontia*, *Euclidia* und vielen anderen mehr an. Sie sind besonders durch Köderfang an mit gegorenem Honig getränkten, an Buschrändern ausgespannten Leinenbändern oder am elektrischen Lichte zu erbeuten. Der fleißige Sammler wird sie aber auch vom Busche oder von niederen Pflanzen klopfen, ebenso von Baumstämmen, an denen sie sich ausruhen, absuchen. Ferner ist die Schar der **Spanner** gewaltig groß. Es sind vor allem die Gattungen *Acidalia*, *Zonosoma*, *Cabera*, *Macaria*, *Larentia* und *Tephroclystia* in meist zahlreichen Arten vertreten, dazu eine Menge Vertreter anderer Gattungen, so daß es sich reichlich lohnt, die Büsche nach ihnen abzuklopfen oder diese Tierchen aus ihrem Verstecke durch Anstreifen der Pflanzen aufzuscheuchen. Betreffs der einzelnen Arten verweisen wir auf die ausführlich gegebene Tabelle im Entomologischen Jahrbuche 1892, S. 27 usw.

Wir wollen nicht versäumen zu erwähnen, daß man die

weiblichen Schmetterlinge nicht sämtlich tötet, sondern zur Eierablage in bereit gehaltenen Schächtelchen mit nach Hause nimmt, um sich so Nachzuchten zu sichern.

Was weiter die **Raupen** anbetrifft, so sind auch diese an Arten bedeutend zahlreicher geworden. Es seien von **Tagschmetterlings-Raupen** erwähnt: *Parnassius mnemosyne* an Lerchensporn, *Pieris daplidice* an Hedrich und Hirtentäschel, *Leptidia sinapis* an Schotenklee und Senf, *Colias palaeno* an Sumpfheidelbeere in Moorgegenden, ferner *Thecla w-album*, *ilicis*, *acaciae*, *pruni* und *Zephyrus quercus*, *Chrysophanus virgaureae* und *hippotoe*, verschiedene *Lycaena*-Arten, der große und der kleine Eisvogel (*Limenitis populi* und *sibilla*), ersterer an Zitterpappel, letzterer an Geisblatt. An Wegerich finden sich die Raupen von *Melitaea dictynna* und *athalia*, während *Argynnis aglaja*, *niobe* und *paphia* an Veilchen, *A. aphirape* und *amathusia* an Natterwurz und Knöterich, und *A. ino* an Wiesenknopf zu suchen sind. Auch können Raupen der Gattungen *Erebia*, *Satyrus*, *Pararge*, *Epinephele* und solche der *Hesperidae* gefunden werden, obwohl deren Lebensweise eine recht versteckte ist. Von den **Schwärmer-Raupen** sind wohl nur solche der Sesien noch zu finden, während die der **Spinner** recht reichlich vorhanden sind. So findet sich an Eiche die Raupe des schönen *Hylophila bicolorana*; ebenso sind *Nola togatulalis* (Eiche), *cucullatella* (Apfelbaum), *strigula* und *confusalis* (Eiche) und *albula* (Wasserrminze, Brombeere), *Miltochrista miniata* an Baumflechte, desgleichen *Endrosa irrorella*, ferner die eigentlichen Flechtensspinner *Pelosia muscerda*, *Lithosia griseola*, *deplana*, *lurideola*, *complanata*, *lutarella* und *sorocula*, vielleicht auch *Oeonistis quadra*, letztere sämtlich an Flechten, nicht selten. Von den Bären (*Arctiidae*) sind wohl die meisten Raupen noch vorhanden. Auch treffen wir die Holzbohrer *Cossus cossus* und *Zeuzera pyrina*, ferner in Menge an Pappeln und Weiden *Stilpnotia salicis*, *Euproctis chrysorrhoea* und *Porthesia similis*, nicht minder *Lymantria dispar* (Laubholz) und *Ocneria detrita* (Eiche), dann *Lymantria monacha* und schließlich *Cosmotriche potatoria*, *Odonestis pruni*, *Gastropacha populifolia*, *Dendrolimus pini* und verschiedene andere mehr.

Alle die **Eulen-** und **Spanner-Raupen** endlich, die der Mai beut, hier anzuführen, ist schier eine Sache der Unmöglichkeit. Wir verweisen auf die diesbezüglichen trefflichen Zusammenstellungen, die bereits das 1894er Jahrbuch,

S. 36 und 37, brachte. Die meisten dieser Raupen sind durch „Kratzen“ und „Leuchten“ oder durch „Abklopfen“ der Büsche, vielleicht auch durch direktes „Absuchen“ an der Futterpflanze zu erlangen. Da sie meist erwachsen sind, bietet ihre Zucht keine Schwierigkeiten.



.Notizen für Mai



Wenn im Juni Nordwind weht,
Kommt Gewitter oft recht spät.

Juni trocken mehr als naß,
Füllt mit gutem Wein das Faß.

Wenn kalt und naß der Juni war,
Verdirbt er meist das ganze Jahr.

D.	T.	Protestantisch.		Katholisch.		Sonne.		Notizraum für Temperatur.
						Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	F.	Nikomed.	†	Juventius	†	3 46	8 10	
2	S.	Marquard	†	Erasmus		3 45	8 11	
3	S.	Trinitatis		Dreifaltigkeit		3 44	8 12	
4	M.	Ulrike		Quirinus		3 43	8 13	
5	D.	Bonifazius	☉	Bonifazius		3 43	8 14	
6	M.	Benignus		Norbert		3 42	8 15	
7	D.	Fronleichnam		Fronleichnam		3 42	8 16	
8	F.	Medardus		Medardus		3 41	8 17	
9	S.	Barnim		Felicianus u. P.		3 41	8 18	
10	S.	1. S. n. Trinit.		2. S. n. Pfingst.		3 40	8 18	
11	M.	Barnabas		Barnabas		3 40	8 19	
12	D.	Claudina	☾	Basilides		3 39	8 20	
13	M.	Tobias		Anton von Padua		3 39	8 21	
14	D.	Modestus		Basilus		3 39	8 21	
15	F.	Vitus		Vitus		3 39	8 22	
16	S.	Justina		Benno	†	3 39	8 22	
17	S.	2. S. n. Trinit.		3. S. n. Pfingst.		3 39	8 23	
18	M.	Paulina		Mark, M.		3 39	8 23	
19	D.	Gerv. u. Prot.	☉	Juliana v. F.		3 39	8 23	
20	M.	Raphael		Silverius		3 39	8 24	
21	D.	Jakobina		Aloysius		3 39	8 24	
22	F.	Achatius		Paulinus		3 39	8 24	
23	S.	Basilus		Edeltraud		3 39	8 24	
24	S.	3. S. n. Trinit.		4. S. n. Pfingst.		3 40	8 24	
25	M.	Elogius		Wilhelm		3 40	8 24	
26	D.	Jeremias		Vigilius		3 40	8 24	
27	M.	Siebenschläfer	☾	Ladislaus		3 41	8 24	
28	D.	Leo Papst	†	Leo II., Papst	†	3 41	8 24	
29	F.	Peter, Paul		Peter u. Paul		3 42	8 24	
30	S.	Pauli Ged.		Pauli Gedächtnis		3 42	8 24	

Juni.

Juni und Juli sind die Monate, in denen für den Entomologen das meiste zu holen ist, in denen also auch der Schmetterlingssammler, hat er nur einigermaßen freie Zeit zur Verfügung, eine geradezu großartige Ausbeute zu machen imstande ist. Es wird nicht verlangt werden, daß hier jede im Juni erscheinende Art registriert wird; vielmehr können wir bei dem gewaltigen Artenreichtume uns immer nur auf das Wichtigste beschränken.

Die **Tagschmetterlinge** erhielten wiederum neuen Zuzug. Da sind es vor allem *Parnassius apollo* und *mnemosyne*, *Aporia crataegi*, *Thecla w-album*, *ilicis* und *acaciae*, viele Bläulinge, z. B. *Lycaena aegon*, *argus*, *orbitulus*, *astrarche*, *icarus*, *eumedon*, *admetus* und *semiargus*, *Libythea celtis*, *Limenitis populi*, *camilla* und *sibylla*, die noch fehlenden *Vanessa polychloros*, *xanthomelas* und *antiopa*, dazu Arten der Gattungen *Melitaea*, *Argynnis*, *Erebia*, *Satyrus*, *Pararge*, *Epinephele*, *Coenonympha* und zahlreiche Vertreter der *Hesperidae*, welche Wiese, Feld und Wald, Berg und Tal zu jeder Tageszeit beleben.

Auch die **Schwärmer** vervollständigen sich mehr und mehr. Wir finden jetzt viele der größten Schwärmer, den Totenkopf (*Acherontia atropos*), welcher aus dem Süden zu uns heraufkommt, den Ligusterschwärmer (*Sphinx ligustri*), zahlreiche *Deilephila*-Arten, so *D. vespertilio*, *D. galii*, vielleicht auch schon den gleichfalls aus Südeuropa zu uns kommenden Oleanderschwärmer (*Daphnis nerii*), und endlich viele Arten der *Sesien* und *Zygaenen*.

Von den **Spinnern** haben sich weitere *Lithosien* eingestellt, von den *Arctiidae* etwa *Hipocrita jacobaeae*, *Diacrisia sanio*, *Arctia villica*, *aulica* (häufig schon im Mai), *Rhyparia purpurata* (auch Juli), dazu *Phragmatobia fuliginosa*, *Spilosoma mendica*, *lubricipeda*, *menthastri*, *urticae* (auch diese vielfach schon im Mai) und andere Arten. Die *Hepialus*-Arten sind da, ebenso *Cossus cossus*, *Cochlidion limacodes* und *Heterogenea asella*, die *Psychidae* und *Liparidae*, *Malacosoma neustria*, *Gastropacha populifolia*, *Cerura bicuspis* und *furcula*, die seltene *Hoplitis milhauseri*, die schönen *Drymonia querna* und *Spatalia argentina* und andere mehr. Nicht unerwähnt mögen noch sein die herrliche *Habrosyne deraea* und die gern begehrte *Thyatira batis*.

Die **Eulen** erscheinen in schier unendlicher Anzahl. Vor allem sind es zahlreiche Vertreter der Geschlechter *Acrionicta*, *Agrotis*, *Mamestra*, *Dianthoecia*, *Hadena*, *Leucania*, *Caradrina*, *Cucullia*, *Heliothis*, *Thalpochares*, *Erastria*, *Zanclognatha*, *Herminia*, *Hypena* und viele andere. Die meisten derselben sind durch die Köderschnur zu erbeuten, viele finden sich am elektrischen Lichte ein, so daß in diesem und den folgenden Monaten mit Leichtigkeit eine große Menge jener herrlichen Tiere der Sammlung zugeführt werden kann. Wir selbst erbeuteten „nur durch Ködern“ in den Monaten Juni bis September in unmittelbarer Nähe der Großstadt Leipzig insgesamt 115 Eulen-Arten in einem Jahre, darunter viele „gute und seltene“ Tiere.

Auch die **Spanner** sind durch zahlreiche Arten vertreten, wie dies ein Streifzug durch Busch und Wald sofort beweist. Vielleicht, daß wir in Buchen- und Birkenwäldern die herrliche grüne *Geometra papilionaria*, dazu die beiden wundervollen *Euchloris pustulata* und *smaragdaria*, letztere wohl nur im südlichen Deutschland, antreffen; sicher zu finden aber sind *Nemoria viridata*, ferner zahllose Vertreter der Gattung *Acidalia*, dazu *Ephyra orbicularia*, die Gattungen *Rhodostrophia*, *Bapta*, *Metrocampa*, *Ourapteryx sambucaria*, *Semiothisa signaria*, zahlreiche *Boarmien*, z. B. *Boarmia ribeata*, *repandata*, *roboraria*, *angularia*, *gemma*, *lichenaria*, *luridata*, *Thamnonoma wauaria* und die verschiedensten Vertreter der Gattungen *Scotosia*, *Lygris*, *Larentia* und *Tephroclystia*. Viele von ihnen finden sich abends am elektrischen Lichte ein, wo sie bequem zu erbeuten sind, während die meisten die Köderschnur meiden.

Der Juni ist aber auch ein trefflicher **Raupen-Sammelmonat**, denn in Hülle und Fülle sind diese gegenwärtig zu finden. So bringt er vor allem die Raupen der **Tagschmetterlinge** *Papilio machaon*, *Parnassius apollo*, die Weißlinge *Pieris brassicae*, *rapae* und *napi*, *Euchloë cardamines*, *Zephyrus betulae* und *Callophrys rubi*, *Chrysophanus dorilis* und *amphidamas* var. *obscura*, *Apatura iris* und *ilia*, *Araschnia levana* var. *prorsa*, *Vanessa polychloros*, *xanthomelas*, *urticae*, *io*, *antiopa*, *Melitaea cynthia*, *phoebe*, *trivia*, *Argynnis selene*, *dia*, *lathonia*, die süddeutschen *Satyrus hermione* und *circe*, *Pararge megera*, *aegeria*, var. *egerides* und *achine*, *Thanaos tages* und andere. Es ist wohl selbstverständlich, daß die Erscheinungszeit all dieser Tiere je nach Witterung und anderen unvorhergesehenen Umständen mehr oder weniger

früher oder später fallen kann. In ganz genau zu gebende Regeln läßt sich die Natur nicht zwingen.

Von **Schwärmer**-Raupen erwähnen wir *Hemaris fuciformis*, *Bembecia hylaeiformis* und evtl. noch einige andere verspätete Sesien. Das Hauptgros der Schwärmer-Raupen folgt erst später.

An **Spinner**-Raupen ist durchaus kein Mangel. Da treffen wir die in zusammengezogenen Salweidenblättern versteckte Raupe von *Earias clorana*, an Gras und niederen Pflanzen *Coscinia cribrum*, ferner *Arctia caja*, *flavia* (in den Alpen) und *maculosa* (Süddeutschland, Ungarn), *Trichiura crataegi*, *Poecilocampa populi*, *Malacosoma neustria*, *castrensis*, *lanestris*, *Lasiocampa trifolii* und *quercus*, *Lemonia taraxaci* und *dumi*, *Gastropacha quercifolia*, *Saturnia spini* (in Österreich und Ungarn), *Drepana falcataria*, *curvatula*, *harpagula*, *lacertinaria*, *binaria*, an Weißdorn und Schlehe *Cilix glaucata*, im südlichen Deutschland auf Ulmen *Exaereta ulmi*, dazu auf Laubbäumen *Pheosia tremula*, *dictaeoides*, *Notodonta ziczac*, *tritophus* und *phoebe*, *Odontesia carmelita*, an Ahorn und Buche *Ptilophora plumigera*, an Birken und Eichen endlich *Polyplocia ruficollis*, *flavicornis* und *ridens* und viele andere.

Nicht minder zahlreich sind auch die **Eulen**, von denen wir unter anderen anführen: *Diloba caeruleocephala*, *Trichosea ludifica* (Eberesche), die auf Fichten lebende *Panthea coenobita*, *Acronicta euphorbiae*, *tridens*, *psi*, *auricoma*, *rumicis*, *Bryophila algae*, *muralis*, *perla*, Arten der Gattungen *Agrotis*, *Neuronia*, *Mamestra*, *Dianthoecia*, *Polia*, *Valeria*, *Brotolomia meticulosa*, *Amphipyra*, *Taeniocampa*, *Pachnobia*, *Mesogona*, *Xanthia*, *Brachionycha*, *Xylina*, *Acontia*, *Euclidia*, und vor allem die Raupen der herrlichen Ordensbänder *Catocala fraxini* (Pappel), *elocata* und *nupta* (Weide, Pappel), *sponsa* und *promissa* (Eiche), *electa* (Weide), *fulminea* (Schlehe) und andere. An Aspen und Birken erscheinen die Raupen von *Brephos nothum* und *parthenias*.

Neben den zahlreichen, bereits im Mai angegebenen **Spanner**-Raupen bringt der Juni noch zahlreiche Arten folgender Gattungen: *Nemoria*, *Acidalia*, *Ephyra*, *Timandra*, *Abraxas*, *Ellopiia*, *Selenia*, *Epione*, *Semiothisa*, *Hibernia*, *Biston*, ferner den Frostspanner (*Cheimatobia brumata*), dazu zahlreiche Vertreter der Gattungen *Larentia* und *Tephroclystia*. Das ist eine gewaltige, kaum zu bewältigende


Menge. Es ist darum beim Sammeln, will man überhaupt etwas erreichen, Mäßigung auf das dringendste geboten.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß im gegenwärtigen Monate sich auch das Aufsuchen von **Puppen**, vor allem von Tagschmetterlingspuppen lohnt. An Grashalmen, hinter Staketen, an kleinen Zweigen, zwischen zusammengesponnenen Blättern von Brennesseln und dergleichen kann man nicht selten Puppen solcher Schmetterlinge finden, deren Aufsuchen als Raupe wegen der versteckten Lebensweise oft erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Wir erwähnen die *Melitaea*- und *Argynnis*-Arten, vor allem aber an Aspenbüschen die Puppen des Eisvogels (*Limenitis populi*) und an Salweiden die des herrlichen Blauschillers (*Apatura iris*).



Notizen für Juni.

--	--



Hundstage hell und klar,
Zeigen an ein gutes Jahr.

Peter Paul recht klar,
Gibt ein gutes Jahr.

Reißt die Spinne ihr Netz entzwei,
Kommt ein Regen bald herbei.

Weht's bei Neumond her vom Pol,
Bringt es kühlen Regen wohl.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	S.	4. S. n. Trinit.	5. S. n. Pfingst.	3 43	8 24	
2	M.	Mar. Heimsuchung	Mar. Heimsuchung	3 44	8 23	
3	D.	Kornelius	Hyacinth	3 44	8 23	
4	M.	Ulrich ☼	Ulrich	3 45	8 22	
5	D.	Anselmus	Numerianus	3 46	8 22	
6	F.	Jesaias	Jesaias	3 47	8 21	
7	S.	Demetrius	Willibald	3 48	8 21	
8	S.	5. S. n. Trinit.	6. S. n. Pfingst.	3 49	8 20	
9	M.	Cyrillus	Veronika	3 50	8 20	
10	D.	Sieben Brüder	Sieben Brüder	3 51	8 19	
11	M.	Pius ☾	Pius I.	3 52	8 18	
12	D.	Heinrich	Joh. Gualbert	3 53	8 17	
13	F.	Margareta	Margareta	3 54	8 16	
14	S.	Bonaventura	Bonaventura	3 55	8 15	
15	S.	6. S. n. Trin.	7. S. n. Pfingst.	3 56	8 14	
16	M.	Walter	Mar. v. K.	3 58	8 13	
17	D.	Alexius	Alexius	3 59	8 12	
18	M.	Karoline	Friedericus	4 0	8 11	
19	D.	Ruth ☼	Vinzenz v. Paula	4 1	8 10	
20	F.	Elias	Margareta	4 3	8 9	
21	S.	Daniel	Praxedes	4 4	8 7	
22	S.	7. S. n. Trinit.	8. S. n. Pfingst.	4 6	8 6	
23	M.	Albertine	Liborius	4 7	8 5	
24	D.	Christine	Christina	4 8	8 3	
25	M.	Jakobus	Jakobus	4 10	8 2	
26	D.	Anna	Anna	4 11	8 0	
27	F.	Berthold ☾	Pantaleon	4 13	7 59	
28	S.	Innozenz	Innozenz	4 14	7 57	
29	S.	8. S. n. Trinit.	9. S. n. Pfingst.	4 16	7 56	
30	M.	Beatrix	Julitta	4 17	7 54	
31	D.	Germanus	Germanus	4 19	7 53	

Juli.

Die größte Menge an Insekten im allgemeinen, an Schmetterlingen und deren Entwicklungsstadien im besondern, bringt ohne Zweifel der Juli, mehr noch als der Juni. Jede Abteilung hat ihre Vertreter gesandt, so daß die Sammler einzelner Familien vollauf zu tun haben, einzuheimsen, ihre Lücken zu vervollständigen, ihre Kasten zu füllen.

Da fliegen vor allem von den **Tagfaltern** *Pieris napi*, *Leptidia sinapis*, *Colias phicomone* und *hyale*, *Gonepteryx rhamni*, die niedlichen *Zephyrus betulae*, *quercus*, *Thecla spini* und *Callophrys rubi*, die prächtigen *Chrysophanus virgaureae*, *utilus*, *dorilis*, *phlaeas*, zahlreiche *Lycaena*-Arten, ferner die herrlichen Schillerfalter *Apatura iris*, *ilia* und die Varietät *clytie*, die süddeutschen *Neptis lucilla* und *aceris*, *Araschnia levana* var. *prorsa*, *Polygonia c-album* und *f-album*, *Argynnis ino*, *daphne*, *lathonia*, *aglaja*, *niobe*, *adippe*, *paphia* und *pandora*, das wunderschöne Brettspiel *Melanargia galathea*, viele Arten der Gattungen *Erebia*, *Satyrus*, *Epinephele*, *Syrichthus*, *Hesperia* und andere mehr.

Die **Schwärmer** haben sich gleichfalls bedeutend vervollständigt. Zu denjenigen, die im Juni aufgeführt wurden, kommen hinzu *Protoparce convolvuli*, *Chaerocampa celerio*, *Thyris fenestrella*, *Ino chloros* und viele Zygänen.

Unter den **Spinndern** mögen folgende Juli-Falter Erwähnung finden, wenn auch alle aufzuführen eine reine Unmöglichkeit ist. Da ist es jetzt *Earias clorana*, welche neben *Hylophilia bicolorana* erscheint, dann Arten der Gattungen *Nudaria*, *Endrosa* und *Lithosia*, ferner *Oeonistis quadra* und zahlreiche Vertreter der *Arctiidae* trifft man überall an, z. B. *Coscinia striata* und *cribrum*, *Diacrisia sanio* und *Parasemia plantaginis*, *Callimorpha dominula* und *quadripunctaria*, die süddeutsche *Pericallia matronula* und die echten Bären *Arctia caja*, *flavia*, *fasciata*, *spectabilis* u. a. Es finden sich *Hepialus*- und *Cossus*-Arten ein, *Zeuzera pyrina*, *Phragmatoecia castaneae*, *Ocnaria*-Arten, *Lymantria monacha*, die eigentlichen Spinner *Cosmotriche potatoria*, *Odonestis pruni*, *Gastropacha quercifolia*, *populifolia*, *Selenophora lunigera*, *Dendrolimus pini*, *Pachypasa otus* u. a. und die Prozessionsspinner *Thaumetopoea pityocampa* und *pini-vora* nebst vielen anderen.

Von den **Eulen** erscheinen weitere *Agrotis*-Arten, die Gattungen *Mamestra* und *Hadena*, *Luceria virens*, *Jaspidea*

celsia und verschiedene Leucanien, *Amphipyra tragopoginis* und *pyramidea*, die schöne *Dicycla oo* (auch schon Juni), *Calymnia pyralina*, *diffinis*, *affinis* und *trapezina*, *Dyschorista suspecta*, *Plastenis retusa* und *subtusa*, *Scoliopteryx libatrix*, *Cucullia*-Arten, ferner *Telesilla amethystina* und verschiedene Plusien, *Anarta myrtili* (in 2. Generation), die Ordensbänder *Catocala sponsa* und *promissa*, *Parascotia fuliginaria*, *Hermia tentacularia* und *derivalis* und *Rivula sericealis*.

Reich ist noch die Ausbeute an **Spannern**, von denen ich als im Juli (bisweilen aber auch schon im Juni) fliegend hervorhebe: *Pseudoterpna pruinata*, *Euchloris pustulata*, *Hemithea strigata*, *Thalera fimbrialis*, *Acidalia*-, *Zonosoma*- und *Abraxas*-Arten, *Numeria pulveraria*, *Ellopija prosapiaria* mit der Aberration *prasinaria* (in 2. Generation), die unvergleichlich schönen *Metrocampa margaritaria* und *honorarya*, vom Genus *Ennomos* etwa schon *quercinaria*, die Sommergeneration von *Selenia bilunaria* var. *juliaria*, dann *Hygrochroa syringaria*, *Therapis evonymaria*, *Epione apiciaria* und *parallelaria*, die *Scmiothisa*- und viele der *Boarmia*-Arten, *Bupalus piniarius*, die hübsche *Phasiane clathrata*, *Eubolia murinaria* (2. Generation), *Lythria purpuraria*, *Ortholitha*-Arten, bisweilen noch *Lithostege farinata* und *Anaitis plagiata*, die *Lygris*-Arten, *Larentia*-Arten in Hülle und Fülle, darunter *bilineata*, eine der schönsten und gemeinsten, und viele der kleinen, interessanten *Tephroclystia*-Arten! Der Juli ermöglicht demnach einen Falterfang, wie er seinesgleichen nicht hat, und Köder und elektrisches Licht bieten hierzu wiederum die hervorragendsten Gelegenheiten.

Nicht minder aber wird der tätige Entomologe im Juli eine gewaltige Menge von **Raupen** eintragen können; er wird einen Rückschritt in der Anzahl der Raupen gegen den Juni überhaupt kaum fühlen, da es ja vom Juni her noch eine große Zahl Tiere gibt, die auch im Juli zu finden sind. Doch muß hier vor allem bedacht werden, daß viele derselben erst im nächsten Jahre den Falter ergeben, in ihrem Puppenstadium also überwintern. Auch sei erwähnt, daß gegenwärtig manche Arten in zweiter Generation auftreten, wodurch ihre Namen zum zweiten Male in der Reihe der bisher genannten wiederkehren.

Von den im Juli auftretenden Raupen erwähnen wir nur die wichtigsten. Es sind:

Tagschmetterlinge: *Colias edusa* und *hyale*, *Gonepteryx rhamni*, *Chrysophanus phlaeas*, *Lycaena argiolus* und *cyllarus*,

beide an Ginster, *Pyrameis atalanta* (Nessel), *cardui* (Distel) und *Carcharodus alceae* (in gerollten Blättern an Malven).

Schwärmer: *Deilephila vespertilio* (in den südlichen Alpen an Weiderich), *Pterogon proserpina* (an Nachtkerze), *Hemaris scabiosae* (an Geisblatt) und andere mehr, von denen die meisten jedoch regelmäßiger den folgenden Monaten angehören, so daß sie besser dort aufgeführt werden.

Spinner: *Sarothripa revayana*, *Deiopeia pulchella*, *Hipocrita jacobaeae* (meist gesellschaftlich an Jakobskraut), *Orgyia gonostigma* und *antiqua*, *Endromis versicolora*, *Saturnia pyri* und *pavonia*, *Agria tau* (an Buchen, Haseln usw.), *Notodonta dromedarius*, *trepida*, *Drymonia chaonia* und *querna*, *Thaumetopoea processionea* und *pityocampa*, deren Haare auf der Haut heftige Entzündungen hervorrufen können, und *Pygaera anastomosis*, *curtula*, *anachoreta* und *pigra*.


Eulen: *Acrioneta menyanthidis* und *alni*, *Agrotis rubi* und *plecta*, *Dianthoccia nana*, *Apamea testacea*, *Trachea atriplicis*, die im Stengel von Disteln und Wollkraut lebende Raupe von *Gortyna ochracea*, *Nonagria cannae*, *sparganii*, *typhae*, *Leucania pallens* und *l-album*, *Taeniocampa pulverulenta*, *Calocampa vetusta* und *exoleta*, *Plusia moneta* und *chrysitis*, *Anarta myrtili*, *Heliaca tenebrata*, *Heliothis ononis*, *Chariclea delphinii*, *Emmelia trabecalis*, *Pseudophia lunaris*, *Catephia alchymista* und *Hypena rostralis*.

Spanner: *Deilinia pusaria* und *exanthemata*, *Ennomos autumnaria* und *alniaria*, *Anisopteryx aceraria* und *aescularia*, *Phigalia pedaria*, *Diastictis artesiaria*, *Larentia juniperata*, *siterata* und *pomoeraria* und *Tephroclystia satyrata*, dazu viele mehr oder weniger häufige Arten.



Notizen für Juli.

--	--



Wenn die Schwalben jetzt schon ziehn,
Sie vor nahender Kälte fliehn.

Ist's Petrus bis Laurentius heiß,
Dann bleibt's im Winter lange weiß.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	M.	Petri Kettenfeier	Petri Kettenfeier	4 20	7 51	
2	D.	Portiunkula	Alf. v. Lig.	4 22	7 49	
3	F.	August	Stephan E.	4 23	7 47	
4	S.	Perpetua	Dominikus	4 25	7 46	
5	S.	9. S. n. Trinit.	10. S. n. Pfingst.	4 27	7 44	
6	M.	Verkl. Chr.	Verkl. Chr.	4 28	7 42	
7	D.	Donatus	Cajetanus	4 30	7 40	
8	M.	Ladislaus	Cyriakus	4 31	7 38	
9	D.	Romanus	Romanus	4 33	7 36	
10	F.	Laurentius	Laurentius	4 35	7 35	
11	S.	Titus	Tiburtius	4 36	7 33	
12	S.	10. S. n. Trinit.	11. S. n. Pfingst.	4 38	7 31	
13	M.	Hildebr.	Hippolyt	4 39	7 29	
14	D.	Eusebius	Eusebius	4 41	7 27	
15	M.	Maria Himmelfahrt	Mariä Himmelf.	4 43	7 25	
16	D.	Isaak	Rochus	4 45	7 23	
17	F.	Bertram	Liberatus	4 46	7 21	
18	S.	Emilia	Helena	4 48	7 19	
19	S.	11. S. n. Trinit.	12. S. n. Pfingst.	4 50	7 16	
20	M.	Bernhard	Bernhard	4 51	7 14	
21	D.	Anastasius	Anastasius	4 53	7 12	
22	M.	Oswald	Timotheus	4 55	7 10	
23	D.	Zachäus	Philipp Benit	4 56	7 8	
24	F.	Bartholomäus	Bartholomäus	4 58	7 6	
25	S.	Ludwig	Ludwig	5 0	7 3	
26	S.	12. S. n. Trinit.	13. S. n. Pf.	5 1	7 1	
27	M.	Gebhard	Jos. Calas	5 3	6 59	
28	D.	Augustinus	Augustinus	5 5	6 57	
29	M.	Joh. Enth.	Joh. Enth.	5 6	6 55	
30	D.	Benjamin	Rosa	5 8	6 52	
31	F.	Rebekka	Raimund	5 10	6 50	

August.

Der Höhepunkt der Erscheinungszeit der Schmetterlinge ist überschritten, die Kolonnen sind bereits merklich gelichtet; aber trotzdem geizt die Natur keineswegs, denn zu den vielen von früheren Monaten auf den August übergehenden Tieren gesellen sich immer noch neue, die Wald, Flur, Feld und Wiese beleben und unser Auge ergötzen.

Von **Tagschmetterlingen** sind wieder neu hinzugekommen: *Papilio machaon*, *Pieris brassicae* und *rapae*, *Colias edusa*, *Chrysophanus amphidamas* in seiner Varietät *obscura*, *Lycaena argiades*, *bellargus*, *coridon* und *damon*, *Pyrameis atalanta* und *cardui*, die südlicher fliegende *Melitaea phoebe*, *Argynnis selene* und *dia*, Arten der Gattung *Satyrus*, *Pararge maera*, *megera* und *aegeria*, das kleine, gelbe Wiesenvögelchen *Coenonympha pamphilus*, *Hesperia malvae*, *orbifer* und *Thanaos Tages*.

Von **Schwärmern** sind *Deilephila euphorbiae*, *Macroglossa stellatarum* und *Bembecia hylaeiformis* zu erwähnen, wie auch die **Spinner** gegenwärtig weit weniger Arten zeigen. Von diesen sind wohl als Neulinge zu nennen: *Endrosa irrorella*, *Pelosia muscerda*, *Lithosia complana* und *lutarella*, *Trichiura crataegi*, *Lasiocampa quercus*, *Drepana falcataria*, *harpagula* u. a., *Cilix glaucata*, *Notodonta ziczac*, *tritophus* und *dromedarius*, *Cnethocampa processionea* und verschiedene *Cymatophora*- und *Polyploca*-Arten.

Von den **Eulen** können wir, wie dies besonders der Köderfang beweist, behaupten, daß deren Zahl noch nicht abgenommen hat. Wir vermerken hier nur die im August neu einrückenden Truppen. Dies sind *Agrotis sobrina*, *pronuba*, *castanea*, *xanthographa*, *umbrosa*, *plecta*, *obelisca*, *saucia*, *segetum*, *praecox*, *Episema glaucina*, *Polia chi*, *serpentina* und *polymita*, *Apamea testacea* und *Celaena matura*, *Hadena amica*, *porphyrea*, *lateritia* und *Miana ophiogramma*, das schöne schwarze Ordensband *Mania maura*, *Helotropa leucostigma*, *Simyra nervosa*, *Arsilonche albovenosa*, *Hydroecia micacea* und *leucographa*, die treffliche *Gortyna ochracea*, *Nonagria nexa*, *cannae*, *sparganii*, *typhae* und *geminipuncta*, *Tapinostola musculosa*, *fulva* und *elymi*, *Calamia lutos*, die weißfleckige *Leucania albipuncta*, *Cosmia paleacea* und *abluta*, *Orthosia pistacina* und *laevis*, die prachtvollen *Xanthia citrigo*, *aurago*, *lutea*, *fulvago* und *gilvago*, *Calocampa solidaginis*, *Plusia moneta*, *chrysis*, *gutta* und

gamma, *Heliothis dipsacea* und *scutosa*, *Thalpochares paula-* die trefflichen Ordensbänder *Catocala clocata*, *nupta*, *con-* *versa*, *diversa* und *nymphagoga*, und *Hypena proboscidalis*,

Ebenso sind **Spanner** aller Art noch recht häufig zu finden. So erscheint jetzt *Hemithea strigata*, *Acidalia vir-* *gularia*, *degeneraria* und *aversata*, *Ennomos autumnaria* und *alniaria*, *Crocallis elinguaris*, *Epione apiciaria*, *Gnophos dilu-* *cidaria*, *Selidosema ericetaria*, *Ortholitha plumbaria*, *Chesias* *spartiata*, *Lygris testata*, *Larentia truncata*, *firmata*, *designata*, *galiata*, *rivata*, *sociata*, *flavofasciata*, *obliterata* und *capitata*, und die kleinen *Tephroclystia innotata* und *sobrinata*.

Das ist doch eine treffliche Auswahl. Aber auch **Raupen** sind noch zahlreich vorhanden; wir erwähnen hier nur die bereits ausgewachsenen Tiere, von denen der August neben bereits früher gemeldeten folgende bringt:

Tagschmetterlings-Raupen: *Papilio podalirius*, *Thaïs poly-* *lyxena*, *Chrysophanus dorilis* und *amphidamas*, *Nemeobius lucina*, *Lycaena icarus*, *cyllarus* u. a., dazu *Polygonia c-album*.

Schwärmer-Raupen: *Protoparce convolvuli*, *Deilephila galii*, *Deil. euphorbiae*, den großen und kleinen Weinvogel (*Chacrocampa celerio* und *Metopsilus porcellus*), *Daphnis nerii*, *Smerinthus quercus* und *Macroglossa stellatarum*.

Spinner-Raupen: Hierher gehören *Epicnaptera ilicifolia*, *Cerura bicuspis*, *Dicranura erminea* und *vinula*, *Stauropus fagi*, die schöne Raupe von *Hoplitis milhauseri*, *Drymonia trimacula*, *Leucodonta bicoloria*, *Spatialia argentina*, *Ochro-* *stigma velitaris* und *Gluphisia crenata*.

Eulen-Raupen: *Craniophora ligustri*, *Dianthoecia capsin-* *cola*, *cucubali* und *carpophaga*, *Chloantha hyperici* und *polyo-* *don*, *Xylomyges conspicillaris*, *Calophasia lunula*, *Cucullia* *scrophulariae*, *lactucae* und *chamomillae*, *Plusia gamma*, *Erastria pusilla*, *deceptoris* und *fasciana*, *Madopa salicalis* und *Hypena proboscidalis*.


Von **Spanner-Raupen** endlich können als neu bezeichnet werden: *Thalera putata* und *lactearia*, *Metrocampa honoraria*, *Epione advenaria*, *Venilia macularia*, *Amphidasis betularia*, *Eucosmia undulata*, *Larentia cucullata*, *albicillata* und andere mehr.

So gibt es also noch immer viel im August zu tun. Doch wird, um einer Verwirrung vorzubeugen, eine weise Auswahl beim Sammeln sehr am Platze sein.



September — Herbstmonat — 30 Tage.

43



Ist's am 1. September hübsch rein,
Wird's den ganzen Monat so sein.

Herbstgewitter bringen Schnee,
Doch dem nächsten Jahr kein Weh.

Regnet's am Michaelistag,
So folgt ein milder Winter nach.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	S.	Aegidius ☽	Aegidius	5 11	6 48	
2	S.	13. S. n. Trinit.	14. S. n. Pfingst.	5 13	6 45	
3	M.	Mansuetus	Mansuetus	5 15	6 43	
4	D.	Moses	Rosalia	5 16	6 41	
5	M.	Nathanael	Laurentius	5 18	6 39	
6	D.	Magnus	Magnus	5 19	6 36	
7	F.	Regina	Regina	5 21	6 34	
8	S.	Mariä Geburt ☾	Mariä Geburt	5 23	6 32	
9	S.	14. S. n. Trinit.	15. S. n. Pfingst.	5 25	6 29	
10	M.	Sosthenes	Nik. v. Tol.	5 26	6 27	
11	D.	Gerhard	Aemilian	5 28	6 24	
12	M.	Ottilie	Guido	5 30	6 22	
13	D.	Christlieb	Maternus	5 31	6 20	
14	F.	† Erhöhung	† Erhöhung	5 33	6 17	
15	S.	Constantia	Nikomedes	5 35	6 15	
16	S.	15. S. n. Trinit. ☼	16. S. n. Pfingst.	5 36	6 13	
17	M.	Lambertus	Lambert	5 38	6 10	
18	D.	Siegfried	Thomas v. Vill.	5 40	6 8	
19	M.	Quatember †	Quatember †	5 41	6 5	
20	D.	Friederike	Eustach. †	5 43	6 3	
21	F.	Matthäus Ev.	Matthäus Ev.	5 45	6 1	
22	S.	Moritz †	Moritz †	5 46	5 58	
23	S.	16. S. n. Trinit. ☾	17. S. n. Pfingst.	5 48	5 56	
24	M.	Joh. Empf.	Gerhard	5 50	5 54	
25	D.	Kleophas	Kleophas	5 51	5 51	
26	M.	Cyprianus	Cyprianus	5 53	5 49	
27	D.	Kosm. u. D.	Kosm. u. D.	5 55	5 46	
28	F.	Wenzeslaus	Wenzeslaus	5 57	5 44	
29	S.	Michaelis	Michaelis	5 58	5 42	
30	S.	17. S. n. Trinit. ☽	18. S. n. Pfingst.	6 0	5 39	

September.

In aller Stille, in kaum bemerkbarem Übergange hat die Natur eine Rückwärtsbewegung unternommen. Sie steht hinsichtlich ihrer Produktivität nicht mehr auf der Höhe wie im August; der wunderbare Wechsel in der Erscheinung der Arten vollzieht sich nicht mehr in gleichmäßig raschem Tempo, und doch sind noch alle Plätze ausgefüllt, alle Gefilde von Insekten belebt, noch hat sie, die große Erzeugerin, genug zu tun, um die großartige Periode zwischen blühendem Leben und dem Überwinterungsschlaf vorzubereiten.

Freilich, viele neue Arten erscheinen nicht mehr, es sind zumeist Überläufer aus früheren Monaten. Von Neulingen für den September sind vielleicht zu nennen unter den **Tag-schmetterlingen**: *Pieris daplidice*, dann die immer erfreuenden *Colias hyale* und *myrmidone*, ebenso der prächtige kleine Perlmutterfalter *Argynnis lathonia*; wohl möglich, daß auch noch einige Arten der Gattungen *Thecla*, *Zephyrus* und *Vanessa* der Puppe entsteigen.

Von **Schwärmern** ist es vor allem der Totenkopf (*Acherontia atropos*), dem der große, kräftige *Protoparce convolvuli*, besonders an Blüten der *Petunie* fliegend, sich anschließt.

Auch die **Spinner** stellen nur noch wenige neue Truppen. Wir erwähnen *Eriogaster catax* und *rimicola*, dazu die schönen Wiesenspinner *Lemonia taraxaci* und *dumi*.

Die **Eulen**, obwohl sie gerade jetzt äußerst zahlreich an den Köder oder an das elektrische Licht gehen, zeigen doch wenige Neuheiten. Es erscheint jetzt *Diloba caeruleocephala*, *Agrotis glareosa* und *ypsilon*, die schöne, weißgerippte *Epineuronia popularis*, die schwarze *Aporophila nigra*, *Ammoconia caecimacula* und *senex*, *Polia flavicincta* und *xanthomista*, die hellgrüne, prächtige *Dichonia aprilina*, *Miselia oxycanthae*, *Hadena adusta*, *Orthosia lota*, *macilenta*, *circellaris*, *helvola*, *nitida*, *litura*, die fahlbraungraue *Xanthia ocellaris*, *Hopiorina croceago*, *Orrhodia fragariae*, *erythrocephala*, *v-punctatum*, *vaccinii*, *ligula*, *Xylina semibrunnea*, *socia*, *furcifera*, *ingrica* und *ornitopus*, *Calocampa vetusta* und *exoleta* und das herrliche blaue Ordensband *Catocala fraxini*.

Endlich sind von neu auftretenden **Spannern** vielleicht noch anzuführen: *Ennomos autumnaria*, *Himera pennaria* und *Larentia juniperata*, *siterata*, *miata*, *vespertaria*, *fluviata*, *vittata*, *dilutata*, *albulata* und *lapidata*.

An **Raupen** ist gerade jetzt der Reichtum ein fast unerschöpflich. Ich nennen nur die, welche noch im alten Jahre meist zur Puppe übergehen und als solche überwintern. Diese Raupen, jetzt nach Hause gebracht, ergeben den Hauptbestand des Puppenvorrats für den Winter. Will man aber aus ihrer Vielartigkeit Nutzen ziehen, so sortiere man sie zu rechter Zeit, d. h. man erziehe die „als unbekannt“ gefundenen Raupen abgesondert und unter geeigneter Anmerkung zur Puppe, die man, wiederum abgetrennt, überwintern läßt, damit man beim Ausschlüpfen des Falters im Frühjahr sich genau der Raupen (und der Puppe) erinnere, aus der er hervorgegangen ist!

Von **Tagschmetterlingen** sind noch als Raupe vertreten: *Papilio machaon*, *Pieris brassicae*, *rapae* und *napi*, *Araschnia levana* (im Buschholze an Brennesseln gesellschaftlich), *Pararge aegeria* v. *egerides*, *Carcharodus alceae* (in gerollten Malvenblättern) und *Thanaos Tages*.

Die **Schwärmer** bringen den Totenkopf (*Acherontia atropos*, an Kartoffelpflanze), *Sphinx ligustri*, *Hyloicus pinastri*, *Chacrocampa elpenor*, *Dilina tiliae*, *Smerinthus ocellata* und *Smerinthus populi*.

An **Spinner-Raupen** ist durchaus kein Mangel. Jetzt finden sich *Earias clorana*, *Hylophila prasinana*, *Spilosoma mendica*, *lubricipeda*, *menthastri* und *urticae*, *Cochlidion limacodes* und *Heterogenes asella*, *Dasychira pudibunda*, der als erwachsene Raupe überwinternde Vielfraß *Macrothylacia rubi*, *Epicnaptera tremulifolia*, *Drepana falcataria*, *curvatula*, *harpagula*, *lacertinaria*, *binaria* und *cultraria*, *Cilix glaucata*, *Cerura furcula*, *Pheosia tremula*, *dictaeoides*, *Notodonta ziczac*, *tritophus*, *phoebe* und *dromedarius*, *Lophopteryx camolina*, *Pterostoma palpina*, *Phalera bucephala* (oft in „schwerer“ Menge), *Pygaera anastomosis*, *Habrosyne derasa*, die schöne *Thyatira batis*, *Cymatophora octogesima*, *or*, *duplaris* und *fluctuosa*.

Die **Eulen** sind wieder stark vertreten; sie hier alle anzuführen, würde den Raum zu weit überschreiten. Die wichtigsten sind: *Demas coryli*, zahlreiche Arten der Gattung *Acrionicta*, *Diphtera alpium*, verschiedene *Agrotis*- und *Mamestra*-Arten, *Dianthoecia compta*, *Chariptera viridana*, *Dypterygia scabriuscula* und *Hyppa rectilinea*, *Callopietria purpureofasciata*, *Trachea atriplicis*, *Brotolomia meticulosa*, *Arsilonche albovenosa*, *Acosmetia caliginosa*, *Rusina umbratica*, verschiedene Arten der Gattungen *Cucullia* und *Plusia*,


Heliothis dipsacea, *Pyrrhia umbra*, *Acontia lucida* und *luctuosa*, *Erastria argentula* und *uncula*, *Prothymnia viridaria*, *Emmelia trabealis*, *Euclidia mi* und *glyphica* und *Bomolocha fontis*.

Von **Spanner**-Raupeu endlich mögen aufgeführt werden: *Nemoria viridata*, *Ephyra pendularia*, *annulata* und *punctaria*, *Abraxas adustata*, *Selenia bilunaria* und *tetralunaria*, *Gonodontis bidentata*, *Eurymene dolabraria*, *Opisthograptis luteolata*, *Semiothisa notata*, *liturata* und *signaria*, zahllose Vertreter der Gattung *Larentia*, *Tephroclystia oblongata* und *subnotata* und viele andere mehr.

Um all diese Tiere zu erlangen, ist jede Sammelmethode, vor allem das Klopfen, dann das Absuchen, Kratzen, Leuchten und Schöpfen am Platze. Bei einiger Übung wird jeder die ihm am liebsten zusagende Sammelart sich aneignen und damit recht gute Resultate erzielen.



Notizen für September.



Hält der Baum seine Blätter lange,
Ist mir um späten Winter bange.

Halten die Krähen Konvivium,
Sieh nach Feuerholz dich um.

Trägt der Hase lang sein Sommerkleid,
So ist der Winter auch noch weit.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	M.	Remigius	Remigius	6 2	5 37	
2	D.	Vollrad	Leodegar	6 3	5 35	
3	M.	Ewald	Candidus	6 5	5 32	
4	D.	Franz	Franz	6 7	5 30	
5	F.	Fides	Plazidus	6 8	5 28	
6	S.	Charitas	Bruno	6 10	5 25	
7	S.	18. S. n. Trinit. ☾	19. S. n. Pfingst.	6 12	5 23	
8	M.	Ephraim	Brigitta	6 14	5 21	
9	D.	Dionysius	Dionysius	6 15	5 18	
10	M.	Amalia	Franz Borg.	6 17	5 16	
11	D.	Burchard	Burchard	6 19	5 14	
12	F.	Ehrenfried	Maximilian	6 21	5 12	
13	S.	Koloman	Eduard	6 23	5 9	
14	S.	19. S. n. Trinit.	20. S. n. Pfingst.	6 24	5 7	
15	M.	Hedwig	Theresia	6 26	5 5	
16	D.	Gallus	Gallus	6 28	5 3	
17	M.	Florentin	Hedwig	6 30	5 0	
18	D.	Lukas Ev.	Lukas Ev.	6 32	4 58	
19	F.	Ptolemäus	Petrus v. Alk.	6 33	4 56	
20	S.	Wendelin	Wendelin	6 35	4 54	
21	S.	20. S. n. Trinit.	21. S. n. Pfingst.	6 37	4 52	
22	M.	Cordula	Cordula	6 39	4 50	
23	D.	Severinus	Severinus	6 41	4 48	
24	M.	Salome	Raphael	6 42	4 46	
25	D.	Adelheid	Crispinus	6 44	4 44	
26	F.	Amandus	Evaristus	6 46	4 41	
27	S.	Sabina	Sabina	6 48	4 39	
28	S.	21. S. n. Trinit.	22. S. n. Pfingst.	6 50	4 37	
29	M.	Engelhard	Narzissus	6 51	4 35	
30	D.	Hartmann	Serapion	6 53	4 33	
31	M.	Wolfgang	Wolfgang	6 55	4 31	

Oktober.

Welch verändertes Bild! Welche Wechsel haben sich in der Natur vollzogen, seit wir die erste *Brachionycha nubeculosa* klopfen, seit die überwinterten Falter sich zuerst wieder an das Tageslicht wagten, bis heute, da die nämlichen Geschlechter sich von neuem zur Winterruhe rüsten. Gewaltige Umwälzungen haben stattgehabt, und in unendlicher Vielseitigkeit lösten die Arten, eine immer schöner und herrlicher als die vorhergegangene, sich ab. Auch die Vegetation hat sich verwandelt; sie hat geblüht und gelebt, und nun ist es mit ihrer Lieblichkeit bald vorüber; andere, trübere Verhältnisse werden herrschen.

Wie aber die Vegetation noch in ihrem Absterben neue Reize entfaltet, sich in leuchtende Farben kleidet, als wollte sie das Grau des Herbstes überstrahlen, so zeigt auch die Insektenwelt noch immer gewisse Reize, und es ist nichts interessanter, als die Beobachtung aufzustellen: in welchem Stadium, in welcher Metamorphose befinden sich alle die Arten, denen wir nunmehr in einer Reihe von acht Monaten unsere Teilnahme gewidmet haben, gerade jetzt, da das entomologische Jahr zur Neige geht! Wir werden eine Verschiedenartigkeit gewahr, die uns in Erstaunen versetzen muß, denn diese Art überwintert als Ei, jene als Raupe, eine dritte als Puppe, und wieder eine andere als Falter selbst. Es gibt sogar Arten, die teils in der einen, teils in der andern Gestalt die Überwinterung antreten. Wahrscheinlich verbindet die fürsorgliche Natur hiermit den Zweck, gerade diese Art auf jeden Fall zu erhalten, falls sie durch Witterungsbedingungen in dem einen Metamorphosenstadium zugrunde gehen sollte. Diese Abweichungen sind selten, sie kommen aber bei Eulen und auch bei Schwärmern in der Tat vor.

Noch treffen wir einige Neuerscheinungen der Schmetterlingsfauna an. Freilich, von **Tagschmetterlingen** ersteht gegenwärtig nichts Neues mehr; es scheint, als ob diese Tiere doch zu zart wären für die oft recht kalten Nächte: Tagschmetterlinge sind eben keine Spätherbsttiere. Von **Schwärmern** kann außer den größten Vertretern dieser Familie wohl neben *Macroglossa stellatarum* als wieder neu *Hemaris scabiosa* gefunden werden. Die **Spinner** senden gleichfalls einige Nachzügler, zu denen *Poecilocampa populi* und *Eriogaster lanestris* zu zählen sind.


Die **Eulen** sind neu vertreten durch *Orrhodia rubiginosa*,

Scopelosoma satellitia und die weißgraue *Brachionycha sphinx*. Auch von den **Spannern** mögen noch folgende erwähnt sein: *Crocallis tusciaria* und *Hybernia bajaran*, *aurantiaria* und *defoliaria*. Natürlich können alle genannten recht wohl auch schon in früheren Monaten auftreten. Es finden sich auch noch viele Vertreter des September, ja selbst vom August her haben sich noch einige, wenn auch in recht abge- schabtem Kleide, erhalten. Viele von diesen Tieren lassen sich noch, und dies besser als früher, da jetzt die meisten Blüten mit ihren Nektarien verschwunden sind, durch Ködern erlangen, viele erscheinen auch am elektrischen Lichte.

Auch von **Raupen** existiert immer noch eine große Zahl; es sind zumeist die im September aufgeführten. Die meisten von ihnen verpuppen sich noch, überwintern also als Puppe. Vielleicht sind als Oktober-Raupen noch besonders zu nennen von **Spinnern** *Phragmatobia fuliginosa*, auf allen Wegen zu finden und als Raupe überwinternd, ferner *Cerura bifida*, *Pygaera curtula*, *anachoreta* und *pigra*; von **Eulen** *Acrionicta tridens*, *psi* und *auricoma*, *Euplexia lucipara*; von **Spannern** vielleicht noch *Timandra amata*, *Lygris reticulata* und wenig andere.

Doch wird man bereits jetzt beim Abklopfen von Büschen und niederen Pflanzen eine große Menge jener kleinen und kleinsten Räumchen erblicken, die sozusagen den Stamm für nächstes Frühjahr bilden sollen. Sie sind allesamt schon jetzt vorhanden, wenn es auch besonders für den Anfänger geradezu eine Torheit wäre, diese winzigen Tierchen mit nach Hause zu nehmen. Sie erfordern zu ihrer Aufzucht eine sorgfältige Pflege, die, wir behaupten nicht zu viel, gründlich gelernt sein will und die die Natur schließlich doch noch besser versteht, als der klügste Raupenzüchter. Wir raten daher dem Anfänger dringend, sich mit solch schwierigen Problemen vorläufig nicht zu befassen, findet er doch alle oder die meisten dieser Tiere im nächsten Frühjahr wieder, und dann sind sie glücklich überwintert und ziemlich erwachsen, so daß er mit größerer Sicherheit den Falter erwarten kann. Diese kleinen Räumchen gehören vor allem den Bären (*Arctiidae*), den Eulen (*Agrotis*, *Mamestra*, *Plusia*, *Leucania* u. a.) und den Spannern (*Geometridae*) an. — Dem erfahrenen Sammler hingegen können wir die Aufzucht solcher Tierchen nur anraten; weiteres darüber lese man im nächsten Monate nach.





Viel und langer Schnee,
Gibt viel Frucht und Klee.

Katharinenwinter
Ein Plackwinter.

Scheint die Sonn' auf Tal und Hang,
Altweibersommer währt nicht lang.

Sankt Elisabeth sagt's an,
Was der Winter für ein Mann.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	D.	Aller Heiligen	Aller Heiligen	6 57	4 30	
2	F.	Aller Seelen	Aller Seelen	6 59	4 28	
3	S.	Gottlieb	Hubertus	7 1	4 26	
4	S.	22. S. n. Trinit.	23. S. n. Pfingst.	7 3	4 24	
5	M.	Erich	Zacharias	7 5	4 22	
6	D.	Leonhard	Leonhard	7 6	4 20	
7	M.	Erdmann	Engelbert	7 8	4 19	
8	D.	Klaudius	4 gekr. Märt.	7 10	4 17	
9	F.	Theodorus	Theodorus	7 12	4 15	
10	S.	Mart. Papst	Andreas Apel	7 14	4 14	
11	S.	23. S. n. Trinit.	24. S. n. Pfingst.	7 16	4 12	
12	M.	Kunibert	Martin, Papst	7 17	4 10	
13	D.	Eugen	Stanislaus K.	7 19	4 9	
14	M.	Levinus	Jukundus	7 21	4 7	
15	D.	Leopold	Leopold	7 23	4 6	
16	F.	Ottomar	Edmund	7 25	4 4	
17	S.	Hugo	Greg. Thaum.	7 26	4 3	
18	S.	24. S. n. Trinit.	25. S. n. Pfingst.	7 28	4 2	
19	M.	Elisabeth	Elisabeth	7 30	4 0	
20	D.	Edmund	Felix v. Valois	7 32	3 59	
21	M.	Allg. Bußtag	Mariä Opferung	7 34	3 58	
22	D.	Ernestine	Cäcilia	7 35	3 57	
23	F.	Klemens	Klemens	7 37	3 55	
24	S.	Leberecht	Chrysogonus	7 39	3 54	
25	S.	25. S. n. Trinit.	26. S. n. Pfingst.	7 40	3 53	
26	M.	Konrad	Konrad	7 42	3 52	
27	D.	Lot	Virgilius	7 44	3 51	
28	M.	Günter	Sosthenes	7 45	3 50	
29	D.	Noah	Saturnin	7 47	3 50	
30	F.	Andreas	Andreas	7 48	3 49	

November.

Wie es jetzt in der Natur im allgemeinen aussieht, so sieht es in der Insektenwelt im besondern aus: Verödet ist die Natur, ausgestorben die liebliche Insektenfauna. Und ist es denn zu verwundern, daß die Natur sich einmal selbst Ruhe schafft, hat sie doch, wie die langen Aufzählungen der früheren Monate beweisen, in den letzten zehn Monaten gerade genug geleistet! Wer diese Zeit richtig anwandte, wer die jeweiligen Erscheinungszeiten der einzelnen Tiere gehörig ausnutzte, der wird auch zufrieden sein und wird selbst gern einer etwas ruhigeren Zeit entgegen zu gehen wünschen; alles strengt an, alles bekommt man einmal überdrüssig, selbst eine Reihe bester, ergiebigster Sammelmonate.

Aber ganz und gar ist in der Natur die Ruhe doch noch nicht eingezogen, abgesehen von den Stürmen und Wettern, die gerade jetzt manchmal dieselbe in allen ihren Tiefen aufwühlen und erregen! Es treten sogar unter den Schmetterlingen immer noch einige Neuerscheinungen auf. Zu diesen gehört der Spinner *Ptilophora plumigera*, der Spanner *Anisopteryx aceraria* (in Laubwäldern) und die schädlichen Frostspanner *Cheimatobia brumata* und *boreata* mit ihren ungeflügelten Weibchen. Letztere sind die gefährlichsten Feinde der Obstgärten, indem die im Frühjahr ausschlüpfenden kleinen Räupchen die Knospen, jungen Blätter und Blüten unserer Obstbäume fressen und dadurch eine Obsternte geradezu unmöglich machen. Die am Stamme in die Höhe kriechenden Weibchen, welche im Herbste ihre Eier ablegen, werden durch an den Stämmen angebrachte Klebgürtel oder Klebringe (*Brumata*-Leim) gefangen. Es schadet nichts, wenn der Entomologe seine Lieblinge auch einmal von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, wenn er sich einmal deren Schädlichkeit oder den eventuellen Nutzen klar macht.

Es finden sich auch im November noch viele, viele **Raupen** der verschiedensten Familien vor; die meisten der ausgewachsenen sind noch zur Puppe zu bringen, als welche sie überwintern. Ihre Namen sind vom Oktober her bekannt. — Ganz besonders groß aber ist die Zahl der kleinen, überwinterten Räupchen, die durch Klopfen in den Schirm oder durch Schöpfen von niederen Pflanzen oft in ungezählter Menge zu erlangen sind. Besonders gern leben sie am Buschholze des Waldes, an Himbeer- und Brombeersträuchern, an Nesseln, Melde, Ampfer, Hopfen, Gras und anderen Pflanzen,

ebenso an niedrigen Holundersträuchern, zwischen deren Blättern sie sich gern versteckt halten.

Haben wir zu Ende unserer Oktoberbetrachtungen das Einsammeln dieser kleinen Tierchen „für den Anfänger“ als gewagt bezeichnet, so möchten wir dasselbe dem fortgeschrittenen Sammler angelegentlich empfehlen; er findet jetzt Arten, die ihm vielleicht im kommenden Frühjahr entgehen. Freilich das Meisterstück der Raupenzucht, eine gute Überwinterung, wird auch ihm noch manche Schwierigkeiten bereiten.

Die Arten der jetzt erscheinenden kleinen Räupchen dürften etwa folgende sein: Von Spinnern viele Bären (*Arctiidae*), z. B. *Diacrisia sanio*, *Arctia caja*, *villica*, *aulica* u. a., von Eulen besonders *Agrotis janthina*, *fimbria*, *augur*, *pronuba*, *triangulum*, *baja*, *c-nigrum*, *ditrapezium*, *rubi*, *brunnea*, *segetum*, *prasina*, *occulta*, *Mamestra leucophaea* und *nebulosa*, *Hadena unanimitis* und *rurea*, *Brotolomia meticulosa*, *Naenia typica*, viele Arten der Gattungen *Leucania* und *Caradrina*, dann *Rusina umbratica*, *Plusia chrysitis* und andere mehr.


Neben dieser Auswahl klopft man häufig noch eine Reihe anderer, jetzt unbekannt erscheinender, kleinerer Raupen, auf deren besondere Erziehung natürlich das Hauptgewicht zu legen ist. Denjenigen fortgeschrittenen Sammlern, die sich zur Jetztzeit außerhalb ihres Wohngebietes befinden, ist zu empfehlen, am fremden Platze sich der Eintragung möglichst vieler dieser kleinen Raupen zu befleißigen, es werden dann häufig Arten darunter sein, die die Heimat nicht hervorbringt.

Von einer November-Exkursion gehe man übrigens nicht nach Hause, ohne einen tüchtigen Vorrat an Futter mitzunehmen. Man füttere die Raupen, die am besten in großen Blumentöpfen (unten Erde, dicht mit Moos bedeckt, oben durch Gaze verschlossen) in kaltem Zimmer aufzubewahren sind, so lange sie Nahrung annehmen, was jetzt meist nur noch in ganz kleinem Maßstabe der Fall ist, und besprenge sie zuweilen mit nicht zu kaltem Wasser. Sobald der Winter eingetreten ist, lasse man die Töpfe unberührt stehen. Tritt zeitweilig warme Witterung ein, so kann man mit einer Kleinigkeit Futter (Kohlgewächsen usw.) etwa eintretenden Nahrungsgelüsten der kleinen Gefangenen Genüge leisten. Im Jahrbuche 1893 ist näheres über Raupenüberwinterung angegeben. Der Erfolg ist meist Glücks- und Erfahrungssache.

Nicht unerwähnt möchten wir schließlich lassen, daß man auch durch Aufspalten hohler Stengel, wie der von Nesseln, Schilf, Klette u. dgl., überwinternde Raupen erlangen kann, die sich solche Verstecke als Schutz gegen die Winterkälte aufgesucht haben.



Notizen für November.



Ist's in der heiligen Nacht hell und klar,
So gibt's ein segensreiches Jahr.

Wenn der Nord zu Vollmond tost,
Folgt ein langer, harter Frost.

Steckt die Krähe zu Weihnachten im Klee,
Sitzt sie um Ostern oft im Schnee.

D.	T.	Protestantisch.	Katholisch.	Sonne.		Notizraum für Temperatur.
				Aufg. U. M.	Untg. U. M.	
1	S.	Arnold	Eligius	7 50	3 48	
2	S.	1. Advent	1. Advent	7 51	3 47	
3	M.	Cassian	Frz. Xaver	7 52	3 47	
4	D.	Barbara	Barbara	7 54	3 46	
5	M.	Abigail	Sabbas	7 55	3 46	
6	D.	Nikolaus	Nikolaus	7 57	3 45	
7	F.	Antonia	Ambrosius	7 58	3 45	
8	S.	Mariä Empfängnis	Mariä Empfängnis	7 59	3 44	
9	S.	2. Advent	2. Advent	8 0	3 44	
10	M.	Judith	Melchiades	8 1	3 44	
11	D.	Waldemar	Damasus	8 3	3 44	
12	M.	Epimachus	Epimachus	8 4	3 44	
13	D.	Lucia	Lucia	8 5	3 44	
14	F.	Israel	Nikasius	8 6	3 44	
15	S.	Johanna	Eusebius	8 7	3 44	
16	S.	3. Advent	3. Advent	8 7	3 44	
17	M.	Lazarus	Lazarus	8 8	3 44	
18	D.	Christoph	Mariä Erw.	8 9	3 44	
19	M.	Quatember	Quatember	8 10	3 44	
20	D.	Abraham	Christiana	8 10	3 45	
21	F.	Thomas Ap.	Thomas Ap.	8 11	3 45	
22	S.	Beate	Flavian	8 11	3 46	
23	S.	4. Advent	4. Advent	8 12	3 46	
24	M.	Adam, Eva	Adam	8 12	3 47	
25	D.	Heil. Christfest	Heil. Christfest	8 13	3 47	
26	M.	2. Christtag	2. Christtag	8 13	3 48	
27	D.	Johann. Evang.	Johann. Evang.	8 13	3 49	
28	F.	Unsch. Kindl.	Unschuldig. Kindl.	8 13	3 50	
29	S.	Jonathan	Thomas B.	8 14	3 51	
30	S.	S. n. Weihn.	S. n. Weihn.	8 14	3 52	
31	M.	Silvester	Silvester	8 14	3 53	

Dezember.

Im Christmonat wird es wohl kaum sich verlohnen, Schmetterlinge zu sammeln, denn „Schnee und Wind“ toben gegenwärtig auch in der Natur und lassen die behagliche Wärme der Stube um so angenehmer erscheinen. Es ist auch für den Sammler besser, sich einmal Ruhe zu gönnen, denn zweifellos haben sich die Schätze seiner bisherigen entomologischen Tätigkeit zahlreich zusammengefunden, gewiß ist noch so manches nicht bestimmt, nicht geordnet, nicht gesichtet. Schmetterlinge zu fangen sind im Dezember kaum mehr, höchstens daß einige verspätete Frostspanner (*Cheimatobia brumata* und *boreata*) selbst bis in den Dezember herein ihr kärgliches Dasein fristen.

Raupen freilich, besonders von den überwinternden Arten, können auch im Dezember gefunden werden, und zwar in der nämlichen Weise und an denselben Orten, wie früher erörtert wurde. Ich für meinen Teil würde mir das Sammeln derselben für die Frühjahrsmonate aufheben, denn einerseits werden die Funde jetzt allzureichhaltig nicht sein, und andernteils ist es wahrlich kein Spaß, mit steifgefrorenen Fingern und kalten Füßen im Walde zu hocken. Das überlassen wir gern solch schnurrigen Käuzen, die an derartigen entomologischen Sonderbarkeiten Gefallen finden; es gehört ein sehr hitziges Entomologenblut dazu.

In Hauptsache ist der Lepidopterologe ans Haus gebannt, er präpariert und etikettiert, er ordnet, räumt auf mit den ungespannten Tieren und ergänzt in der Sammlung, was der vergangene Sommer Neues oder Besseres gebracht hat. Er muß jetzt auch studieren, denn die vergangene Sammelsaison wird ihm gezeigt haben, daß sein „entomologisches Wissen“ noch manche Lücke zeigt und daß er, so klug er sich mit seinen paar lateinischen Namen dünkt, doch noch recht viel zu lernen hat. Vor allem sollte er in bezug auf die Lebensweise der einzelnen ihm bisher noch unbekannt gebliebenen Arten sein Wissen zu bereichern suchen, er sollte durch Lektüre einschlägiger Werke sich selbst vervollkommen und durch Verkehr mit anderen Sammelfreunden sein entomologisches Verständnis erweitern. Niemand ist so vollkommen, daß er nicht noch etwas lernen könnte. Der kommende Sommer aber wird ihm zu theoretischen Studien keine Zeit übrig lassen.

Dann aber sammle er auch Kraft für neue Unternehmungen im kommenden Jahre, denn die Blumen werden wiederkehren, der Wald wird aufs neue grünen und Nahrung bieten für seine unzähligen Bewohner. Die alte Herrlichkeit wird wieder da sein, leuchtend, beglückend — ewig unerforschlich!



Notizen für Dezember.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [1917](#)

Autor(en)/Author(s): Krancher Oskar

Artikel/Article: [Lepidoptera. 5-57](#)