

Katalog der bisher bekannt gewordenen Cymatophoriden.

Von Professor Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

Cymatophoridae Herr.-Schäff. (1845).

Bombyciae Hbn. (1716—27).

Bombyciformes Gué. (1852).

Cymatophorinae S. (1869).

Noctuo-Bombycidae Dup. (1826).

Noctuo-Bombycides Dup. (1844).

Noctuo-Bombycites Latr. (1809).

Noctuo-Bombycini Boisd. (1829).

Thyatiridae Smith 1893.

Lithocharis Warr. (1812).

maxima Leech (1888), Japan.

Saronaga Moore (1881).

albicosta Moore (1867), Indien.

albicostata Brem. (1861), Sibirien bis Japan.

commifera Warr. (1912), Indien, W.-China.

albicosta Leech (1900) p. p.

consimilis Warr. (1912), Japan.

albicosta Leech (1900) p. p.

mirabilis Butl. (1879), Japan.

trifolium Alph. (1895), Ussuri.

Habroyne Hbn. (1816—27).

Gonophora Bruand (1849).

armata Moore (1882), Indien.

Chatfeldti Grote (1895), Alaska, Ver. Staaten.

derasa Edw. (1873).

conscripta Warr. (1812), Tibet.

derasa L. (1767), Europa bis Indien und Korea.

pyritoides Hufn. (1767).

var. derasoides (Dobr.) Tutt (1891), Amurgeb.

var. gloria (Boisd.) Gué. (1852), Kaukasus.

var. intermedia Brem. (1864), O.-Eur. bis Amurgeb.

derasoides Butl. (1877), Indien, Japan.

fraterna Moore (1888).

Bisher bekannt gewordene Cymatophoriden.

101

- Dieckmanni* Graes. (1888), Amurgeb.
indica Moore (1867), Indien, Japan
 var. *pterographa* Pouj. (1887), Tibet, China
plagiosa Moore (1882), Indien
rectangulata Ottol. (1897), Ver. Staaten
 var. *arizonensis* Barn. u. M. Dunn (1912), Arizona
sanguinea Moore (1882), Indien
scripta Gosse (1840), Ver. Staaten
 abrasa Gué. (1852)

Thyatira Hbn. (1816—27)

- achatina* Weymer (1896), Z.-Afrika
albipuncta Wil. (1911), Formosa
apicalis Leech (1900), W.-China
arizana Wil. (1900), Formosa
aurorina Butl. (1881), Japan
batis L. (1758), Eur. bis Japan
 var. *albopunctata* Spul. (1908)
 var. *cognata* Warr. (1888), Indien
 var. *conflua* Rebel (1910)
 confluens Marschn. (1908)
 var. *derosea* Marschn. (1909)
 var. *confluens* Reut. (1890)
 juncta Tutt (1891)
casta Feld. (1874), Bogota
conspicua Leech (1900), W.-China
decorata Moore (1881), Indien
flavida Butl. (1885), Japan
flavimargo Leech (1900), W.-China
Hedemanni Christ. (1885), Transkaukas.
hersilia Druce (1889), Guatemala
heurippe Druce (1889), Panama, Mexiko
hypatia Druce (1889), Panama
magniplaga Walk. (1858), Borneo
mexicana Edw. (1884), Arizona bis Guatemala
 superba Barn. (1901)
Moellendorffi Fixs. (1887), Korea
oblonga Pouj. (1887), China
 flavigrae Leech (1911) usw.
opalescens Alph. (1897), W.-China
ornata Leech (1900), China
Pryeri Butl. (1881), Japan
repugnans Walk. (1856), Indien, Ceylon

102 Bisher bekannt gewordene Cymatophoriden.

sexguttata Scudd. (1869) (Larve), N.-Amerika
staphylea Dogn. (1890), Loja
stramineata Warr. (1912), Assam bis Z.-China
 flavida Leech (1911) p. p.
tenuis Hamps. (1896), Tibet
trimaculata Brem. (1861), O.-Sibirien bis Korea
var. *albomaculata* Leech (1890), China
var. *chincensis* Leech (1890), China
undulans Hamps. (1893), Indien
vicina Gué. (1852), Java
violacea Fixs. (1887), Korea, China.

Euthyatira Smith (1891)

Persiscota Grote (1895)
candida Smith (1890), Florida
lorata Grote (1881), Ver. Staaten
pudens Gué. (1852), Ver. Staaten
var. *anticostiensis* Grote (1886)
var. *pansylvanica* Smith (1902)
semicircularis Grote (1881), Ver. Staaten
var. *griseor* Dum. (1910)
superba Barnes (1901)
tema Streck. (1898), Ver. Staaten.

Pseudothyatira Grote (1865)

Lacinia Grote (1863)
cymatophoroides Gué. (1852), Ver. Staaten
expultrix Grote (1863), Ver. Staaten

Gaurena Walk. (1865)

argentisparsa Hamps. (1896), Tibet
florens Walk. (1865), Sikkim, W.-China
florescens Walk. (1865), Sikkim, W.-China
gemella Leech (1900), W.-China
grisescens Oberth. (1894), W.-China
sinuata Warr. (1912), W.-China, Hsinun.

Cymatophora Tr. (1825)*)

Bombycia Hbn. (1810) (s. descr.)
Ceratopacha Steph. (1829)

*) Hübner hat kein Genus dieses Namens aufgestellt, sondern nur eine Gruppe der Geometriden „Cymatophorae“ benannt. Die Priorität des Namens *Tethea* Ochs. 1816 ist gegen jenen von Donati (Dict. hist. nat. 33, S. 418) zweifelhaft.

Bisher bekannt gewordene Cymatophoriden. 103

Ceropacha Steph. (1829)
 Chymatophora Gué. (1836)
 Kymatophora Tr. (1835)
 Ochropacha Wllgr. (1871)
 Palinipsestis Hbn. (1816—27)
 Tethea Ochs. (1816)
 Uraba Walk. (1863)

Subgenera (Europa): *Cymatophora* Spul. (or *u. ocularis*),

Cymatophorina Spul. (*diluta*)
Tethea Hbn. (*fluctuosa*, *duplaris*)

albidisca Moore (1888), Indien
albuncula Ev. (1851), Irkutsk
alternata Moore (1881), Indien
ampliata Butl. (1878), Ussuri bis Japan
subsp. angustimedia Warr. (1912)
subsp. suffusa Warr. (1812)
aspera Walk. (1865), Australien
basalis Wil. (1911), Japan
brevis Leech (1900), W.-China
brunnea Leech (1900), China
cuprina Moore (1881), Indien
deplanata Walk. (1866), Tasmanien
dubia Warr. (1888), Indien
duplaris L. (1767), arkt. Gebiet bis N.-Italien u. W.-Sibirien
 bicolor Esp. (1791—99)
 bicolorata Hufn. (1767)
 binotata F. (1893)
 bipuncta Borkh. (1792)
 ruficollis Brahm (1791)
 undosa Hbn. (1799—1804)
var. argentea Tutt (1888)
var. obscura Tutt (1888)
var. pulverosa Warr. (1912)
var. unipunctata Spul. (1908)
fasciata Dunn. (1910), Vancouver, Ins.
fluctuosa Hbn. (1799—1804), Skandinavien, M.-Eur.
hodita Swinh. (1895), Muriée
improvisa Edw. (1873), Ver. Staaten
 Tearli Edw. (1886)
intensa Butl. (1881), Amurgeb., Japan
 angustata Hdgr. (1885)
 octogesima Butl. (1878)

104 Bisher bekannt gewordene Cymatophoriden.

- leucocera Hamps. (1894), Indien
lugens Walk. (1863), Tasmanien
meterythra Hamps. (1894), Indien
moderata Walk. (1857), Bogota
ocularis L. (1767), N.- u. M.-Eur. bis Korea
octogena Esper. (1786)
octogesima Hbn. (1786)
or Borkh (1792)
var. caucasica Krul. (1901)
var. Fletcheri Tutt (1893)
var. interrupta Spul. (1908)
var. rosea Tutt (1891)
var. sareptensis Spul. (1908)
subsp. amurensis (Btt.) Warr. (1902), Amurgebiet
or Schifferm. (1776), Eur. bis Armenien
consobrina Borkh. (1792)
flavicornis (L. ?) Auriv. (1888)
gamma graecum Vill. (1789)
gemina Becker (1794)
octogena Esp. (1786)
omega graecum Retz. (1783)
upsilon graecum Goeze (1781)
var. albingensis Warn. (1908)
var. albingoradiata Bunge (1911)
var. discolor Warr. (1912)
var. facsiata Teich (1889)
var. flavistigmata Tutt (1888)
var. fuscostigmata Strand (1903)
var. graëlica Kane (1894)
var. marginata Warn. (1911)
var. obscura Spul. (1908)
var. scotica Tutt (1888)
var. terrosa Graes. (1888), Asien
var. unifasciata Spul. (1908)
var. unimaculata Auriv. (1888)
orbicularis Moore (1888), Indien
ornata Leech (1900), Japan
var. unicolor Leech (1900),
persimilis Hamps. (1894), Indien
renalis Moore (1888), Indien
rubida Hamps. (1894), Indien
Taiwana Wil. (1911), Formosa
Tankrei Graes. (1888), Amurgebiet

Bisher bekannt gewordene Cymatophoriden.

105

temperans Walk. (1856), Rio de Janeiro
trifolium Alph. (1895), Ussuri
undosa Wil. (1911).


Paragnorima Warr. (1912)
brunnea Leech (1900), W.-China
fuscescens (Hamps.) Warr. (1912), Indien.

Parapsestis Warr. (1912)
argenteopicta Oberth. (1879), Amurgebiet bis Japan
var. *plumbea* Butl. (1879).

Polyptoca Hbn. (1816—27)
Asphalia Hbn. (1816—27)
Cymbiphorina Spul. (1908)
Scodra Heinem. (1859)
aenea Wil. (1911), Formosa
albidisca (Moore) Warr. (1888), Indien
arctipennis Butl. (1878), Japan
var. *innotata* Warr. (1912)
bifasciata Hamps. (1895), Sikkim
diluta Schifferm. (1776), S.- u. M.-Europa bis Kleinasien
 abietis Ernst u. Engr. (1785)
 bipuncta Dup. (1826)
 bistrigata Borkh (1790)
 fasciculosa Borkh. (1790)
 octogena var. Esp. (1791)
 undata F. (1787)
var. *latimedia* Warr. (1912)
var. *nubilata* Tutt (1888)
var. *variegata* Spul. (1908)
flavicornis L. (1758), N.- u. M.-Eur., SO.-Rußland
 cinerea Hfn. (1767)
 luteicornis Haw. (1810)
 sulphureomaculata Retz. (1783)
var. *finmarchica* Schöy. (1881)
var. *galbanus* Tutt (1891)
var. *rosea* Tutt (1898)
var. *scotica* Tutt (1888)
subsp. *Haverkampfi* Haverk. (1904)
galema Swinh. (1894), Indien
Korbi Rebel (1901), Anatolien
nigrofascicula Gracs. (1888), Ussurigeb.
 nigrofasciata Warr. (1912)

106 Bisher bekannt gewordene Cymatophoriden.

- onirae Dogn. (1891), Loja
ornata Leech (1888), Japan
var. concolor Leech (1888)
polychromata Hamps. (1896), Sikkim
punctigera Butl. (1885), Japan
ridens F. (1787), M.- u. S.-Eur.
 chrysoceras Becker (1794)
 flavicornis Schifferm. (1776)
 putris Rottemb. (1776)
var concinna Warr. (1912)
var. erythrocephala Esp. (1786)
var. interrupta Tutt (1888)
 subvar. interrupta-alba Tutt (1891)
 subvar. interrupta-ochrea Tutt (1891)
var. nigricans Spul. (1908)
var. variegata Spul. (1908)
var. xanthoceros Borkh. (1792)
ruficollis Schifferm. (1776), S.-Europa
- Nemacerota Hamps. (1892)
- cinerea Warr. (1888) Indien
umbrosa Wil. (1911), Japan
- Cimelia Led. (1853)
- Axia Hbn. (1816—27)
 Timia Boisd. (1829) (s. descr.)
- margarita Hbn. (18..), S.-Europa
olga Stdgr. (1900), Armenien
Voulogeri Stdgr. (18..), Algier.
- Epicimelia Korb (1900)
- Theresiae Korb (1900), Anatolien
- Ausava Walk. (1858)
- triplaga Walk. (1858), Rio de Janeiro.
- Corula Walk. (1856)
- geometroides Walk. (1856) Australien.



ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Kranner\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [1919](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Katalog der bisher bekannt gewordenen Cymatophoriden. 100-106](#)