

Das System der Psychiden.

Von Prof. Dr. K. W. von Dalla Torre, Innsbruck.

Wenn man die Psychiden nach J. W. Tutt (u. Superfamilien), G. F. Hampson und J. Rebel (Familie) als eine einheitliche Gruppe auffaßt, so ergibt sich unter Zugrundelegung der Arbeit des erstern (1900) folgendes System für die Gattungen:

I. *Micropsychina* Tutt.

- | | |
|---|--|
| Subfam. <i>Narycinae</i> m. (<i>Narycidae</i> Tutt). | <i>Eccompsoctera</i> Walsingham 1897. |
| <i>Narycia</i> Stephens 1833 (<i>Conoeca</i> Scott 1865, <i>Oecobia</i> Scott 1865, <i>Xysmatodoma</i> Zeller 1852). | <i>Gymnelema</i> Heylaerts 1891. |
| Subfam. <i>Diplodominae</i> m. (<i>Diplodomidae</i> Tutt). | <i>Lasiotena</i> Meyrick 1887. |
| <i>Diplodoma</i> Zeller 1852. | <i>Mallobathra</i> Meyrick 1888. |
| Subfam. <i>Lypusinae</i> Rebel (<i>Lypusidae</i> Tutt). | <i>Mesopolia</i> Walsingham 1897. |
| <i>Sect. Lypusini</i> m. (<i>Lypusidi</i> Tutt). | <i>Microcossus</i> Walsingham 1887. |
| <i>Lypusa</i> Zeller 1852. | <i>Scoriodytes</i> Meyrick 1888. |
| <i>Sect. Penestoglossini</i> m. (<i>Penestoglossidae</i> Tutt). | Subfam. <i>Anaphorinae</i> Walsingham 1887. |
| <i>Penestoglossa</i> Felder & Rogenhöfer 1875. | <i>Neolophus</i> Walsingham 1887. |
| (<i>Psilothrix</i> Wocke 1871, non Redtenbacher 1858). | <i>Eulepista</i> Walsingham 1883. |
| <i>Sect. Melasinini</i> m. (<i>Melasinidi</i> Tutt). | <i>Hyperlopus</i> Walsingham 1887. |
| <i>Melasina</i> Boisduval 1840. | <i>Thysanoscelis</i> Walsingham 1887. |
| (<i>Coracia</i> Hübner 1816—21). | <i>Homonymus</i> Walsingham 1887, |
| <i>Melasiniana</i> Strand 1914. | (<i>Ankistrophorus</i> Walsingham 1887, non <i>Ancistrophora</i> Schiner 1865). |
| <i>Alavona</i> Walker 1863. | <i>Acrolophus</i> Peey 1832. |
| * | <i>Felderia</i> Walsingham 1887. |
| <i>Dialectica</i> Walsingham 1887 (<i>Diadactica</i> Tutt 1900). | <i>Ortholophus</i> Walsingham 1887. |
| <i>Compsoctena</i> Zeller 1852. (<i>Gallaria</i> Walker 1863, <i>Thapava</i> Walker 1864, <i>Tissa</i> Walker 1863.) | <i>Pseudanaphora</i> Walsingham 1887. |
| | <i>Concgenes</i> Walsingham 1887. |
| | <i>Anaphora</i> Clemens 1850. |
| | <i>Hypocleptus</i> Walsingham 1887. |
| | <i>Eddara</i> Walker 1863. |
| | <i>Tirasia</i> Walker 1863. |
| | <i>Atopocera</i> Walsingham 1897. |
| | <i>Staeterhinus</i> Butler 1881. |
| | <i>Urbara</i> Walker 1864. |
| | <i>Titoncmis</i> Meyrick 1888. |

II. Mesopsychina m.

Subfam. Solenobiinae m. (Solenobiidae Tutt 1900, Talaeporinae Rebel pp.)

Solenobia Duponchel 1844—46.

Subfam. Talaeporiinae Rebel 1906. (Talaeporidae Tutt 1900).

Banksia Tutt 1899.

Taleporia Hübner 1816—1827 (Capillaria Haworth 1828,

Cochlophasia Cartis 1834,

Talaeporia Zeller 1839, Talaeporidea Guénée 1846, Talaeporina Seebold 1879, Talaeporia Frey 1880).

Scioptris Meyrick 1891.

(Sciopteris Tutt 1900).

Subfam. Dissocteninae Rebel 1906 (Dissoctenidae Tutt).

Dissoctena Standinger 1859.

III. Macropsychina. Tutt.

Subfam. Moffatiinae Strand 1912.

Moffatia Moore 1890.

Subfam. Luffiinae m. (Luffiidae Tutt).

Luffia Tutt 1899.

Bacotia Tutt 1899.

Subfam. Fumariinae m. (Fumeidae Tutt).

Sect. Proutiini m. (Proutiidi Tutt).

Proutia Tutt (1899), (Fumea Haworth 1811 pp.)

Sect. Fumariini m. (Fumeidi Tutt).

Bruandia Tutt 1900, (Fumea Haworth 1811 pp.)

Masonia Tutt 1900, (Fumea Haworth 1911).

Fumaria Haworth 1811, (Fumea Haworth 1812.)

Subfam. Epichnopteryginae Rebel (Epichnopterygidae Tutt).

Sect. Psychideini m. (Bijugidi Tutt).

Psychidia Rambur 1866 (Bijugis Heylaerts 1881).

Sect. Rebeliini m. (Psychideidi Tutt).

Rebelia Heylaerts 1900, (Psychidea Tutt 1900 non Rambur 1866).

Sect. Epichnopteryginini m. (Epichnopterygidi Tutt).

Whittleia Tutt 1900 (Epich-

nopteryx Hübner 1816—1827 pp.).

Epichnopteryx Hübner 1816—1827. pp.

Subfam. Stichobasinae m. (Psycheoidae Tutt).

Stichobasis Kirby 1892, (Diabasis Heylaerts 1879, non Hoffmann 1819).

Heckmeyeria Heylaerts 1880.

Subfam. Chaliinae Hampson 1892.

Plateumeta Butler 1881.

Pteroxys Hampson 1892.

Mahasena Moore 1877.

Chalia Moore 1877 (Oiketicoides Heylaerts 1881 pp., Oiceticoides Kirby 1892.)

?Aprata Moore 1883.

Subfam. Psychinae Rebel 1906.

Sect. Apteroini m. (Apteroinidi Tutt).

Apterona Millière 1857, (Cochliothea Rambur 1866, Cochlophanes Staudinger 1871, Cochlophora Siebold 1871, Cochlophanes Mac Lachlan 1884).

Sect. Psychini m. (Psychinae Tutt).

Stenophanes Heylaerts 1881, (Arctus Rambur 1866 non Haan 1849 et al. Phalacropteryx Hübner 1816—1827 pp.).

- Psyche Schrank 1801, Megalophanes Heylaerts 1881.
 Heylaertsia Hampson 1892.
 Sterrhopteryx Hübner 1816—27.
 (Empedopsyche Standfuß 1879, Gymna Heylaerts 1881, Nodaria Haworth 1828, Trichopsyche Wallengren 1869).
 Auchmophila Rebel 1907.
 Deborrea Heylaerts 1884
 Barundra Moore 1818.
 Eurukuttarus Hampson 1892.
 Chalioides Swinhoe 1882.
 Manalha Moore 1877.
 Sect. Phalacropterygini m. (Phalacropterigidi Tutt).
 Standfussia Tutt 1900, (Scioptera Rambur 1866 pp.).
 Lepidoscioptera Dalla Torre 1920 (Seioptera Rambur 1866 non Westwood 1840).
 Leptopteryx Hübner 1816-27 (Scioptera Rambur 1866 pp.).
 Ptilocephala Rambur 1866 (Oreopsyche Speyer 1865, Pyropsyche Chapman 1903).
 Phalacropteryx Hübner 1816 bis 1827, Oreopsyche Speyer 1865 pp.).
 Deuterohyalina Dalla Torre 1920 (Hyalina Rambur 1866 non Auck).
 Oreopsyche Speyer 1865 (Carche-riopsyche Wallengren 1869).
 Sect. Acanthopsychini m. (Acanthopsychidi Tutt).
 Chalipecten Strand 1912 (Oiceticina Tutt 1900 pp.).
 Acanthopsyche Heylaerts 1881 (Oiketicoides Heylaerts 1881, Oiceticina Tutt 1900).
 Subg. Hemilipia Hampson 1897.
 Subg. Semimanatha Jones 1919.
 Pachythelia Westwood 1848 (Pachytelia Heylaerts 1881).
 Canephora Hübner 1803 (Lepidopsyche Newman 1850).
 Lithula Fereday 1878.
- Metisa Walker 1855 (Babula Moore 1890).
 Pteroma Hampson 1892.
 Brachycyttarus Hampson 1892.
 Dasaratha Moore 1888.
 Acousmaticus Butler 1882 (Acousmaticus Tutt 1900).
 Biopsyche Dyaz 1905.
 Hyalarcta Meyrick 1907.
 Thanatopsyche Butler 1882.
 Thyridopteryx Stephens 1834. (Hymenopsyche Grote 1865).
 Animula Herrich Schäffer 1856 (Psychoglone Felder 1874).
 Subfam. Oiketicinae m. Oiketicina Heylaerts, Tutt).
 Amatissa Walker 1862, (Bambalina Moore 1883, Cryptothelea Walker 1855, Kophene Moore 1879).
 Monda Walker 1865 (Monda Dallas 1826).
 Claniades Bethune-Baker 1908.
 Clania Walker 1865.
 Paracharactes Meyrick & Lower 1907.
 Eumeta Walker 1855 (Lansdownia Heylaerts 1881).
 Metura Walker 1855 (Metura Tutt 1900).
 Engyophlebus Karsch 1900.
 Plutorectis Meyrick & Lower 1907.
 Plutorectella Strand 1924.
 Platoeceticus Packard 1889.
 Oiketicus Lansdown-Guilding 1827 (Cephalia Walker 1866, Dappula Moore 1883).
- *
- Genera, deren Zuteilung unsicher ist:
 Akesina Moore 1888 (Anesina W. I. Kirby 1892).
 Dipyle Guérin 1867.
 Eliostola Meyrick & Lower 1867.
 Genduarua Walker 1856.
 Orophora Fereday 1878.
 Psychonoctua Grote 1865.
 Rasicotia Moore 1890.
 Zamopsyche Dyaz 1923.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [1927](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Das System der Psychiden. 129-131](#)