

Bestandserhebungen an Insekten während der Exkursionstagung der EVSA e.V. im Gebiet der Zichtauer Berge (Altmark)

Anmerkung der Redaktion: Die Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt e.V. führte vom 31.05.02 bis zum 02.06.02 eine Exkursionstagung im Raum Zichtau (Altmark) durch. Nachfolgend werden die Ergebnisse der während dieser Zeit durchgeführten Bestandserhebungen aufgeführt. Die Publikation weiterer Ergebnisse der Aufsammlungen zu anderen Gruppen ist noch vorgesehen.

Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae)

Peer SCHNITTER (Halle a.d. Saale)

Zwischen dem 31.05. und 02.06.2002 wurden im weiteren Gebiet der Zichtauer Berge sowie in einigen Bereichen bei Haldensleben an 85 Fundorten Carabiden nachgewiesen. Insgesamt konnten aus dem Material 94 zumeist häufigere Arten bestimmt werden. Einen wichtigen Hinweis zu *Calosoma sycophanta* verdanken wir Herrn DIENEMANN, dem ehemals für den Zichtauer Forst zuständigen Forstmeister. In der Kürze der Zeit war nicht zu erwarten, daß Seltenheiten gefunden werden würden. Allerdings sollten in einem faunistisch bislang eher unbeachteten Gebiet Sachsen-Anhalts wichtige Grundlagendaten zusammengetragen werden, die mit den Nachweisen von *Agonum vestitum*, *Bradycellus caucasicus* und *Olisthopus rotundatus* auch 3 Arten der Roten Listen Sachsen-Anhalts einschlossen. In der nachstehenden Tabelle sind neben der Anzahl der Fundorte auch die entsprechenden Meßtischblattquadranten (1:25.000) angeführt.

lfd. Nr.	Art	Anzahl Fundorte	in den MTB-Quadranten:
1	<i>Abax parallelepipedus</i> (PILL. & MITTERPACHER, 1783)	9	3333/3,4; 3432/1; 3433/1,3,4; 3634/2
2	<i>Acupalpus dubius</i> SCHILSKY, 1888	4	3333/3; 3432/1; 3634/1
3	<i>Acupalpus parvulus</i> (STURM, 1825)	3	3432/1; 3634/1
4	<i>Agonum afrom</i> (DUFTSCHMID, 1812)	12	3333/3; 3432/1,4; 3433/2; 3634/1,3
5	<i>Agonum duftschmidt</i> SCHMIDT, 1994	1	3634/1
6	<i>Agonum fuliginosum</i> (PANZER, 1809)	9	3333/3,4; 3432/1,4; 3433/2; 3634/1,3
7	<i>Agonum micans</i> NICOLAI, 1822	8	3333/4; 3432/1,4; 3433/2; 3634/1
8	<i>Agonum versutum</i> STURM, 1824	1	3634/3
9	<i>Agonum viduum</i> (PANZER, 1797)	3	3333/3; 3433/2
10	<i>Amara aenea</i> (DE GEER, 1774)	37	3333/3,4; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1,2
11	<i>Amara apricaria</i> (PAYKULL, 1790)	10	3333/3; 3432/1,2; 3433/1,2,4; 3634/1
12	<i>Amara aulica</i> (PANZER, 1797)	1	3432/2
13	<i>Amara bifrons</i> (GYLLENHAL, 1810)	5	3333/4; 3432/1; 3433/1; 3434/1
14	<i>Amara brunnea</i> (GYLLENHAL, 1810) ¹⁾	1	3433/2
15	<i>Amara consularis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	2	3433/1; 3634/1
16	<i>Amara convexior</i> STEPHENS, 1828	1	3433/4
17	<i>Amara familiaris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	5	3432/2; 3433/2,4; 3634/2
18	<i>Amara similata</i> (GYLLENHAL, 1810)	6	3333/3; 3432/1; 3433/1,2,4; 3634/1
19	<i>Amara tibialis</i> (PAYKULL, 1798)	1	3433/1
20	<i>Anchomenus dorsalis</i> (PONTOPIDDAN, 1763)	13	3333/3,4; 3432/2; 3433/1,2; 3434/1, 3634/1,3
21	<i>Anisodactylus binotatus</i> (FABRICIUS, 1787)	8	3432/1,4; 3433/2; 3634/1
22	<i>Anthraxus consputus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	3	3333/3; 3634/1
23	<i>Badister collaris</i> MOTSCHULSKY, 1844	4	3432/1; 3634/1
24	<i>Badister dilatatus</i> CHAUDOIR, 1837	5	3432/1,4; 3634/1
25	<i>Bembidion articulatum</i> (PANZER, 1796)	3	3432/1; 3433/4
26	<i>Bembidion assimile</i> GYLLENHAL, 1810	3	3432/1; 3634/1
27	<i>Bembidion biguttatum</i> (FABRICIUS, 1779)	14	3333/3; 3432/1,4; 3433/1,2,4; 3634/1,3
28	<i>Bembidion dentellum</i> (THUNBERG, 1787)	7	3333/4; 3432/4; 3433/4; 3634/1,3
29	<i>Bembidion doris</i> (PANZER, 1797)	3	3333/3, 4; 3432/1

30	<i>Bembidion femoratum</i> STURM, 1825	1	3432/2
31	<i>Bembidion gilvipes</i> STURM, 1825	2	3634/3
32	<i>Bembidion lampros</i> (HERBST, 1784)	31	3333/3,4; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3434/1; 3634/1
33	<i>Bembidion octomaculatum</i> (GOEZE, 1777)	1	3634/1
34	<i>Bembidion properans</i> (STEPHENS, 1828)	3	3333/3; 3432/4; 3634/3
35	<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (LINNAEUS, 1761)	4	3432/2; 3433/1
36	<i>Bembidion tetracolum</i> SAY, 1823	2	3432/1,4
37	<i>Bembidion varium</i> (OLIVIER, 1795)	8	3432/1,4; 3433/4; 3634/1,3
38	<i>Bradycellus caucasicus</i> (CHAUDOIR, 1846)	1	3433/1
39	<i>Bradycellus harpalinus</i> (AUDINET-SERVILLE, 1821)	2	3433/1
40	<i>Broscus cephalotes</i> (LINNAEUS, 1758)	1	3433/3
41	<i>Calathus ambiguus</i> (PAYKULL, 1790)	2	3333/3; 3432/1
42	<i>Calathus cinctus</i> MOTSCHULSKY, 1850	1	3433/2
43	<i>Calathus erratus</i> (C.R. SAHLBERG, 1827)	23	3333/3; 3432/1; 3433/1-4; 3634/2,3
44	<i>Calathus fuscipes</i> (GOEZE, 1777)	36	3333/3,4; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1,2,3
45	<i>Calathus melanocephalus</i> (LINNAEUS, 1758)	35	3333/3; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1,2,3
46	<i>Calathus micropterus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	2	3433/1
47	<i>Calosoma sycophanta</i> (LINNAEUS, 1758) ²⁾	1	3433/2
48	<i>Carabus auratus</i> LINNAEUS, 1761	1	3434/1
49	<i>Carabus coriaceus</i> LINNAEUS, 1758	1	3432/1
50	<i>Carabus glabratus</i> PAYKULL, 1790	1	3634/1
51	<i>Carabus granulatus</i> LINNAEUS, 1758	9	3333/4; 3432/4; 3433/2; 3634/1,3
52	<i>Carabus nemoralis</i> O.F. MÜLLER, 1764	6	3333/3; 3432/1,4; 3433/1; 3634/1
53	<i>Cicindela campestris</i> LINNAEUS, 1758	3	3333/3; 3433/1,4
54	<i>Cicindela hybrida</i> LINNAEUS, 1758	10	3333/3; 3433/1; 3433/2,3; 3534/1,3
55	<i>Clivina fossor</i> (LINNAEUS, 1758)	1	3634/1
56	<i>Demetrias atricapillus</i> (LINNAEUS, 1758)	8	3333/3; 3432/1,4; 3433/4; 3634/1
57	<i>Dyschirius globosus</i> (HERBST, 1784)	8	3333/3; 3432/1,4; 3634/1
58	<i>Elaphrus cupreus</i> DUFTSCHMID, 1812	8	3333/3,4; 3432/1,4; 3634/1
59	<i>Harpalus affinis</i> (SCHRANK, 1781)	38	3333/3; 4; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1,2,3
60	<i>Harpalus anxius</i> (DUFTSCHMID, 1812)	8	3432/1; 3433/1,2; 3634/2,3
61	<i>Harpalus autumnalis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	2	3433/1,2
62	<i>Harpalus pumilus</i> STURM, 1818	2	3433/1
63	<i>Harpalus rubripes</i> (DUFTSCHMID, 1812)	13	3333/4; 3432/1,2,4; 3433/1-4
64	<i>Harpalus rufipalpis</i> STURM, 1818	5	3433/1,2,4
65	<i>Harpalus serripes</i> (QUENSEL IN SCHÖNHERR, 1806)	2	3432/2; 3634/1
66	<i>Harpalus smaragdinus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	4	3433/1-4
67	<i>Harpalus tardus</i> (PANZER, 1797)	22	3333/4; 3432/1,2; 3433/1,3,4; 3634/1
68	<i>Leistus ferrugineus</i> (LINNAEUS, 1758)	3	3433/1
69	<i>Leistus terminatus</i> (HELLWIG in PANZER, 1793)	2	3432/4
70	<i>Loricera pilicornis</i> (FABRICIUS, 1775)	15	3333/4; 3432/1,2,4; 3433/2,4; 3634/1,3
71	<i>Microlestes minutulus</i> (GOEZE, 1777)	5	3433/1,2,3
72	<i>Nebria brevicollis</i> (FABRICIUS, 1792)	25	3333/3; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1,2,3
73	<i>Notiophilus biguttatus</i> (FABRICIUS, 1779)	7	3433/1,2,4; 3634/2
74	<i>Notiophilus palustris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	2	3433/1; 3634/2
75	<i>Olisthopus rotundatus</i> (PAYKULL, 1798) ³⁾	1	3433/2
76	<i>Oodes helopioides</i> (FABRICIUS, 1792)	16	3333/3,4; 3432/1,4; 3433/2; 3634/1,3
77	<i>Patrobus amorufus</i> (STROEM, 1768)	1	3333/4
78	<i>Platynus assimilis</i> (PAYKULL, 1790)	4	3333/3; 3634/1,3
79	<i>Poecilus cupreus</i> (LINNAEUS, 1758)	32	3333/3,4; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1,2,3
80	<i>Poecilus lepidus</i> (LFSKE, 1785)	13	3333/3; 3432/1; 3433/1-4; 3634/1
81	<i>Poecilus versicolor</i> (STURM, 1824)	10	3333/3; 3432/4; 3433/1,2; 3634/3
82	<i>Pseudophonus rufipes</i> (DE GEER, 1774)	29	3333/3,4; 3432/1,2,4; 3433/1-4; 3634/1
83	<i>Pterostichus anthracinus</i> (ILLIGER, 1798)	14	3333/3; 3432/1,2,4; 3433/4; 3634/3
84	<i>Pterostichus diligens</i> (STURM, 1824)	7	3333/3; 3432/1,4; 3433/2; 3634/1
85	<i>Pterostichus melanarius</i> (ILLIGER, 1798)	23	3333/3; 3432/1,2,4; 3433/1,2,4; 3434/1; 3634/1,3
86	<i>Pterostichus minor</i> (GYLLENHAL, 1827)	8	3333/3; 3432/1,4; 3433/2; 3634/1

87	<i>Pterostichus niger</i> (SCHALLER, 1783)	10	3333/3; 3432/1,4; 3433/2,3,4; 3634/1
88	<i>Pterostichus nigrita</i> (PAYKULL, 1790)	4	3432/1; 3634/1
89	<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (FABRICIUS, 1787)	17	3333/3,4; 3432/1; 3433/1-4; 3534/1,2
90	<i>Pterostichus strenuus</i> (PANZER, 1797)	5	3432/1,2; 3634/1
91	<i>Stenolophus mixtus</i> (HERBST, 1784)	10	3333/3; 3432/1,2,4; 3433/2,4; 3634/1
92	<i>Stenolophus skrimshirani</i> STEPHENS, 1828 ⁴⁾	2	3432/1
93	<i>Syntomus foveatus</i> (GEOFFROY in FOURC., 1785)	9	3333/3; 3433/1,2,3; 3634/2,3
94	<i>Syntomus truncatellus</i> (LINNAEUS, 1761)	20	3333/3,4; 3432/1,4; 3433/1-4; 3634/1
95	<i>Trechus quadristriatus</i> (SCHRANK, 1781)	29	3333/3,4; 3432/1,2,4; 3433/1,2,4; 3634/1

- 1) für die Art typischer Fundort: lichter randlicher Birken-Kiefern-Vorwald: Nähe Breitenfeld (W) im Zichtauer Forst,
- 2) alte Beobachtungen; nach Angaben von DIENEMANN vor 1960 mehrfach zwischen Eigenthum (W) und Schwiesau in den nach W abfallenden Kiefernforsten der Zichtauer Berge,
- 3) unter Holzresten auf einer großen offenen Sandfläche, randlich mit *Calluna*-Heide bestanden; über der freigehaltenen Gastrasse: Nähe Schwiesau (SW) im Zichtauer Forst,
- 4) an zwei kleinen Waldtümpeln in der Verlandungszone, hier nicht selten: Neuferchau (NW) und Rappin (W).

Weitere Käfer (Coleoptera)

Andreas Schöne (Dessau)

Die letzte Sammeltagung der EVSA e. V. im Zeitraum vom 31.05. bis 02.06.2002 führte in die Altmark, in die Umgebung von Zichtau. Während der Exkursionen konnten nachfolgend aufgeführten Käferarten nachgewiesen werden. Für die Bestimmung und Überprüfung einiger Arten danke ich vielmals den Herren K. LIEBENOW (Brandenburg/Havel) und Dr. P. SCHOLZE (Quedlinburg).

Wiepke/Elfquellen, MTB 3433-2, 31.05.2002, Bodenstreu gesiebt, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-015-005-	<i>Omalius rivulare</i> (PAYKULL, 1789)		
23-015-018-	<i>Omalius caesus</i> GRAVENHORST, 1806		
23-082-005-	<i>Othius subuliformis</i> STEPHENS, 1833		
23-088-029-	<i>Philonthus decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)		
23-107-001-	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAVENHORST, 1806)		
23-114-007-	<i>Tachyporus hypnorum</i> (LINNÉ, 1758)		
23-117-013-	<i>Tachinus signatus</i> (GRAVENHORST, 1802)		
23-206-003-	<i>Parocysa longitarsis</i> (ERICHSON, 1837)		2
24-020-001-	<i>Rybaxis longicornis</i> (LEACH, 1817)		

Wiepke/Elfquellen, MTB 3433-2, 31.05.2002, Handaufsammlung, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
85-035-001-	<i>Anomala dubia</i> (SCOPOLI, 1763)		
93-012-001-	<i>Apoderus coryli</i> (LINNÉ, 1758)		
93-115-002-	<i>Hylobius abietis</i> (LINNÉ, 1758)		

Wiepke/Elfquellen, MTB 3433-2, 31.05.2002, unter Kiefernrinde, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-078-.001-	<i>Nudobius lentus</i> (GRAVENHORST, 1806)		
53-012-.001-	<i>Uleiota planata</i> (LINNÉ, 1761)		
91-004-.001-	<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)		
91-034-.002-	<i>Orthotomicus laricis</i> (FABRICIUS, 1792)		

Wiepke/Elfquellen, MTB 3433-2, 31.05.2002, auf Blüten (Umbelliferen), leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-114-.005-	<i>Tachyporus solutus</i> ERICHSON, 1839		
23-117-.012-	<i>Tachinus fimetarius</i> GRAVENHORST, 1802		
87-039-.001-	<i>Molorchus minor</i> (LINNÉ, 1758)		

Schwiesau/Speicher südl. Jemmeritzer Moor, MTB 3333-4, 01.06.2002, Bodenstreu gesiebt, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-015-.018-	<i>Omalium caesum</i> GRAVENHORST, 1806		
23-025-.002-	<i>Anthobium atrocephalum</i> (GYLLENHAL, 1827)		
23-032-.003-	<i>Lesteva longoelytrata</i> (GOEZE, 1777)		
23-055-.024-	<i>Stenus providus</i> ERICHSON, 1839		2
23-055-.086-	<i>Stenus nitidiusculus</i> STEPHENS, 1833		
23-062-.003-	<i>Medon brunneus</i> (ERICHSON, 1839)		1
23-068-.017-	<i>Lathrobium volgensense</i> HOCHHUTH, 1851		
23-068-.023-	<i>Lathrobium brunnipes</i> (FABRICIUS, 1792)		
23-082-.005-	<i>Othius subuliformis</i> STEPHENS, 1833		
23-088-.029-	<i>Philonthus decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)		
23-104-.025-	<i>Quedius fuliginosus</i> (GRAVENHORST, 1802)		
23-180-.003-	<i>Geostiba circellaris</i> (GRAVENHORST, 1806)		
23-203-.002-	<i>Ilyobates bennetti</i> DONISHORPE, 1914		

Schwiesau/Speicher/ südl. Jemmeritzer Moor, MTB 3333-4, 01.06.2002, Exkremente Rind, leg. TH. LEHMANN

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-088-.046-	<i>Philonthus splendens</i> (FABRICIUS, 1792)		

Schwiesau/Speicher/südl. Jemmeritzer Moor, MTB 3333-4, 01.06.2002, aus Krautschicht gekeschert, leg. TH. LEHMANN

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-117-.012-	<i>Tachinus fimetarius</i> GRAVENHORST, 1802		

Wiepke/Sand-Wachtberg/Mergelgrube, MTB 3433-2, 01.06.2002, Bodenstreu gesiebt, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
01-006-.009-	<i>Leistus ferrugineus</i> (LINNÉ, 1758)		
23-055-.094-	<i>Stenus impressus</i> GERMAR, 1824		
23-061-.003-	<i>Rugilus rufipes</i> (GERMAR, 1836)		
23-062-.003-	<i>Medon brunneus</i> (ERICHSON, 1839)		1
23-082-.001-	<i>Othius punctulatus</i> (GOEZE, 1777)		

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-090-.001-.	<i>Gabrius osseticus</i> (KOL., 1846)		
23-107-.001-.	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAVENHORST, 1806)		
23-113-.003-.	<i>Sepedophilus immaculatus</i> (STEPHENS, 1832)		
23-187-.002-.	<i>Liogluta granigera</i> (KIESENWEITER, 1850)		

Wiepke/Sand-Wachtberg/Mergelgrube, MTB 3433-2, 01.06.2002, am Rand des Wasserloches getreten, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
01-010-.001-.	<i>Omophron limbatum</i> (FABRICIUS, 1776)		
23-066-.004-.	<i>Scopaeus sulcicollis</i> (STEPHENS, 1833)		1
23-114-.007-.	<i>Tachyporus hypnorum</i> (LINNÉ, 1758)		
23-123-.002-.	<i>Myllaena intermedia</i> ERICHSON, 1837		

Wiepke/Sand-Wachtberg/Mergelgrube, MTB 3433-2, 01.06.2002, auf Pappelgebüsch, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
88-034-.006-.	<i>Melasoma populi</i> (LINNÉ, 1758)		

Letzlingen/Colbitz-Letzlinger Heide, MTB 3534-2, 02.06.2002, Bodenstreu unter Calluna-Heide, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
23-026-.001-.	<i>Olophrum piceum</i> (GYLLENHAL, 1810)		
23-055-.022-.	<i>Stenus clavicornis</i> (SCOPOLI, 1763)		
23-055-.094-.	<i>Stenus impressus</i> GERMAR, 1824		
23-062-.003-.	<i>Medon brunneus</i> (ERICHSON, 1839)		1
23-080-.005-.	<i>Xantholinus tricolor</i> (FABRICIUS, 1787)		
23-082-.005-.	<i>Othius subuliformis</i> STEPHENS, 1833		
23-109-.017-.	<i>Mycetoporus clavicornis</i> (STEPHENS, 1832)		
23-113-.0022.	<i>Sepedophilus marshami</i> (STEPHENS, 1832)		

Letzlingen/Colbitz-Letzlinger Heide, MTB 3534-2, 02.06.2002, von Pflanzen am Wegesrand gekeschert, leg. A. SCHÖNE

LUCHT	ART	RL BRD	RL LSA
88-007-.004-.	<i>Crioceris asparagi</i> (LINNÉ, 1758)		
88-034-.006-.	<i>Melasoma populi</i> (LINNÉ, 1758)		

Schmetterlinge (Lepidoptera)

Von Jörg Kellner (Dessau)

Auswertung für alle Arten, Zeitraum vom 31.05. – 02.06.02

FFH- Arten fett gedruckt, besondere Arten sind kursiv

3333.4 Schwiesau bei Klötze NSG „Jemmeritzer Moor“

Tagfang. KELLNER, LEHMANN, SCHÖNBORN, SCHÖNE; vom: 01.06.2002

Koch-nr.	Art	Status	Anzahl
1031	Pararge megera L.		1
1052	Vanessa urticae L.	Larve	33
1122	Cyaniris argiolus L.		1

2058	<i>Spilosoma menthastri</i> Esp.	1
2077	<i>Orgyia antiqua</i> L. Larve	1
2131	<i>Proserpinus proserpina</i> Pali.	1
3008	<i>Acronycta rumicis</i> L. Larve	1
4018	<i>Jodis putata</i> L.	20
4036	<i>Scopula floslactata</i> Haw.	1
4145	<i>Cidaria pectinataria</i> Knoch	1
4182	<i>Cidaria alternata</i> Müll	1
4205	<i>Euchoeca nebulata</i> Scop.	3
4274	<i>Anticollix sparsata</i> Tr.	1
4291	<i>Cabera pusaria</i> L.	2
4297	<i>Campaea margaritata</i> L.	1
4319	<i>Cepphis advenaria</i> Hbn.	15
4324	<i>Semiothisa alternaria</i> Hbn.	1
4384	<i>Bupalus piniarius</i> L.	2

3333.4 Schwiesau bei Klötze NSG „Jemmeritzer Moor“

Lichtfang 160W ML + 250W HQL; KELLNER, SCHÖNBORN, SCHÖNE; vom: 01.06.2002

Koch-nr.	Art	Status	Anzahl
2058	<i>Spilosoma menthastri</i> Esp.		2
2075	<i>Dasychira pudibunda</i> L.		1
2112	<i>Drepana falcataria</i> L.		1
2125	<i>Mimas tiliae</i> L.		1
2162	<i>Lophopteryx camelina</i> L.		1
3063	<i>Rhyacia festiva</i> Schiff.		1
3120	<i>Polia nana</i> Hufn.		1
4018	<i>Jodis putata</i> L.		4
4036	<i>Scopula floslactata</i> Haw.		1
4121	<i>Cidaria ocellata</i> L.		1
4125	<i>Cidaria obeliscata</i> Hbn.		6
4131	<i>Cidaria truncata</i> Hufn.		1
4135	<i>Cidaria montanata</i> Schiff.		1
4137	<i>Cidaria spadicearia</i> Schiff.		1
4145	<i>Cidaria pectinataria</i> Knoch		2
4165	<i>Cidaria unangulata</i> Haw.		1
4220	<i>Eupithecia exigua</i> Hbn.		1
4242	<i>Eupithecia vulgata</i> Haw.		1
4266	<i>Eupithecia tantillaria</i> Bsd.		1
4283	<i>Lomaspilis marginata</i> L.		1
4291	<i>Cabera pusaria</i> L.		2
4296	<i>Ellopija fasciaria</i> L.		2
4297	<i>Campaea margaritata</i> L.		3
4309	<i>Gonodontis bidentata</i> Cl.		1
4316	<i>Opisthograptis luteolata</i> L.		1
4319	<i>Cepphis advenaria</i> Hbn.		1
4323	<i>Semiothisa notata</i> L.		4
4326	<i>Semiothisa liturata</i> Cl.		4
4365	<i>Boarmia punctinalis</i> Scop.		3
4367	<i>Boarmia bistortata</i> Goeze		1
4384	<i>Bupalus piniarius</i> L.		4

3333.4 Wiepke bei Gardelegen Elfquelle am Wiepkebach

Lichtfang - 4 Anlagen ; JUNG, KELLNER, SCHMIDT, SCHÖNBORN, SCHÖNE vom:
31.05.2002

Koch-nr.	Art	Status	Anzahl
2046	<i>Lithosia sororcula</i> Hfn.		1
2058	<i>Spilosoma menthastri</i> Esp.		1
2075	<i>Dasychira pudibunda</i> L.		9
2087	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.		1
2087	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.	Larve	1
2112	<i>Drepana falcatoria</i> L.		5
2115	<i>Drepana lacertinaria</i> L.		1
2146	<i>Gluphisia crenata</i> Esp.		3
2162	<i>Lophopteryx camelina</i> L.		1
2164	<i>Pterostoma palpinum</i> L.		2
2175	<i>Palimpsestis</i> or F.		1
3016	<i>Acronycta megacephala</i> F.		4
3063	<i>Rhyacia festiva</i> Schiff.		3
3421	<i>Abrostola triplasia</i> L.		1
3447	<i>Pechipogon barbalis</i> Cl.		2
3450	<i>Hypena proboscidalis</i> L.		1
4029	<i>Cosymbia punctaria</i> L.		1
4036	<i>Scopula floslactata</i> Haw.		2
4125	<i>Cidaria obeliscata</i> Hbn.		4
4131	<i>Cidaria truncata</i> Hufn.		1
4135	<i>Cidaria montanata</i> Schiff.		2
4145	<i>Cidaria pectinataria</i> Knoch		6
4165	<i>Cidaria unangulata</i> Haw.		1
4193	<i>Cidaria albulata</i> Schiff.		1
4196	<i>Cidaria coerulata</i> F.		2
4204	<i>Hydrelia flammeolaria</i> Hufn.		1
4206	<i>Asthenia albulata</i> Hufn.		1
4265	<i>Eupithecia lariciata</i> Frr.		2
4266	<i>Eupithecia tantillaria</i> Bsd.		1
4283	<i>Lomaspilis marginata</i> L.		9
4289	<i>Bapta bimaculata</i> F.		5
4291	<i>Cabera pusaria</i> L.		4
4296	<i>Ellopiia fasciaria</i> L.		1
4297	<i>Campaea margaritata</i> L.		9
4316	<i>Opisthograptis luteolata</i> L.		5
4323	<i>Semiothisa notata</i> L.		6
4324	<i>Semiothisa alternaria</i> Hbn.		1
4326	<i>Semiothisa liturata</i> Cl.		9
4365	<i>Boarmia punctinalis</i> Scop.		4

3433.2 Wiepke bei Gardelegen Wachtberg; Mergelgrube

Tagfang; KELLNER; SCHMIDT; SCHÖNBORN; vom: 01.06.2002

Koch-nr.	Art	Status	Anzahl
1008	<i>Pieris napi</i> L.		2
1011	<i>Gonepteryx rhamni</i> L.		2

1042	<i>Coenonympha pamphilus</i> L.	2
1055	<i>Vanessa antiopa</i> L.	1
1083	<i>Callophrys rubi</i> L.	1
1108	<i>Lycaena icarus</i> Rott.	1
2082	<i>Lymantria dispar</i> L.	1
3151	<i>Monima miniosa</i> Schiff. Larve	1
3381	<i>Lithacodia fasciana</i> L.	2
3382	<i>Lithacodia deceptor</i> Scop.	5
3404	<i>Gonospileia mi</i> Cl.	1
4032	<i>Scopula immorata</i> L.	1
4085	<i>Minoa murinata</i> Scop.	9
4169	<i>Cidaria bilineata</i> L.	1
4327	<i>Semiothisa clathrata</i> L.	1
4383	<i>Ematurga atomaria</i> L.	2

3433.2 Wiepke bei Gardelegen Wachtberg; Mergelgrube

Lichtfang 250W HQL; SCHMIDT vom: 01.06.2002, extrem kühl (10°C), starker Taufall

Koch-nr.	Art	Status	Anzahl
3340	<i>Meristis trigrammica</i> Hufn.		1
3382	<i>Lithacodia deceptor</i> Scop.		1
4182	<i>Cidaria alternata</i> Müll.		1
4291	<i>Cabera pusaria</i> L.		1
4365	<i>Boarmia punctinalis</i> Scop.		1

Letzlingen, Letzlinger Heide NO Ort ; typischer Heidestandort

Tagfang, KELLNER & SCHÖNE vom: 02.06.2002

Koch-nr.	Art	Status	Anzahl
1042	<i>Coenonympha pamphilus</i> L.		2
1060	<i>Melitaea cinxia</i> L.		5
1108	<i>Lycaena icarus</i> Rott.		2
2002	<i>Procris pruni</i> Schiff.	Larve	7
3374	<i>Anarta myrtili</i> L.	Larve	1
4383	<i>Ematurga atomaria</i> L.		9

Anschriften der Verfasser

Dr. Peer Hajo Schnitter
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Reideburger Str. 47
06116 Halle (Saale)
email: schnitter@lau.mu.lsa-net.de

Andreas Schöne
Puschkinallee 33
06846 Dessau
email: AnSchoene@datel-dessau.de

Jörg Kellner
Kirschweg 37
06846 Dessau

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [11_2003](#)

Autor(en)/Author(s): Schnitter Peer Hajo, Schöne Andreas, Kellner Jörg

Artikel/Article: [Bestandserhebungen an Insekten während der Exkursionstagung der EVSA e.V. im Gebiet der Zichtauer Berge \(Altmark\) 42-49](#)