

## Übersicht über die Nachweise der „Cantharoidea“ im Ohre-Aller-Hügelland

von Werner WITSACK

**Vorbemerkungen**

Die eigenen Nachweise (l/d Witsack) stammen aus standardisierten Kescherfängen (vgl. WITSACK 1975) auf einer Vielzahl von Untersuchungsflächen in den unterschiedlichsten Habitaten (z.B. Feuchtestandorte, mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Kalk- und Sandmagerrasen, Laub- und Nadelwäldern u.a.). Zu folgenden Terminen fanden Kontrollfänge statt: 8.6.2004 (7 Fangorte = Fo), 9.6.2006 (13 Fo), 10.6.2006 (8 Fo), 5.9.2006 (13 Fo), 1.6.2007 (2 Fo), 2.6.2007 (7 Fo), 3.6.2007 (1 Fo), 1.8.2007 (11 Fo), 6.8.2007 (10 Fo).

Die Nachweise sind in folgender Reihenfolge dargestellt:

Datum; Fundort-Nummer (Tagebuch-Nr.); Lage- und Habitatangabe; Anzahl an Individuen (1,2 = 1 Männchen, 2 Weibchen); geografische Koordinaten (N = Nord, E = Ost); leg./det.

**Liste der nachgewiesenen Arten**

RL ST: Rote Liste Sachsen-Anhalt (WITSACK 2004)

l/d Witsack = leg. und det. Witsack

<b>Cantharidae (17 Arten)</b>	
27-002-028-	<i>Cantharis cryptica</i> ASHE, 1947
	8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,0 Ex.; 52°21'35,2"N; 11°16'02,4"E; l/d Witsack
27-002-025-	<i>Cantharis decipiens</i> BAUDI, 1871
	8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,8"N; 11°12'21,6"E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 0,1 Ex.; 52°14'46,6"N; 11°02'17,9"E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'30,7"N; 11°04'41,1"E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 0,1 Ex.; 52°17'02,2"N; 11°02'38,0"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 0,1 Ex.; 52°17'15,8"N; 11°16'19,3"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu-Wald; 0,2 Ex.; 52°17'29,6"N; 11°04'57,5"E; l/d Witsack
27-002-030-	<i>Cantharis figurata</i> MANNERHEIM, 1843
	10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'19,6"N; 11°05'09,5"E; l/d Witsack
27-002-005-	<i>Cantharis fusca</i> L., 1758
	9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsel, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,7"N; 11°17'12,7"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 0,1 Ex.; 52°17'10,2"N; 11°03'47,8"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 2,0 Ex.; 52°16'19,6"N; 11°05'09,5"E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 2,1 Ex.; 52°17'15,6"N; 11°15'11,1"E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-5; 2 km WNW Eschenrode, Rasen, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°17'21,7"N; 11°05'46,7"E; l/d Witsack
27-002-017-	<i>Cantharis lateralis</i> L., 1758
	9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 1,0 Ex.; 52°18'44,7"N; 11°09'59,0"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1 Ex.; 52°16'19,6"N; 11°05'09,5"E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-4; 2 km WNW Eschenrode, Roggenfeld; 6 Ex.; 52°17'15,3"N; 11°05'50,5"E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-5; 2 km WNW Eschenrode, Rasen, Feuchtestelle; 1 Ex.; 52°17'21,7"N; 11°05'46,7"E; l/d Witsack;
27-002-026-	<i>Cantharis livida</i> L., 1758
	9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 1,1 Ex.; 52°18'53,1"N; 11°14'50,3"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°17'11,2"N; 11°04'06,4"E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'26,3"N; 11°21'10,5"E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6"N; 11°15'11,1"E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-4; 2 km WNW Eschenrode, Roggenfeld; 1 Ex.; 52°17'15,3"N; 11°05'50,5"E; l/d Witsack;

27-002-018-.	<i>Cantharis nigricans</i> (MÜLLER, 1776)
	8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kiefern-Wald; 3 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,2 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,3 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kiefern-Wald; 2,1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 1,0 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kiefernwald; 1,0 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 0,1 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 1,0 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kiefern-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack;
27-002-014-.	<i>Cantharis obscura</i> L., 1758
	8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kiefern-Wald; 0,4 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack;
27-002-013-.	<i>Cantharis pellucida</i> F., 1792
	8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 1,1 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 0,2 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 2,2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 0,1 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kiefern-Wald; 1,1 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 0,2 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 1,0 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; l/d Witsack;
27-002-027-.	<i>Cantharis rufa</i> L., 1758
	9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald u. Lichtung; 3,3 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 3,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 0,2 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 2,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-5; 2 km WNW Eschenrode, Rasen, Feuchtestelle; 3,2 Ex.; 52°17'21,7''N; 11°05'46,7''E; l/d Witsack;
27-008-001-.	<i>Malthinus punctatus</i> (FOURCROY, 1785); (Syn.: <i>Malthinus flaveolus</i> (HERBST, 1786))
	10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack;
27-009-027-.	<i>Malthodes crassicornis</i> (MÄRKEL, 1846) – <b>RL ST 2</b>
	8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; l/d Witsack
27-009-025-.	<i>Malthodes lobatus</i> KIESENWETTER 1952 – <b>RL ST D</b>
	8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,2 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.;

	52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calferde, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack
27-009-024-	<i>Malthodes spathifer</i> KIESENWETTER, 1852
	9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 4,2 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 0,1 ? Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack;
27-005-002-	<i>Rhagonycha fulva</i> (SCOPOLI, 1763)
	1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; l/d Witsack
27-005-008-	<i>Rhagonycha lignosa</i> (MÜLLER, 1764)
	8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,2 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,1 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 2,2 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calferde, Kiefern-Wald; 2 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Sattuelle, Kiefern-Wald; 3 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 0,1 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kiefernwald; 0,4 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 0,2 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1,3 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 2,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 0,2 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,4 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 0,2 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1+3 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 0,3 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kiefern-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; l/d Witsack; 1.6.2007; Fo-2; - Lichtfang- Bischofswald bei Iverode, Waldrand - Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,3 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack;
27-005-006-	<i>Rhagonycha limbata</i> THOMSON, 1864
	9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 2,4 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 0,1 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 4 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,0 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; l/d Witsack;
<b>Malachidae (6 Arten)</b>	
29-007-001-	<i>Anthocomus coccineus</i> (SCHALLER, 1783)
	1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 2 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 4 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; l/d Witsack;
29-014-002-	<i>Axinotarsus pulicarius</i> (F., 1775)
	2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack;
29-014-001-	<i>Axinotarsus ruficollis</i> (OLIVIER, 1790)
	10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack;
29-004-001-	<i>Charopus flavipes</i> (PLAYKULL, 1798)
	8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald u. Magerrasen; 7,9 Ex.; 52°18'52,9''N; 11°10'06,8''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Sattuelle, Kiefern-Wald; 1,2 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kiefernwald; 1,0 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3b; 1 km

	SW Schwanefeld, Magerrasen ; 1,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald; 0,2 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,3 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 0,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 15,0 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack;
29-0064-.001-.	<i>Cordylepherus viridis</i> (F., 1787)
	8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald u. Magerrasen; 0,5 Ex.; 52°18'52,9''N; 11°10'06,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 12 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 0,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 7 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-4; 2 km WNW Eschenrode, Roggenfeld; 1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 9 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack;
29-.006-.0032-.	<i>Malachius bipustulatus</i> (L., 1758)
	8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 1,2 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 1,2 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 1,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack;
<b>Melyridae (3 Arten)</b>	
30-005-.009-.	<i>Dasytes aeratus</i> STEPH., 1830, (Syn.: <i>Dasytes aerosus</i> KIESW 1867) – <b>RL ST 3</b>
	9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kiefernwald; 1 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald ; 1 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 1 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 3 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 1.6.2007; Fo-2; - Lichtfang-Bischofswald bei Iverode, Waldrand - Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack;
30-005-.008-.	<i>Dasytes plumbeus</i> (MÜLLER, 1776)
	8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kiefern-Wald; 3 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 2 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 6 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 3 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kiefern-Wald; 4 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kiefernwald; 2 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald ; 7 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 2 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Iverode u. Bodendorf; 5 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 3 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 6 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 4 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; l/d Witsack;
30-007-.001-.	<i>Dolichosoma lineare</i> (ROSSI, 1794)
	8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald u. Magerrasen; 1 Ex.; 52°18'52,9''N; 11°10'06,8''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 4 Ex.;

<p>52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; 1/d Witsack; 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; 1/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 6 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; 1/d Witsack; 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 5 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; 1/d Witsack; 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 2 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; 1/d Witsack; 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen ; 1 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; 1/d Witsack;</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Anmerkungen

Der Nachweis von *Malthodes crassicornis* zählt zu den Besonderheiten, denn es handelt sich um eine stark gefährdete Art (Rote Liste Sachsen-Anhalt, Kat. 2).

Die Art *Malthodes lobatus* zählt zu den sehr kleinen Arten dieser Gattung. Da von der Art gewöhnlich fast ausschließlich Weibchen gefangen werden und diese mit anderen sehr kleinen Arten verwechselt werden können, ist über ihr sicheres Vorkommen bisher wenig bekannt. In der Roten Liste Sachsen-Anhalts ist sie deshalb in Kat. D (Daten defizitär) eingeordnet.

### Literatur

WITSACK, W. (2004): Rote Liste der Weichkäfer i.w.S. (Cantharoidea: Omalisidae, Lampyridae, Cantharidae, Drillidae; Cleroidea: Malachiidae, Melyridae, Phloiophilidae) des Landes Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 39 : 287- 290.)

### Anschrift des Autors:

Dr. Werner Witsack  
Stieger Weg 55  
06120 Halle

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17\\_2009](#)

Autor(en)/Author(s): Witsack Werner

Artikel/Article: [Übersicht über die Nachweise der „Cantharoidea“ im Ohre-Aller-Hügelland 109-113](#)