

Crabronidae	Crabro peltarius (Schreber, 1784)		Calvörde	Oehlke, J.
Crabronidae	Crabro scutellatus (Scheven, 1781)		Calvörde	Oehlke, J.
Crabronidae	Crabro scutellatus (Scheven, 1781)		Flechtingen	Oehlke, J.
Crabronidae	Lestica clypeata (Schreber, 1759)		Etingen	Oehlke, J.
Pompilidae	Cryptocheilus notatus affinis (Vander Lin)	08.07.1981	Calvörde	Oehlke, J.

Anschrift des Autors:

Eckart Stolle
Landrain 50
06118 Halle

Fliegen der ÜF Empidoidea aus Bodenfallenfängen

von Andreas STARK

Fallenstandorte BoFl 1 bis BoFl 3 (siehe „Methodisches Herangehen“ S. 7)

Taxon (Familie/Art)	BoFl 1	BoFl 2	BoFl 3
Empididae			
<i>Rhampomyia (Aclonempis) longipes</i>	0 m / 3 w	0 m / 1 w	0 m / 6 w
<i>Hilara anglodanica</i>			1 m / 0 w
<i>Hilara spec. 2</i>		0 m / 1 w	
<i>Empis s. str. chioptera</i>	0 m / 2 w	0 m / 1 w	0 m / 1 w
<i>Rhampomyia (Megacyttarus) crassirostris</i>	0 m / 1 w		
Hybotidae			
<i>Oedalea zetterstedti</i>			0 m / 1 w
<i>Tachypeza nubila</i>		1 m / 1 w	2 m / 9 w
<i>Platypalpus aristatus</i>			2 m / 1 w
<i>Platypalpus ciliaris</i>	1 m / 0 w		
<i>Bicellaria nigra</i>		0 m / 1 w	
Dolichopodidae			
<i>Chrysotimus molliculus</i>		0 m / 1 w	
<i>Neurigona quadrifasciata</i>	0 m / 6 w	0 m / 6 w	0 m / 14 w
<i>Dolichopus ungulatus</i>	0 m / 1 w		2 m / 15 w
<i>Hercostomus aerosus</i>			2 m / 0 w
<i>Hercostomus brevicornis</i>	4 m / 11 w	0 m / 1 w	> 20 m / >20 w
<i>Hercostomus chrysozygos</i>			1 m / 1 w
<i>Sciapus platypterus</i>	0 m / 2 w	0 m / 5 w	0 m / 5 w
<i>Xanthochlorus tenellus</i>			0 m / 5 w

BiFl 4 bis BiFl 6 (siehe „Methodisches Herangehen“ S. 7)

Taxon (Familie/Art)	BiFl 4	BiFl 5	BiFl 6
Empididae			
<i>Hilara intermedia</i>	0 m / 1 w		
<i>Rhamphomyia (Aclonempis) longipes</i>	0 m / 2 w		
<i>Rhamphomyia sulcatella</i>	0 m / 1 w		
<i>Phylodromia melanocephala</i>		0 m / 1 w	
Hybotidae			
<i>Drapetis parilis</i>			0 m / 3 w
<i>Elaphropeza ephippiata</i>	1 m / 0 w		
<i>Euthyneura gyllenhali</i>	0 m / 4 w		
<i>Tachypeza nubila</i>	5 m / 11 w	0 m / 2 w	
<i>Platypalpus brachystylus</i>		0 m / 1 w	
<i>Platypalpus ciliaris</i>	8 m / 1 w		
<i>Platypalpus nigritarsis</i>	0 m / 3 w		
<i>Platypalpus pallidiventris</i>	1 m / 0 w		
Dolichopodidae			
<i>Neurigona quadrifasciata</i>	1 m / 29 w	0 m / 1 w	0 m / 2 w
<i>Dolichopus nigricornis</i>	1 m / 0 w		
<i>Dolichopus ungulatus</i>	0 m / 15 w		
<i>Dolichopus wahlbergi</i>	0 m / 1 w		
<i>Hercostomus aerosus</i>	0 m / 1 w		
<i>Hercostomus brevicornis</i>	46 m / 40 w		
<i>Sciapus platypterus</i>	0 m / 3 w		0 m / 1 w
<i>Xanthochlorus tenellus</i>			0 m / 1 w

Anmerkung: Bei fast allen Arten handelt es sich um weit verbreitete, oft in großen Populationen auftretende Spezies. Viele sind typische Waldarten (*Neurigona quadrifasciata*, *Sciapus platypterus*, *Platypalpus ciliaris*). Bemerkenswert ist *Euthyneura gyllenhali* als Bewohner totholzreicher Wälder.

Anschrift des Autors:

Andreas Stark
druck-zuck GmbH
Seebener Str. 4
06114 Halle (Saale)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17_2009](#)

Autor(en)/Author(s): Stark Andreas

Artikel/Article: [Fliegen der ÜF Empidoidea aus Bodenfallenfängen
184-185](#)