

## Die Käferfauna der Binnendüne Aken (Coleoptera)

von Manfred JUNG

In den Jahren 2011 und 2012 erfolgten im Rahmen der Vorbereitung einer Renaturierung der Binnendüne Aken Untersuchungen zur Laufkäfer- und Wanzenfauna im Auftrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Die Charakterisierung des Gebietes erfolgte bei BUNAT (2013). Parallel zu vorgenannten Untersuchungen wurden auch alle anderen Käferfamilien erfasst und ausgewertet. Dabei wurden nicht nur die Trockenrasenflächen und die Gras- und Hochstaudenfluren des eigentlichen Düngeländes inclusive der dort vorhandenen solitären Gehölze besammelt, sondern auch die Randbereiche der sich unmittelbar anschließenden Gehölzstrukturen.

Durch die zu Beginn der Renaturierungsarbeiten erfolgte teilweise Beseitigung eines Kiefern-Robinien-Bestandes entstanden offene Bereiche. Einschließlich dort liegendegebliebener und trocknender Kiefernkronen wurden diese Flächen zur Erfassung auch xylobionter Arten in die Untersuchung einbezogen, ebenso eine am Durchfahrtsweg zur Elbe vorhandene Lagerfläche für diverses Schotter- und Bodenmaterial, die nach Beräumung mit lehmhaltigen Erdstoffen unbekannter Herkunft einplaniert wurde. Hier hat sich sofort eine Ruderalflora, u.a. mit Klatschmohn, Rauken- und Kamillenarten ausgebildet und als Folge wurden einige für das Gebiet untypische Rüsselkäferarten registriert.

Die Inventarisierung erfolgte durch die Auswertung der Käfer aus den Bodenfallen, desweiteren durch Abklopfen und Abklopfen der Vegetation, durch Bodensuche und Lichtfang. Es wurden exclusive der separat behandelten Laufkäfer (MALCHAU 2015) insgesamt etwa 3600 Einzelexemplare in 348 Arten aus 47 Familien erfasst. Elf Arten gelten nach der Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützt, 47 Arten sind in den Roten Listen Sachsen-Anhalts als gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht eingestuft. Allerdings existieren für viele Käferfamilien noch keine Roten Listen unseres Bundeslandes. *Longitarsus tristis* wurde erstmals für Sachsen-Anhalt nachgewiesen.

Die Nomenklatur der Gesamtartenliste folgt dem online-Verzeichnis der Käfer Deutschlands auf [www.koleopterologie.de](http://www.koleopterologie.de).

### Erläuterung Häufigkeiten:

ss (sehr selten) = 1 Exemplar, s (selten) = 2-10 Ex., mh (mäßig häufig) = 11-100 Ex., h (häufig) = 101-1000 Ex.

### Erläuterung Bemerkungen:

./ = aufgrund der aquatischen Lebensweise bzw. des Vorkommens in feuchten Landlebensräumen (z. B. Uferzonen) oder Ruderalbereichen nicht zum typischen Arteninventar des Untersuchungsgebietes gehörend, NF = Neufund für Sachsen-Anhalt

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
Dytiscidae- Schwimmkäfer					
<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (SCHALLER, 1783)	04-.006-.001-	s			./
<i>Hydroporus angustatus</i> STURM, 1835	04-.008-.003-	s			./
<i>Hydroporus incognitus</i> SHARP, 1869	04-.008-.010-	s			./
<i>Hydroporus planus</i> (FABRICIUS, 1781)	04-.008-.019-	ss			./
<i>Suphrodytes dorsalis</i> (FABRICIUS, 1787)	04-.0081.001-	ss			./
<i>Agabus bipustulatus</i> (LINNÉ, 1767)	04-.023-.009-	mh			./
<i>Agabus undulatus</i> (SCHRANK, 1776)	04-.023-.026-	ss			./

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Ilybius ater</i> (DEGEER, 1774)	04-024-002-	s			./.
<i>Rhantus exsoletus</i> (FORSTER, 1771)	04-026-008-	ss			./.
<b>Hydrophilidae - Wasserkäfer</b>					
<i>Coelostoma orbiculare</i> (FABRICIUS, 1775)	09-0012.001-	s			./.
<i>Cercyon marinus</i> THOMSON, 1853	09-003-009-	s			./.
<i>Megasternum concinnum</i> (MARSHAM, 1802)	09-004-001-	s			./.
<i>Hydrobius fuscipes</i> (LINNÉ, 1758)	09-008-001-	s			./.
<i>Anacaena limbata</i> (FABRICIUS, 1792)	09-010-002-	s			./.
<i>Anacaena lutescens</i> (STEPHENS, 1829)	09-010-0021.	s			./.
<i>Helochares obscurus</i> (MÜLLER, 1776)	09-012-002-	s			./.
<i>Enochrus quadripunctatus</i> (HERBST, 1797)	09-013-004-	s			./.
<i>Hydrochara caraboides</i> (LINNÉ, 1758)	09-016-001-	ss			./.
<b>Histeridae - Stutzkäfer</b>					
<i>Saprinus semistriatus</i> (SCRIBA, 1790)	10-010-005-	s			
<i>Margarinotus purpurascens</i> (HERBST, 1791)	10-029-003-	s			
<b>Silphidae - Aaskäfer</b>					
<i>Nicrophorus vespilloides</i> HERBST, 1783	12-001-006-	s			
<i>Nicrophorus vespillo</i> (LINNÉ, 1758)	12-001-008-	s			
<i>Nicrophorus vestigator</i> HERSCHEL, 1807	12-001-009-	s			
<i>Thanatophilus rugosus</i> (LINNÉ, 1758)	12-003-001-	s			
<i>Silpha tristis</i> ILLIGER, 1798	12-007-005-	s			
<i>Phosphuga atrata</i> (LINNÉ, 1758)	12-009-001-	s			
<b>Cholevidae - Nestkäfer</b>					
<i>Nargus bruneus</i> (STURM, 1839)	14-005-004-	s			
<i>Nargus anisotomoides</i> (SPENCE, 1815)	14-005-005-	s			
<i>Sciodrepoides watsoni</i> (SPENCE, 1815)	14-010-001-	s			
<i>Catops grandicollis</i> ERICHSON, 1837	14-011-005-	ss			
<i>Catops fuliginosus</i> ERICHSON, 1837	14-011-017-	s			
<b>Leiodidae - Schwammkugelkäfer</b>					
<i>Leiodes rugosa</i> STEPHENS, 1829	16-003-007-	s			
<i>Agathidium marginatum</i> STURM, 1807	16-011-001-	s			
<i>Agathidium convexum</i> SHARP, 1866	16-011-004-	ss			
<i>Agathidium laevigatum</i> ERICHSON, 1845	16-011-016-	s			
<b>Staphylinidae: Kurzflügler</b>					
<i>Metopsia similis</i> ZERCHE 1998	23-007-001-	mh			
<i>Omalius rivulare</i> (PAYKULL, 1789)	23-015-005-	ss			
<i>Omalius caesum</i> GRAVENHORST, 1806	23-015-018-	mh			
<i>Olophrum assimile</i> (PAYKULL, 1800)	23-026-006-	s			
<i>Acidota cruentata</i> (MANNERHEIM, 1830)	23-030-003-	ss			
<i>Carpelimus rivularis</i> (MOTSCHULSKY, 1860)	23-046-008-	s			
<i>Carpelimus obesus</i> (KIESENWETTER, 1844)	23-046-009-	s	1		
<i>Carpelimus corticinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-046-017-	s			
<i>Anotylus rigosus</i> (FABRICIUS, 1775)	23-0481.003-	mh			
<i>Platystethus arenarius</i> (FOURCROY, 1875)	23-049-001-	ss			
<i>Bledius gallicus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-050-020-	s			
<i>Stenus calcaratus</i> SCRIBA, 1864	23-055-012-	ss		2	
<i>Stenus clavicornis</i> (SCOPOLI, 1763)	23-055-022-	mh			
<i>Stenus providus</i> ERICHSON, 1839	23-055-024-	ss			
<i>Stenus bimaculatus</i> GYLLENHAL, 1810	23-055-026-	s		2	
<i>Stenus argus</i> GRAVENHORST, 1806	23-055-044-	s			
<i>Stenus humilis</i> ERICHSON, 1839	23-055-057-	mh			
<i>Stenus cicindeloides</i> (SCHALLER, 1783)	23-055-076-	ss			
<i>Stenus impressus</i> GERMAR, 1824	23-055-094-	ss			
<i>Stenus ochropus</i> KIESENWETTER, 1858	23-055-096-	s			
<i>Paederus brevipennis</i> LACORDAIRE, 1835	23-059-006-	ss	1		

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Paederus littoralis</i> GRAVENHORST, 1802	23-059-010-	s			
<i>Astenus immaculatus</i> STEPHENS, 1833	23-060-007-	ss	1		
<i>Astenus gracilis</i> (PAYKULL, 1789)	23-060-010-	s			
<i>Scopaeus laevigatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	23-066-001-	ss	1		
<i>Lathrobium fulvipenne</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-068-021-	ss			
<i>Gyrophypnus angustatus</i> STEPHENS, 1833	23-079-005-	s			
<i>Xantholinus tricolor</i> (FABRICIUS, 1787)	23-080-005-	mh			
<i>Xantholinus laevigatus</i> JACOBSEN, 1847	23-080-007-	s			
<i>Xantholinus linearis</i> (OLIVIER, 1795)	23-080-010-	h			
<i>Xantholinus longiventris</i> HEER, 1839	23-080-015-	s			
<i>Othius angustus</i> STEPHENS, 1833	23-082-004-	mh			
<i>Othius subuliformis</i> STEPHENS, 1833	23-082-005-	mh			
<i>Philonthus debilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-010-	ss			
<i>Philonthus concinnus</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-015-	ss			
<i>Philonthus cognatus</i> STEPHENS, 1832	23-088-023-	s			
<i>Philonthus succicola</i> THOMSON, 1860	23-088-026-	ss			
<i>Philonthus decorus</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-029-	ss			
<i>Philonthus carbonarius</i> (GRAVENHORST, 1810)	23-088-039-	ss			
<i>Philonthus punctus</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-050-	ss			
<i>Philonthus lepidus</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-064-	h			
<i>Philonthus micans</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-069-	ss			
<i>Bisnius nitidulus</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-088-063-	mh			
<i>Gabrius osseticus</i> (KOLENATI, 1846)	23-090-001-	mh			
<i>Gabrius appendiculatus</i> SHARP, 1910	23-090-024-	s			
<i>Ontholestes murinus</i> (LINNÉ, 1758)	23-092-002-	ss			
<i>Platydracus fulvipes</i> (SCOPOLI, 1763)	23-095-001-	ss			
<i>Platydracus stercorarius</i> (OLIVIER, 1795)	23-095-005-	mh			
<i>Ocypus olens</i> (MÜLLER, 1764)	23-099-001-	s			
<i>Ocypus ophthalmicus</i> (SCOPOLI, 1763)	23-099-004-	mh			
<i>Ocypus nitens</i> (SCHRANK, 1781)	23-099-010-	ss			
<i>Ocypus brunripes</i> (FABRICIUS, 1781)	23-099-012-	mh			
<i>Ocypus fuscatus</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-099-014-	s			
<i>Ocypus picipennis</i> (FABRICIUS, 1792)	23-099-015-	ss			
<i>Ocypus fulvipennis</i> ERICHSON, 1840	23-099-016-	ss			
<i>Heterothops quadripunctulus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-100-004-	ss			
<i>Heterothops dissimilis</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-100-005-	s			
<i>Quedius longicornis</i> KRAATZ, 1857	23-104-007-	ss			
<i>Quedius tristis</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-104-027-	s			
<i>Quedius molochinus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-104-031-	mh			
<i>Quedius persimilis</i> MULSANT ET REY, 1875	23-104-069-	mh			
<i>Ischnosoma splendidus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-1091-003-	mh			
<i>Bolitobius castaneus</i> (STEPHENS, 1832)	23-112-002-	ss			
<i>Bolitobius formosus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-112-004-	ss			
<i>Sepedophilus immaculatus</i> (STEPHENS, 1832)	23-113-003-	ss			
<i>Sepedophilus obtusus</i> (LUZE, 1902)	23-113-0042	mh			
<i>Tachyporus nitidulus</i> (FABRICIUS, 1781)	23-114-001-	s			
<i>Tachyporus solutus</i> ERICHSON, 1839	23-114-005-	s			
<i>Tachyporus hypnorum</i> (FABRICIUS, 1775)	23-114-007-	mh			
<i>Tachyporus atriceps</i> Stephens, 1832	23-114-010-	mh			
<i>Tachyporus pusillus</i> GRAVENHORST, 1806	23-114-015-	s			
<i>Lamprinodes saginatus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-115-001-	s			
<i>Tachinus fimetarius</i> GRAVENHORST, 1802	23-117-012-	ss			
<i>Tachinus rufipes</i> (LINNÉ, 1758)	23-117-013-	ss			
<i>Tachinus laticollis</i> GRAVENHORST, 1802	23-117-014-	ss			
<i>Tachinus corticinus</i> GRAVENHORST, 1802	23-117-017-	s			

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Brachida exigua</i> (HEER, 1839)	23-128-001-	s			
<i>Falagrioma thoracica</i> (CURTIS, 1833)	23-1502.001-	ss			
<i>Thinonoma atra</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-1541.001-	s			
<i>Nehemitropia lividipennis</i> (MANNERHEIM, 1831)	23-171-001-	mh			
<i>Ousipalia caesula</i> (ERICHSON, 1839)	23-178-001-	h			
<i>Geostiba circellaris</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-180-003-	s			
<i>Dinaraea angustula</i> (GYLLENHAL, 1810)	23-182-001-	mh			
<i>Drusilla canaliculata</i> (FABRICIUS, 1787)	23-195-001-	mh			
<i>Zyras limbatus</i> (PAYKULL, 1789)	23-196-005-	s			
<i>Zyras funestus</i> (GRAVENHORST, 1806)	23-196-006-	ss			
<i>Zyras humeralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-196-007-	ss			
<i>Zyras lugens</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-196-010-	ss	2		
<i>Dinarda hagensii</i> WASMANN, 1889	23-199-003-	mh	1		
<i>Oxyopoda opaca</i> (GRAVENHORST, 1802)	23-223-004-	ss			
<i>Oxyopoda abdominalis</i> (MANNERHEIM, 1830)	23-223-024-	h			
<i>Oxyopoda togata</i> ERICHSON, 1837	23-223-029-	s	2		
<i>Oxyopoda brachyptera</i> (STEPHENS, 1832)	23-223-046-	mh			
<i>Oxyopoda tarda</i> SHARP, 1871	23-223-047-	s			
<i>Oxyopoda soror</i> THOMSON, 1855	23-223-055-	s			
<i>Aleochara curtula</i> (GOEZE, 1777)	23-237-001-	ss			
<i>Aleochara brevipennis</i> GRAVENHORST, 1806	23-237-008-	ss			
<i>Aleochara ruficornis</i> GRAVENHORST, 1802	23-237-038-	ss			
<i>Aleochara bilineata</i> GYLLENHAL, 1810	23-237-043-	mh			
<i>Aleochara bipustulata</i> (LINNÉ, 1761)	23-237-046-	mh			
<i>Rheochara spadicea</i> (ERICHSON, 1837)	23-238-001-	s	3		
<i>Brachygluta haematica</i> (REICHENBACH, 1816)	24-021-007-	s	1		
<b>Lampyridae - Leuchtkäfer</b>					
<i>Lampyris noctiluca</i> (LINNÉ, 1758)	26-001-001-	s			
<i>Lamprohiza splendidula</i> (LINNÉ, 1767)	26-002-001-	s			
<i>Phosphoenus hemipterus</i> (GOEZE, 1777)	26-003-001-	ss	V		
<b>Cantharidae - Weichkäfer</b>					
<i>Cantharis nigricans</i> (MÜLLER, 1776)	27-002-018-	ss			
<i>Rhagonycha fulva</i> (SCOPOLI, 1763)	27-005-002-	s			
<i>Malthodes minimus</i> (LINNÉ, 1758)	27-009-012-	s			
<b>Malachiidae - Zipfelkäfer</b>					
<i>Charopus flavipes</i> (PAYKULL, 1798)	29-004-001-	mh			
<i>Charopus concolor</i> (FABRICIUS, 1801)	29-004-003-	mh	V		
<i>Cordylepherus viridis</i> (FABRICIUS, 1787)	29-0064.001-	ss			
<i>Axinotarsus ruficollis</i> (OLIVIER, 1790)	29-014-001-	s			
<i>Axinotarsus marginalis</i> (LAPORTE DE CASTELNAU, 1840)	29-014-003-	s			
<b>Melyridae - Wollhaarkäfer</b>					
<i>Dolichosoma lineare</i> (ROSSI, 1794)	30-007-001-	ss			
<b>Cleridae - Buntkäfer</b>					
<i>Thanasimus formicarius</i> (LINNÉ, 1758)	31-007-001-	ss			
<i>Thanasimus femoralis</i> ZETTERSTEDT, 1828	31-007-003-	ss	3		
<i>Trichodes alvearius</i> (FABRICIUS, 1792)	31-009-003-	ss	3		
<b>Elateridae - Schnellkäfer</b>					
<i>Ampedus sanguinolentus</i> (SCHRANK, 1776)	34-001-018-	ss			
<i>Ampedus elongatulus</i> (FABRICIUS, 1787)	34-001-022-	s			
<i>Dalopius marginatus</i> (LINNÉ, 1758)	34-009-001-	ss			
<i>Agriotes sputator</i> (LINNÉ, 1758)	34-010-014-	ss			
<i>Melanotus rufipes</i> (HERBST, 1784)	34-016-002-	s			
<i>Agrypnus murina</i> (LINNÉ, 1758)	34-019-001-	mh			
<i>Prosternon tessellatum</i> (LINNÉ, 1758)	34-025-001-	ss			

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Limonium minutus</i> (LINNÉ, 1758)	34-.035-.002-	s			
<i>Oedostethus quadripustulatus</i> (FABRICIUS, 1792)	34-.044-.002-	ss			
<i>Cardiophorus atramentarius</i> ERICHSON, 1840	34-.049-.006-	s	3		
<i>Cardiophorus ebeninus</i> (GERMAR, 1824)	34-.049-.010-	s			
<i>Dicronychus cinereus</i> (HERBST, 1784)	34-.050-.001-	s			
<b>Buprestidae - Prachtkäfer</b>					
<i>Chalcophora mariana</i> (LINNÉ, 1758)	38-.002-.001-	ss	2		
<i>Agrilus angustulus</i> (ILLIGER, 1803)	38-.020-.006-	ss			
<i>Agrilus cuprescens</i> MENETRIES, 1832	38-.020-.024-	ss	R		
<b>Eucinetidae - Purzelkäfer</b>					
<i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> (GERMAR, 1818)	41-.001-.001-	s			
<b>Heteroceridae - Sägekäfer</b>					
<i>Heterocerus fenestratus</i> (THUNBERG, 1784)	44-.002-.006-	s			./.
<b>Dermestidae - Speckkäfer</b>					
<i>Dermestes murinus</i> LINNÉ, 1758	45-.001-.004-	ss			
<i>Dermestes lanarius</i> ILLIGER, 1802	45-.001-.005-	h			
<b>Byrrhidae - Pillenkäfer</b>					
<i>Simplocaria semistriata</i> (FABRICIUS, 1794)	47-.004-.002-	ss			
<i>Lamprobyrrhulus nitidus</i> (SCHALLER, 1783)	47-.007-.001-	ss			
<i>Byrrhus pilula</i> (LINNÉ, 1758)	47-.011-.002-	s			
<b>Nitidulidae - Glanzkäfer</b>					
<i>Carpophilus hemipterus</i> (LINNÉ, 1758)	50-.006-.004-	ss			
<i>Amphotis marginata</i> (FABRICIUS, 1781)	50-.012-.001-	ss			
<i>Glschrochilus quadrisignatus</i> (SAY, 1835)	50-.021-.0021.	s			
<b>Kateretidae - Kurzflügelkäfer</b>					
<i>Kateretes pusillus</i> (THUNBERG, 1794)	501.001-.002-	mh			
<b>Monotomidae - Rindenglanzkäfer</b>					
<i>Monotoma brevicollis</i> AUBÉ, 1837	52-.0001.006-	ss			
<b>Silvanidae - Raubplattkäfer</b>					
<i>Uleiota planata</i> (LINNÉ, 1761)	531.011-.001-	ss			
<b>Erotylidae - Pilzkäfer</b>					
<i>Dacne rufifrons</i> (FABRICIUS, 1775)	54-.003-.003-	ss			
<b>Cryptophagidae - Schimmelkäfer</b>					
<i>Cryptophagus pilosus</i> GYLLENHAL, 1827	55-.008-.042-	ss			
<i>Atomaria analis</i> ERICHSON, 1846	55-.014-.028-	s			
<i>Atomaria testacea</i> STEPHENS, 1830	55-.014-.036-	ss			
<i>Atomaria nigrirostris</i> STEPHENS, 1830	55-.014-.045-	s			
<i>Atomaria linearis</i> STEPHENS, 1830	55-.014-.046-	s			
<b>Phalacridae - Glattkäfer</b>					
<i>Olibrus affinis</i> (STURM, 1807)	56-.002-.009-	ss	3		
<b>Latridiidae - Moderkäfer</b>					
<i>Corticarina truncatella</i> (MANNERHEIM, 1844)	58-.008-.004-	s			
<i>Corticarina minuta</i> (FABRICIUS, 1792)	58-.008-.005-	ss			
<i>Melanophthalma distinguenda</i> (COMOLLI, 1837)	58-.009-.002-	ss			
<b>Colydiidae - Rindenkäfer</b>					
<i>Orthocerus clavicornis</i> (LINNÉ, 1758)	60-.006-.001-	s			
<i>Bitoma crenata</i> (FABRICIUS, 1775)	60-.016-.001-	ss			
<b>Endomychidae - Stäublingskäfer</b>					
<i>Lycoperdina succincta</i> (LINNÉ, 1767)	61-.010-.002-	s			
<b>Coccinellidae - Marienkäfer</b>					
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpuncta</i> (LINNÉ, 1758)	62-.003-.001-	ss			
<i>Cyanegetis impunctata</i> (LINNÉ, 1767)	62-.004-.001-	h			
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (HERBST, 1792)	62-.006-.002-	s			
<i>Scymnus frontalis</i> (FABRICIUS, 1787)	62-.008-.003-	s			
<i>Scymnus suturalis</i> THUNBERG, 1795	62-.008-.015-	s			

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Nephus redtenbacheri</i> (MULSANT, 1846)	62-.0081.001-.	s	3		
<i>Nephus bisignatus</i> (BOHEMAN, 1850)	62-.0081.005-.	ss			
<i>Platynaspis luteorubra</i> (GOEZE, 1777)	62-.011-.001-.	s			
<i>Hippodamia variegata</i> (GOEZE, 1777)	62-.018-.003-.	ss			
<i>Tythispiss sedecimpunctata</i> (LINNÉ, 1761)	62-.022-.001-.	mh			
<i>Adalia decempunctata</i> (LINNÉ, 1758)	62-.023-.002-.	ss			
<i>Coccinella septempunctata</i> LINNÉ, 1758	62-.025-.003-.	mh			
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (LINNÉ, 1758)	62-.026-.001-.	s			
<b>Aspidiphoridae - Staubpilzkäfer</b>					
<i>Sphindus dubius</i> (GYLLENHAL, 1808)	63-.001-.001-.	ss			
<b>Anobiidae - Klopfkäfer</b>					
<i>Ernobius nigrinus</i> (STURM, 1837)	68-.007-.001-.	s			
<i>Ernobius mollis</i> (LINNÉ, 1758)	68-.007-.012-.	ss			
<i>Anobium nitidum</i> FABRICIUS, 1792	68-.012-.004-.	s			
<b>Ptinidae - Diebskäfer</b>					
<i>Ptinus rufipes</i> OLIVIER, 1790	69-.008-.004-.	ss			
<b>Oedemeridae - Scheinbockkäfer</b>					
<i>Chrysanthia nigricornis</i> WESTHOFF, 1882	70-.006-.002-.	ss			
<i>Oedemera flavipes</i> (FABRICIUS, 1792)	70-.010-.001-.	s			
<i>Oedemera virescens</i> (LINNÉ, 1767)	70-.010-.010-.	s			
<b>Pyrochroidae - Feuerkäfer</b>					
<i>Schizotus pectinicornis</i> (LINNÉ, 1758)	72-.002-.001-.	ss			
<b>Anthicidae - Blütenmulmkäfer</b>					
<i>Notoxus monoceros</i> (LINNÉ, 1761)	75-.001-.003-.	s			
<i>Anthicus antherinus</i> (LINNÉ, 1761)	75-.004-.0071.	ss			
<b>Mordellidae - Stachelkäfer</b>					
<i>Variimorda mendax</i> MÉQUIGNON, 1946	79-.002-.004-.	s			
<i>Mordella brachyura</i> MULSANT, 1856	79-.003-.007-.	mh			
<b>Alleculidae - Pflanzenkäfer</b>					
<i>Gonodera luperus</i> (HERBST, 1783)	82-.006-.001-.	s			
<i>Isomira thoracica</i> (FABRICIUS, 1792)	82-.007-.002-.	s			
<i>Isomira murina</i> (LINNÉ, 1758)	82-.007-.005-.	s			
<b>Tenebrionidae - Schwarzkäfer</b>					
<i>Melanimon tibiale</i> (FABRICIUS, 1781)	83-.009-.001-.	mh			
<i>Crypticus quisquilius</i> (LINNÉ, 1761)	83-.013-.001-.	mh			
<i>Alphitobius diaperinus</i> (PANZER, 1797)	83-.026-.001-.	ss			
<b>Geotrupidae - Mistkäfer</b>					
<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (SCRIBA, 1791)	842.005-.001-.	s			
<i>Trypocopris vernalis</i> (LINNÉ, 1758)	842.006-.002-.	mh			
<b>Scarabaeidae - Blatthornkäfer</b>					
<i>Onthophagus ovatus</i> (LINNÉ, 1767)	85-.014-.008-.	s			
<i>Aphodius distinctus</i> (MÜLLER, 1776)	85-.019-.033-.	s			
<i>Aphodius granarius</i> (LINNÉ, 1767)	85-.019-.086-.	s			
<i>Psammodius asper</i> (FABRICIUS, 1775)	85-.021-.002-.	ss	0		
<i>Anomala dubia</i> (SCOPOLI, 1763)	85-.035-.001-.	s	2		
<i>Polyphylla fullo</i> (LINNÉ, 1758)	85-.034-.001-.	s	2	§ BA	
<i>Chaetopteropia segetum</i> (HERBST, 1783)	85-.0391.001-.	s	2		
<i>Cetonia aurata</i> (LINNÉ, 1761)	85-.045-.001-.	s			
<b>Lucanidae - Hirschkäfer</b>					
<i>Dorcus parallelipedus</i> (LINNÉ, 1758)	86-.002-.001-.	s	3	§ BA	
<b>Cerambycidae - Bockkäfer</b>					
<i>Grammoptera ruficornis</i> (FABRICIUS, 1781)	87-.023-.002-.	ss		§ BA	
<i>Pseudovadonia livida</i> (FABRICIUS, 1776)	87-.0272.001-.	ss		§ BA	
<i>Stenurella melanura</i> (LINNÉ, 1758)	87-.0293.001-.	ss		§ BA	
<i>Stenurella bifasciata</i> (MÜLLER, 1776)	87-.0293.002-.	s		§ BA	

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Cerambyx scopolii</i> FUESSLY, 1775	87-.032-.003-.	s	3	§ BA	
<i>Molorchus minor</i> (LINNÉ, 1758)	87-.039-.001-.	s		§ BA	
<i>Anaglyptus mysticus</i> (LINNÉ, 1758)	87-.063-.001-.	ss		§ BA	
<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (DEGEER, 1775)	87-.075-.006-.	ss		§ BA	
<i>Tetrops praeustus</i> (LINNÉ, 1758)	87-.087-.001-.	ss		§ BA	
<b>Chrysomelidae - Blattkäfer</b>					
<i>Clytra laeviuscula</i> RATZEBURG, 1837	88-.012-.003-.	s			
<i>Smaragdina aurita</i> (LINNÉ, 1767)	88-.013-.004-.	ss			
<i>Chrysolina graminis</i> (LINNÉ, 1758)	88-.023-.006-.	s			
<i>Chrysolina varians</i> (SCHALLER, 1783)	88-.023-.036-.	s			
<i>Chrysolina geminata</i> (PAYKULL, 1799)	88-.023-.040-.	ss			
<i>Gastrophysa polygona</i> (LINNÉ, 1758)	88-.028-.001-.	s			
<i>Galeruca tanacetii</i> (LINNÉ, 1758)	88-.041-.001-.	mh			
<i>Sermylissa halensis</i> (LINNÉ, 1767)	88-.047-.001-.	s			
<i>Phyllotreta vittula</i> (REDTENBACHER, 1849)	88-.049-.002-.	ss			
<i>Aphthona cyparissiae</i> (KOCH, 1803)	88-.050-.001-.	s			
<i>Aphthona atrocaerulea</i> (STEPHENS, 1831)	88-.050-.013-.	s			
<i>Aphthona venustula</i> (KUTSCHERA, 1861)	88-.050-.014-.	mh			
<i>Aphthona euphorbiae</i> (SCHRANK, 1781)	88-.050-.015-.	s			
<i>Aphthona nonstriata</i> (GOEZE, 1777)	88-.050-.017-.	s			
<i>Longitarsus tristis</i> WEISE, 1888	88-.051-.0401.	s			NF
<i>Neocrepidodera transversa</i> (MARSHAM, 1802)	88-.057-.002-.	mh			
<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (SCOPOLI, 1763)	88-.057-.004-.	mh			
<i>Mantura chrysanthemi</i> (KOCH, 1803)	88-.065-.001-.	mh			
<i>Mantura pallidicornis</i> (WALTL, 1839)	88-.065-.002-.	ss			
<i>Chaetocnema concinna</i> (MARSHAM, 1802)	88-.066-.003-.	ss			
<i>Chaetocnema hortensis</i> (GEOFFROY, 1785)	88-.066-.017-.	s			
<i>Chaetocnema compressa</i> (LETZNER, 1846)	88-.066-.020-.	mh			
<i>Cassida nebulosa</i> LINNÉ, 1758	88-.076-.005-.	s			
<i>Cassida vittata</i> VILLERS, 1789	88-.076-.028-.	ss			
<b>Scolytidae - Borkenkäfer</b>					
<i>Hylastes opacus</i> ERICHSON, 1836	91-.004-.002-.	ss			
<i>Pityogenes bidentatus</i> (HERBST, 1783)	91-.032-.006-.	ss			
<i>Xyleborus saxeseni</i> (RATZEBURG, 1837)	91-.036-.004-.	s			
<i>Xyleborus monographus</i> (FABRICIUS, 1792)	91-.036-.005-.	ss			
<i>Xyleborus germanus</i> (BLANDFORD, 1894)	91-.036-.008-.	s			
<b>Cimberidae - Kiefernblütenstandsrüßler</b>					
<i>Cimberis attelaboides</i> (FABRICIUS, 1787)	921.001-.001-.	s	3		
<b>Rhynchitidae - Triebstecher</b>					
<i>Lasiorrhynchites coeruleocephalus</i> (SCHALLER, 1783)	923.003-.005-.	ss			
<b>Apionidae - Spitzmausrüssler</b>					
<i>Pseudoperapion brevisrostre</i> (HERBST, 1797)	925.025-.001-.	ss			
<i>Pseudostenapion simum</i> (GERMAR, 1817)	925.026-.001-.	s			
<i>Perapion violaceum</i> (KIRBY, 1808)	925.029-.001-.	mh			
<i>Perapion marchicum</i> (HERBST, 1797)	925.029-.003-.	mh			
<i>Perapion curtirostre</i> (GERMAR, 1817)	925.029-.005-.	mh			
<i>Apion haematodes</i> Kirby, 1808	925.030-.002-.	s			
<i>Apion cruentatum</i> WALTON, 1844	925.030-.003-.	s			
<i>Apion rubiginosum</i> GRILL, 1893	925.030-.004-.	s	3		
<i>Ischnopterapion loti</i> (KIRBY, 1808)	925.034-.001-.	s			
<i>Oxystoma craccae</i> (LINNÉ, 1767)	925.042-.003-.	ss			
<b>Curculionidae - Rüsselkäfer</b>					
<i>Otiorrhynchus raucus</i> (FABRICIUS, 1777)	93-.015-.056-.	s			
<i>Otiorrhynchus rugosostriatus</i> (GOEZE, 1777)	93-.015-.060-.	ss			
<i>Otiorrhynchus ovatus</i> (LINNÉ, 1758)	93-.015-.159-.	mh			

Taxon	Identnummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Phyllobius vespertinus</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.021-.022-	ss			
<i>Romualdius scaber</i> (LINNÉ, 1758)	93-.0261.002-	s			
<i>Brachysomus setiger</i> (GYLLENHAL, 1840)	93-.035-.001-	s			
<i>Exomias mollicomus</i> (AHRENS, 1812)	93-.037-.013-	mh			
<i>Strophosoma capitatum</i> (DeGeer, 1775)	93-.040-.003-	mh			
<i>Strophosoma faber</i> (HERBST, 1785)	93-.040-.004-	s			
<i>Philopedon plagiatus</i> (SCHALLER, 1783)	93-.042-.001-	mh			
<i>Sitona lineatus</i> (LINNÉ, 1758)	93-.044-.010-	s			
<i>Sitona macularius</i> (MARSHAM, 1802)	93-.044-.019-	s			
<i>Sitona hispidulus</i> (FABRICIUS, 1777)	93-.044-.021-	s			
<i>Charagmus gressorius</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.0441.001-	s			
<i>Charagmus griseus</i> (FABRICIUS, 1775)	93-.0441.003-	s			
<i>Coniocleonus hollbergi</i> (FAHRAEUS, 1842)	93-.056-.001-	s	3		
<i>Tychius quinquepunctatus</i> (LINNÉ, 1758)	93-.104-.001-	s			
<i>Sibinia sodalis</i> GERMAR, 1824	93-.105-.001-	s			
<i>Sibinia unicolor</i> (FAHRAEUS, 1843)	93-.105-.008-	h	2		
<i>Sibinia pellucens</i> (SCOPOLI, 1772)	93-.105-.011-	ss			
<i>Sibinia subelliptica</i> (DESBRUCHERS, 1873)	93-.105-.014-	s	1		
<i>Anthonomus pedicularius</i> (LINNÉ, 1758)	93-.106-.010-	ss			
<i>Anthonomus phyllocola</i> (HERBST, 1795)	93-.106-.017-	ss			
<i>Brachonyx pineti</i> (PAYKULL, 1792)	93-.108-.001-	s			
<i>Curculio venosus</i> (GRAVENHORST, 1807)	93-.110-.002-	ss			
<i>Pissodes pini</i> (LINNÉ, 1758)	93-.111-.006-	ss			
<i>Magdalis armigera</i> (GEOFFROY, 1785)	93-.112-.008-	s			
<i>Magdalis phlegmatica</i> (HERBST, 1797)	93-.112-.012-	mh	2		
<i>Magdalis memnonia</i> (GYLLENHAL, 1837)	93-.112-.014-	s	3		
<i>Magdalis linearis</i> (GYLLENHAL, 1827)	93-.112-.015-	s	2		
<i>Magdalis duplicata</i> GERMAR, 1819	93-.112-.018-	ss			
<i>Hylobius transversovittatus</i> (GOEZE, 1777)	93-.115-.004-	ss	1		
<i>Donus tessellatus</i> (HERBST, 1795)	93-.124-.012-	s			
<i>Hypera meles</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.125-.014-	ss	3		
<i>Hypera arator</i> (LINNÉ, 1758)	93-.125-.016-	mh			
<i>Hypera miles</i> (PAYKULL, 1792)	93-.125-.019-	s			
<i>Hypera diversipunctata</i> (SCHRANK, 1798)	93-.125-.020-	s	3		
<i>Rhinoncus pericarpus</i> (LINNÉ, 1758)	93-.145-.004-	s			
<i>Rhinoncus castor</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.145-.008-	s			
<i>Amalus scortillum</i> (HERBST, 1795)	93-.152-.001-	ss			
<i>Coeliodes transversalbofasciatus</i> (GOEZE, 1777)	93-.157-.008-	ss			
<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (FABRICIUS, 1787)	93-.163-.003-	ss			
<i>Ceutorhynchus chalybaeus</i> GERMAR, 1824	93-.163-.015-	ss	1		/.
<i>Ceutorhynchus hirtulus</i> GERMAR, 1824	93-.163-.020-	ss	1		/.
<i>Ceutorhynchus picitarsis</i> GYLLENHAL, 1837	93-.163-.022-	ss			
<i>Ceutorhynchus typhae</i> (HERBST, 1795)	93-.163-.0601.	mh			
<i>Oprohynchus suturalis</i> (FABRICIUS, 1775)	93-.1633.002-	ss			
<i>Neoglocianus maculaalba</i> (HERBST, 1795)	93-.1636.001-	ss			/.
<i>Glocianus punctiger</i> (GYLLENHAL, 1837)	93-.1637.003-	s			
<i>Microplontus rugulosus</i> (HERBST, 1795)	93-.1639.001-	s			
<i>Microplontus millefolii</i> (SCHULTZE, 1897)	93-.1639.005-	s	3		
<i>Stenocarus ruficornis</i> (STEPHENS, 1831)	93-.168-.001-	ss			
<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (LINNÉ, 1758)	93-.169-.001-	s			
<i>Mecinus pyraister</i> (HERBST, 1795)	93-.173-.006-	s			
<i>Gymnetron rostellum</i> (HERBST, 1795)	93-.174-.006-	ss	2		
<i>Rhimusa tetra</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.1741.002-	mh			
<i>Rhimusa antirrhini</i> (PAYKULL, 1800)	93-.1741.004-	ss			
<i>Rhimusa linariae</i> (PANZER, 1792)	93-.1741.012-	s			



Taxon	Idennummer	Häufigkeit	RL LSA	§ BA	Bemerkungen
<i>Cionus thapsus</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.176-.013-	s			
<i>Orchestes pilosus</i> (FABRICIUS, 1781)	93-.1804.004-	ss	1		
<i>Orchestes quercus</i> (LINNÉ, 1758)	93-.1804.005-	s			
<i>Orchestes hortorum</i> (FABRICIUS, 1792)	93-.1804.007-	mh	3		
<i>Orchestes testaceus</i> (MÜLLER, 1776)	93-.1804.014-	mh	2		

Die folgenden Arten werden für das Gebiet der Binnendüne als besonders bemerkenswert gehalten:

*Dinarda hagensii* WASMANN, 1889

Der einzige Nachweis im Untersuchungsgebiet erfolgte in den Bodenfallen des Standortes 4 im August und September 2012, in diesem Zeitraum waren 18 Käfer im Material enthalten. Die Art lebt in den Nestern von *Formica ecsecta* und ist in sandigen Gebieten oft häufig.

*Trichodes alvearius* (FABRICIUS, 1792)

Ein Exemplar dieser Buntkäferart fand P. GÖRICKE am 15.5.2011 auf Doldenblüten am Fuße der Binnendüne. Die Art ist in Deutschland in Wärmegebieten weit verbreitet, aber selten. Die Larven sind an die Nester solitärer Bienen und Wespen gebunden.

*Chalcophora mariana* (LINNÉ, 1758)

Am 24.5.2012 flog ein Käfer an einen Stapel Kiefernstämmen an. Der Marienprachtkäfer ist schon wegen seiner Größe von bis zu 33 Millimetern eine imposante Erscheinung, lebt in lichten Kiefernwäldern, ist überall selten und fehlt in vielen Regionen. Er dürfte in den lichten Kiefernbeständen rund um das Untersuchungsgebiet ideale Lebensbedingungen vorfinden.

*Nephus bisignatus* (BOHEMAN, 1850)

*N. bisignatus* ist für Sachsen-Anhalt erstmals im Jahre 2006 auf der Binnendüne Gerwisch nachgewiesen worden. Seit 2011 konnten weitere Käfer in xerothermen Habitaten in der Colbitz-Letzlinger Heide und in der Umgebung von Genthin gefunden werden. Im Jahre 2012 gelang der Nachweis von zwei Käfern auch auf der Binnendüne. In der Literatur galt die Art bisher als Küstenart, ist aber mittlerweile aus vielen Regionen bis nach Baden und in die Pfalz bekannt.

*Psammodyus asper* (FABRICIUS, 1775)

Das einzige Exemplar wurde am 7.7.2011 im Bereich der Pionierassen auf dem Dünenkopf gesiebt. Die Art ist in der Roten Liste Sachsen-Anhalts als ausgestorben eingestuft, wurde aber seit 1996 mehrfach gefunden (MALCHAU 2010, RÖBNER 2012).

*Polyphylla fullo* (LINNÉ, 1758)

Vom Walker, einem unserer größten Blatthornkäfer, wurden zwei erwachsene Larven im Sand bzw. unter einem Brett gefunden. Außerdem konnten einige einzelne Flügeldecken bei den Bodensuche festgestellt werden, die Käfer waren wohl Fledermäusen zum Opfer gefallen.

*Longitarsus tristis* WEISE, 1888

Der am 2.5.2012 am Fuße der Binnendüne erfolgte Nachweis von vier Käfern wurde bereits als Neufund für Sachsen-Anhalt publiziert (JUNG 2014).

*L. tristis* lebt an Helmkraut (*Scutellaria*) und wurde in Deutschland bisher nur in den Regionen Ne, SH, MV nachgewiesen.

*Chaetocnema compressa* (LETZNER, 1846)

*Ch. compressa* wird im Untersuchungsgebiet regelmäßig, aber nur in Einzelexemplaren gefunden. Die Art lebt wahrscheinlich analog *Chaetocnema procerula* (ROSENHAUER, 1856) an *Carex*-Arten.

Sie wurde in Bodenfallen des Landesamtes für Umweltschutz und vom Verfasser durch Abklopfen der Vegetation in zahlreichen trockenen Sandgebieten in Elbnähe und in der Colbitz-Letzinger Heide nachgewiesen.

*Sibinia unicolor* (FAHRAEUS, 1843)

*S. unicolor* ist im Untersuchungsgebiet auf *Gypsophila* sp. zwar sehr häufig (JUNG 2012), trotzdem besteht durch die Kleinflächigkeit des gesamten Areals ein hohes Gefährdungspotenzial für den Bestand.

In Sachsen-Anhalt wurde die Art erstmals in den Jahren 1994 bis 1998 durch Untersuchungen des Landesamtes für Umweltschutz in Trockenrasengebieten und in Zwergstrauchheiden bei Arneburg, Lkr. Stendal sowie bei Wimmelburg und Questenberg, Lkr. Mansfeld-Südharz gefunden. In Deutschland erfolgten außerdem sporadische Nachweise überwiegend in der Osthälfte (Br, Th und Sn), weiterhin in By und der Region Hn.

*Hylobius transversovittatus* (GOEZE, 1777)

*H. transversovittatus* ist die einzige nicht an Koniferen gebundene mitteleuropäische Art. Sie lebt monophag am Blutweiderich (*Lythrum salicaria*) und ist damit an diese Habitate gebunden. Die Art ist in ganz Deutschland heimisch, allerdings meist nur sporadisch anzutreffen.

*Ceutorhynchus chalybaeus* GERMAR, 1824

Der einzige Käfer wurde am 24.5.2012 auf einer Ruderalfläche gekeschert. Die Art lebt an Hellerkraut (*Thlaspi arvense*), das im UG nur auf dieser Fläche festgestellt wurde.

*Ceutorhynchus hirtulus* GERMAR, 1824

Auch von dieser Art konnte nur ein Käfer nachgewiesen werden, am 15.5.2011 kescherte P. GÖRICKE das Tier aus der Vegetation. Die Art lebt an verschiedenen Kreuzblütengewächsen (Brassicaceae) und dürfte zusammen mit voriger nicht zum Arteninventar der Binnendüne zu gehören.

*Orchestes pilosus* (FABRICIUS, 1781)

Die Art lebt an Eichen in xerothermen Gebieten, der einzige Nachweis im Untersuchungsgebiet erfolgte durch Abklopfen des elbseitigen Gehölzsaumes. *O. pilosus* ist in der Roten Liste Sachsen-Anhalts zwar in Kategorie 1 eingestuft, allerdings liegen mittlerweile mehrere Nachweise vor (u.a. aus der Colbitz-Letzinger Heide und dem Ziegelrodaer Forst)

## Literatur

- BUNAT, Büro für Umweltberatung und Naturschutz Dr. Werner Malchau (2013): Erhaltung und Teilrenaturierung der Binnendüne Aken im Biosphärenreservat Mittelelbe. - Unveröff. Gutachten im Auftrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Schönebeck, 85 S. + Anlagen.
- JUNG, M. (2012): Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt V. - Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 56: 155-157.

- JUNG, M. (2014): Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt VI. - Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 58: 161-165.
- LAU - LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (2004): Rote Listen Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39, 429 S.
- MALCHAU, W. (2010): Wiederfund von *Psammodyus asper* (F., 1775) in Sachsen-Anhalt (Col., Scarabaeidae). - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 18(1): 30-31.
- RÖBNER, E. (2012): Die Hirschkäfer und Blatthornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). - Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V. - Erfurt, 508 S.

Anschrift des Verfassers:

Manfred Jung  
Hauptstraße 26a  
38822 Athenstedt

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [23 2015](#)

Autor(en)/Author(s): Jung Manfred

Artikel/Article: [Die Käferfauna der Binnendüne Aken \(Coleoptera\) 73-83](#)