Nouveaux Coléoptères du Musée zoologique de Hamburg.

Par **M. Pic.**

Les coléoptères décrits ci-dessous (un Anobiide et six Dermestides) appartiennent au Zoologisches Staatsinstitnt und Zoologisches Museum, Hamburg, mais je possède aussi en Co-Types *Cryptorhopalum Nevermanni* et *submetallicum.* Ils proviennent la plupart des recoltes de F. Nevermann à Costa-Rica.

Eucnocerus ater n. sp. Oblongus, nitidus, griseoluteo pubescens et fulvo hirsutus, niger, antennis ad basin pedibusque rufescentibus.

Oblong, un peu rétréci aux extrémités, peu convexe orné en dessus de poils gris jaunâtres ou fauves, en partie soulevés, en dessous de poils jaunes couchés, noir avec la base des antennes et les pattes roussatres. Tête densément et ruguleusement ponctuée, antennes courtes, à 2e article court et large, à 3e etroit et court, 4ème peu alongé, 5e et suivants serratulés; prothorax court et large, très retréci en avant, à lobe postérieur médian peu prononcé, rebordé et cilié sur les côtes, à punctuation ruguleuse sur les côtes, assez fine et écartée sur le milieu; ècusson subtriangulaire, grand; élytres de la longueur du prothorax, peu longs, attenués postérieurement, subarrondis à l'apex, ciliés sur les côtes, à punctuation assez fine, irrégulière et espasée. Long 5 mill. Distinct, à première vue, des espèces connues par la coloration uniforme noire du dessus du corps, diffère, en outre, de *C. dispar* Sharp. par la structure des antennes, notamment par le 5e article denté.

Cryptorhopalum atrum n. sp. Oblongum, postice atenuatum, nitidum, griseo pubescens, nigrum, membris rufis, clava antennarum longissima, articulo ultimo breve, thorace antice paulo inciso.

Oblong, atténué postérieurement, peu convexe, brillant, orné de poils gris et de quelques poils obscurs soulevés, noir avec les membres roux. Tête à ponctuation peu dense; massue des antennes pas très large et très longue, de deux articles, le premier très long, le dernier court; prothorax court et large, rétréci en avant, subsinué sur les côtes, à punctation fine, bien plus écartée au milieu que sur les côtes, à lobe postérieur pro-

noncé et tronqué au sommet; écusson grand, triangulaire; élytres à peine plus larges que le prothorax, assez longs, attenués postérieurement, subarrondis à l'apex, à épaules marquées, peu impressionnés vers la suture postérieurement, à ponctuation fine, un peu écartée. Long 3 mill. Par la structure de la massue des antennes voisin de *Cr. pedestre* Sharp. dont il se distingue nettement par la coloration générale noire du dessus du corps.

Cryptorhopalum Nevermanni n. sp. Oblongo subovatum, antice et postice attenuatum, nitidum, griseo aut luteo, pro parte fusco pilosum, nigrum, membris rufis, clava antennarum parum elongata, articulo ultimo precedente paulo breviore.

Oblong, subovalaire, attenué aux deux extrémités, un peu plus postérieurement, peu convexe, orné de poils clairs et obscurs non rapprochés, noir avez les membres roux. Tëte à ponctuation assez fine et assez écartée, masue des antennes assez courte les deux articles à peu près égaux; prothorax court et large, rétréci en avant, rebordé sur les côtés, à lobe postérieur médian prononcé, subarqué au sommet, à ponctation fine et rapprochée, écusson petit; élytres peu plus larges que le prothorax, à épaules marquées, assez courts, attenués postérieurement, subarrondis à l'apex, un peu impressionés sur la suture postérieurement, à ponctuation écartée, peu plus forte que celle du prothorax. Long 2·3—2·5 mill. Très distinct de *C. Biolleyi* Pic, par la forme moins allongée, le revètement pubescent moins dense et moins clair.

Cryptorhopalum submetallicum n. sp. Subovatum, postice attenuatum, nitidum, griseoluteo pilosum, nigrum vage olivaceum, membris rufis, clava antennarum parum elongata, articulo ultimo precedente fere aequale.

Subovalaire, atténué postérieurement, un peu convexe, orné de poils clairs plus ou moins couchés, non rapprochés, noir, un peu olivatre métallique, membres roux. Tëte à ponctuation écartée; massue des antennes assez grosse et peu alongée avec le dernier article un peu plus court que le précédent; prothorax court et large, rétréci en avant, rebordé sur les côtes, à lobe prostérieur médian prononcé, subarqué au sommet, à ponctuation fine, plus ou moins écartée, écusson petit; élytres à épaules marquées, assez courts, très attenués postérieurement, subarrondis à l'apex, à ponctuation écartée, plus forte que celle du prothorax. Long 3 mill.

Peut se placer près de *C. cyphonoides* Sharp. dont il se distingue, à première vue, par le revëtement pubescent moins net et moins rapproché, le dessus du corps à reflets métalliques.

Pseudodorcatoma hirsuta n. sp. Oblongo-subovata, antice attenuata, subconvexa, nitida, proparte rude griseo pubescens, breve hirsuta, nigropicea, antennis pro parte, capite pedibusque rufis.

Oblong-subovalaire, attenué en avant, un peu convexe, brillant, orné d'une pubescence rude et courte formant, sur les côtés et à l'extremité des élytres, des macules ou courtes facies grises nettes, noir de poix, élytres un peu rembrunis avec parties des antennes, tête et pattes rousses; tête rousse, grande et grosse avec les yeux noirs, entíes, assez petits et saillants, antennes rousses, à trois derniers articles en partie foncés, 1er article grand et gros, 2ème subglobuleux, suivants diversement petits, les deux-avants derniers élargis et longs, terminal plus long que les précédents; prothorax assez court et large, subarqué sur les côtes, bombé au milieu, à ponctation granuleuse; écusson petit; élytres de la largeur du prothorax, courts, subarrondis à l'apex, assez convexes, comprimés sur les côtés, épaules marquées, à ponctation granuleuse assez fine avec des dessins pubescents nets; pattes grêles. Long 2 mill.

Espèce distincte, à premiere vue, des espèces connues du genre par la pubescence plus rude, en partie soulevée en dessus.

Attagenus diversepubescens n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, non regulariter in élytris, inhirsutus, rufo-brunneus, pro parte piceus, antennis ad basin pedibusque testaceis, élytris rufocastaneis; capite parum fortiter et dense punctato, clava antennarum triarticulata, articulo ultimo longissimo, cultriforme; thorace breve et lato, antice attenuato, sat fortiter et dense punctato; élytris thorace non latioribus, elongatis, lateraliter subsinuatis, postice attenuatis, sat minute, et sparse punctatis, pro parte sublineato griseo pubescentibus; infra corpore regulariter griseo pubescente. Long 6 mill.

Importé à Dresden.

Espèce caractérisée par sa coloration plutôt claire jointe à une forme allongée et le revêtemant des élytres non disposé de façon continue, laissant des parties glabres. — Peut se placer près de *A. molitor* Reitt.

Globicornis (Hadrotoma) boliviana n. sp. Oblonga, parum nitida, griseo pubescens aut fusco hirsuta, nigra, antennis ad basin pedibusque testaceis, élytris nigris, antice testaceo maculatis, sutura nigra; capite minute et dense punctato, opaco; antennis parum brevibus, validis, ad basin gracilioribus, articulo ultimo breve; thorace breve et lato, antice attenuato, medio convexo, lateraliter postice late deplanato, minute non dense punctato; élytris thorace non latioribus, sat brevibus, postice attenuatis, sat minute et sparse punctatis, ad basin paulo impressis. Long 2 mill.

Bolivie, Prov. La Paz.

Ressemble par sa coloration à *G. argentina* Pic, plus petit, moins large, prothorax de structure différente deprimé latéralement, antennes moins courtes, etc.

Quelques observations sur les Coléoptères Nilionidae

par **M. Pic.**

L'étude synoptique de Mader sur les Nilionides qui vient de paraître (Ent. Nachricht. X. 1936 p. 73 a 102) a attiré mon attention sur cette famills d'Heteromères (à faciès de *Coccinellidae* et m'a fait revoir des insectes dont je ne m'étais plus occupé depuis un certain nombre d'années, me contentant d'ajouter à ma collection quelques éléments nouveaux sans les classer.

Mader, après m'avoir gracieusement qualifié d'entomologiste génial, se plait à me critiquer beaucoup en détails et raille mes descriptions en séries. C'est d'alleurs le propre des auteurs de penser que ce qu'ils produisent vaut toujours mieux que ce que font les autres. Cependant Mader dans la critique me semble commettre des erreurs sérieuses dues à des inexactitudes, ce qui attenue le mérite de son oeuvre personelle. Je relève une double observation qui peut me suffire comme riposte. Dans son synopsis (p. 81 a 82) Mader établit la division (13/18) ainsi défini: „Une bordure suturale claire nettenant détachée sur les élytres."

Or, dans cette division, l'auteur introduit le *N. pilosus* Cast. décrit comme ayant les élytres noirs bordées de clair latéralement, donc sans bordure suturale claire. Et, dans la

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)

Jahr/Year: 1934-1936

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: Nouveaux Coléoptères du Musée zoologique de Hamburg. 193-196