

Bestimmungstabelle der Brenthidæ.

Von **R. Kleine**, Stettin.

(Fortsetzung).

Heteroblysmia Kleine.

1. Zweifarbige Arten **2**
- Einfarbige Arten, der Prothorax in derselben Farbe wie die übrigen Körperteile **3**
2. Violettbraun, nur der Prothorax ist ziegelrot, Metasternum und Abdomen breit gefurcht **electa** Kln.
- Hellkastanienbraun, Elytren schwarz, Metasternum schmal gefurcht, Abdomen abgeflacht, nicht gefurcht
formidolosa Kln.
3. Prothorax glatt, ohne rugosen Fleck auf der Mitte **4**
- Prothorax mit rugosem Fleck **5**
4. Körper unbehaart **borneensis** Kln.
- Körper stark behaart **condensa** Kln.
5. Metarostrum in der Mitte gefurcht **accurata** Kln.
- Metarostrum dreifurchig **6**
6. Kopf gefurcht, Prothorax im Basalteil zart gefurcht, Metatarsus aller Beine verlängert **fusca** Calabr.
- Kopf und Prothorax ungefurcht, Metatarsus kurz **7**
7. Rüssel und Prothorax mehr oder weniger schwarz, Elytren mit vier Schmuckbinden **vittata** Calabr.
- Rüssel und Prothorax nicht schwarz, Schmuckzeichnung über alle Rippen verbreitet **cava** Kln.

Rhaphirhynchus Schoenherr.

1. Rotbraune, schwarzbraune, seltener schwarze Arten, immer matt, selten schwach glänzend, von der Gestalt eines **Arrhenodes** **2**
- Metallisch in verschiedener Abstufung, Prothorax hochglänzend, wenigstens mit schwachem Glanz, von der Gestalt eines **Belopherus** **14**
2. Metarostrum glatt, gegen das Mesorostrum zart gefurcht, Prothorax mit sechs schwarzen Längsstreifen
sexvittatus Senna
- Metarostrum gefurcht, Prothorax nicht mit schwarzen Längsstreifen, höchstens seitlich schwarz **3**

3. 1. Fühlerglied unterseits gedorn **4**
 — 1. Fühlerglied ungedorn **8**
4. Schwarze Arten **5**
 — Rotbraune Arten **7**
5. Metarostrum zart gefurcht, Prothorax mit rotbrauner Mittel-
 linie **amazonicus** Senna
 — Metarostrum breit gefurcht, Prothorax schwarz **6**
6. Die auf der Oberseite liegenden Rippen breit, tiefe Gitterung
 in den Furchen nur an den Seiten **longulus** Sharp
 — Alle Rippen schmal, convex, mit Ausnahme der Sutural-
 furche sind alle Rippen tief und breit gegittert
fecundus Kln.
7. Schmuckzeichnung auf den Elytren auf der 3.—8. Rippe
 eine Basalbinde bildend **cocoensis** Calabr.
 — An der Basis ist nur auf der 3. Rippe eine längere Linie,
 auf der 5. ein basaler Punkt, sonst ist die Basis ohne jede
 Schmuckzeichnung **amplicollis** Senna
8. Elytren seitlich grob gitterfurchig, Gitterung rundlich,
 Rippen schmal **insculptus** Senna
 — Elytren seitlich punkstreifig oder mit punktierten Furchen **9**
9. Schwarze Arten **10**
 — Rotbraune Arten **11**
10. Elytren hinten einzeln ausgerandet, Außenecken verlängert
scobinirostris Gyll.
 — Elytren hinten gerade, Außenecken nicht verlängert
filicornis Sharp
11. Elytren neben der Sutura tief gefurcht, seitlich rugos ge-
 gittert, Unterseite des Körpers schwarz glänzend
signifer Bohem.
 — Elytren neben der Sutura flach gefurcht, seitlich flach
 punktiert, Körper auf der Unterseite rotbraun **12**
12. Kopf breiter als lang, 1. und 2. Abdominalsegment nicht
 gefurcht **vicinus** Senna
 — Kopf etwas länger als breit, 1. und 2. Abdominalsegment
 gefurcht **13**
13. Metasternum und Abdomen breit gefurcht, nur der Pro-
 thorax ist matt **excellens** Kln.
 — Metasternum nur an der Basis flach eingedrückt, 1. und
 2. Abdominalsegment flach gefurcht, das ganze Tier ist matt
obenbergeri Kln.

14. Elytren seitlich gitterfurchig, Rippen convex
nitidicollis Gyll.
 — Elytren neben der Sutura mehr oder weniger flach gerippt,
 an den Seiten in den Reihen zart punktiert **15**
15. Neben der Sutura sind noch zwei flache Rippen vorhanden **16**
 — Es sind mehr als zwei flache Rippen vorhanden . . . **18**
16. Oberseite des Prothorax matt **deceptor** Sharp
 — Oberseite des Prothorax wie das ganze Tier glänzend . **17**
17. 1. und 2. Abdominalsegment nicht gefurcht **severini** Senna
 — Abdominalsegmente kräftig längsgefurcht **auricollis** Senna
18. Seitliche Rippen zart und fein punktiert **19**
 — Die Punktierung ist tief und kräftig **24**
19. Metatarsus der Vorderbeine länger als das 1. u. 2. Glied **20**
 — Metatarsus nicht länger **21**
20. Kleine, circa 11 mm lange grünmetallische Art
politus Senna
 — Große, circa 27 mm lange Art, schwarzmetallisch, Elytren
 schwarz **principalis** Sharp
21. Stark glänzende Art **rothschildi** Senna
 — Matte oder wenig glänzende Arten **22**
22. 3. Rippe auf den Elytren mit kurzen Streifen, Schmuck-
 zeichnung in einer ante- und postmedianen Binde angelegt
excelsus Kln.
 — 3. Rippe ohne Schmuckstreifen **23**
23. 4. Rippe mit langem Schmuckstreifen von der Spitze bis
 zur Mitte, 5. desgleichen von der Basis bis zur Mitte
obscurus Sharp
 — 4. Rippe mit langem, an der Basis beginnenden Streifen,
 5. nur mit Basalpunkt **variabilis** Senna
24. Hintere Außenecken der Elytren immer mehr oder weniger
 deutlich gedornt **25**
 — Nicht gedornt, zuweilen stumpf vorgezogen **27**
25. Oberseite des Körpers schwarzmetallisch, Unterseite erz-
 braun, basales Fühlerglied braun . . . **mexicanus** Sharp
 — Der ganze Körper schwarzmetallisch **26**
26. 3. Elytrenrippe mit ganz durchgehendem Schmuckstreifen,
 der nur auf der Mitte mehr oder weniger unterbrochen ist,
 4.—8. Rippe höchstens mit kleinen Streifen oder Punkten
chiriquensis Sharp

- 3. Rippe mit 2 Streifen, basal kurz, median bis zum Ab-
sturz, 7. Rippe kurz postmedian, 8. durchgehend
panamanensis Senna
27. Elytren neben der Sutura mit drei Furchen **28**
— Mit vier Furchen **29**
28. Elytren und Beine braunmetallisch glänzend
consanguineus Senna
— Das ganze Tier schwarzmetallisch **sennai** Sharp
29. Körper schwarzbraun, Unterseite rotbraun, Metallglanz ge-
ring **30**
— Der ganze Körper schwarzmetallisch **31**
30. Schmuckzeichnung in langen Streifen angelegt
linearis Senna
— Schmuckzeichnung in 11—12 kurzen Streifen
favorabilis Kln.
31. Kopf und Prothorax kupferfarbig, Suturfurche unpunktiert
anomalus Sharp
— Kopf und Prothorax matt, Suturfurche punktiert
jansoni Sharp

Ananesiotes Kleine.

Nur eine Art **insularis** Kln.

Abrentodes Sharp.

1. Elytren regulär gerippt-gefurcht **2**
— Elytren nur auf der Oberseite mit 2—4 Furchen **3**
2. Rippen breit, Punktierung in den Furchen undeutlich
sulcipennis Sharp
— Rippen schmal, Punktierung tief **robustus** Sharp
3. Schmuckzeichnung auf den Elytren aus einzelnen langen
Streifen bestehend **breviceps** Sharp
— Schmuckzeichnung aus vielen kurzen Streifen bestehend . **4**
4. Prothorax hochglänzend, Elytren mit zwei unpunktierten
Furchen **auratus** Sharp
— Prothorax dunkelmetallisch, Elytren mit 4 unpunktierten
Furchen **pusillus** Sharp

Apocemus Calabresi.

Einfarbige, rotbraune Art **conciliator** Kirsch
Zweifarbige Art, blauschwarz mit rotem Prothorax
ignobilis Kln

Teraticorrhynchus Kleine.

Metarostrum auf der Oberseite mit dornigen Rändern, Elytren nicht gitterfurchig, sondern punktstreifig **serratus** Kln.

Metarostrum glatt, Elytren gitterfurchig . . **defectus** Kln.

Allacompsus Kleine.

Nur eine Art **separator** Kln.

Rhaphirhynchidus Kleine.

Nur eine Art **excitatus** Kln.

Pseudobelopherus Calabresi.

Elytren am Hinterrand gedorn, Metasternum und Abdomen stark gefurcht, violettbraun **deductus** Kln.

Elytren nur mit kleinem spitzen Zahn, Metasternum und Abdomen zart und schmal gefurcht, rotbraun

orientalis Calab.

Belopherus Schoenherr.

1. Prothorax an den Seiten gedorn **2**

— Nicht gedorn **3**

2. Prothorax mit einem seitlichen großen Dorn **maculatus** Ol.

— Mit mehreren kleinen Dornen besetzt **spinus** Gyll.

3. Elytren nur mit Sutura, sonst ohne Rippen und Furchen

simplicicollis Suffr.

— Elytren immer mehr oder weniger deutlich, zuweilen stark punktiert **4**

4. Kopf verlängert, walzig **5**

— Kopf kürzer, fast quadratisch **6**

5. Prothorax, Kopf und Rüssel glatt **nasutus** Fabr.

— Prothorax, Kopf und Rüssel rugos, warzig skulptiert

eximus Kln.

6. Metarostrum kantig, rau, Prothorax über den Hüften nur wenig warzig skulptiert, Hinterrand mit Querfurchen

strigicollis Lacord.

— Metarostrum rund, glatt, Prothorax über den Hüften deutlich warzig erhaben, Hinterrand ohne Furchen

schoenherri Mannerh.

Elytracantha Kleine.

1. Rüssel unterseits nicht behaart, Kopf am Hinterrand tief eingebuchtet, Prothorax nicht runzelig skulptiert, einzeln, grob punktiert, kleine Art **contraria** Kln.

- Rüssel behaart, Kopf gerade, Prothorax gerunzelt, große Arten **2**
2. Metarostrum tief gefurcht, unterseits kurz behaart, 2. Fühlerglied knopfförmig **pogonocerus** Montrz.
- Metarostrum flach gefurcht, unterseits lang behaart, 2. Fühlerglied doppelt so lang wie breit **cerberus** Kln.

Heterorhynchus Calabresi.

Nur eine Art **ornatus** Calabr.

Anepsiotes Kleine.

1. Rippen und Furchen auf den Elytren nur auf der Oberseite vorhanden **2**
- Auf den ganzen Elytren vorhanden **3**
2. Prothorax unbehaart, Elytren außer der üblichen Schmuckzeichnung noch mit postmedianer, schwarzer Makel
kleinei Calabr.
- Prothorax an der Basis behaart, Elytren ohne schwarze Makel **elegans** Calabr.
3. Kopf breiter als lang, Prothorax an den Seiten mit schwarzen Makeln **luzonicus** Calabr.
- Kopf quadratisch, ohne schwarze Makeln **4**
4. Prothorax und Elytren oder eines der beiden Organe behaart **commendabilis** Kln.
- Keine Behaarung **5**
5. Seiten und Unterseite des Metarostrums grob, grubig skulptiert **bellus** Kln.
- Nicht grob skulptiert **6**
6. Prothorax hochglänzend, Prorostrum mit je zwei seitlichen Dornen **nitidicollis** Calabr.
- Prothorax matt, Prorostrum mit kurzen Zähnen auf den Oberkanten **schenklingi** Kln.

7. **Eutrachelini.**

Eutrachelus Berthold.

Schwarze Art, Schmuckzeichnung auf den Elytren stark reduziert **morio** Kln.

Braune Art, Schmuckzeichnung viel stärker entwickelt
temmincki Latr.

8. **Tychaeini.****Tychaeus** Fisch. Waldh.

Nur eine Art **myrmecophagus** Hbst.

9. **Ithystenini.****Cediocera** Pascoe.

Braun, namentlich die Elytren braunstreifig, Kopf kaum punktiert **longicornis** Pasc.

Schwarz, Kopf kräftig punktiert **tristis** Senna

Teramocerus Schoenherr.

1. Elytren tief punktstreifig **gracilis** Boh.

— Elytren nur schwach punktstreifig **2**

2. Oberseite violettblau, Unterseite grünlichglänzend
pulchellus Perr.

— Rotbraune, braunmetallische oder grünlichglänzende Arten **3**

— Pechschwarze, nicht metallische Arten **6**

3. Grünmetallisch, glänzend, nicht spangrün . . **belti** Sharp

— Braunmetallische Arten **4**

4. Unterseite des Rüssels nicht pubescent . **obscurus** Perr.

— Unterseite pubescent **5**

5. Prosternum mit dichtliegenden Querfurchen, 1. und 2. Abdominalsegment tief und breit gefurcht . . . **elutus** Kln.

— Prosternum nicht querfurchig, 1. und 2. Abdominalsegment nicht tief und breit gefurcht **janthinus** Boh.

6. Elytren an den hinteren Außenecken spitz gedorn
mannerheimi Boh.

— Elytren nicht gedorn **punctirostris** Boh.

Proteramocerus Kleine.

1. Arten ohne Metallglanz **2**

— Arten mit Metallglanz **8**

2. Hintere Außenecken der Elytren gerundet, nicht gedorn **3**

— Hintere Außenecken gedorn oder stumpfspitzig . . . **4**

3. Elytren ohne Makel, Sutura schwarz . . . **laevis** Germar

— Elytren mit Makel, Sutura nicht schwarz . . . **fidus** Kln.

4. Grundfarbe rotbraun **badius** Boh.

— Grundfarbe schwarz oder dunkelmetallisch, nicht metallisch glänzend oder grün schillernd **5**

5. Die neben der Sutura liegende 2. Rippe an der Basis nicht verloschen, sondern durchgehend . . . **acutipennis** Boh.
— 2. Rippe an der Basis verloschen **6**
6. Fühler und Tarsen gelblich **filum** Sharp
— Fühler und Tarsen schwarz **7**
7. Rüssel länger als Kopf und Prothorax zusammen, Kopf lang, am ganzen Körper glänzend **chalcites** Perty
— Rüssel so lang wie Kopf und Prothorax zusammen, Kopf kurz, Körperoberseite matt **opacus** Perty
8. Der Metallglanz ist nicht sehr intensiv und nicht spangrün, er ist aber auf der ganzen Oberseite, zum Teil auch unterseits zu finden, alle Körperteile sind hochglänzend . . . **9**
— Der Metallglanz ist immer spangrün, brillierend, die nichtmetallischen Teile der Oberseite sind matt oder schwach glänzend **10**
9. Sutura und Thoracalfurche von gleicher Farbe wie der andere Oberkörper **micans** Kln.
— Hellrotbraune Art, Elytren mit Ausnahme des Absturzes violettblau, Glanz mäßig **eminens** Kln.
10. Grundfarbe braun, matt, Metallglanz spangrün, nur auf den Elytren **11**
— Metallglanz auf Elytren und Prothorax **12**
11. Kopf quer gerunzelt, Kopf und Metarostrum seitlich und unterseits einzeln punktiert, Elytren gitterfurchig
chontalensis Sharp
— Kopf nicht quengerunzelt, Kopf und Metarostrum seitlich und unterseits kräftig punktiert, Elytren nicht gitterfurchig
enervatus Kln.
12. Prothorax am Halse mit tiefen, groben Querrunzeln, Elytrenanhänge nach unten gekrümmt **emendatus** Kln.
— Prothorax nicht quengerunzelt, Anhänge der Elytren nicht nach unten gebogen **nitidus** Kln.

Hovasius Senna.

Nur eine Art **alluaudi** Senna

Pseudophocylides Kleine.

Schwärzlich, 3. Elytrenrippe ohne rote Streifen, Elytrenanhänge horizontal stehend **insularis** Kln.

Grünmetallisch, 3. Rippe an der Basis rot, Elytrenanhänge
vertical stehend **clarus** Kln.

Phocylides Pascoe.

1. Einfarbig schwarze Arten **2**
— Andersgefärbte Arten **3**
2. Hinterrand des Kopfes ausgehöhlt, Anhänge der Elytren
lang **collaris** Pasc.
— Hinterrand kaum eingedrückt, Elytrenanhänge kurz
ebenius Pasc.
3. Einfarbig kastanienbraune Art . . **pascoei** W. S. Macleay
— Prothorax, Kopf, Prorostrium und die Elytrenanhänge
zinnoberrot, sonst schwarz oder schwarzbraun **bicolor** Guér.

Plesiophocylides Kleine.

Nur eine Art **conditus** Kln.

Tinoteramocerus Kleine.

Nur eine Art **enormis** Kln.

Ozodecerus Chevrolat.

1. Metallische Arten **2**
— Schwarze Arten **3**
2. Elytren am Absturz zweispitzig . . . **forficulatus** Chevrl.
— Elytren dreispitzig **tricuspidatus** Chevrl.
3. Große Art, Prothorax rugos punktiert **rugicollis** Chevrl.
— Kleine Art, Prothorax nicht rugos punktiert **pygmaeus** Senna

Homales Kolbe.

Schwarz, matt, Stirn und Metarostrium zart gefurcht
glaber Kolbe
Metallisch glänzend, Stirn und Metarostrium nicht gefurcht
metallicus Kolbe

Bulbogaster Lacordaire.

Kupfrigmetallische Art, Elytren nur mit einer durchgehenden
Furche **ctenostomoides** Lacord.
Grünmetallische Art, Elytren zweifurchig
hebridarum Fairm.

Mesetia Blackburn.

Nur eine Art **amoena** Blackb.

Ithystenus Pascoe.

1. Paramerenlamellen an der Spitze unbehaart . . . Gruppe **5**
- Paramerenlamellen an der Spitze immer behaart . . . **2**
2. Parameren hinter den Lamellen nicht taillenförmig erweitert
Gruppe **1**
- Parameren taillenförmig erweitert **3**
3. Lamellen bis zur Taille gespalten Gruppe **2**
- Lamellen nicht bis zur Taille gespalten **4**
4. Lamellen an der Basis verwachsen Gruppe **3**
- Lamellen nicht lang verwachsen, sondern einen kurzen
Zusammenhang lassend, breit klaffend Gruppe **4**

Gruppe 1.

1. Elytrenanhänge sehr lang **mülleri** Kln.
- Elytrenanhänge kurz **2**
2. Hinterschenkel über die Elytren hinausragend **3**
- Hinterschenkel nicht über die Elytren hinausragend . . . **6**
3. Schmuckstreifen auf den Elytren nur an der Basis deutlich
spinosus Kln.
- Schmuckstreifen auf der ganzen 2. Rippe deutlich . . . **4**
4. Stark metallisch irisierende Art, Elytren bräunlich-grünlich,
Elytrentorne stumpflich **françoisi** Desbr.
- Schwarze Arten, Elytrentorne spitz **5**
5. Prothorax dunkelrotbraun **hebridarum** Senna
- Prothorax tiefschwarz **unicolor** Kln.
6. Grünmetallische Art, Schmuckstreifen gelb **hollandiae** Bsd.
- Schwärzliche Arten mit dunklen Schmuckstreifen . . . **7**
7. Elytrentorne gerade **frontalis** Pasc.
- Elytrentorne gekrümmt **curvidens** Montrz.

Gruppe 2.

1. Elytrenanhänge kurz **2**
- Elytrenanhänge lang **6**
2. Elytrenanhänge dreieckig **3**
- Elytrenanhänge von anderer Gestalt **5**
3. Rüssel unterseits behaart **barbirostris** Kln.
- Rüssel unbehaart **4**

4. Grundfarbe schwarz, matt, Stirn ungefurcht, Metarostrum
schmal oder garnicht gefurcht, Prothorax am Halse gerif-
felt, 2. Abdominalsegment gefurcht . . . **ophiopsis** Pasc.
— Grundfarbe metallisch-grün, glänzend, Stirn gefurcht, Meta-
rostrum breit und flach gefurcht, Prothorax am Halse nicht
geriffelt, 2. Abdominalsegment nicht gefurcht **franklini** Kln.
5. Elytrenanhänge dornig, spitz . . . **franklin-mülleri** Kln.
— Elytrenanhänge an der Basis gedreht **fervus** Kln.
6. Rotbraune Arten 7
— Schwarze, wenigstens dunkle Arten 8
7. Elytrenanhänge rundlich-walzig, Elytren am Absturz verengt
. **nigrosulcatus** Fairm.
— Elytrenanhänge kantig, Elytren parallel
. **densepunctatus** Kln.
8. Prothorax rot, Elytren schwarz **bicolor** Guér.
— Prothorax und Elytren schwarz 9
9. Elytren ohne Schmuckstreifen 10
— Elytren mit Schmuckstreifen 11
10. Mehr oder weniger glänzende Art, Kopf grubig skulptiert,
Elytrenanhänge nicht kantig, flach gebogen . **similis** Kln.
— Matte Art, Kopf an der Mittelfurche querrunzelig, Elytren-
dorne eckig-kantig **fumosus** Pasc.
11. Elytrenanhänge gedreht **cultellatus** Kln.
— Elytrenanhänge nicht gedreht 12
12. Elytrenanhänge etwa 6—7 mal so lang wie an der Basis breit,
kantig, an der Spitze nicht knotig verdickt . **sabulosus** Kln.
— Elytrenanhänge höchstens 4 mal so lang wie an der Basis
breit, flach nach außen gebogen, an der Spitze wieder
einander zugewandt, nicht kantig, an der Spitze knotig ver-
dickt **forficulatus** Kln.

Gruppe 3.

1. Elytrenanhänge lang 2
— Elytrenanhänge kurz 4
2. Elytrenanhänge an der Basis gedreht **appendiculatus** Kln.
— Elytrenanhänge an der Basis nicht gedreht 3
3. Elytrenanhänge breit, blattartig, Scheitel ungefurcht
. **alatus** Kln.
— Elytrenanhänge schmal, keilförmig, Scheitel gefurcht
. **caudatus** Kln.

4. Beine lang, Hinterschenkel weit über die Elytren hinausragend **perlongus** Kln.
- Beine normal, Hinterschenkel wenig oder garnicht über die Elytren hinausragend **5**
5. Schmuckstreifen nur an der Basis . . . **linearis** Pasc.
- Schmuckstreifen durchgehend **6**
6. Schmuckstreifen nur an der 2. Rippe **7**
- Schmuckstreifen auf der 1. und 2. Rippe **9**
7. Allgemeine Skulptur sehr stark, selbst auf die Elytrenanhänge übergehend **punctifrons** Kln.
- Allgemeine Skulptur schwach **8**
8. Elytren beim ♂ ansehnlich bedornt, Kopf schwach gefurcht, mit matter, oft filziger Partie **wallacei** Pasc.
- Elytren beim ♂ mit kleinen, scharfen Ecken, Kopf kräftig gefurcht, keine matte, filzige Partie . **angustatus** Guér.
9. Schwarz, Schmuckzeichnung orange . . . **bistriatus** Kln.
- Stahlblau, Schmuckzeichnung schwefelgelb **10**
10. Kopf mit flacher Mittelfurche, neben der Furche ohne braune Partie, Metarostum ohne warzige Skulptur
cyaneiventris Kln.
- Kopf tief gerinnt, neben der Mittelfurche mit brauner Partie, Metarostum mit starken Warzen . . . **diversicolor** Kln.

Gruppe 4.

- Nur eine Art **decorus** Kln.

Gruppe 5.

1. Metallisch glänzend, Anhänge der Elytren groß, flach
rugosipunctatus Kln.
- Ohne Metallglanz, Elytrenanhänge kürzer, dornig . . . **2**
2. Parameren mit starker Taille, Lamellen lang, fingerförmig, in der Mitte sich nicht berührend . . . **confluens** Kln.
- Parameren ohne Taille, Lamellen kurz, stumpf-messerspitzig, sich in der Mitte nicht berührend . . . **adoptivus** Kln.

Achrionota Pascoe.

1. Am ganzen Körper in der Punktierung schuppig behaart
bilineata Pasc.
- In der Punktierung nicht behaart **2**

- Pronotum nicht gefurcht, Metarostrum spärlich squamos oder kurz behaart **6**
6. Basales Fühlerglied höchstens mäßig verlängert und an der Spitze niemals nodos verdickt **7**
- Basales Fühlerglied immer lang, schlank, an der Spitze nodos verdickt **15**
7. Elytren gegen den Absturz normal verschmälert, Anhänge an der Basis sich nicht berührend **8**
- Elytren deutlich verschmälert, Anhänge sich berührend **14**
8. 9. und 10. Fühlerglied einzeln in beiden Geschlechtern von gleicher Länge wie das 7. und 8. zusammen, Spitzenteil daher länger **articulatus** Senna
- 9. und 10. Fühlerglied einzeln kürzer als das 7. und 8. zusammen **9**
9. Elytren gedorn **10**
- Elytren mit Anhängen **11**
10. Tiefschwarz, am ganzen Körper mit breiter, blattartiger schneeweißer Reihenbeschuppung . . . **albopilosus** Kln.
- Graubraun, Beschuppung klein, gelblich **shelfordi** Senna
11. Augen prominent, 5. Abdominalsegment auffallend verschmälert **ambiguus** Senna
- Augen wenig vorstehend, 5. Abdominalsegment normal verschmälert **12**
12. Beschuppung fast ganz fehlend, Prothorax am Halse stark zusammengeschnürt **griseus** Kln.
- Beschuppung immer vorhanden, Prothorax am Halse nicht zusammengeschnürt **13**
13. Große, bis 60 mm lange Art, Elytrenanhänge sehr lang, 3.—8. Fühlerglied vorn nodos, 9. u. 10. zusammen so lang wie das 8. allein **completus** Kln.
- Mittelgroße Art, Anhänge nicht sehr lang, Fühlerglieder nicht nodos, 9. u. 10. Glied zusammen länger als das 8. allein **furcillatus** Gyll.
14. Prorostrum sehr kurz, Spitzenglieder der Fühler bestimmt getrennt, 5. Abdominalsegment mehr oder weniger abgestutzt **silvanus** Senna
- Prorostrum weniger kurz, Spitzenglieder eng stehend, 5. Abdominalsegment zugespitzt **erythropus** Ritsm.
15. Kopf mäßig verschmälert und verlängert, Rüssel sehr robust **intermedius** Senna

- Kopf lang und schlank, Rüssel zart 16
16. Elytrenanhänge kurz, dornig 17
- Anhänge von verschiedener Länge, aber nicht dornig 19
17. 2. u. 3. Fühlerglied etwa gleichlang **philippinicus** Senna
- 3. Fühlerglied $3\frac{1}{2}$ mal so lang wie das 2. 18
18. 2.—8. Fühlerglied nach vorn an Länge abnehmend
spötteli Kln.
- 2.—8. Fühlerglied gleichlang **samarensis** Kln
19. Elytrenanhänge säbelartig nach außen gebogen **nigripes** Kln.
- Anhänge nicht nach außen gebogen 20
20. Elytren am Absturz höckerig verdickt . . . **eelsus** Kln.
- Elytren nicht verdickt 21
21. 9.—11. Fühlerglied kürzer als das 8. allein
compendarius Kln.
- 9.—11. Fühlerglied länger als das 8. allein 22
22. 7. und 8. Fühlerglied länger als die folgenden
forcipatus Westw.
- 7. und 8. Fühlerglied sehr kurz . . . **poultoni** Senna
- (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1937-1938

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidae. \(Fortsetzung\). 129-144](#)