

## Einige neue Elateriden-Formen aus dem paläarkt. Faunengebiet.

Von **Emil Jagemann**, Brünn.

### 1.) **Tropihypnus bimargo** Rtrr.

Die Färbung dieses Tieres ist nach Reitter (WZ 1896, pg. 235): „Dilute ferrugineus, antennis pedibusque tetaceis, capite nigro, ore rufo, prothorace rufo, subtus brunneo-flavo.“ Oft kommen Stücke vor, bei denen die Flügeldecken dunkler sind. Ich besitze ein Stück aus den Tälern des kirgisischen Alatau, (Turkestan), bei dem sie sehr dunkel-kastanienbraun sind, ihre Scheibe ist in breitem Umfange fast schwarz. Kopf dunkelbraun, wie die Flügeldeckenscheibe, sein Vorderrand breit heller rotbraun.

**alatauensis** aber. nov.

Stücke mit hellerem Vorderrande des Kopfes sind auch bei der Stammform zu finden.

### 2.) **Hypnoidus (Zorochrus) caucasicus** sp. n.

Schwarz, Fühler braun, das 2—4 Glied heller; Beine gelb mit angedunkelten Schenkeln; fein grau behaart.

Die einzelnen Fühlerglieder von gleicher Länge. Halsschild kaum etwas länger als breit, von der Mitte nach vorne verengt, sein Vorderrand gerade. Die Hinterwinkel undeutlich gekielt, der Kiel nicht länger als ein Drittel der Halsschildlänge. Flügeldecken flach, oval, mit eingerissenen Streifen, die Zwischenräume flach, dicht unregelmäßig und sehr fein punktuert.

Von der Größe des *flavipes* Aubé, und ihm sehr ähnlich, von ihm aber durch den undeutlichen, kürzeren Kiel der Hinterwinkel, viel gröber und stärker punktierten und mattern Halsschild abweichend.

Caucasus: Suchum, Abchasien; von H. Evg. Stěpanov durch Vermittlung des H. Dr. Jureček in Prag erhalten.

### 3.) Die Aberrationen des **Athous haemorrhoidalis** F.

(1, 18) Halsschild jederseits ohne Eindrücke.

(2, 12, 17) Seiten der Abdominalsegmente rostrot.

(3, 11) Alle Abdominalsegmente breit rostrot gerandet.

(4, 10) Flügeldecken ohne hellere Makel.

- (5, 6, 9) Oberseite dunkel, fast schwarz, das erste Glied der Fühler wenigstens teilweise, Schienen und Tarsen u. auch der Hinterrand der Abdominalsegmente — insbesondere des letzten — rostrot. Der erste Zwischenraum an der Naht der Flügeldecken gewöhnlich rostrot. Behaarung der Oberseite rötlich-grau.  
a. **obscurus** Payk. (nach Buyss)
- (6, 5, 9) Flügeldecken mehr weniger kastanienrot. Abdominalsegmente sehr breit rostrot, ihre Mitte oft nur gebräunt. Das letzte Abdominalsegment ganz rostrot.
- (7, 8) Behaarung gelblichgrau (Stammform) (= *ruficaudis* Gyll. nach Buyss.) . . . **haemorrhoidalis** F.
- (8, 7) Schmälere Form. Die Behaarung ist dichter, silbergrau. . . . . a. **faeculentus** Buyss.
- (9, 5, 6) Flügeldecken hell pechbraun.  
a. **ruficaudis** Gyll. (nach Reitt.)
- (10, 4) Flügeldecken dunkel kastanienbraun, ihre Basis in den ersten 5 oder 6 Zwischenräumen mit einer hellen rostroten Makel, welche sich bis zu einem Drittel der Flügeldecken nach rückwärts zieht. Abdominalsegmente breit rostrot gerandet, ebenso das letzte.  
a. **Sicardi** Buyss
- (11, 3) 2. und 3. Abdominalsegment an den Seiten breit rostrot gerandet; manchmal ein rostroter Flecken auf dem 2. Abdominalsegment, der sich bis zum Rande des 1. Abdominalsegmentes zieht. Dunkel braunschwarz, manchmal mit grünlichem Scheine. Sonst wie *obscurus* Payk. aber schlanker, Halsschild länglicher, flacher. Die Punktierung der Oberseite stärker.  
a. **Croissandaui** Buyss.
- (12, 2, 17) Die Abdominalsegmente ganz rostrot, oder lebhaft rot.
- (13, 16) Halsschild normal gebildet wie bei der Stammform.
- (14, 15) Dunkel schwarzbraun, Fühler dunkel, Beine rostrot.  
a. **leucophaeus** Lac.
- (15, 14) Abdomen, Tibien, Tarsen, Mandibeln, Palpen und die 4 letzten Glieder der Fühler lebhaft rot.  
a. **Deubeli** Buyss.

- (16, 13) Vorderrand des Halsschildes fast so breit wie der Hinterrand, die Mittellinie bis zum Vorderrande deutlich, die abgerundeten Vorderwinkel stark vortretend, der Seitenrand vor ihnen bedeutend stärker als bei der Stammform gebuchtet. Vorder- und Seitenrand in der Nähe der Vorder-Winkel stark gerandet. Die Punktierung der seitlichen Streifen der Flügeldecken auf der vorderen Hälfte stärker.

Dunkel rostbraun bis dunkelbraun. Vorderrand der Flügeldecken in der unmittelbaren Nähe des Schildchens oft heller. Fühler dunkel, Beine rostrot mit dunkleren Schenkeln. Vorder- und Mittelbrust und die Mitte der Hinterbrust bis auf den ganz schmalen Hinterrand angedunkelt.

Bačkovo, Bulgarien; von Herrn Dr. Jureček in größerer Anzahl gesammelt. . sbsp. **Jurečeki** nov.

- (17, 2, 12) Körper einfarbig hell rotbraun, höchstens die Mitte der Mittel- und Hinterbrust zu geringen Teilen leicht angedunkelt. Halsschild wie beim vorigen. Helle Stücke von *Jurečeki*. Fundort wie beim vorigen.
- (18, 1) Halsschild jederseits der Länge nach mit 3 Eindrücken. Schwarz, die Flügeldecken bräunlich, fein grau behaart. Seitenränder und Hinterwinkel des Halsschildes rötlich, ebenso die Beine.

v. **multiimpressus** Pic.



# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Jagemann Emil

Artikel/Article: [Einige neue Elateriden-Formen aus dem paläarkt. Faunengebiet. 68-70](#)