

Insektenart Exemplare mit Originaletikettierung von möglichst sehr vielen verschiedenen Sammlern des In- und Auslandes aufweisen zu können.

Es muß damit gerechnet werden, daß gewisse Studien, so z. B. jene der Mikroskulpturen, der Verbreitung der einzelnen Arten u. A. m. im Laufe der Zeiten noch bedeutend vertieft werden. Für diese fortschrittlichen Studien aber wird naturgemäß das Material derjenigen entomologischen Sammlungen das wissenschaftlich höchstwertige sein, welche über verläßlich etikettierte Belegexemplare recht verschiedener Lokalitäten und Sammler verfügen. Meinerseits trachte ich auch mit jenen Kollegen, welche mir Belegtieri für meine kleine Spezialsammlung liefern, Lichtbilder zu tauschen, um auch diese dereinst im gleichen Institut verwahren zu lassen und dadurch der entomologischen Sammelgeschichte dienlich zu sein.

Mögen vorstehende Anregungen wenigstens hier oder dort auf fruchtbaren Boden fallen und praktische Anwendung finden!

Sur divers Coléoptères

Par **M. Pic.**

1^o *Pterydrías debilis* Reitt.

Espèce peu connue et fort curieuse, placée tout d'abord par l'auteur (W. Ent. Zeit. 1895) dans les Hylophilidae dont il a bien le faciès mais avec des élytres raccourcis. En réalité, ce genre doit prendre place dans le voisinage de *Thelydrías* Mots. parmi les Drilidae (famille composée actuellement d'éléments très disparates), et non pas parmi les Karumiinae (suivant l'annotation récente du Catalogue Winkler)

Pterydrías debilis Reitt. a été décrit sur un unique exemplaire provenant de Haïfa, en Syrie, et que j'ai acquis autrefois avec la collection des Hylophilidae de ce grand savant entomologiste et infatigable publiciste très regretté. Tout récemment j'ai revu cette curieuse espèce dans un lot d'insectes communiqués pour être déterminés, par un de mes bons correspondants et infatigable voyageur, Mr. S. Tenenbaum qui l'a recueilli en Palestine, à Ben Schemen.

2^o *Cydistus Zurcheri* Bourg.

Ce joli Drilidae a été recueilli en Palestine par Mr. S. Tenenbaum. Je connaissais déjà cette espèce de Syrie: Akbés (ex Delagrange) et Caramanie: Adana (coll. Pic.). Cette espèce est figurée (Wien. Ent. Zeit. XXVII 1908, p. 133) sous le nom inexact de *Reitteri* Bourg. Le *C. Zurcheri* Bourg a été décrite la même année (Bull. Soc. Ent. Fr. 1908 p. 211).

3^o *Splichalia tigrinella* Reitter (Deuts. Ent. Zeit. 1913 p. 665), du Thibet, est bien la même espèce que *Nemostira nigrofosciata* Pic, décrit en 1912 (synonymie déjà indiquée, in Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 214) d'après deux exemplaires types reçus récemment de Mr. Emmerich Reitter.

4. Sur le genre *Calchaenestes* Kr.

Tout d'abord je dois dire que la synonymie d'Aurivillius (Coleopt. Catalog. 39, Cerambycidae, p. 466) concernant le genre *Calchaenestes* Kr. est en partie inexacte, le *4-maculata* Pic n'étant pas synonyme de *oblongomaculata* Guer. mais désignant une variété, a macules postérieures réunies sur chaque élytre, de *sexmaculata* Reiche. De plus, ce n'est pas le *Nogeli* Friv, qui est figuré (Berl. Ent. Zeit VII, 1863, t 4, F. 5), mais *oblongomaculata* Guer.

Après étude d'un certain nombre d'exemplaires, de différentes origines, je crois devoir conclure à l'existence actuelle pour ce genre de deux unités spécifiques plutôt que de ne reconnaître qu'une seule espèce variable, suivant une interprétation plus généralement admise.

Pour appuyer cette façon de voir, je me base, non seulement sur l'habitat différent pour chacune des anciennes formes portant les noms de *oblongomaculata* Guer. et *sexmaculata* Reiche, mais aussi sur quelques différences qui paraissent assez constantes et que je vais indiquer dans le synopsis suivant.

- 1 *Prothorax* presque régulièrement arrondi-arqué sur les côtés médians, rarement avec une petite saillie très émousée: élytres ayant une côte latérale très marquée, plus ou moins longue, sans macule antéapicale noire. Orient: Gréciles grecques, Turquie, Turquie d'Asie, Ch y
oblongomaculata Guer.
 - 1' *Prothorax* non régulièrement arrondi sur les côtés et présentant une saillie plus ou moins distincte, souvent même nettement tuberculé vers le milieu latéral; élytres sans côte latérale saillante ou celle-ci à peine indiquée et courte avec une macule anteapicale noire (forme type), parfois jointe à la macule postmédiane (var. *4-maculata* Pic et var. *juncta* Pic.) Afrique Sle.: Algérie, Maroc. *sexmaculata* Reiche.
- Je possède *C. oblongomaculata* Guer. des localités suivantes: Syrie, Missis en Caramanie, Boghas, Taygetos en Morée et je l'ai capturé au nombre de 2 exemplaires, à Samos, dans l'île de Cephalaria au mois de mai, sur des arbousiers. Quant au *6 maculata* Reiche je le possède de Tanger et l'ai capturé en un certain nombre d'individus (forme type et var.) en Algérie, dans la belle forêt de l'Akfadou située en Kabylie, au mois de juin, sur des jeunes chênes. Cette dernière espèce se retrouverait dans l'Espagne Mle.

5° A propos de *Dorcadion Dalm.*

Plavilstshikov a muté (*Coleoptera* II, 1927, p. 51) le *Dorcadion Piochar-di ab. Theophilei* Pic en *Mauricei* (plutôt qu'en *Mauritii*), ce qui me semble curieux pour un auteur très enclin à la critique et qui se plait, à tout instant, à relever des erreurs, au besoin supposées, chez ses collègues ayant décrit des *Cerambycides*.

Le *Dorcadion erivanicum* Pic, suivant le même auteur russe (l. c. p. 51), n'est qu'une variété très particulière de *D. dimidiatum* Muls. Si cette forme est très particulière pourquoi donc ne pas l'admettre au moins comme sous-espèce.

Je ne crois pas, comme le suppose Plavilstshikov, (l. c. p. 51) que *D. subericatum* Pic, soit une simple variété de *D. caucasicum* Kust. (*sericatum* Kryn.) mon espèce ayant les élytres plus courts, nettement marqués de roux au sommet, le prothorax plus fortement ponctué, les antennes rousses.

6° Genre *Luperus* Geofr.

Dans le *Coleopterorum Catalogus* 78, *Galerucinae*, par J. Weise, plusieurs *Luperus* Geofr., décrits par moi, sont omis, omissions en partie réparées dans le Supplément à ce catalogue de V. Laboissière, (*Coleoptera* I, 1925, p. 51, 52), mais sont restées complètement oubliées par les deux auteurs, les citations des espèces et var. suivantes:

Luperus (Calomicrus) angorensis Pic. L'Echange XXVIII, 1912, p. 34, d'Angora.

Luperus (s. str.) diversepunctatus Pic. L'Echange 1912, p. 34, d'Espagne.

Luperus circumfusus v. talensis Pic, de Tunisie et *L. Fallax v. notaticollis* Pic, d'Algérie, décrites dans l'Echange XXVIII, 1912, p. 43.

Le *Luperus calabricus* a été publié par moi, L'Echange, XXVIII-1912, p. 34, en même temps que la var. *Paganettii* Pic. (dénaturée en *Panagettii*, in *Coleoptera* I, p. 52), de L. Biraghi Rag., donc antérieurement à la même dénomination de Laboissière.

7° *Arescus histrio* Baly et ses variétés.

Le joli *Hispide*, de l'Am. Mle. présente les variétés nouvelles suivantes, figurant dans ma collection (?) et toutes originaires de l'Equateur, séparables à l'aide du synopsis suivant:

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Elytres bicolores | 2 |
| — | Elytres concolores, roux (forme type) | <i>histrio</i> Baly. |
| (1) | Mr. Baly a signalé (Cat. <i>Hispidae</i> 1858, p. 82 et 83) déjà quelques variétés qui n'ont pas été nommées. | |
| 2 | Elytres dépourvus de bande longitudinale, ou transversale, noire ou bleue | 5 |

- Elytres avec une bande longitudinale, ou transversale, noire ou bleue 3
- 3 Elytres à bande transversale noire ou bleue 4
- Elytres à bande longitudinale noire ou bleue. Prothorax soit noir, (v. atricollis), soit testacé maculé de foncé (v. notaticollis), soit entièrement testacé (v. testaceicollis).
- 4 Elytres noirs bleutés, marqués, sur la base et après le milieu, de jaune; une macule humérale noire. v. *humeralis*
- Elytres noirs bleutés, marqués, sur la base et après le milieu, de rouge; pas de macule humérale noire. v. *inhumeralis*
- 5 Elytres foncés diversement marqués de roux ou de testacé. 7
- Elytres maculés de foncé vers leur milieu sur fond clair 6
- 6 Coloration générale flave v. *flavescens*
- Coloration générale rougeâtre. v. *rubricolor*
- 7 Elytres entièrement foncés postérieurement 10
- Elytres à sommet rougeâtre ou flave 8
- 8 Elytres également marqués de clair à la base 9
- Elytres noirs ou bleus avec l'extrémité seule rougeâtre.

Prothorax roux concolore (v. apicalis), ou maculé de noir (v. notatus).

- 9 Elytres plus ou moins maculés de testacé à l'apex. v. *inlimbatus*
- Elytres simplement et étroitement bordés de clair à l'apex. v. *sublimbatus*
- 10 Elytres foncés, plus ou moins largement marqués de rougeâtre à la base. 11
- Elytres foncés, brièvement marqués de testacé à la base. v. *reducta*
- 11 Pas de maculé isolée noire humérale v. *Donckieri*
- Une petite macule isolée noire humérale. v. *humeralis*
- 8^o *Arescus labiatus* Perty.

A signaler chez cette espèce les quatre principales variétés nouvelles suivantes de ma collection:

V. subruber, de l'Equateur. Elytres flaves bordés de noir antérieurement avec des macules antérieures et une fascie médiane noires, largement marqués de rougeâtre postérieurement;

V. multinotatus, de l'Equateur. Elytres testacés, multimaculés de foncé antérieurement et au milieu, largement marqués de rougeâtre postérieurement.

V. boliviensis, de Bolivie. Elytres noirs à dessins testacés suivants: fascie basale arquée et sinuée, fascie médiane et bordure antéapicale.

V. Germaini, de Bolivie. Elytres noirs, seulement courtement bordés de testacé à l'extrémité de la suture.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Sur divers Coléoptères 68-71](#)