Syrien: Aleppo, erhalten von der Naturaliensammlung Staudinger & Bang-Haas.

Ein einziges ♀.

Nomenclatorische Bemerkungen über einige Coleopteren-Gattungen.

Von ord. Univ.-Professor Embrik Strand, Riga.

Abascantis Schaufuß, Tijdschr. v. Entom. 29. (1886), p. 258 (cfr. auch Coleopter. Cat., pars 27 (1911), p. 164) [nec Stal 1864] nenne ich **Abascantodes** Strand n. n. (Pselaphidae).

Adpsion Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916 A. 5. p. 90, fehlt im „Nomenclator anim. gener.“ (Tenebrion.).

Anabolina Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 5. p. 77, fehlt im „Nomenclator anim.“, ist aber durch *Anabolodes* Banks 1903 praeoccupiert und möge *Anabolina* Strand n. n. heißen. (Eucnemidae.)

Anomalopus Casey, Mem. Coleopt. VI. p. 40 (1915) als Subgenus zu *Anomala*, fehlt in Coleopter. Catal., pars 66; der Name *Anomalopus* ist aber schon wiederholt früher (Duméril 1851, Stimpson 1870) gebraucht worden! Ich nenne *Anomalopus* Casey: **Anomalopides** Strand n. n. (Rutelinae.)

Calimus Mulsant, Hist. Col. France [vol. 4] Sécurip. Suppl. Longicorn. p. [15] (1846), noch in Schenkling's Coleopter. Catal., pars 39 (1912) p. 270 als gültiger Gattungsname gebraucht, kann wegen *Callimus* Fischer de Waldheim, Bull. Soc. Natur. Moscou 6. p. 374 (1833) nicht bleiben, sondern möge in **Callimellum** Strand n. n. umgetauft werden. (Cerambycidae.)

Callithorax Motschulsky, Bull. Soc. Natural. Moscou 24 IV., p. 482 (1851) ist in Coleopter. Cat. p. 27 (1911) übersehen, während Schaufuß, Nunqu. otios. 2 p. 246 diese monotypische, von Bengalen stammende Gattung für Synonym zu *Pselaphu* Herbst erklärt, was aber offenbar nicht stimmt. Da *Callithorax* schon 1846 nach L. Agassiz (in: Nomenclator zool. Index p. 60 und 61) gebraucht wurde, nenne ich *Callithorax* Motsch. **Callithoracoides** Strand n. n. (Pseliphidae)

Capnodes Broun, Manual New Zealand Col., fasc. 2 p. 690 (1881) (auch noch in Schenkling's Coleopter. Catal., pars 48 p. 72 (1912) gebraucht) [nec *Capnodes* Guénéé 1852] nenne ich **Capnodula** Strand n. n. (Anobiidae.)

Cassidula Weise, Wiener Entom. Zeitung 10. p. 204 (1891), welcher Name noch als gültig gebraucht wird, z. B. in Reitter's Katalog und in seiner Fauna Germ. Käfer IV. p. 218 (1912) und in Schenkling's Coleopt. Catal., pars 62 p. 97 (1914), ist aber schon seit 1797 (Humphrey, Museum Calornianum p. 32) und 1830 (Blainville, Dict. Sci. nat. 60. p. 181) vergeben. Ich schlage für *Cassidula* Weise den Namen **Cassidulella** Strand n. n. vor. (Cassidinae.)

Catarractes Bernhauer, Ann. mus. nation. hungar. 13. p. 95—189 (1915), auch in Coleopter. Catal., pars 82 p. 707 (1926) als gültiger Gattungsname gebraucht, kann wegen *Catarractes* Brisson 1760 nicht bleiben, sondern möge **Catarractodes** Strand n. n. genannt werden. (Staphylinidae.)

Comophorus Blanchard, Catal. Collect. entom. 1. p. 106 (1850) wird noch in Schenkling's Coleopt. Cat. pars 47 (1912) p. 101 als gültiger Name gebraucht, trotzdem Agassiz denselben Namen schon 1846 für eine Fischgattung gebraucht hatte, und

zwar in: Nomenclator zool., Index p. 5 96. Auch wenn man geltend machen wollte, Agassiz hätte in diesem Falle nicht beabsichtigt, einen neuen Namen zu geben, sondern hier läge nur ein Druckfehler (statt *Comephorus* Lacépède) vor, so müßte dennoch *Comophorus* Blanch. nec Agass. verworfen werden laut den Nomenclaturregeln, Artikel 34, woraus hervorgeht, daß der Gebrauch allein eines Gattungsnames (also egal, ob mit oder ohne Absicht!) genügt, um einen späteren homonymen Gattungsnamen ungültig zu machen. Ich nenne *Comophorus* Blanch. nec Agass. **Comophorina** Strand n. n. (Melolonthinae.)

Etude synoptique du genre *Pristolycus* Gorb. (Col.),

par M. Pic.

Le genre *Pristolycus* Gorb. a été décrit en 1888 (Trans. Ent. Soc. Lond. p. 407); l'auteur l'a classé dans les Lycides, en paraissant douter de sa place exacte. D'après E. Olivier (Revue Sc. Bourb. XXIV 1911 p. 68), ce genre rentrerait dans les Lampyrides et c'est en effet dans cette famille (acquise par E. Olivier) que se trouvait les *types* de Gorham, et non dans celle des Lycides (acquise par moi).

Les principaux caractères de genre seraient les suivants :

Forme oblongue allongée, corps aplati. Tête non visible du dessus, dépourvue de rostre; élytres ornés chacun de trois fortes côtes de longueurs inégales. Hanches intermédiaires très rapprochées, insertion des femurs sur les trochantères un peu oblique (caractères des Lampyrides), abdomen sans trace d'appareil lumineux (caractère des Lycides). Le genre a un faciès de Lycide, mais, par ses caractères du dessous du corps mélangés, sa place dans la systématique peut se discuter: par esprit d'impartialité, je laisse de côté la question de son classement définitif. Toutes les espèces de *Pristolycus* Gorb. ont les membres, la tête et le dessous du corps noirs, les élytres orangés ou pourprés, diversement marqués de noir antérieurement vers la suture; le prothorax varie de coloration. Pour permettre de distinguer les quelques espèces de ce genre, je résume leurs principales différences dans le synopsis suivant. (1)

1	Prothorax plus ou moins de coloration claire, testacée ou pourprée avec son milieu diversement noir; apex des élytres clair, de la coloration foncière.	2
—	Prothorax entièrement noir, avec quelquefois pourtour, surtout en avant, d'une coloration roussâtre mal limitée; apex des élytres ayant une bordure noire, ou tout au moins rembrunie. Côtes des élytres plus ou moins foncées (forme type), ou, discales au moins, de coloration claire (v. <i>diversecostatus</i> Pic.) Japon. Chine.	
		<i>sagulatus</i> Gorb.
2	Antennes relativement courtes, ne dépassant guère le milieu des élytres, et très aplaties; suture des élytres noire antérieurement.	3
—	Antennes longues, atteignant presque le sommet des élytres, peu larges, à articles longs; suture des élytres pourprée jusqu' à l'écusson. Tonkin.	
		<i>Laboissierei</i> Pic.
3	Prothorax court et large, plus ou moins teinté de pourpré sur les côtés, diversement testacé en avant et en arrière, à bande médiane noire ordinaire.	4

Verbreitung: Nordöstliches China; Gebirge westlich von Peking (Kraatz, typischer Fundort), Inn-shan bei Kalgan, 800—2000 m (coll. mea), Kuku-choto (coll. mea), Shi-wan-tze, Hiu-mou-kiang-keou (coll. mea).

crassesculptus diruptus Mor.

Flügeldeckenskulptur regelmäßig, die Intervalle etwas weniger erhaben, nicht so häufig unterbrochen (der Unterschied ist ungefähr so wie zwischen *Carabus caelatus* F. und *caelatus* ssp. *dalmatinus* Dft.). Die ganze Oberseite etwas matter, einfarbig schwarz, oder schwarz mit schmalen blauen oder violetten Rändern oder schwarz mit dunkelblauen Schimmer auf der ganzen Oberseite; stets düsterer als die Nominatform. Bei meinen Exemplaren ist das 4. Fühlerglied etwas kürzer als das zweite und auch Semenow erwähnt dieses Merkmal. Größe wie bei der Nominatform.

Verbreitung: Nordwest-China und angrenzendes Thibet. Kuku-Nor Geb., 3200 m (coll. mea), Prov. Kansu, ohne nähere Angabe (Morawitz, typischer Fundort), Plateau von Amdo, div. Lokalitäten, 2700 m (Semenow), Nan-shan, Sinin-shan (Semenow, coll. mea), Prov. Szetschuan: Sunpan (Semenow).

Nach der Skulptur zu urteilen ist *diruptus* die primitivere Form, von der sich *crassesculptus* abgespalten hat; aus geographischen Gründen ist ja auch diese Verbreitungsrichtung zu erwarten.

Crassesculptus Kr. steht innerhalb der Gattung *Carabus* ziemlich isoliert da und bildet den einzigen Vertreter des Subgenus *Pagocarabus* Mor., welches durch folgende Merkmale charakterisiert ist:

1. Kopf nicht verdickt; 2. Gularborsten fehlend; 3. Kinnzahn sehr kurz, kürzer als die Seitenloben; 4. Vorletztes Glied der Lippentaster bisetos, am distalen Ende ohne Seta; 5. Viertes Fühlerglied in distalen Viertel dicht behaart; 6. Halsschildseitenrandseten vorhanden (4 + 1); 7. Abdominalporen vorhanden; 8. Abdominalstrigen fehlend.

Die Kombination dieser 8 Merkmale findet sich sonst bei keinem Vertreter der Gattung *Carabus*. Morphologisch zunächst stehen wohl die Untergattungen *Neoplesius* Reitt. und *Sphodristocarabus* Géh.

Druckfehler-Berichtigung

zu meinen beiden Artikeln in „Entom. Nachrichtenblatt“ II, Heft 1, p. 2-3 u. 5-6 (1928).

Von Prof. Embrik Strand.

Es muß heißen:

- p. 2: *Abascantus* statt *Abascantis*
 „ *Anabolina* Bank 1903, dagegen *Anabolodes* Strand n. n.
 „ *Callimus* statt *Calimus*
 „ *Pselaphus* statt *Pselaphu*
 „ *Callithorax* schon 1846 von (statt nach!) L. Agassiz . . .
 „ *Pselaphidae* statt *Pseliphidae*
 p. 3: Index p. 95 und 96 (statt p. 5 69)
 p. 4: B. G. Teubner statt B. G. Teudner
 „ gestempelt **ist** statt gestempelt war
 p. 5: (oberste Zeile): Korrekturbelegen
 „ (6. Zeile von unten): **die** deutlichsten statt **am** deutlichsten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Nomenclatorische Bemerkungen über einige Coleopteren-Gattungen. 2-3](#)