

Übersichts-Tabelle der bekannten Arten:

1. Der dritte Flügeldeckenstreifen mit 2 Porenpunkten. Transylvan. Alpen.
procerus Duft.
 — Der dritte Flügeldeckenstreifen mit 3 Porenpunkten 2
 — Der dritte Flügeldeckenstreifen mit 4 Porenpunkten 3
2. Flügeldecken mit wenig vortretenden Schultern, $1\frac{1}{2}$ mal so lang als breit, wie bei *procerus* gebildet. Czorna Hora, Hoverla **Roubali** Jan.
 — Flügeldecken mit vortretenden Schultern, kürzer und breiter, auffallend kurz oval, ebenfalls Halsschild breiter als bei der vorigen Art. Czorna Hora, Kuzny **corpulentus** Weise.
3. Flügeldecken zweimal so lang als breit. Marmaroš **proceroides** Jean.
 — Flügeldecken nur $1\frac{1}{2}$ mal so lang als breit. Hoverla **Mačhai** mihi.
 D. *procerus* Roubali und *Mačhai* haben gleich lange Flügeldecken, D. *corpulentus* zeichnet sich durch lange und schmale, D. *corpulentus* durch kurze und breite Flügeldecken aus.
 Den D. *corpulentus* Weise hat Herr Šticha aus Prag in 2 Ex. ♀ in Kuzny an der rumänischen Grenze vorigen Jahres gesammelt.

Lema femorata Guér. et formes voisines.

Par M. Pic.

Deux anciennes espèces de *Lema* F. (à faciès de *Crioceris* Geoffr.), des îles de la Sunde et se trouvant sur le continent asiatique, sont caractérisées dans le genre par la forme robuste, la grande taille, les antennes rousses à articles 8 et 9, ou 8 à 10, entièrement, ou en partie, noirs, les cuisses postérieures robustes ou très épaissies. Ces espèces ont une coloration générale roussâtre ou testacée, les élytres sont fortement ponctués, maculés de foncé, le dessous du corps est parfois en partie foncé. Les deux anciennes espèces décrites, auxquelles doit s'ajouter mon *Lema subinnotata* (décrit comme variété de *4-punctata* Ol.), se distinguent de la façon suivante.

1. Prothorax concolor, entièrement roux; élytres sans macules suturales foncée, ayant seulement une, ou deux, macules discales 2
 — Prothorax roux, bimaculé de foncé de chaque côté sur la base; élytres ayant chacun, en plus de deux macules discales, une macule suturale près de l'extrémité et une autre plus grande postscutellaire foncée (forme type), celle-ci parfois jointe à la macule discale antérieure (v. nov. *anticejuncta*).
 Java, Sumatra, Malacca, Tonkin **femorata** Guér.
2. Elytres moins longs et moins atténués à l'extrémité, ayant chacun deux macules discales foncées (**4-punctata** Ol. et var.) 3
 — Elytres plus longs et plus atténués à l'extrémité, ayant une seule macule discale antémédiane. Tonkin **subinnotata** Pic
3. Deux articles seulement des antennes foncés; pattes foncées (v. nov. **malaccana**), ou rousses avec les tarsi noirs (forme type). Îles Andaman, Java, Sumatra, Bornéo, Tonkin, Saïgon, Malacca.
 — Trois articles des antennes foncés, au moins en dessus; pattes, tarsi compris, entièrement rousses. Jndes: Walardi v. nov. **Maindroni**.
 Les insectes ayant servi à la rédaction de cet article font tous partie de ma collection.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Lema femorata Guer. et formes voisines. 15](#)