

3. (4.) Flügeldecken mit feinem Nahtstreif, die Hinterhüftplatten reichen bis zum Anfang der letzten Bauchschiene. Endglieder der Taster größer als die vorletzten *Cnemidotus* Er.
 4. (3.) Flügeldecken ohne Nahtstreif, die Hinterhüftplatten reichen bis zum Hinterrande der 3. Bauchschiene. Endglieder der Taster kleiner als die vorletzten.
 5. (6.) Halsschild an der Basis mit kräftigem Quereindruck bis in die Hinterwinkel, Längstrichel tief, lang und stark gekrümmmt. Halsschild kräftig gerandet, Rücken flach *Protohalipus* n. g.
 6. (5.) Halsschild ohne oder mit schwachem Quereindruck zwischen den kurzen und fast geraden Längstricheln, wenn letztere vorhanden. Halsschild schwach gerandet, Rücken gewölbt *Halipus* Latr.
-

Les Staphylinides recoltés par Mr. Nicolas Iconnicov dans le Pérou (Coleoptera, Staphylinidae).

Par N. N. Plavilstschikov,

Directeur du Laboratoire Biologique du Technikum de l'Industrie et de l'Économie de Plechanov à Moscou.

La présente liste est basée sur les matériaux, que Mr. N. Iconnicov a collectionné dans le Pérou (11° 3' S. — 75° 17' W. Greenw.), au 1.000—1.800 mètres d'altitude. Cette collection, déterminée par Mr. M. Bernhauer, se trouve dans le Musée Zoologique de l'Université de Moscou.

1. Piestus (*Zirophorus*) bicornis Cast. (1834). — 1800', 23. XI. 06, un seul exemplaire.
2. Piestus (s. str.) pennicornis Fauv. (1865). — 1000' 27. VIII. 06; 1 exemplaire.
3. Leptochirus (s. str.) Kolbei Bernh. (1903). — 1000' 29. VIII., 14. IX. 06.; 3 exemplaires. Espèce décrite de Bolivie.
4. Leptochirus (*Mesochirus*) maxillosus F. var. *boliviensis* Heller (1898). — 1000', 2. IX. 06; 4 exemplaires.
5. Leptochirus (*Mesochirus*) tenuis Bernh. (1903). — 1000', 29. VIII., 14. IX. 06; 9 exemplaires. Espèce décrite de Bolivie.
6. Leptochirus *iconnicovi* Bernhauer (in litteris?) — 1000', 29. VIII. 06; 1 exemplaire avec l'étiquette „cotype“.
7. Lispinus brevicollis Fauv. (1865). — 1000', 30. VIII. 06. L'habitat de cette espèce est assez étendu, on la rencontre à Guatemala, à Nicaragua, en Mexique.
8. Osorius peruvianus Bernh. (1908). — 1000', 27. VIII., 1. IX., 21., 22. X. 06; 7 exemplaires.
9. Paederus mutans Sharp (1876). — 1000', 25. IX., 9. X. 06; 2 exemplaires. Décrite de Bolivie.
10. Paederus tridens Sharp (1876). — 1000', 19. IX., 9. X., 3. XI. 06; 5 exemplaires.
11. Cryptobius longicornis Sharp (1876). — 1000', 23. IX. 06; un seul exemplaire.
12. Xantholinus peruvianus n. sp. (Bernhauer in litteris). — 1000', 13., 18. IX. 06; 3 exemplaires.
13. Agerodes kraatzi Kirsch (1865). — 68 exemplaires: 1000' — 29. IX., 13., 14., 15., 21., 26. X. 06; 1800' — 12., 13., 16., 17., 19., 21., 29. X. 06.

14. *Agerodes coeruleus* Motsch. (1858). — 1800', 19., 29. IX. 06; deux exemplaires.
15. *Agerodes semiviolaceus* Bernh. (1911) var. — 1000', 11. X. 06.; un seul exemplaire. La forme typique décrite de la Bolivie.
16. *Agerodes punctipennis* Bernh. (1906). — 1000', 4. XI. 06; un seul exemplaire. Espèce décrite de Venezuela.
17. *Agerodes peruvianus* Bernhauer (in litteris?). — 1800', 12. XI., 1. XII. 06; deux exemplaires.
18. *Eulissus chalybaeus* Mannh. (1830). — 1000', 3., 18., 19., 22. X. 06; 1800', 8., 28. X. 06; 7 exemplaires.
19. *Philonthus figulus* Er. (1839). — 1800', 21. XI. 06; 1 exemplaire.
20. *Philonthus longicornis* Steph. (1832). — 1000', 14. X. 06.; 1800', 19., 21. XI. 06; 4 exemplaires.
21. *Philonthus lopterus* Er. (1839). — 1800', 19. XI. 06; un seul exemplaire. La description originale a été basée sur l'individus indiqués comme provenants de Colombie.
22. *Chroaptomus flagrans* Er. (1839). — 1000', 4. IX. 06; 1800', 21. XI. 06; 4 exempl.
23. *Paederomimus aeneiceps* Sharp (1876). — 1000', 5. IX. 06; un seul exemplaire. Espèce décrite de fleuve des Amazones.
24. *Belonuchus frater* Bernh. (1906). — 1800', 7. IX. 06; 1 exemplaire.
25. *Belonuchus peruvianus* Fauvel (in litteris). — 1800', 23. XI. 06; 1 exemplaire.
26. *Belonuchus longiceps* Bernh. (1906). — 1800', 7., 17., 29. XI. 06, 7 exemplaires.
27. *Belonuchus iconnicoffi** n. sp. (Bernhauer in litteris). — 1800', 9., 20. XI. 06; 2 exemplaires.
28. *Staphylinus ochropygus* Nordm. (1837). — 1000', 21. X. 06; 1 exemplaire. Habite: Brésil, Guyanes.
29. *Staphylinus fervidus* Sharp (1884) var. — 1000', 22. X. 06; un seul exemplaire. La forme typique a été décrite de Mexique.
30. *Phanolinus episcopus* Bernh. (1906). — Un seul exemplaire avec une date commune: „11° 3' S. — 75° 17' W. Greenw.“, Espèce décrite de Bolivie.
31. *Philothalpus anceps* Er. (1839). — 1000', 13. X. 06; 1 exemplaire.
32. *Styngetus langei* Bernh. (1905). — 1800', 16. XI. 06; 1 exemplaire.
33. *Brachydirus antennatus* Sharp (1876). — 1800', 11. XI. 06; un seul exemplaire. Espèce décrite de fleuve des Amazones.
34. *Brachydirus testaceus* Fabr. (1801). — 1000', 16., 24. IX., 16. X., 3. XI. 06; 4 exemplaires. Habitat de cette espèce: Guatemala, Venezuela, Colombie.
35. *Brachydirus aeneipennis* n. sp. (Bernhauer in litteris). — 1800', 13., 16. XI. 06; 3 exemplaires.
36. *Xanthopygus calidus* Er. (1859). — 1000', 9. X. 06; un seul exemplaire.
37. *Gastrisus opaculus* Sharp. (1884). — 1000', 13., 16., 21. X. 06; 6 exemplaires. Espèce décrite de Panama.
38. *Aleochara centralis* Sharp. — 1800', 13., 15., 17., 19. XI. 06; 5 exemplaires.
39. *Aleochara taeniata* Sharp. — 1000', 13. X. 06; 1800', 10. XI. 06; 6 exemplaires.
40. *Diestota angulicollis* Bernh. — 1000', 3. XI. 06; 1 exemplaire.

* rectius: iconnicovi.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Plavilstshikov Nikolaj Nikolajevitsch

Artikel/Article: [Les Staphylinides recoltes par Mr. Nicolas Iconnicov dans le Perou \(Coleoptera, Staphylinidae\). 29-30](#)