Synonymische Bemerkungen über Agapanthia-Arten.

(Coleoptera, Cerambycidae.)

Von **N. N. Plavilstshikov**, Leiter d. Biol. Laborat. d. Industr.-Ökonom. Plechanov'schen Technikums in Moskau.

1. Agapanthia lais Reiche var. violaceipennis Pic (Mat. Long., V, 1, 1904, p. 9) ist nur eine Aberration (aberratio coloris).

2. Var. brevior, welche M. Pic von A. coeruleipennis Friv. beschrieben hat (Descr. Long. Syrie, 1891, p. 1), ist von der typischen Form der A. coeruleipennis nicht verschieden (nach „cotypus" der v. brevior). Vergl. auch E. Reitter, Wien. Ent. Ztg., 1898, p. 135.

3. Agapanthia plicatipennis Pic (Mat. Long., IX, 2, 1915, p. 8) = A. amurensis Kraatz 1879. (Vergl. N. Plavilstshikov, Encycl. Entom., Col., II, 2, 1927, p. 61.)

4. Agapanthia semicyanea Pic (l. c. IX, 2, 1915, p. 8) = A. amurensis Kraatz 1879. (Vergl. N. Plavilstshikov, l. c., p. 61.)

5. Agapanthia latior Pic (Bull. Soc. Zool. France, XXIII, 1898, p. 179), welche M. Pic aus Turkestan beschrieben hat, ist mit A. nigriventris C. Waterh. (Trans. Linn. Soc. Lond. (2) V, 1889, p. 130, t. 14, f. 16) aus Afghanistan ganz identisch.

6. Agapanthia Jacobsoni Plav. (Revue Russe d'Entom., XV, 1915, p. 122) aus Buchara = A. nigriventris Waterh. 1889.

7. Agapanthia auliensis Pic (Mat. Longic., VI, 2, 1907, p. 12) aus Turkestan = Agapanthia angelicae Reitt. 1898 (nach „cotypus" der A. auliensis).

8. Agapanthia coeruleonigra Reitt. (Wien. Ent. Ztg., 1898, p. 132) ist ganz identisch mit Agapanthia alternans Fisch. (1842) aus Sibirien. Ich habe den „typus" der A. alternans Fisch. studiert.

9. Agapanthia transbaicalica Suv. (Rev. Russe d'Entom., XIII, 1913, p. 80) aus Transbaicalien = A. alternans Fisch. (nach „typus" der alternans und „cotypus" der transbaicalica).

10. Agapanthia Ganglbaueri Sem. (Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 503) von Altaj ist eine gut begrenzte Art und nicht ein Synonym der A. alternans Fisch., wie ich früher geschrieben hatte. (Vergl. N. Plavilstshikov, Encycl. Entom., Coleopt., II, 2, 1927, p. 61.)

11. Agapanthia Kindermanni Pic. (Mat. Longic., V, 2, 1905, p. 3) aus Syrien ist eine Variation von A. dahli Richt.

12. Agapanthia alexandris Pic (Echange, XVII, 1901, p. 82) aus Turkestan (Alexandergebirge) ist ein Synonym der A. Müllneri Reitt. (1898).

13. Agapanthia verecunda Chevr. (Ann. Soc. Ent. France, (6) II, 1882, p. 63) aus Syrien ist eine besondere Art und kein Synonym der A. cynarae Germ. (1817), wie Ganglbauer (1884) und besonders Aurivillius (Col. Cat., 74, 1923, p. 461) angeben.

14. Agapanthia Delagrangei Pic. (1894), welche als eine Varietas von A. cynarae Germ. beschrieben (Echange, X, 1894, p. 75) und später als selbständige Art zitiert wurde (Pic, Mat. Longic., VIII, 2, 1912, p. 6), ist ein Synonym der A. verecunda Chevr.

15. Agapanthia villosoviridescens Deg. var. subchalybaea Reitt. (Wien. Ent. Ztg., 1898, p. 134) ist eine selbständige Art, die durch zwei Subspecies (subchalybaea subchalybaea im Caucasus und subchalybaea turanica m. in Turkestan) vertreten ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Plavilstshikov Nikolaj Nikolajevitsch

Artikel/Article: Synonymische Bemerkungen über Agapanthia-Arten. (Coleoptera, Cerambycidae.) 103