Im übrigen ist die Ähnlichkeit mit boops Grav. eine sehr große und entfällt die Notwendigkeit der Beschreibung der mit boops gemeinsamen Merkmale.

Länge: 6.5 mm.

Beim ♂ ist das sechste Sternit breit und flach, bogig ausgerandet.

Da-laen-saen bei Nong-po (Coll. Walker).

In der Sammlung des British Museum und in meiner eigenen.

Ein neuer Kulturschädling aus Ceylon.

Von **Hans Eggers**, Stolberg (Harz).

Coccotrypes theae n. sp. (Col. Ipidae).

♀: Klein, fast zylindrisch gebaut, braun, glänzend, schwach punktiert und spärlicher behaart als die meisten verwandten Arten.

Kopf dicht punktiert mit Längsrissen durchsetzt, fein und spärlich behaart; Fühler gelbbraun.

Halsschild kaum länger als breit, mit fast parallelen, nur wenig ausgebogenen Seiten, im vorderen Drittel verschmälert. Vorderrand etwas vorgezogen und mit vier Höckern besetzt. Hinterecken nur schwach abgerundet. Oben flachgewölbt, dicht mit schwachen, länglichen, wenig erhabenen Höckern besetzt; in der hinteren Hälfte eine angedeutete, feine, leicht erhabene Mittellinie.

Flügeldecken gleich breit und mehr als ein Drittel länger als das Halsschild, parallelseitig bis zum letzten Viertel, dann zur Naht hin abgeschrägt, sodaß der Hinterrand an der Naht fast einen abgestumpften rechten Winkel bildet, ähnlich wie bei C. striatus m. von Ostafrika. Oben glatt, die Punkte der Reihen fast ebenso fein und weitläufig gestellt, wie auf den Zwischenräumen. Die Zwischenraumpunkte tragen längere, abstehende, sehr feine Haare; auf den Punktreihen sind die Haare sehr kurz, fein und geneigt, auch mit der Lupe schwer erkennbar. Absturz flacher als bei den meisten anderen Arten.

Länge: 1.5 mm.

♂: unbekannt.

Fundort: Ceylon (Peradeniya), „ex tea seed", leg. Dr. F. C. Nutson. Type im British Museum, Cotypen auch in coll. Eggers.

Der Käfer unterscheidet sich von Coccotrypes carpophagus Hornung (= integer Eichh.) durch die lange parallelseitige Form, die glatte Oberfläche der Flügeldecken, deren spärliche feine Punktierung und feine Behaarung; die Höcker des Halsschildes sind bei carpophagus rund, bei theae länglich. Die anderen kleinen Coccotrypes des Ostens (C. perditor Bldf. aus Japan und niger m. aus Ostafrika) sind viel stärker punktiert und anders geformt. C. advena Bldf. gehört der Beschreibung nach wohl zu einer anderen Gattung, Thamnurgides.

Zwei neue Aberrationen der Strangalia quadrifasciata L.

Von Dr. **Leo Heyrovský**, Prag.

Bei der Bearbeitung des Cerambycidenmateriales, welches unsere Entomologen im heurigen Sommer in Karpathorußland gesammelt haben, habe ich zwei sehr inter-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Eggers Hans

Artikel/Article: Ein neuer Kulturschädling aus Ceylon. 112