

Nouveaux Coléoptères de Chine

par M. Pic.

Je dois la connaissance des nouveautés de cet article aux communications de Emmerich Reitter à qui je suis heureux d'en dédier plusieurs.

Falsoxanthalia n. genus (Hétéromère). Oblongo-elongatus, subconvexus; capite sat breve, labro elongato, oculis paulo emarginatis, prominulis; antennis parum gracilibus, articulis se ultimis valde dilatatis; articulo ultimo palparum suborato; thorace breve et lato, lateraliter et postice minute emarginato, elytris angustiore; scutello minuto; elytris minute marginatis; pedibus sat brevibus, femoribus parum crassis.

Sans doute voisin de *Xanthalia* Frm. (que je ne connais pas en nature) et en différant, à première vue, par la forme non élargie, les yeux non entiers, la structure particulière des antennes, la forme du prothorax, les élytres non striés.

Falsoxanthalia bicoloripes n. sp. Oblongo-elongato, subconvexa, nitida, sparse griseo pubescens, rufo-testacea, capite, antennis, palpis, tibiis tarsisque ingris; capite mediocre sat sparse punctato; thorace fortiter non dense punctato; elytris thorace sat latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, irregulariter, fortiter non dense punctatis. — Long. 6—7 mill. — Ginfushan (coll. E. Reitter et Pic).

Leichrodes nigronotatus n. sp. (Hétéromère). Suboratus, apice attenuatus, sat convexus, nitidus, parum et sparse punctatus, rufo-testaceus, antennis apice et aliquot infra corpore nigris, thorace ante scutellum nigro notato, elytris in singulo et in disco ad medium et ante apicem nigro notatis. — Long. 4 mill. — Ginfushan (coll. E. Reitter et Pic).

Ressemble à *L. tonkinus* Pic, plus grand et très distinct, à première vue, par les élytres maculés de foncé.

Lyprocaulus Reitteri n. sp. (Hétéromère). Sat elongatus, subnitidus, parum et breve pubescens, niger; capite parum breve, diverse, pro parte dense punctato, antice biimpresso et minute transverse sulcato; antennis thorace paulo longioribus, sat gracilis, articulis ultimis paulo latioribus; thorace sat elongato,

antice breve attenuato, postice fere recto et paulo marginato, medio supra diverse sulcato aut impresso, dense foreolato-punctato, multi et irregulariter plicato; scutello minuto; elytris thorace paulo latioribus, ad basin medio submarginatis et paulo attenuatis, sat elongatis, postice attenuatis, minute striatis aut punctatis, punctis pro parte elongatis, intervallis diverse punctatis et postice pro parte subimpressis; pedibus parum elongatis, femoribus sat crassis, tibiis anticis et intermedius paulo curvatis. — Long. 12—13 mill. — Nitou Tatsenlu. Szechuan (coll. E. Reitter et Pic).

Ressemble un peu à *L. attenuatus* Pic, il en diffère nettement par la sculpture du prothorax et des élytres, les cuisses moins époissies.

Ceropria Reitteri n. sp. (Hétéromère). Oblongo-subovalis, subconvexa, glabra, nitida, piceo-aenescens, membris diverse rufis aut brunneis; capite breve, minute et sparse punctato; antennis rufescentibus, articulo 3^e elongato, 4^o subglobuloso, 5^e et sequentibus latioribus; thorace breve, antice attenuato, lateraliter paulo marginato, antice non recto, angulis anticis subrotundatis, postice sinuato et pro parte marginato, minute biimpresso, minutissime et sparse punctato; elytris thorace indistincte latioribus, humeris prominulis, lateraliter subarcuatis et minute marginatis, postice attenuatis, parum distincte striatis, parum fortiter lineato punctatis, intervallis minutissime et sparse punctatis; pedibus diverse rufis aut brunneis, sat brevibus. — Long. 8—8·5 mill. — Tatsienlu (coll. E. Reitter et Pic).

Cette petite espèce a un faciès d' *Amara* Bon. (comme *Androsus amaroides* Gebien) avec une coloration à peu près uniforme et se reconnaît ainsi au premier coup d'œil.

Androsus cyanescens n. sp. (Hétéromère). Plus minusve elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, glaber, nigrometallicus, supra cyaneus, aliquot paulo violaceus; capite non breve, fortiter et diverse punctato; antennis nigris, apice dilatatis; thorace brevi et lato, antice attenuato, lateraliter marginato, postice fere recto, antice arcuate inciso, angulis anticis paulo prominulis, fere rectis, postice sinuato, angulis posticis rectis, sat fortiter diverse et sparse punctato; elytris thorace paulum latioribus, humeris fere rectis, diverse elongatis, sub-

parallelis, apice attenuatis, minute striato-punctatis, intervallis minutissime et sparse punctatis; pedibus sat brevibus, femoribus infra longe bicarinatis et medio excavatis, tibiis anticis apice et externe subangulatis. — Long. 9—11 mill. — Ginfushan (coll. Reitter et Pic).

Peut se placer près de *A. neomedinus* Frm., bien plus grand, forme plus parallèle avec les élytres moins striés, etc.

Epicauta Emmerichi nov. (Vésicont). Angustata, subopaca, nigra, capite rufo; antennis gracilibus, breve pubescentibus, nigris, articulis 2 basalibus pro parte rufis; capite minute et sparse punctato; thorace parum elongato, medio sulcato, parum fortiter sat dense punctato; elytris elongatis, minutissime dense punctatis, nigris, lateraliter et apice albo marginatis; pedibus gracilibus, breve pubescentibus, tarsis anticis in mare paulo crassis. — Long. 15—20 mill. Ginfushan (coll. E. Reitter et Pic).

Par ses élytres étroitement bordés de poils blancs sur les côtes et à l'extrémité, mais non à la suture, se rapproche de *E. hirticornis* Haag. dont il n'est peut-être qu'une variété; en diffère, à première vue, par la brieveté de la pubescence sur les antennes.

Cis boleti v. nov. *latrix*. (Cisidae). Oblongus, latus, parum nitidus, griseo-holosericeo aut fulvo pubescens, niger aut piceus, palpis, antennis ad basin pedibusque rufis; capite medio profunde excavato et circa fortiter marginato; thorace margine antice paulo elevato, medio plus minusve inciso. — Long. 4—5 mill. — Chine: Tatsienlu, Tjije (coll. E. Reitter et Pic).

Diffère de la forma typica, par l'aspect plus robuste, la tête plus excavée.

Melasoma formosana v. nov. *Emmerichi* (Phytophaga). Oblongo, plus minusve elongata, nitido, subconvexa, supra metallica, viridis aut viride-aurata (aliquot cyanea), labro, palpis, antennis ad basin, thorace lateraliter plus minusve pedibusque testaceus, antennis apice nigris, infra corpore pro majore parte nigro; capite diverse excavato, diverse non sparse punctato; thorace brevi et lato, antice late emarginato, angulis anticis paulo prominulis, lateraliter fere recto, medio diverse sulcato aut impresso, inaequale et irregulariter punctato; elytris thorace latioribus, subconvexis, apice attenuatis, lateraliter marginatis,

minute et irregulariter punctatis, ad basin et ad humeros impressie. — Long. 7—9 mm. — Chine: Tatsienlu (coll. E. Reitter et Pic).

Diffère de forma typica (qui ne n'est connue que par la description) au moins par le prothorax non entièrement foncé, diversement métallique au milieu, testacé sur le bord antérieur et surtout sur les côtes.

Colobapsis atrithorax n. sp. (Phytophaga). Elongatus, nitidus, parum pubescens, niger, elytris luteis, in singulo nigro biimmaculatis; macula humeralis et maculis duabus mediis connatis, abdomen pro parte luteo, femoribus pro parte rufis, posticis apice luteo notatis; thorace supra inaequale, parum punctato, postice lateraliter tuberculato; elytris sat elongatis, ad humeros angulatis, mediocre et irregulariter punctatis, sparse nigro pilosis; femoribus posticis dentatis, tibiis paulo curvatis. — Long. 10 mill. — Kiulung (coll. E. Reitter et Pic).

Voisin de *C. speciosus* Baly, moins robuste, avec les tibias moins arqués et les dessins noirs des élytres différents.

Merista Reitteri n. sp. (Phytophaga). Oblonga, parum nitida, nigra, elytris externe luteo marginatis et anguste luteo trifasciatis; fascia antice arcuata, ad scutellum remota, fascia postmedia transversa, fascia reducta interna et obliqua antepicalis, aliquot pro parte oblitterata, sutura ad apicem paulo lutea; thorace parum et minute punctato, bifoveolato; elytris mediocre, sat dense punctatis. — Long. 12—14 mill. — Tat-sienlu-Kiulung (coll. E. Reitter et Pic).

Voisin de *M. Oberthuri* Jac. dont il se distingue, à première vue, par la première bands des élytres arquée et la 3^e oblique.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1934-1936

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Nouveaux Coléoptères de Chine 84-87](#)