b) Außer der Randung der Flügeldecken ist auch eine Makel jederseits des Schildchens an der Basis der Elytren rot oder bläulich. ab. **vittata** Panz.

c) Die rote Färbung nimmt die Scheibe der Flügeldecken ein und läßt dagegen die schmalen Ränder frei. ab. **chlamydata** n.

d) Die Flügeldecken ohne jede andersfarbige Zeichnung oder Makeln. ab. **unicolor** Westh.

Plateumaris discolor ab. **tatrica** n.

Halsschild purpurrot, Flügeldecken violettblau, Slowakei, Hohe Tatra, von Al. Procházka bei Štrbské pleso gefunden.

Diese Art ändert sich folgendermaßen ab:

a) Einfarbig erzgrün, grün oder mit bläulichen oder rötlichen Reflexen. **forma typica.**

b) Einfarbig stark goldglänzend. ab. **lacordairei** Perris.

c) Einfarbig schwarz. ab. **nigrita** Schilsky.

d) Oberseite zweifarbig, Halsschild dunkel purpurrot, Flügeldecken dunkel violettblau. ab. **tatrica** n.

Literatur.

G. Olsoufieff in Tanariarive hat zur Synopsis des Curculionides de Madagascar von A. Hustache ein erstes Supplement mit einem Addendum für beides veröffentlicht in den Memoires de l'academie. Malgache Fasc. XIV. Er beschrieb darin eine große Menge neuer Curculioniden von Madagaskar. Ein sehr interessantes Werk und für Curculioniden-Spezialisten der exotischen Fauna von großem Werte umsomehr, als darin 100 neue Formen, noch dazu von einer Familie, beschrieben sind.

E. Reitter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)

Jahr/Year: 1934-1936

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Reitter Emmerich

Artikel/Article: Literatur. 130