

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Pterostichus Honnorati Dej. ssp. *Hustachi* Fagniez.

Von der Nominatform verschieden: Hsch. viel schmaler, die beiden Eindrücke an der Basis deutlich und fast parallel statt gekrümmt. Fühler und Beine rötlich, desgleichen die Hschränder und Elytren. Kopf und die Mandibeln schwarz, Oberlippe und Fühler rötlich, bis auf die ersten drei Fühlerglieder, die dunkler sind. Hautes-Alpes, Frankreich. Misc. Ent. XXX, 11.

Pterostichus (Calopterus) Selmanni Duft.

ssp. *inexpectus* Schaub. Von der Nomform verschieden: Gestalt weniger gestreckt, konstantes Auftreten eines großen runden Grübchens, das fast die ganze Breite des Clypeus einnimmt, durch etwas kürzere, eiförmige, zur Spitze weniger breit verrundete Fld. und beim ♂ durch das nach rückwärts stärker vortretende Nahtzähnnchen der rechten Fldspitze. Die untere Paramere, die zwar meist stärker variiert, ist breiter, gedrungener, mit kurzer stumpfer Spitze. Höllengebirge, Oberösterreich. Ent. Anz. I, 136.

ssp. *kassbergensis* Schaub. Übergangsrasse von *inexpectus* zu *Selmanni*. In der Körperform nähert sie sich dem *Selmanni*. Der Clypeus trägt wie bei *inexpectus* das runde Grübchen, das nur in seltenen Fällen klein oder flach und undeutlich ist. Der Clypeus fällt der ganzen Breite nach plötzlich und stark gegen den Basalrand der Oberlippe ab, der Abfall ist durch eine mehr weniger deutliche Querkante markiert. Von *inexpectus* unterscheidet er sich durch gestreckteren Körperbau und die an der Spitze breiter verrundeten Fld., das Nahtzähnnchen an der Spitze fehlt vollständig. Die untere Paramere wie bei *Selmanni* gebildet, die innere Spitzenabschrägung ist etwas stärker bogenförmig ausgeschnitten. Kassberg in Oberösterreich. Ent. Anz. I, 137.

ssp. *styranus* Schaub. Im allgemeinen durch größere, breitere, plumpere Gestalt, den flachen, grübchenlosen, bis zur Basis der Oberlippe gleichmäßig abgeflachten Clypeus, dessen Vorderrand etwas stärker ausgeschnitten ist, breiteren Hsch. mit viel breiterer Basis, wie bei *Selmanni* an der Spitze breit abgerundeten Fld. mit einfacher Spitze ausgezeichnet. Die untere Paramere ist plumper, mit breiterer, stumpfer Spitze. Gebirge bei Steyr in Oberösterreich. Ent. Anz. I, 137.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 39](#)