download unter www.biologiezentrum.at

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Pterostichus (Calopterus) Selmanni Duft.

ssp. ***Roubali*** Schaub. Von sämtlichen Ostalpenrassen verschieden durch den schlankeren und an der Basis deutlich schmäleren Hsch., habituell noch am ehesten mit *inexpectus* Schaub. zu vergleichen. Körper mäßig gestreckt und mäßig flach. Die Oberseite dunkelbronzefarben bis schwärzlich, die Schienen sind ziemlich dunkel, ähnlich wie bei *styranus* Schaub., nicht so hell wie bei der typischen Form oder bei *inexpectus*. Der Klypeus fällt nach vorne flach ab und ist in der Mitte ohne Grübchen. Der Hsch. ist kleiner, weniger breit, an den Seiten weniger stark gerundet, zur Basis fast geradlinig verengt, die Seiten sind vor den Htecken schräg verlaufend, kaum ausgeschweift, die Htecken daher in der Anlage nicht rechtwinkelig, sondern etwas stumpfwinkelig, die Basis ist deutlich schmäler, die inneren Basalgrübchen sind tief und etwas breiter, die äußeren Grübchen fehlen oder sind nur sehr schwach angedeutet, die Seitenränder des Hsch. sind besonders vorne merklich breiter. Die Fld. sind nicht so gestreckt wie bei der typischen Form und an den Seiten etwas stärker gerundet, ähnlich wie bei *inexpectus*. Der Penis ist kräftiger, mit kürzerer, gerader Spitze. Böhmerwald. Ent. Anz. VII, 177.

ssp. ***Hoffmanni*** Schaub. Habituell an die typische Form anzuschließen. Unterscheidet sich von dieser durch den an den Seiten viel schwächer gerundeten und nach vorne schwächer verengten Hsch., der vor den Htecken deutlich ausgeschweift ist, und die fast vollständig fehlenden äußeren Basalgrübchen. Österreich — Steirische Ostalpen. Ent. Anz. VII, 178.

Agonum ericeti Panz.

ssp. ***Nowotnyi*** Wagn. Äußerst konstant in der Färbung, *Agon. Mülleri* vortäuschend, Kopf und Hsch. metallisch grün, Fld. dunkel, bronzefarben. Ob. Schles. Col. Centralbl. II, 91.

Lebia cyanocephala L.

a. ***tibialis*** Scholz. Schienen fast ganz schwarz, nur die Innenkante ist in der Mitte undeutlich rotbraun und das erste Figld. oben mit einem dunklen Strich, so daß es nur unten gelbrot erscheint. Schlesien. Ent. Bl. XXI, 46.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. (Col.). 59