

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

In der Herzegowina: Gacko, Jablanica, Nevesinje, Domanovic, Blagaj, Vucija bara, hier auch *xanthoptera* (Schaw. B. H. VII und Rbl. Stud. II). Inselfunde: Scoglio Oruda 14. IX. sehr zahlreich in sehr kleinen Stücken (Galv. B. A. I. 245), wohl sicher einer II. Gen. angehörend (Str.); Lussin, Gruica, Oriule grande Anfang Juni (Galv. B. A. I.); Brazza, Bua vielfach (Str.).

Sonst Bosnien, Montenegro, Serbien, Corfu, Norditalien, Alpen usw.; sibirisch.

1235. *cribrum* L. Lokal nur selten. Bei Sesana (Hafn. F. G.); einmal in der f. *punctigera* Fr. in einem ausgetrockneten Bachbette Draga bei Triest (Str.); Fiume Juni (Mn.); Nabresina am Licht ein ♂ 2. VI. (Kitschelt, Wr. E. V. 1913) in der f. *candida* Cyr.; von Mann aus Mitteldalmatien aufgeführt, von Str. dort nirgends angetroffen; auch aus der Herzegowina kein Fundort bekannt. Bosnien nur: Sarajevo und Trebevic (Rbl. Stud. II).

Sibirisch.

1236. *Hipocrita jacobaeae* L. Lokal. Wippach nicht selten Mai, Juni (Hafn. F. Kr.); Görz überall häufig von Ende April bis Anfang Juli; Mitte Juli bereits vollkommen erwachsene Raupen gefunden, die jedoch keine II. Gen. ergaben (Hafn. F. Görz); ebenda häufig April bis Juli, Heiligenkreuz-Cesta 19. VI., Opcina 8. VI. nicht häufig (Str.); Triest gemein (?) Mai, Juni, aus Raupen gezogen (Carr.); Lovrana Juli (Rbl. M. M.); Aquileja 22. V. (Galv.); Nabresina nächst dem Bahnhof (Lbl.); Guardiella 24. V. (Galv.); Insel Brioni Anfang Juni (Wache); Mitteldalmatien (Mn.); Cetina-Ebene zwei Stück, abgeflogen, 15. VI. (Str.); Jablanica in der Herzegowina (Rbl. Stud. II).

Sonst noch Norditalien, Südtirol, Kroatien, Montenegro, Griechenland; wohl sibirisch.

1237. *Deiopeia pulchella* L. Im Süden des Gebietes schon sässig, nördlich davon wohl nur als Zugtier zu betrachten. Sporadisch. Sturje bei Wippach und fraglich von Idria (Hafn. F. Kr.); Triest (Moser); ebenda 3. VII. ein Stück am Licht (Stdr.); ebenda Verz. F. A. Vogel (Carr.); Kronberg bei Görz 28. VI. (Stdr.); Bucari bei Fiume einzeln Juni (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); ebenda im Juli Castelvechio und Spalato öfter am Lichte, Ende Juni Sebenico, Dernis, Cikola-Ebene Mitte Juni am Bahndamm gegen die Mosetschlehne bei Zitnic nicht besonders häufig und wenig variabel, doch mehrfach sehr blasse Stücke mit wenig Rot und Schwarz (*pallida* und *semisignata* Spuler) (alle Stdr.); aus der Herzegowina, Mostar und Bosnien nachgewiesen (Rbl., Schaw.). Inselfunde: Brioni grande (Rbl.); Lissa, ein aberr. ♀ (Galv. Dalm. Ins.); Brazza Ende Juni zwei Stück Lichtfang (Stdr.).

Tropisch.

1238. *Nudaria mundana* L. Wenig bekannt. Lokal. Lengenfeld 16. VII., Krmatal Mitte Juni, Wippach und St. Veit bei Wippach Lichtfang Ende Juni bis Mitte Juli, auch in Anzahl aus Gebüsch gescheucht (Hafn. F. Kr.); bei Görz scheinbar fehlend; Fiume Juni, Juli (Mn.); von Mann auch aus Mitteldalmatien aufgeführt. Herzegowina: Prenj, 1000—1300 m, Gacko, Vucija bara (Rbl. Stud. II). Jo.

Sonst noch Norditalien, Tirol, Kroatien, Banat; orientalisches.

1239. *Mitochrista miniata* Forst (4266). Radmannsdorf, Mojstrana Mitte Juli (Hafn. F. Kr.); im Gebiete sehr selten; Görz, Grojnatal 19. VI.—28. VIII. einzeln und selten, ebenda Juni, Juli nicht häufig (Hafn. F. Görz); Abbazia 16. VII. (Rbl. M. M.); Mann führt sie von Mitteldalmatien auf. Jablanica (Rbl. Stud. II).

Sonst Tirol, Norditalien, Kroatien, Alpen, Balkan; sibirisch.

Endrosa Hb. (Setina Schrk.).

1240. *irrorella* Cl. Lokal, an manchen Flugplätzen aber häufig. f. *flavicans* B. Isonzoufer Lucinico bei Görz im letzten Maidrittel zahlreich im Grase fliegend (Hafn. F. Görz); ebenda mehrfach (Stdr.); Triest, F. A. Vogel'sches Verz. (Carr.); Mitteldalmatien (M.); Herzegowina: Vucija bara Juli *flavicans* (Schaw. B. H. VI); Nennform Zelengora, Nevesinje, *flavicans* von Velež und Gacko (Rbl. Stud. II).

Sonst noch Tirol, Kärnten, Kroatien, Balkan; sibirisch.

1241. *roscida* Esp. Nur Castua bei Fiume Mai (Mn.) und Mitteldalmatien (Mn.). Sibirisch.*)

1242. *Cybosia mesomella* L. Seltenheit! Crna Prst, Birnbaumerwald, Adelsberg (somit wohl auch ins Wippachtal reichend) (Hafn. F. Kr.); Hudajužna ein ♂ Mitte Juli, Podbrdo bei 1400 m zwei Stück beim Aufstieg auf die Crna Prst (Stdr.); Triest, Verz. F. A. Vogel (Carr.); Mitteldalmatien (Mn.); ebenda Knin 26. VI., Cetina-sümpfe 2. VII. je ein Stück (Stdr.); Herzegowina: Vucija bara Juli (Schaw. B. H. VI); Lakat (Rbl. Stud. II).

Sonst Kroatien, Bosnien, Corfu; sibirisch.

1243. *Gnophria rubricollis* L. Lokal, selten. Radmannsdorf, Mojstrana, Krma- und Vratatal Ende Juni, Birnbaumerwald 6. VI., auf dem Kouk (Hafn. F. Kr.); Mattuglie 18. VII. (Rbl. M. M.); Monte Biokovo bei Almissa in Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Spalato 26. VI. mehrfach am Licht (Stdr.). In Triest fing ich (Stdr.) am 2. VII. 1911 ein ♀ der f. *flavicollis* Neuburg., die bisher nur aus Rumänien bekannt war.

Sonst noch Kroatien, Bänat, Westbulgarien; sibirisch.

1244. *Oeonistis quadra* L. Selten. Görz Lichtfang Juli (Hafn. F. Görz); Triest 29. III. eine Raupe Scorcola, ebenda 22. VII. ein ♀, Muggia 1. VII. ein ♂ an einer Pappel sitzend (Stdr.); Clana bei Fiume Juni in Buchengebüsch häufig (Mn.); Abbazia, Mattuglie 24. VII. (Rbl. M. M.); Clissa bei Spalato 24. VII. ein ♂ ♀ (Stdr.); Sinj (Mn.); Mostar und Jablanica in der Herzegowina (Rbl., Schaw.).

Sonst Tirol, Norditalien, Krain, Kroatien, Montenegro (Durmitor), Rumänien, Bulgarien; sibirisch.

Lithosia F.

1245. *deplana* Esp. Mojstrana an Fichten 14. VII., Franzdorf (Hafn. F. Kr.); Trenta ein Stück 18. VIII. (Stdr.); Triest, F. A. Vogel (Carr.) bedarf der Bestätigung; Brioni grande Anfang Juni und Ende August, Anfang September sehr häufig in den Macchien (Rbl. Br. gr.); Fiume 9. VI. (Mändl). Aus Dalmatien und der Herzegowina nicht bekannt. Sibirisch.

1246. *griseola* Hb. Mojstrana (Hafn. F. Kr.); sonst nur Fiume 10. VI. (Mändl).

(Fortsetzung folgt.)

*) *E. aurita* Esp. ist aus dem benachbarten Hochgebirge Kärntens festgestellt und dürfte daher im alpinen Teile des Gebietes noch gefunden werden.