Die Schmetterlingssammlung Pfarrer August Fuchs im Naturhistorischen Museum der Stadt Wiesbaden.

- a) Typen, beschrieben von A. Fuchs und F. Fuchs,
- b) Originalstücke, die zu Abbildungen auf Tafel 71 a, A. Spuler, Die Schmetterlinge Europas, benutzt worden sind.

Von A. Hepp, Frankfurt (Main).

Dr. Horns Mitteilung (Über den Verbleib der entomologischen Sammlungen der Welt, ein Beitrag zur Geschichte der Entomo-Museologie, Supplementa Entomologica 12, 1926, p. 48) "Fuchs, A. (Pfarrer). Pal. Lepidopt. vereinzelt", und der 25. Todestag (20. l. 1904) des bekannten Erforschers der Lepidopterenfauna des Rheingaus veranlaßten mich, nach dem Verbleib der Sammlung A. Fuchs zu forschen. Die Societas entomologica — 18, 1904, p. 163 — brachte kurz die Mitteilung: "Am 20. Januar" verschied der in weiteren Entomologen-Kreisen bekannte Herr Pfarrer A. Fuchs in Bornich, Vater unseres Mitgliedes Herrn Ferdinand Fuchs in Boppard, der sich besonders um die lepidopterologische Erforschung des Rheingaus große Verdienste erworben hat." In demselben Jahrgang — pp. 168, 174 — ist seine Schmetterlingssammlung ausgeboten worden. "Die große wissenschaftliche Schmetterlingssammlung des verstorbenen Pfarrers A. Fuchs, bestehend aus ungefähr 40.000 Stücken, meist Europäern und Hunderten von Originalen, ist zu verkaufen. Manche Genera sind sehr reich vertreten, z. B. enthält das Genus Acidalia 128 verschiedene Arten und 38 benannte Varietäten in 1120 Exemplaren; Gnophos enthält alle europäischen Arten und sehr viele asiatische. Besichtigung usw." Diese Anzeige hat, zum Vorteil für die entomologische Wissenschaft, nur geringen Erfolg gehabt. Den "Nachträgen und Verbesserungen" (Supplementa Entomologica 17, 1929, p. 91) zur zitierten Arbeit Dr. Horns entnehme ich: "Fuchs, A. (Pfarrer). Pal. Lepidopt. (spec. Macros u. Fauna des Mittelrheins) via Sohn an Mus. Wiesbaden." Entsprechende Mitteilung ist in den Jahrbüchern des nassauischen Vereins für Naturkunde Wiesbaden (80, 1929) erschienen. Danach hat Dr. Ferdinand Fuchs die noch vorhandenen Teile der Sammlung 1926 dem Naturhistorischen Museum geschenkt. Nach Angabe des Entomologen

dieses Museums, Herrn W. Roth*), fehlten in der Sammlung die Gattungen Parnassius, Eupithecia und Zygaena (Anthrocera). Eine Anzahl Makrolepidopteren ging zugrunde oder in anderen Besitz über. R. Püngeler**) soll Material erhalten haben.

Die Zusammenstellung enthält nur einen Teil der von A. und F. Fuchs beschriebenen Falter. Ich glaube aber, daß dem arbeitenden Lepidopterologen auch mit diesem unvollständigen Typenverzeichnis gedient und viel unnützes Suchen erspart wird. Zu bemerken ist: Zu a). Die Falter sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in Dr. A. Seitz, Die Großschmetterlinge der Erde, Paläarkten I—IV, stehen. Hinter jeder Type ist angegeben, in welcher entomologischen Zeitschrift sie beschrieben ist (lahrb. nass. Ver. = lahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde Wiesbaden; Ent. Zeit. Stettin = Entomologische Zeitung. Hrsg. vom entomologischen Verein zu Stettin; Soc. ent. = Societas entomologica. Organ für den internationalen Entomologen-Verein Zürich). Bei einigen Typen fehlt das Zitat und konnte nicht ermittelt werden. Die Textstellen im Seitz, g. F. mit der Abbildung, und e. F. bei A. Spuler, Die Schmetterlinge Europas, sind vermerkt. Die Typen sind fett gedruckt. Prout hat im Seitz oft A. Fuchs und F. Fuchs verwechselt. Wenn als Autor Fuchs genannt ist, dann ist es A. Fuchs. F. Fuchs kommt nur für die Falter unter Nr. 19, 40, 55, 71 und 96 als Autor in Frage. Zu b). Die Zusammenstellung hat mehr historisches Interesse. Die Textstelle bei Spuler, Band II, ist vermerkt.

Allgemein. Die Gattungsnamen sind nach Staudinger-Rebel, Catalog der Lepidopteren des Paläarct. Gebiets, Seitz und Spuler angegeben. Hieraus ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, daß die Gattungsnamen im Lauf von ca. 30 Jahren, namentlich bei den Spannern, mitunter dreimal gewechselt haben.

- a) Typen, beschrieben von A. Fuchs und F. Fuchs.
- 1. Pararge megaera L. ab. mediolugens Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 45, 1892, p. 87. Seitz I, p. 134.
- 2. Pararge maera L. gen. aest. maja Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 34, 1873, p. 98. Seitz I, p. 135.

^{*)} Herr W. Roth war so freundlich, ein Verzeichnis der Typen und Originalstücke anzufertigen. Weiterhin hat er mir weitgehendst Auskunft über unsichere Literaturangaben usw. gegeben. Für alles danke ich ihm an dieser Stelle verbindlichst.

^{**)} Püngelers Sammlung ist jetzt im Zoologischen Staats-Museum Berlin.

- 3. Aphantopus hyperantus L. ab. caeca Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 45, 1884, p. 253. Seitz I, p. 137.
- 4. Aphantopus hyperantus L. ab. minor Fuchs. Seitz I, p. 137.
- 5. *Epinephele jurtina* L. ab. *cinerascens* Fuchs. Jahrb. nass. Ver. **45**, 1892, p. 85. Seitz I, p. 140.
- 6. Coenonympha hero L. ab. sibirica Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 52, 1899, p. 126. Im Seitz nicht vermerkt.
- 7. Apatura ilia Schiff. ab. budensis Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 52, 1899, p. 122. Seitz I, p. 162.
- 8. Argynnis selene Schiff. selenia Freyer (= angustipennis Fuchs). Seitz I, p. 228; Taf. 67 h.
- 9. Argynnis lathonia L. ab. paradoxa Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 52, 1899, p. 124. Seitz I, p. 236.
- 10. Callophrys rubi L. ab. immaculata Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 44, 1891, p. 211. Seitz I, p. 263; Taf. 72 e.
- 11. Lycaena icarus Rott. ab. caerulea Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 38, 1877, p. 133. Seitz I, p. 312; Taf. 80 g.
- 12. Lycaena icarus Rott. ab. brunnea Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 53, 1900, p. 32. Seitz I, p. 313.
- 13. Cyaniris argiolus L. gen. aestiv. parvipuncta Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 41, 1880, p. 116. Seitz I, p. 322.
- 14. Hesperia alveus Hb. g. vernalis und
- 15. v. *alpina* Fuchs. Jahrb. nass. Ver. **42**, 1889, p. 201. Im Seitz nicht vermerkt.
- 16. Spilosoma menthastri Esp. ab. paucipuncta Fuchs. Jahrb nass. Ver. 45, 1892, p. 89. Seitz II, p. 87; Taf. 15 f.
- Arctia hebe L. ab. albicans Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 52, 1899,
 p. 128. Seitz II, p. 100.
- 18. Callimorpha dominula L. var. bithynica Stgr. (= ochromaculata Fuchs. i. l., Seitz II, p. 101.
- 19. Stilpnotia salicis L. ab. nigrociliata F. Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 66, 1913, p. 71. Seitz II, p. 123.
- 20. Ocneria rubea Schiff. ab. rubrior Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 53, 1900, p. 45. Seitz II, p. 132.
- 21. Lasiocampa quercus L. ♀ ab. lapponica Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 41, 1880, p. 124. Seitz II, p. 157.
- 22. Lasiocampa quercus L. & ab. tenuata Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 41, 1880, p. 122. Seitz II, p. 158.

- 23. *Drepana cultraria* F. gen. aest. *aestiva* Spuler (= *minor* Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 45, 1884, p. 259). Seitz II, p. 200; Taf. 23 i.
- 24. Smerinthus (Amorpha) populi L. ab. fuchsi Bartel (= rufescens Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 42, 1889, p. 204). Seitz II, p. 246.
- 25. Bryophila (Metachrostis) perla F. ab. lutescens Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 42, 1889, p. 208. Seitz III, p. 21; Taf. 4 g.
- 26. Agrotis (Euxoa) forcipula Schiff. v. et ab. bornicensis Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 45, 1884, p. 260.
- 27. Agrotis (Euxoa) margaritacea Vill. ab. immaculata Fuchs. Spuler 1, 1908, Nachtrag p. 352. Seitz III, p. 54.
- 28. Ammoconia (Orthosia) senex H. G. (Hb.) v. mediorhenana Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 45, 1892, p. 92 (91). Seitz III, p. 61,
- 29. Ammoconia senex Hb. v. mediterrana Fuchs, ibidem.
- 30. Dianthoecia (Polia) luteago Hb. v. seibelii Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 51, 1898, p. 205. 29 und 30 im Seitz nicht vermerkt.
- 31. Cucullia linosyridis Fuchs. Soc. ent. 18, 1903, p. 83. Seitz III, p. 106.
- 32. Aporophila nigra Hw. ab. seileri Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 62, 1901, p. 128 (? Zitat unsicher). Seitz III, p. 124; Taf. 30 e.
- 33. Orrhodia (Conistra) vaccinii L. ab. glabroides Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 62, 1901, p. 131. Seitz III, p. 147; Taf. 36 b.
- 34. Orrhodia (Conistra) vaccinii L. ab. conspadicea Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 62, 1901, p. 130. Seitz III, p. 147. Spuler 1, 1907, p. 256, zieht die ab. conspadicea zu ligula Esp.
- 35. Orthosia (Amathes) macilenta Hb. ab. nigrodentata Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 52, 1899, p. 135. Seitz III, p. 151.
- 36. Orthosia (Amathes) circellaris Hfn. ab. nigridens Fuchs. Ent. Zeit. Stettin 44, 1883, p. 263. Seitz III, p. 151.
- 37. Orthosia (Amathes) helvola L. ab. cinnamomea Fuchs. Soc. ent. 18, 1903, p. 3. Seitz III, p. 152.
- 38. Hadena (Parastichtis) monoglypha Hfn. v. pallida Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 44, 1891, p. 94. Seitz III, p. 166; Taf. 39 g.
- 39. Polyphaenis sericata Esp. ab. mediolucens Fuchs. Jahrb. nass Ver. 44, 1891, p. 92. Seitz III, p. 198; Taf. 44 g.
- 40. Heliothis (Chloridea) dipsacea L. ab. albida F. Fuchs. Jahrb. nass. Ver. 57, 1904, p. 38. Seitz III, p. 245; Taf. 50 i.
- 41. Anarta myrtilli L. ab. olivacea Fuchs. Spuler 1, 1907, p. 277. Seitz III, p. 252. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Hepp Albert

Artikel/Article: Die Schmetterlingssammlung Pfarrer August Fuchs im Naturhistorischen Museum der Stadt Wiesbaden. a) Typen, beschrieben von A. Fuchs und F. Fuchs, b) Originalstücke, die zu Abbildungen auf Tafel 71a, A. Spuler, Die Schmetterlinge Europas benutzt... 156-159