

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Stenus salisburgensis Bernh.

Vom ähnlichen *dauricus* verschieden: Kopf breiter, so breit als die Fld., stärker und dichter punktiert, Stirnfurchen viel undeutlicher und flacher, Hsch. länger und schmärer als der Kopf, weitläufiger, gröber und runzeliger punktiert, glänzender. Fld. etwas kürzer, weitläufiger, aber nicht stärker und viel mehr gerunzelt punktiert. Der Hinterleib ist etwas stärker punktiert. Die Oberfläche ist im allgemeinen glänzender, tiefer schwarz, ohne jeden Bleischimmer. Lg. 2·5—3 mm. Salzburg, Hofgastein. Kol. R. XIII, 91.

Euaesthetus Wuorentausi Bernh.

laeviusculus Mannh. nahe, jedoch viel kleiner, schmaler, die Fld. sind bedeutend kürzer, die Punktierung des Hsch. und der Fld. feiner. Von *fulvus* Motsch. verschieden: durch den dunklen Hinterleib, kleinere Gestalt, viel kürzere Fld. und viel weitläufigere Punktierung des Vorderkörpers. Lg. 1·5 mm. Wuorentaus bei Dudinka. Kol. R. XIII, 91.

Medon Lebedevi Roubal.

Schwächig, verhältnismäßig lang und schmal, dunkel schwarzbraun mit schwach heller durchscheinenden Schultern und Hinterändern der Flügeldecken, der Mund und die Beine gelbbraun, die Palpen und Fühler schwarzbraun mit mehr oder weniger heller umrandeten einzelnen Gliedern.

Kopf schwach nach vorne verengt, wenig länger als breit, an den Seiten deutlich schuppig chagriniert, im übrigen glatt, auf der Oberfläche ziemlich fein und zwischen den Augen auch dicht punktiert, hinten in der Mitte unpunktiert, an den Seiten grob und wenig dicht punktiert, die Hinterecken breit verrundet. Halsschild von Kopfbreite, so lang als breit, flachgewölbt, nach hinten ziemlich stark verengt, mit abgerundeten Ecken, ziemlich grob und dicht punktiert, mit glatter Mittellinie, im Grunde blank. Flügeldecken parallelseitig, viel länger als der Halsschild, um ein Drittel länger als breit, so breit wie der Halsschild, sehr dicht und mäßig stark körnelig punktiert, mäßig dicht, anliegend grau behaart. Der ganze Vorderkörper glänzend. Das Abdomen sehr fein, dicht, netzartig punktiert, sehr schwach grau, anliegend, länger als die Elytren behaart. Lg. 4·8 mm, größte Breite 0·7 mm. — *Rossia* or.: *Kazan*. Col. Centralbl. I, 244.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 319](#)