

Zur Rhynchotenfauna Böhmens.

Von M. F. Richard Scholz, Liegnitz.

(Fortsetzung)

28. *S. cursitans* F. Pg. In lockrer Erde und unter trockenem Laub, unter Grasbüschen und Heidekraut.
29. *Aelia acuminata* L. Pg. Auf Gräsern, saugt auch am Getreide. Kopula. Mai—Juni.
30. *A. ac. v. Burmeisteri* Küst. Pg., Sobieslau, Eger, Franzensbad (Duda).
31. *A. Klugi* Hhn. Pg. Seltener, wie vorige. Kopula im Juni, Larven auf dürrn Gräsern.
32. *A. rostrata* Boh. Pg. Auf Gräsern, auch auf Achillea. Diese Art wurde wiederholt als Getreideschädling beobachtet (Nickerl). Frühjahr bis Herbst.
33. *Neottiglossa pusilla* Gmel. (*inflexa* Wlff.). Nh. Auf Wiesen, auf Gräsern in Waldschlägen, überwintert unter Steinen und Laub an Waldrändern.
34. *N. leporina* H. Sch. Selten, einmal gestreift (Duda).
35. *Stagonomus pusillus* H. Sch. Nh. Im Walde an niederen Pflanzen (Fragaria, Ajuga). 6—8.
36. *Eusarcoris aeneus* Scop. Pg., Nh. An pflanzenreichen, feuchten Orten, auf Wiesen, an Waldrändern, auf Labiaten, besonders Stachys. Überwintert. 5—6 und 7—10.
37. *E. melanocephalus* F. Pg., Nh. Wie voriger an Labiaten (Stachys, Ballota, Melitta). Überwintert. Larven auf Stachys und Ballota. 5—6 und 9.
38. *Rubiconia intermedia* Wlff. Pg., Nh. Auf feuchten Wiesen, auf abgeholzten, sonnigen Waldabhängen, auf und unter Labiaten. 7—9.
39. *Staria lunata* Hhn. Pg., Nh. Auf sonnigen, trockenen Berg-halden unter Laub und Steinen, auch auf Thymus, Galium, Centaurea oder Syringa. Frühjahr und Herbst.
40. *Peribalus vernalis* Wlff. Pg., Nh. Auf Wiesen und in Wäldern; auf verschiedenen Pflanzen: Centaurea, Verbascum etc., wo auch die Larve. 5—7 und 9—10.
41. *P. sphacelatus* F. Pg., Nh. In Waldschlägen, auf sonnigen Anhöhen auf Verbascum u. a. Pflanzen.
42. *Palomena viridissima* Poda. Pg. Auf Eichen, Birken, Haseln u. a. 5—6 und 8—10.
43. *P. vir. v. simulans* Put. Pg. Herbstform.

44. *P. prasina* L. Pg. Wie Nr. 42.
45. *P. pr. v. subrubescens* Gorski. Pg. Herbstform.
46. *Chlorochroa juniperina* L. Nh. Auf Wachholder.
47. *Ch. pinicola* Muls. Nh. Auf Kiefern. 6 und 9—10.
48. *Carpocoris fuscispinus* Boh. Pg. An Disteln, Königskerzen u. a., auf Schirm- und Korbblüten. Varietät der folgenden Art.
49. *C. purpureipennis* De Geer (*nigricornis* F.). Nh. Wie vorige-Art, bzw. Var. Frühjahr und Herbst.
50. *C. lunulatus* Goeze (*lynx* F.). Pg. Auf Sanddünen mit pontischem Pflanzenwuchs, an *Artemisia* u. a.
51. *Codophila varia* F. Pg. Einmal hier gefunden.
52. *Dolycoris baccarum* L. Pg., Nh., Bb., Kb. (Moor am Veitsberg, Soosbachtal etc.) Auf Sträuchern und Kräutern gemein.
53. *Eurydema ornatum* L. Pg. An *Hypericum* (Gürtler). Auf Cruciferen. In Frankreich auf angebauten Kohlarten schädlich (Puton).
54. *E. festivum* L. Nh. An *Verbascum*, *Cardamine* u. a., auf Wiesen und an Gräben. Überwintert.
55. *E. festivum v. decoratum* H. Sch. Bei Prag (Duda).
56. *E. Fieberi* Fieber. Pg., Nh. Auf steinigten Hügeln an *Alyssum saxatile*.
57. *E. oleraceum* L. Pg., Kb. (Pirkenhammer auf *Turitis glabra*, Egerufer.) Wird dem Gemüse zuweilen schädlich. Kopula Juni. Mehrere Varietäten. April bis Oktober.
58. *Piezodorus lituratus* F. Pg., Nh. Auf verschiedenen Sträuchern und Bäumen; oft an *Sarothamnus*, *Oenothera*, auch auf Kleeefeldern. In Schlesien fand ich die Art mehrfach auf *Calamagrostis* in einer Sandgrube. Kopula Mai.
59. *P. lit. v. alliaceus* Germ. Pg. Im Mai mehrfach in Kopula auf *Spartium* und *Oenothera*.
60. *Rhaphigaster nebulosa* Poda. Pg. Auf und in der Nähe von Kulturland (Gärten, Gemüseländereien). Sonnt sich gern an warmen Mauern. Kopula Ende Mai oder Juni.
61. *Pentatoma rufipes* L. Pg., Nh., Kb. (Pirkenhammer ein Stück an *Sorbus*). Auf Bäumen und Sträuchern. Saugt auch (kranke ?) Raupen aus. Kopula im August.
62. *Acanthosoma haemorrhoidale* L. Pg., Nh. Auf verschiedenen Bäumen und Sträuchern; an den roten Früchten der Eberesche, von *Viburnum*. Kopula Juni—Juli.
63. *Elasmotethus interstinctus* L. Pg., Nh. Auf Birke, Erle, Weide, Hasel u. a., Kopula im Mai.

64. *Elasmucha ferrugata* F. Nh. Auf Vaccinium, Lonicera, Corylus, Betula u. a. Frühjahr und Herbst.
65. *Cyphostethus tristriatus* F. Nh. Besonders auf Juniperus u. a. im Spätsommer und Herbst. 5—6; 8—10.
66. *Picromerus bidens* L. Pg., Nh., Bb. Auf Sträuchern, Hecken und niederen Pflanzen. Jagt (nach Dr. Gulde) Raupen und saugt sie aus. Kopula September? Überwinterung der Eier?
67. *Arma custos* F. Pg., Nh. Auf Erlen, Birken, Weiden u. a., verfolgt Agelastica alni L. (Col.) nebst Larve. Frühjahr und Herbst.
68. *Troilus luridus* F. Pg., Nh., Bb., Kb. (Donitz a. Eger, 1 St.) An Bäumen, auf Sträuchern. In gleicher Weise nützlich wie *Picromerus* (Dr. Gulde). April bis Oktober.
69. *Rhacognathus punctatus* L. Pg., Nh. Schmiedeberg im Erzgebirge. Auf Weiden, Hartriegel (Cornus). Ich fand die Art in der Heide an Waldrändern auf Erica.
70. *Jalla dumosa* L. Pg., Nh. Meist unter niederen Pflanzen, auch an Eichen- und Haselsträuchern. Steigt an warmen Abenden an Pflanzen empor.
71. *Zicrona coerulea* L. Pg., Nh., Kb. (Wald über Freundschaftssaal, ein Stück auf Birke). Auf Eiche, Birke, Hasel u. a.; im Frühjahr und Herbst unter trockenem Laub, wo sie überwintert. Tritt zuweilen zahlreich auf, immer gleichzeitig mit kleineren Pflanzenschädlingen (Dr. Gulde), ist daher gewiß nützlich! 2—10.

2. Coreoideae.

72. *Gonocerus acuteangulatus* Goeze. Pg., Eger, Leitömschl. Auf Laubholz, Eiche, Rose, Faulbaum, Birke. Kopula Juni — Juli. Larven oft auf Faulbaum (Dr. Gulde). 5—6 und 8—10.
73. *Verlusia rhombea* L. Pg., Nh. Meist an niederen Pflanzen, steigt bei heißem Wetter hoch. Überwintert. 4—5 und 8—10.
74. *Coreus scapha* F. Pg., Nh., Kb. (Donitz a. Eger, 1 Stück gestrichen). Unter Verbascum, Euphorbia, Artemisia. Überwintert. Eine wohlriechende Wanzenart (Nickerl). Frühjahr und Herbst.
75. *Syromastes marginatus* L. Pg. Oft auf Rumex, auf Sträuchern. Überwintert. Kopula April—Mai.
76. *Spathocera laticornis* Schill. Pg., Nh. Zwischen Gras und Steinen; auf Rainen. 5—6.
77. *Sp. Dalmanni* Schill. Nh. Wie vorige, auch auf Rumex acetosella. An heißen Tagen auf niederen Pflanzen. Überwintert. Kopula Mai—Juni.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Scholz M. F. Richard

Artikel/Article: [Zur Rhynchotenfauna Böhmens. 326-328](#)