

Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V. D. E. V.

XV.

(Alle für die Stelle bestimmten Mitteilungen usw. sind grundsätzlich nur an den Obmann A. U. E. Aue, Frankfurt [Main], Cronstettenstr. 4, zu adressieren.)

Die Großschmetterlingsfauna um Frankfurt a. M. im Jahre 1929.

Von Wilhelm Lommatszsch, Tharandt (Sa.).

(Fortsetzung)

179. *Panolis griseovariegata* Goeze. Ein Falter an der Ober-
schweinstiege gefunden, 20. V. (L.). Die Raupe wurde im
Juli bei Mitteldick erbeutet (A.).
180. *Calymnia trapezina* L. 31. VII.—16. VIII. Zahlreich am Licht
und Köder, auch an Baumstämmen gefunden; Oberrad,
Babenhäuser Landstraße, Mitteldick. Sehr variabel in der
Färbung. Die Raupe fand L. im Mai, im Enkheimer Wald.
181. *Dyschorista fissipuncta* Hw. 21. VI.—11. VII. Drei Falter im
Zimmer am Licht gefangen (L.). — Auch bei Soden i. T.
182. *Plastenis retusa* L. Am 30. VII. zwei Falter an der Zimmer-
lampe gefangen (L.). — Hepp fand die Art bei Weißkirchen
i. T.
183. *Xanthia gilvago* Esp. 19. IX. und 8. X. Zwei Falter in Frank-
furt am Licht gefangen (A., Pr.).
184. *X. ocellaris* Bkh. Von Ende August bis zum 28. IX. wurden
insgesamt 7 Falter in Frankfurt gefunden: Westliche Anlagen
(H.), Hutpark am Köder (Lv.), Zoologischer Garten (Pr.).
Nach Hepp ist die Art neu für Frankfurt! Wegen der Unter-
schiede gegenüber *gilvago* Esp. vergleiche man Warnecke
im 10. Jahrg. dies. Ztschr., Seite 1 f.
185. *Orrhodia vaccinii* L. Lv. fing am 6. IX. zwei Falter am
Köder im Hutpark. — Sonst bei Frankfurt häufig.
186. *Scopelosoma satellitia* L. Falter wurden am 29. III. und von
6. IX.—21. IX. gefunden. Hutpark, Schwanheimer Wald,
Babenhäuser Landstraße, meist am Köder. — Sehr häufig im
Gebiet.
187. *Xylina ornitopus* Rott. Im April und September in Rinden-

- rissen im Stadtwald gefunden (B., L.). Eine häufige Erscheinung im Gebiet (Hepp).
188. *Calocampa exoleta* L. B. schüttelte im Oktober einen Falter im Grafenbruch aus Gebüsch. — Auch im Frankfurter Stadtwald gefunden.
 189. *Calophasia lunula* Hufn. Entgegen den Beobachtungen von Hepp, der nur eine Generation annimmt, in diesem Jahre in zwei bis drei Generationen gefunden: 2. VI. als Falter (1. Generation) (L.); 9. VI.—14. VII. als Raupe, 31. VII. und 4. VIII. als Falter und Puppe (2. Generation) (A., L.); 25. VIII.—11. IX. als Raupe; im Oktober als Raupe (vielleicht Abkömmlinge einer partiellen 3. Generation) (B.). Zwei Generationen — die zweite nur partiell, da auch dies Jahr Puppen der Juliraupe überwinterten — dürften die Regel sein. Gegenüber anderen Jahren war die Raupe ungewöhnlich häufig, bei Mitteldick an *Linaria vulgaris* Mille.
 190. *Cucullia umbratica* L. 23. VI.—3. VII. Zahlreiche Falter bei Goldstein und Oberrad bei Tage an Pfählen gefunden. (L., S.). — Hepp fing die Art bei Oberursel.
 191. *Anarta myrtilli* L. 15. V. und 31. VII. zwei Falter bei Mitteldick gefangen (L.). Raupen wurden ebendort und am Feldberg i. T. vom 31. VII. bis September einzeln an *Calluna vulgaris* Salisbury gefunden. — Auch von Hensenstamm bekannt.
 192. *Heliaca tenebrata* Sc. Diese wie die vorige bei Tage fliegende Art wurde am 22. V. im Enkheimer Wald in Anzahl beobachtet und gefangen (L.).
 193. *Heliothis dipsacea* L. Die Raupen wurden im Juni und August/September bei Mitteldick sehr zahlreich, besonders in der zweiten (Raupen-) Generation, an *Senecio viscosus* L. und *Achillea millefolium* L. gefunden (A., B., L.). — Auch im Jahre 1928 war die Raupe in dieser Gegend ungewöhnlich häufig, 1930 wurde dort auch der Falter in großer Zahl beobachtet.
 194. *Pyrria umbra* Hufn. A. und B. fanden die Raupen ziemlich häufig zusammen mit der vorigen Art. — Hepp klopfte die Raupen im Jahre 1927 bei Weißkirchen i. T. von *Ononis spinosa* L.
 195. *Erastria deceptor* Sc. Am 7. VI. fing L. den Falter am Försterwiesenweg im Stadtwald. — Im Gebiet nicht häufig.
 196. *E. fasciana* L. 16. VI.—9. VII.: Distrikt Kaisertanne im Stadt-

wald, Mitteldick, Schwanheimer Wald, Köppern i. T. (L.). B. fand die Raupe im September an der Babenhäuser Landstraße häufig unter *Rubus*, aber auch an *Molinia cerulea* Moench in der Grastränk. — Auch am Bieberer Berg festgestellt.

f. *albilinea* Hw. fing L. am 9. VII. im Schwanheimer Wald. — Im Jahre 1930 wurde diese Form von B. mehrfach aus Raupen erzogen.

197. *Rivula sericealis* Sc. Ein Falter am 11. VI. im Vilbeler Wald gefangen (L.). B. kratzte im Oktober die noch kleinen Raupen im Grafenbruch.
198. *Plusia chrysitis* L. Am 31. VIII. ein Falter in Oberrad am Licht (S.). Die Raupe wurde im Oktober in der Grastränk an Nesseln häufig gefunden (B.).
199. *P. gamma* L. Beobachtet vom 23. VI.—11. VIII. bei Tage an Blüten, nachts am Licht. Mitteldick, Eschersheim, Oberrad. Raupen wurden im August und September im Stadtwald öfters gekratzt. Das Auftreten der *Gamma*-Eule war 1929 gegenüber dem vorhergehenden Jahre recht vereinzelt.
200. *Euclidia mi* Cl. Nur zwei Falter am 29. V. und 9. VI. bei Mitteldick gefangen (L.). B. fand Raupen im September bei Goldstein. Die Art war in den vorhergehenden Jahren zwar nicht übermäßig häufig, aber doch bei weitem nicht so selten wie 1929. Im Jahre 1930 fand B. die Raupen äußerst zahlreich im Stadtwald.
201. *E. glyphica* L. In zwei Generationen Mitte Mai und Ende Juli im Schwanheimer und Enkheimer Wald lokal, aber recht zahlreich beobachtet (L.).
202. *Pseudophia lunaris* Schiff. L. fing einen ganz abgeflogenen Falter am 7. VI. am Försterwiesenweg im Stadtwald.
203. *Catocala fraxini* L. Ein ♀ am 21. IX. am Köder an der Babenhäuser Landstraße (W.).
204. *C. elocata* Esp. W. erzog am 4. VIII. einen Falter aus einer aus dem Stadtgebiet Frankfurt stammenden Raupe.
205. *C. nupta* L. Zahlreich am 21. IX. am Köder an der Babenhäuser Landstraße (W.).
206. *C. promissa* Esp. In drei Exemplaren am 15. VIII. an der Babenhäuser Landstraße am Köder (W.). — Hepp meldet die Art von Stierstadt.
207. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr. 16. VI.—30. VII. Mehrfach am Licht in Frankfurt gefangen (L.). A. und B. fanden die

- Raupe im September/Okttober bei Buchschlag und Offenbach häufig in vermodertem Laub.
208. *Z. tarsicrinalis* Knoch. Die Raupe wurde im Oktober bei Offenbach und in der Grastränk gefunden. Selten (B.). — Auch bei Cronberg i. T. festgestellt.
209. *Z. grisealis* Hb. Die Raupe im September/Okttober einzeln bei Buchschlag und im Stadtwald gefunden (B.).
210. *Z. emortualis* Schiff. 2. VI.—16. VII. Recht häufig im Zimmer am Licht gefangen (L.), ein Falter bei Mitteldick (A.). Die Raupe fand sich bei Mitteldick und Buchschlag, nicht häufig, in abgehauenen Eichenzweigen (B.).
211. *Herminia cribrumalis* Hb. B. fand nur eine Raupe im Oktober am Mörderbrunnen (Stadtwald). — 1930 dagegen war die Raupe sehr häufig im Stadtwald und Enkheimer Wald (B.).
212. *Pechipogon barbalis* Cl. 25. V.—28. VI. Im Distrikt Kaiser-tanne (Stadtwald) in Eichenstangenhölzern häufig an Stämmen (L.). Die Raupe erhielten A. und B. sehr häufig im Stadtwald durch Klopfen von Buchenzweigen, Kratzen aus Laub und Ausschütteln von Reisig. — Auch bei Soden i. T.
213. *Hypena proboscidalis* L. Die Raupe häufig im Stadtwald an Nesselblättern im Oktober, klein (B.). — Nach Hepp auch bei Rödelheim und Dillingen.
214. *Habrosyne derasa* L. B. klopfte die Raupe einzeln bei Cronberg i. T. von Brombeere, September. — Nach Hepp auch bei Oberursel und Rödelheim; ferner bei Hensenstamm.
215. *Thyatira batis* L. Einige Raupen im Stadtwald von Himbeeren geklopft, September (B.). — Auch bei Hensenstamm festgestellt.
216. *Cymatophora or* F. Die Raupen wurden im September bei Buchschlag und Oberrad gekratzt (B., S.). S. erzog daraus einen Falter der f. *unimaculata* Aur.
217. *Polyploca flavicornis* L. 2. IV. Vilbeler Wald in Birkenbeständen (L.). A. fand die Raupe an Birke bei Goldstein im Mai/Juni. — Nach Hepp auch im Enkheimer Wald.
218. *Brephos parthenias* L. Ende März zahlreich im Schwanheimer Wald in Birkenbeständen (Lv.). — Auch im Vilbeler Wald festgestellt.
219. *Pseudoterpna pruinata* Hufn. 4. VIII. ein Falter bei Mitteldick gefangen (B.). A. fand die Raupe am 3. VII. ebenda an Besenginster. — Hepp erwähnt die Art von der Sprendlinger Landstraße; ferner bei Louisa festgestellt. (Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. 33-36](#)