

Neue exotische Coleopteren (Malacodermata).

Von M. Pic.

Themus granulipennis n. sp.

Elongatus, nitidus, griseo pubescens, fere concolor et rufo-brunneus, membris pallidioribus. Capite sat elongato, thorace non latiore, postice non distincte attenuato, oculis nigris, prominulis; antennis parum elongatis et gracilibus, articulo 2^o 3^o longiore; thorace breve sat lato, lateraliter subarcuato, angulis posticis non prominulis, supra inaequale, medio bigibbuloso; elytris thorace valde latioribus, elongatis, postice vage dilatatis, minute punctatis, sparse et irregulariter granulosis, sutura et margina elevatis; pedibus sat gracilibus, elongatis, unguibus simplicibus.

Long. 15 mill. China.

Diese Art ist durch seine fast einförmige Färbung und durch die Sculptur seiner Flügeldecken gut gekennzeichnet. Sie gleicht etwas dem *C. Babaulti*, welcher selbst nahe verwandt mit *Kashmirensis* Pic (1916) ist, jedoch sind bei unserer Art die Flügeldecken kürzer, der Halsschild ist einfarbig und seine Seiten weniger gerade, der Kopf, vor den Augen, mehr vorgezogen und ohne schwarze Makeln, die Flügeldeckensculptur ist verschieden.

Stenothemus particularis n. sp.

Angustatus, parum nitidus, griseo pubescens, pallidus, pro parte brunnescens, antennis nigris, testaceo annulatis, elytris pallidis, multi, pro parte regulariter, piceo notatis. Capite elongato, postice valde et longe attenuato, antice obscuriore, oculis nigris, prominulis; antennis sat brevibus et gracilibus, articulo 3^o secundo paulo longiore; thorace breve, sat angustato, lateraliter subarcuato, angulis posticis non prominulis, lateraliter et antice deplanato, medio sulcato, elytris thorace valde latioribus, longissimis, parallelis, minute ruguloso-punctatis, apice breve subacuminatis; pedibus gracilibus et elongatis, testaceis et brunneo notatis, unguibus simplicibus.

Long. 11 mill. Yunnan.

Diese Art zeichnet sich durch eine sehr lange und schmale Form und gleichzeitig durch den Bau des Halsschildes, welcher keine vortretende Hinterecken besitzt, aus.

Hyas subcrucifer n. sp.

Oblongo-elongatus, antice paulo et postice valde attenuatus, fere opacus, niger, infra pro parte brunnescens, thorace antice et elytris ad humeros et postice externo luteo notatis. Antennis deplanatis pectinatis; thorace breve, antice valde et triangulariter attenuato, nigro, antice longitudinaliter luteo bivittato, vittis antice dilatatis et postice rubro notatis; elytris ad humeros valde dilatatis et arcuatis, postice valde attenuatis, lateraliter diverse deplanatis, medio subconvexis, in disco subsulcatis, minute et dense ruguloso-punctatis, nigris, ad humeros transverse et postice externe subtriangulare luteo notatis; abdomine fusco-piceo, uniformiter colorato; pygidio infra lateraliter paulo luteo notato.

Long. 18 mill., lat. ad humeros 12 mill. Brasilien.

Gekennzeichnet durch die besondere Form und Färbung der Flügeldecken; die schwarze Färbung stellt eine breite kreuzförmige Zeichnung vor. Von *H. ingeniosa* E. oliv. weicht diese Art, außer der Färbung, durch den kürzeren Halsschild, die gegen die Schulter erweiterte Form der Flügeldecken und die kürzeren Flügeldecken ab.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Pic Maurice

Artikel/Article: [Neue exotische Coleopteren \(Malacodermata\). 77-78](#)