

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Lep.)

Cidaria (Larentia) multistrigaria Hw.

var. *sericeata* Schwing. Karstform der *multistrigaria* (oder eigene Art?) von Südtirol. — Rundflügeliger, „im ♂ Geschlecht kleiner, weißgrau mit charakteristischem Seidenglanz, ohne eine Spur von Punkten auf den Adern; Zeichnung ähnlich wie *mult.*, aber weniger scharf hervortretend.“ ♀ mit gleicher Zeichnung und Farbe, gleich groß und größer, Flügelform nicht schmal und gestreckt wie *multistrigaria*-♀. Ganz verschieden von der spanischen *olbiaria* Mill. [Leo Schwingenschuss-Wien, Verhandl. zool.-bot. Ges., Wien, 1924/5, 74./5., S. (142)].

Cidaria (Larentia) badiata Schiff. (Hb.)

Forma *atrox* Schwing. Ein durch Zucht erhaltenes ♀ zeigt „mit Ausnahme des weißen Punktes im Saumfeld, eines gelbbraunen Fleckchens um den Mittelpunkt und einer wolkigen gelbbraunen Aufhellung im Mittelfeld, den ganzen Vfl. veilblau verdunkelt, zeichnungslos. Auch die Hfl. erscheinen stark rotgrau verdunkelt.“ — [Leo Schwingenschuss-Wien, Verhandl. zool.-bot. Ges., Wien, 74./5., 1924/5, S. (143)].

Cidaria (Larentia) Bubaceki n. sp. Reisser.

Zwischen *C. caesiata* Lang und *flavicinctata* Hb. stehend. „Durch das Überwiegen der blaugrauen und goldgelben Töne, sowie die beim ♂ ganz hellen Hinterflügel macht diese Art einen viel bunteren und kontrastreicherem Eindruck.“ Es folgen fünf Seiten Beschreibung. Sierra Nevada (Spanien), in ca. 2000 Meter Höhe. (Reisser, Zeitschr. öst. Entom. Vereins, Wien, XI., 1926, Nr. 11.)

Cidaria (Larentia) Bubaceki Reisser

ab. *deaurata* Reisser. Die goldgelbe Beschuppung fehlt. (Wie vor.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Lep.\). 83](#)